LAÉRCIO VASCONCELOS

O ALGEBRISTA

TEORIA E EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO E REVISÃO

5400 EXERCÍCIOS + 1300 QUESTÕES

PREPARATÓRIO PARA COLÉGIO NAVAL, EPCAR, COLÉGIO MILITAR (ENSINO MÉDIO) EMBASAMENTO PARA IME, ITA, EFOMM, ESPCEX, VESTIBULARES

VOLUME 01

LVC

WWW.LAERCIO.COM.BR

Scanned by CamScanner

LAÉRCIO VASCONCELOS

O ALGEBRISTA

Volume 1

Rio de Janeiro

2016

LAÉRCIO
VASCONCELOS
COMPUTAÇÃO

Scanned by CamScanner

O ALGEBRISTA VOLUME 1
Copyright © 2016, Laércio Vasconcelos Computação LTDA

DIREITOS AUTORAIS

Este livro possui registro na Biblioteca Nacional e está cadastrado no sistema ISBN. Nenhuma parte deste livro pode ser reproduzida ou transmitida por qualquer forma, eletrônica ou mecânica, incluindo fotocópia ou qualquer outro meio de armazenamento sem a permissão do autor.
Lei 9.610/1998

Título
O ALGEBRISTA VOLUME 1
ISBN: 978-85-86770-22-7

Autor
Eng. Laércio Vasconcelos

Supervisora de Marketing
Sirléia Damázio

Capa
Rafael Conde

Ilustrações
Sergio Luiz Correia de Vasconcelos

Laércio Vasconcelos Computação
Rua Almirante Cochrane, 33 sl 201, Tijuca
Rio de Janeiro RJ CEP 20.550-040
Tel (21) 2210-2888
www.laercio.com.br

Scanned by CamScanner

Para minha irmã querida, Rosana Maria

Scanned by CamScanner

ÍNDICE

CAPÍTULO 1: Números inteiros.....1
O início da álgebra.....1
Conjuntos numéricos.....1
Números naturais.....2
O número 0.....2
Números inteiros.....3
Números racionais.....4
Números irracionais.....6
Números reais.....6
Números complexos ou imaginários.....7
Operações com números inteiros.....8
Adição de inteiros.....9
Exercícios.....11
Módulo ou valor absoluto.....12
Adição de inteiros de sinais diferentes.....12
Exercícios.....13
Soma algébrica.....14
Comparação de inteiros.....15
Exercícios.....16
Subtração de inteiros.....16
Exercícios.....17
Expressões com adição e subtração de inteiros.....18
Corta-corta.....20
Exercícios.....21
Eliminação de parênteses.....21
Exercícios.....23
Parênteses, chaves e colchetes.....24
Multiplicação e divisão de inteiros.....24
Produto com mais de dois fatores.....26
Exercícios.....27
Expressões combinando multiplicações e divisões.....27
Exercícios.....27
Exercícios.....28
Potenciação de números inteiros.....28
Exercícios.....29
Propriedades das potências.....30
Exercícios.....31
Expressões com números inteiros.....32
Sequência de adições e subtrações.....33
Exercícios.....33
Sequência de multiplicações e divisões.....33

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Encontrando a fração geratriz....66
Fatoração de números naturais....66
MMC....67
Comparação de frações....68
Exercícios de revisão sobre frações....69
Lidando com sinais....72
Exercícios....74
Simplificação....74
Exercícios....75
Adição e subtração de números racionais....75
Comparação de números racionais....78
Exercícios....79
Multiplicação e divisão de números racionais....80
Inverso ou recíproco....82
Fração de fração....83
Expressões com adição, subtração, multiplicação e divisão de racionais....83
Organize o rascunho....84
Exercícios....86
Propriedades das operações com números racionais....88
Propriedade de fechamento da adição....89
Propriedade do elemento neutro da adição....89
Propriedade comutativa da adição....90
Propriedade associativa da adição....90
Propriedade de fechamento da multiplicação....90
Propriedade do elemento neutro da multiplicação....90
Propriedade comutativa da multiplicação....90
Propriedade associativa da multiplicação....91
Propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição e subtração....91
Potências de números racionais – expoentes positivos....91
A ordem correta....92
Exercícios....95
Exercícios....96
Propriedades das potências....96
Exercícios....97
Exercícios....98
Exercícios....100
Potências de números racionais – expoentes negativos....101
Exercícios....103
Raízes de números racionais....104
Exercícios....106
Cuidado com o sinal negativo....107
Exercícios....108

Scanned by CamScanner

Expoentes 1/2 e 1/3 109
Exercícios 111
A raiz quadrada negativa? 111
Expressões com números racionais 113
Exercícios 115
Extração de raiz quadrada 118
Números irracionais 122
Números reais 124
Operando com números reais 126
Exercícios de revisão 127
Detonando uma prova – Questão 11 133
Respostas dos exercícios 134
Detonando uma prova – Questão 11 141

CAPÍTULO 3: Expressões algébricas 143
Questões clássicas 143
Termos e expressões 143
Termo algébrico 143
Termos semelhantes 144
Redução de termos semelhantes 145
Expressões algébricas 145
Valor numérico 146
Exercícios 146
Classificação de expressões algébricas 146
Exercícios 147
Monômio e polinômio 148
Binômios e trinômios 148
Grau de um monômio ou polinômio 149
Polinômio homogêneo 149
Polinômio em x 149
Polinômio completo 149
Completar e ordenar P(x) 150
Exercícios 150
Operações com monômios 151
Adição e subtração de monômios 151
Exercícios 151
Multiplicação de monômios 151
Exercícios 152
Potências de monômios 152
Exercícios 153
Divisão de monômios 153
Exercícios 153

Scanned by CamScanner

Monômios não divisíveis....153
Exercícios....154
Distributividade....154
Exercícios....155
Adição e subtração de polinômios....156
Exercícios....157
Multiplicação de polinômios....158
Outro método para armar a multiplicação....160
Exercícios....161
Divisão de polinômios....161
Divisão de polinômio por monômio....161
Exercícios....162
Divisão de dois polinômios....163
Teorema do resto....166
Exercícios....167
Potências de um polinômio....167
Exercícios....168
Expressões envolvendo polinômios....168
Exercícios....171
Exercícios de revisão....171
Soluções dos exercícios....182

CAPÍTULO 4: Produtos notáveis....189
Para ganhar tempo....189
$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$....189
Interpretação geométrica....193
Não confunda....194
Exercícios....195
$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$....195
Exercícios....196
Interpretação geométrica....198
Não confunda....199
$(a+b+c)^2$....200
Exercícios....200
$(a+b).(a-b) = a^2 - b^2$....200
Exercícios....203
Produto de Stevin: $(x+a).(x+b) = x^2 + Sx + P$....203
Exercícios....204
Exercícios....205
Exercícios....206
Exercícios....207
Interpretação geométrica....207

Scanned by CamScanner

Derivados do Produto de Stevin 207
(x+a).(x+b).(x+c) 207
(a+1).(b+1) 208
(a+1).(b+1).(c+1) 208
Exercícios 209
Cubos da soma e da diferença 209
$(a+b)^3$ 209
$(a-b)^3$ 210
Exercícios 210
Soma e diferença de cubos 211
$(x + 1/x)^n$ 212
Exercícios de revisão 214
Respostas dos exercícios 218

CAPÍTULO 5: Fatoração 223
Usar expressões racionais 224
Fatoração por evidência 225
Exercícios 227
Interpretação geométrica da fatoração por evidência 227
Exercícios 228
Fatoração por agrupamento 228
Exercícios 229
Interpretação geométrica da fatoração por evidência 230
Exercícios 230
Fatoração por quadrados e cubos 230
Exercícios 231
Exercícios 232
Exercícios 233
Fatoração por diferença de quadrados 233
Exercícios 233
Exercícios 234
Exercícios 234
Soma e diferença de cubos 234
Exercícios 235
Trinômio do segundo grau na forma $x^2 + bx + c$ 235
Exercícios 236
Trinômios que não podem ser fatorados 237
Exercícios 238
Trinômio do segundo grau na forma $ax^2 + bx + c$ 238
Justificativa do método da fatoração de $ax^2 + bx + c$ 239
Exercícios 240
Exercícios 241

Scanned by CamScanner

Fatorações combinadas **241**
Exercícios 242
Fatoração por "mágica" **242**
Polinômios 245
Fatoração em provas e concursos **247**
Exemplo: EPCAr 2010 – Expressões algébricas complexas 247
Exemplo: CMRJ 2015 – Expressões algébricas e equações 248
$x^n - y^n$ e $x^n + y^n$ **249**
$x^n - y^n$ 249
$x^n + y^n$ 250
Exercícios de revisão **250**
Respostas dos exercícios **256**

CAPÍTULO 6: MMC e MDC **263**
Problemas sobre MMC e MDC **263**
Fatores numéricos e algébricos **263**
Recordando o MDC e o MMC de números naturais **264**
MDC e o MMC de expressões algébricas **265**
Exercícios 266
Exercícios 266
MDC e simplificação de frações algébricas **267**
Exercícios 267
MMC e redução ao mesmo denominador **267**
Exercícios 268
Casos especiais **268**
Exercícios de revisão **270**
Respostas dos exercícios **272**

CAPÍTULO 7: Frações algébricas **275**
Obrigatório para concursos **275**
Simplificação de frações algébricas **276**
Um erro clássico 277
Para simplificar frações com monômios 278
Exercícios 278
Exercícios 279
Exercícios 280
Exercícios 281
Multiplicação de frações algébricas **281**
Exercícios 283
Frações algébricas com sinais negativos 283

Scanned by CamScanner

Exercícios.....286
Divisão de frações algébricas.....286
Exercícios.....289
Adição e subtração de frações algébricas.....289
Denominadores que simplificam.....291
Exercícios.....291
Exercícios de revisão.....292
Respostas dos exercícios.....301

CAPÍTULO 8: Equações do primeiro grau.....307
Facilidade ou dificuldade?.....307
Igualdades.....307
Equações de primeiro grau.....308
Exercícios.....309
Método de resolução.....309
Exercícios.....313
Discussão de uma equação do primeiro grau.....314
x=0 é solução determinada.....317
Exercícios.....318
Equações equivalentes.....319
Inequação.....319
Exercícios.....320
Equação fracionária.....320
Exercícios.....323
Equação modular.....323
Exercícios de revisão.....324
Respostas dos exercícios.....330

CAPÍTULO 9: Sistemas de equações do primeiro grau.....333
Uma incógnita, duas incógnitas, três incógnitas.....333
Método da substituição.....334
Exercícios.....336
Método da adição.....336
Exercícios.....337
Método da comparação.....337
Exercícios.....338
Método dos determinantes.....340
Demonstração.....342
Cuidado com a "pegadinha" das posições trocadas.....343
Colocando em evidência.....343

Scanned by CamScanner

Exercícios....343
Sistemas literais....344
Exercícios....344
Sistemas com 3 equações e 3 incógnitas....345
Exercícios....346
Sistemas fracionários....347
Exercícios....348
Sistemas possíveis e determinados....349
Retas concorrentes....349
Sistemas impossíveis....350
Retas paralelas....351
Sistemas indeterminados....351
Retas coincidentes....352
Exercícios....353
Exercícios de revisão....354
Respostas dos exercícios....362

CAPÍTULO 10: Problemas do primeiro grau....365
Problema, equação, solução....365
Exercícios....368
Problemas envolvendo idades....369
Exercícios....371
Problemas de torneiras....371
Exercícios....375
Diagramas - "entendeu ou quer que eu desenhe? "....375
Exercícios....378
Problemas de espaço, tempo e velocidade....379
Exercícios....381
Problemas de misturas....382
Exercícios....388
Problemas de juros....389
Exercícios....391
Problemas do segundo grau....392
Diminuir, subtrair....394
Exercícios de revisão....395
Respostas dos exercícios....409
Resoluções de exercícios selecionados....412

CAPÍTULO 11: Conjuntos e tópicos sobre ANÁLISE....425
Análise e álgebra....425

Scanned by CamScanner

O número zero 426
0, 1, 2 426
Conjuntos 426
O conjunto dos números naturais 426
O conjunto dos números racionais positivos 426
Exemplos de conjuntos 427
Pertinência 427
Conjunto vazio 427
Exercícios 427
Representação por enumeração 428
Representação por diagrama 428
Representação por propriedade 429
Conjunto unitário 429
Conjuntos equivalentes 430
Exercícios 430
Subconjunto 430
Pertence ou está contido? 431
Conjunto universo 432
Exercícios 432
Operações com conjuntos 433
União de conjuntos 433
Interseção de conjuntos 434
Diferença de conjuntos 435
Complementar 436
Exercícios 437
Diagrama de Venn para 3 conjuntos 437
Diferença simétrica 438
Número de elementos 439
Número de subconjutnos 441
Conjunto das partes 442
Exercícios 443
Intervalos 443
Operações com intervalos 445
Máximos e mínimos de intervalos 448
Médias 449
Média aritmética 449
Média geométrica 449
Média harmônica 450
Desigualdade das médias 450
Média ponderada 451
Plano cartesiano 452
Relações e funções 453
Diagrama de setas 454
Produto Cartesiano 455

Scanned by CamScanner

Função....456
Domínio, contradomínio, imagem....456
Função linear e função afim....458
Sistemas de equações e interseção de gráficos....459
Exercícios de revisão....460
Respostas dos exercícios....470
Resoluções de exercícios selecionados....472

CAPÍTULO 12: Inequações do primeiro grau....479
A forma final da inequação do 1º grau....479
Exercícios....482
Conjunto solução....482
Inequações fracionárias....482
Exercícios....484
Sistemas de inequações....484
Exercícios....485
Inequações com duas variáveis....485
Equações com módulo....487
Inequações com módulo....488
Inequações "indeterminadas" e impossíveis....489
Módulo....489
$|2x - 8| < 6$....490
$|x - a| < |x - b|$....490
Exercícios....490
União e interseção?....491
Exercícios de revisão....492
Respostas dos exercícios....495
Resoluções de exercícios selecionados....495

CAPÍTULO 13: Equações do segundo grau....499
Equações do segundo grau....499
Formas incompletas....499
Exercícios....500
Equações do 2º grau impossíveis....500
Forma fatorada....501
Exercícios....502
Exercícios....502
Resolução por soma e produto....502
Exercícios....503
Completando quadrados....503

Scanned by CamScanner

Exercícios....504
Fórmula geral da resolução....504
Exercícios....505
Exercícios....506
Discussão pelo discriminante....506
Exercícios....507
Gráfico do trinômio do segundo grau....507
Relações entre coeficientes e raízes....509
Soma das raízes....509
Produto das raízes....509
Diferença das raízes....510
Outras operações com as raízes....510
Exercícios....510
Resolvendo mentalmente – I (soma e produto)....511
Resolvendo mentalmente – II....511
Exercícios....512
Exercícios de revisão....513
Respostas dos exercícios....523
Resoluções de questões selecionadas....527

CAPÍTULO 14: Cálculo de radicais....537
Operações com potências de expoentes racionais....537
Radical, radicando, índice....539
Operações básicas....539
Simplificação do índice....539
Adição (e subtração) de radicais....539
Colocar fora do radical....539
Colocar dentro do radical....540
Multiplicação e divisão de radicais....540
Operações algébricas com radicais....540
Potenciação de radicais....540
Redução ao mesmo índice....540
Comparação....541
Cuidado com o sinal....541
Exercícios....542
Racionalização de denominadores....544
Exercícios....545
Radicais duplos....545
A fórmula de transformação....546
Exercícios....548
Raízes para lembrar....548
Exercícios de revisão....549

Scanned by CamScanner

Respostas dos exercícios **556**
Resoluções de exercícios selecionados **560**

CAPÍTULO 15: Equações redutíveis ao segundo grau **567**
Equações biquadradas **567**
Exercícios 568
Equações irracionais **568**
Exercícios 570
Outras equações redutíveis **570**
Exercícios de revisão **571**
Respostas dos exercícios **577**
Soluções de exercícios selecionados **578**

CAPÍTULO 16: Sistemas do segundo grau **583**
Sistemas não lineares **583**
Alguns exemplos **583**
É álgebra ou aritmética? 585
Exercícios de revisão **586**
Respostas dos exercícios **590**
Resoluções de exercícios selecionados **591**

CAPÍTULO 17: Inequações do segundo grau **595**
Cuidado com o sinal **595**
Inequação com trinômio do segundo grau **595**
Exercícios 598
Inequação fracionária **598**
Exercícios 600
Outras inequações **600**
Inequação com módulo 601
Inequação com exponencial 602
Exercícios 603
Exercícios de revisão **603**
Respostas dos exercícios **606**
Resoluções selecionadas **607**

Scanned by CamScanner

CAPÍTULO 18: Problemas do segundo grau 613
Exemplos 613
Exemplo 1 613
Exemplo 2 614
Exemplo 3 614
Exemplo 4 615
Exemplo 5 615
Aritmética avançada: nem sempre as equações resolvem 616
Exemplo 6 616
Exercícios 618
Respostas dos exercícios 619
Resoluções selecionadas 619

CAPÍTULO 19: Funções 621
Domínio 621
Exercícios 622
Função composta 622
Função afim 624
Função injetiva ou injetora 624
Translação de eixos 625
Função par e função ímpar 627
Função identidade 628
Função inversa 629
Exercícios de revisão 630
Respostas dos exercícios 632
Resoluções selecionadas 633

CAPÍTULO 20: Trinômio do segundo grau 637
O último tópico 637
Trinômio do 2º grau 637
Função quadrática ou polinomial do 2º grau 637
Equação do 2º grau 637
Gráfico da função quadrática 638
O gráfico 638
O vértice da parábola 639
Exercícios 640
A concavidade 640
Cortando os eixos 642
Soma e produto das raízes 643
Exercícios de revisão 643

Scanned by CamScanner

Respostas dos exercícios.....649
Resoluções selecionadas.....650

CAPÍTULO 21: Polinômios.....655
Polinômios identicamente iguais.....655
Polinômios idênticos.....655
Polinômios iguais para alguns valores.....656
Exercícios.....657
Separação em frações.....657
Equações envolvendo polinômios.....659
Divisibilidade entre polinômios.....659
Teorema do resto.....660
Exercícios.....660
Teorema das raízes racionais.....661
Teorema de Bolzano.....663
Relações de Girard.....663
Exercícios.....664
Exercícios de revisão.....664
Respostas dos exercícios.....669
Resoluções selecionadas.....670

Scanned by CamScanner

Capítulo 1

Números inteiros

O início da álgebra

Em um curso de matemática em nível intermediário, não é possível começar com "1 + 1 = 2". Por isso a maioria dos cursos e livros deste nível partem do princípio que os alunos já possuem conhecimentos básicos, como frações, operações com números naturais, etc. É comum nesses livros que partam também do princípio de que os alunos já sabem operar com números inteiros negativos. Também devido a isso, não são cobradas questões sobre essa parte inicial da álgebra em concursos como Colégio Naval, Colégio Militar, EPCAr e similares. Entretanto muitos alunos trazem do ensino fundamental, deficiências antigas no aprendizado de números negativos e expressões numéricas envolvendo esses números.



Alunos do Colégio Naval

Por isso, este livro apresenta seus dois capítulos iniciais com esses assuntos, que servem como uma revisão sobre essa parte inicial da álgebra. O leitor notará que ao contrário dos demais capítulos, este praticamente não apresenta questões de concursos, justamente porque são raríssimas tais questões sobre os primórdios da álgebra. Ainda assim, traz uma grande quantidade de exercícios, que visa sanar as deficiências, permitindo um embasamento para um bom aprendizado da álgebra nos capítulos restantes.

Conjuntos numéricos

A álgebra é uma parte da matemática estudada a partir do 6º ou 7º ano do ensino fundamental. Antes disso, predomina o estudo da aritmética, que trata principalmente das operações com números naturais e os números racionais positivos. No início da álgebra, aprendemos os números inteiros negativos e suas operações, depois os números racionais, tanto positivos quanto negativos. Finalmente são estudados os números irracionais e os números reais. Esta álgebra básica estudada nas últimas séries do ensino fundamental é necessária à continuação da matemática no ensino médio e superior. A álgebra é bastante cobrada em provas de concursos realizados no final do ensino fundamental e do ensino médio.

Neste capítulo apresentaremos os conjuntos numéricos, desde o conjunto dos números naturais, explorado nas primeiras séries do ensino fundamental, até os números reais e

Scanned by CamScanner

números complexos. Estudaremos mais detalhadamente neste capítulo as operações com números inteiros. O estudo detalhado dos demais conjuntos numéricos será feito nos próximos capítulos.

Existem vários tipos de álgebra. Por exemplo, a chamada *álgebra booleana* é a base do funcionamento dos computadores. Os números usados na álgebra booleana assumem dois valores: 0 e 1, ou Verdadeiro e Falso. As operações básicas da álgebra booleana não são as mesmas usadas na aritmética e na álgebra do ensino fundamental (adição, subtração, multiplicação, divisão, etc.), mas sim, operações lógicas como AND (e), OR (ou) e NOT (não). O desenvolvimento da álgebra booleana, partindo dessas três operações, permitiu o desenvolvimento dos computadores, desde os mais antigos, até os mais modernos.

A álgebra que nos interessa aqui é a que envolve os números reais, usados extensivamente na matemática, física, engenharia e ciências correlatas. Nossa primeira providência será então apresentar os conjuntos numéricos que você já conhece, e novos conjuntos, até chegarmos ao conjunto dos números reais.

Números naturais

O desenvolvimento da matemática surgiu da necessidade de contar objetos. Daí surgiram os primeiros números:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ...

O número 0

Inicialmente não havia o número 0, e sim, o *algarismo 0*. Era usado apenas para representar números que não tinham quantidades inteiras de determinadas ordens. Por exemplo, o número 408 possui 4 centenas e 8 unidades (ordens), mas não possui uma dezena completa. O zero era usado apenas como algarismo para dar esta indicação. Somente muito depois do surgimento dos números naturais, foi criado o número zero como indicação de ausência de quantidade.

No ensino fundamental e no ensino médio, praticamente todos os autores consideram o 0 como um número natural, mas nos estudos mais avançados de matemática pura, o 0 não é considerado como um número natural. Como este livro é voltado para o final do ensino fundamental, será usada a convenção dos autores da área, de que 0 é um número natural. Portanto no nosso contexto, que é o mesmo adotado pelos concursos correlatos (Colégio Naval, EPCAr, Colégio Militar, etc.), de que o conjunto dos números naturais inclui o 0.

$N = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ... \}$

Este é o conjunto dos números naturais, indicado com a letra N maiúscula. Note que é errado dizer que N é o conjunto dos números inteiros positivos, pois o número 0 pertence a N entretanto não é positivo (0 não é positivo nem negativo). Quando nos referimos apenas aos números inteiros positivos, ou seja, os números naturais excluindo o zero, temos o chamado conjunto N*:

$N^* = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ... \}$

Tanto N quanto N* são conjuntos infinitos. A única diferença entre eles é o número 0.

Conjuntos de números podem ser representados graficamente através das chamadas "retas numéricas". A figura abaixo mostra como uma reta numérica poderia ser usada para

Scanned by CamScanner

representar os números naturais. A reta numérica é uma espécie de "régua infinita", na qual são marcados os números. No caso dos naturais, uma extremidade da régua tem o número 0. A partir daí são marcados os demais números, de um em um. O conjunto dos números naturais ocupa apenas os pontos da reta numérica que correspondem às marcações inteiras, e não os pontos localizados entre essas marcações. Por exemplo, não existem números naturais compreendidos no espaço entre 0 e 1, nem no espaço entre 1 e 2, nem no espaço entre 2 e 3, etc. Veremos a seguir que outros conjuntos numéricos como os racionais, irracionais e reais possuem elementos compreendidos entre as marcações inteiras.



Números inteiros

O conjunto dos números inteiros é uma ampliação do conjunto dos naturais. A diferença é que números inteiros também podem ser negativos. Por exemplo, assim como existe o número 5, existe também o número –5. Usamos a letra Z maiúscula para indicar o conjunto dos números inteiros:

$Z = \{... -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ...\}$

Para cada número inteiro positivo, existe um inteiro negativo correspondente. Por exemplo, assim como existe o número 1000, existe também o número –1000. Quando um número é positivo, não precisamos, e não é de costume, indicar o sinal. Portanto +20 é o mesmo que 20, por exemplo.

Observe que todos os números naturais são também inteiros. Isso é o mesmo que dizer que o conjunto dos números naturais *está contido* no conjunto dos números inteiros. Matematicamente escrevemos isso da seguinte forma:

$N \subset Z$ (lê-se: N está contido em Z)

Em várias situações da vida real, é necessário usar números negativos. Alguns exemplos:

a) Se uma pessoa não tem dinheiro algum e ainda deve R$ 10,00 a um amigo, isso é o mesmo que dizer que ela tem –R$ 10,00, ou 10 reais negativos.

b) À temperatura na qual a água se transforma em gelo, convencionou-se na física chamar de 0 grau centígrado (0°C). Temperaturas mais frias são chamadas de negativas. Por exemplo, em um congelador é comum encontrar temperaturas na faixa de –5°C, em um freezer é comum chegar a –20°C.

c) Se um carro está andando de marcha-à-ré com velocidade de 10 km/h, podemos dizer que sua velocidade na verdade é –10 km/h.

d) Se em um jogo perdemos 20 pontos, é o mesmo que dizer que ganhamos –20 pontos.

e) Se subimos em um monte com altura de 30 metros, dizemos que estamos a 30 metros acima do solo. Se por outro lado descemos em um buraco com 20 metros, é o mesmo que dizer que estamos a uma altura de –20 metros.

Scanned by CamScanner

f) Dizer que uma empresa lucrou –10 milhões é o mesmo que dizer que teve um prejuízo de 10 milhões.

g) Se um automóvel andava a 60 km/h e passou para 80 km/h, dizemos que sua velocidade variou 20 km/h. Por outro lado, se o automóvel estava a 60 km/h e passou para 50 km/h, podemos dizer que variou –10 km/h. A variação negativa indica uma diminuição, enquanto a variação positiva indica um aumento.

Vemos então que, mesmo sendo muito mais comum e natural encontrar números positivos, várias situações nos levam à necessidade de usar números negativos.

Números inteiros também podem ser representados em uma reta numérica. A diferença é que essa reta se estende ao infinito, nos dois sentidos. O número zero deve ser representado na reta, à sua esquerda ficam os números negativos, e à sua direita os números positivos.



Já vimos que todo número natural é também um número inteiro, ou seja, o conjunto Z contém o conjunto N, o que é o mesmo que dizer que conjunto N está contido no conjunto Z. Escrevemos então:

$N \subset Z$

Podemos representar isso através de um *diagrama de Venn*, muito usado na teoria dos conjuntos:



Já citamos também que o conjunto N* é o conjunto N excluindo o número zero, ou seja, o conjunto dos números inteiros positivos. O conjunto Z também tem alguns subconjuntos que devem ser notados:

$Z^* = \{... -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, ... \}$ = conjunto dos números inteiros não nulos
$Z_+ = \{0, 1, 2, 3, 4, ...\}$ = conjunto dos números inteiros não negativos = N
$Z_+^* = \{1, 2, 3, 4, ...\}$ = conjunto dos números inteiros positivos = N*
$Z_- = \{..., -4, -3, -2, -1, 0\}$ = conjunto dos números inteiros não positivos
$Z_-^* = \{..., -4, -3, -2, -1\}$ = conjunto dos números inteiros negativos

Números racionais

O próximo conjunto é o chamado "conjunto dos números racionais", representado por Q. Este conjunto reúne todos os números inteiros, e mais as frações, positivas e negativas. Portanto o conjunto Q contém números como 2/5, –1/7, –4/9, 1/6, enfim, qualquer fração na forma p/q,

Scanned by CamScanner

onde p e q sejam primos entre si (caso contrário estaríamos contando frações repetidas, de mesmo valor), e desde que q não seja 0 (já que não existe divisão por 0). Esta definição inclui também todos os números inteiros, basta fazer q=1.

Nas primeiras séries do ensino fundamental, estudamos as frações, mas somente as positivas. Podemos então dizer que foi estudado o conjunto dos números racionais não negativos. Ao iniciarmos o estudo da álgebra, finalmente podemos abordar o conjunto completo dos números racionais, abrangendo os positivos e os negativos (e o zero, é claro, que também é número racional).

Observe que o conjunto Q engloba o conjunto Z, ou seja, todo número inteiro é também um número racional. Isso é o mesmo que dizer que Z está contido em Q. Escrevemos então:

$$Z \subset Q$$

Como por sua vez, N está contido em Z, podemos escrever:

$$N \subset Z \subset Q$$

O diagrama de Venn abaixo mostra a relação entre os três conjuntos.



Os números racionais também fazem parte da reta numérica. Entretanto é difícil fazer esta representação, já que entre cada dois números inteiros consecutivos, existem infinitos números racionais. A figura abaixo mostra um pequeno trecho da reta numérica, compreendido entre 0 e 1, e alguns dos infinitos números racionais localizados neste intervalo.



É claro que seria impossível indicar todos os números racionais neste intervalo. Indicamos alguns números na forma decimal (0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,75), que como sabemos, são iguais a frações (1/10, 1/5, 3/10, 2/5, 3/4). Indicamos ainda algumas frações. Todas as frações próprias positivas estão neste intervalo, pois são menores que 1 (numerador é menor que o denominador). Escolhemos apenas algumas delas para serem indicadas.

O conjunto dos números racionais é tão denso que mesmo em um pequeno intervalo da reta numérica (por exemplo, o intervalo entre 0 e 1 do exemplo acima) existem infinitos números racionais. Se cada um desses números for marcado com um pequeno ponto, os números racionais desse intervalo formariam uma linha "cheia", ou seja, sem nenhuma lacuna. Dados

Scanned by CamScanner

dois números racionais quaisquer, por mais próximos que sejam, sempre existirão entre eles, infinitos outros números racionais.

Na verdade, mesmo estando a linha "cheia", ainda existem pontos "vazios", que são os números irracionais, apresentados no próximo item.

Números irracionais

Nem todos os números podem ser expressos na forma de uma fração, ou seja, a razão entre dois números inteiros. Todos os números que não podem ser expressos como fração (ou seja, que não são números racionais), são ditos *números irracionais*. Usamos a letra I para representar esse conjunto, que também é infinito. Por exemplo, o número $\sqrt{2}$ é irracional. Nunca poderemos encontrar dois números inteiros p e q, de tal forma que p/q seja igual à raiz quadrada de 2, ou seja que elevando (p/q) ao quadrado, encontremos como resultado o número 2. Números irracionais apresentam infinitas casas decimais que não se repetem. Por exemplo, o número $\sqrt{2}$ pode ser expresso, aproximadamente, por:

1,414213562373095048801688724209 7...

Se continuarmos realizando o cálculo da raiz quadrada, indefinidamente, nunca encontraremos uma sequência que passa a repetir, como ocorre nas dízimas periódicas. Lembramos que dízimas periódicas são equivalentes a frações (chamadas de *fração geratriz*). Por exemplo:

1/7 = 0,142857142857142857142857142857 14...

Vemos que a sequência 142857 é repetida indefinidamente, já que se trata de um número racional. Já com números irracionais, podemos até encontrar trechos repetidos, mas nunca um trecho que se repita indefinidamente.

Todas as raízes inexatas, como $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{5}$, $\sqrt{7}$, $\sqrt{20}$, etc., são números irracionais. Também são aqueles mais complexos, que envolvem raízes cúbicas e superiores, e raízes dentro de raízes. Existem também números irracionais que não podem ser expressos na forma de raízes. Por exemplo, o número π, sem dúvida um dos mais famosos números irracionais, muito usado na geometria, que dá a razão entre o perímetro e o diâmetro da circunferência.

π = 3,14159265358979323846264338327 95...

Números reais

Se unirmos todos os números racionais (Q) e todos os números irracionais (I), o resultado será o conjunto dos números reais (R). Usando a terminologia de conjuntos, isso é o mesmo que dizer:

$R = Q \cup I$

O diagrama abaixo mostra a relação entre os conjuntos I, R e Q. Note que I é apenas a faixa escura que está dentro de R mas fora de Q, indicada na figura.

A relação entre Q, Z e N já era nossa conhecida:

$N \subset Z \subset Q$

Scanned by CamScanner

Já o conjunto dos números irracionais (I) não tem elementos em comum com Q (dizemos que Q e I são disjuntos). Se partirmos de Q e adicionarmos o conjunto I, o conjunto total será R.

O conjunto I também tem infinitos elementos, e é extremamente denso. Se marcarmos na reta numérica, todos os pontos que são números irracionais, a indicação de todos esses pontos formará uma linha cheia. Entre dois números racionais quaisquer, sempre existirão infinitos números irracionais.

OBS.: É comum encontrar o termo "números relativos". Essa expressão diz respeito aos conjuntos Z, Q, I e R, cujos elementos podem ser positivos ou negativos, além do zero, é claro.



Números complexos ou imaginários

Os números complexos não serão estudados neste livro, pois não fazem parte do programa do ensino fundamental. São estudados no ensino médio e em cursos de matemática, física e diversos ramos da engenharia. Este conjunto é representado por **C** e contém o conjunto dos números reais. Números complexos são formados a partir da raiz quadrada de –1, que como sabemos, não existe no conjunto dos reais. É criado então o conjunto C, cujos números possuem uma parte real e uma parte imaginária. Convencionou-se chamar de i o número complexo que elevado ao quadrado resulta em –1, ou seja:

$$i = \sqrt{-1}$$

Valem para os números complexos, propriedades algébricas muito parecidas com as dos números reais. Por exemplo:

$$\sqrt{-16} = \sqrt{16}.\sqrt{-1} = 4i$$

Todos os múltiplos de i são números complexos, entretanto, os números complexos também podem ser formados pela soma de uma parte imaginária e uma parte real, por exemplo:

5 + 4i

A forma geral de um número complexo é a+bi, onde a e b são reais. Quando b=0, temos apenas a parte real, portanto todos os números reais atendem à definição de números

Scanned by CamScanner

complexos, por isso $R \subset C$. Quando a=0, o número tem apenas a parte imaginária, dizemos então que se trata de um número *imaginário puro*.

O algebrismo dos números complexos não chega a ser difícil. Basta tratar o número i como se fosse uma letra qualquer, e chegando ao resultado, substituir i^2 por -1.

Números complexos não são representados em uma reta numérica, e sim, através de duas retas numéricas perpendiculares, com um eixo para a parte real e um eixo para a parte imaginária. Os números complexos são representados pelo plano assim formado.



A figura acima apresenta o plano complexo. O eixo horizontal é chamado de *eixo real*. O eixo vertical é chamado de *eixo imaginário*. Todos os pontos do plano assim formado representam números complexos. Os pontos do eixo real são os números reais. Os pontos do eixo imaginário são números imaginários puros. Todos os demais pontos possuem parte real e parte imaginária. A figura mostra ainda a localização de alguns números complexos: 5+4i, 2-3i, -4+6i e -3-4i. A parte real de um número complexo é a sua projeção no eixo real, e a parte imaginária é a sua projeção no eixo imaginário.

Porque estamos ensinando isso se a matéria não faz parte do ensino fundamental? Porque existe uma matéria do ensino fundamental, ensinada neste livro, que usa também sistemas de eixos perpendiculares: o sistema de coordenadas cartesianas, as relações e funções, importantíssimas na álgebra. Mas primeiro precisamos dominar os números reais, que felizmente são bem mais fáceis que os números complexos.

Operações com números inteiros

As operações matemáticas com números inteiros são muito parecidas com as operações feitas com números naturais, assunto predominante nos primeiros anos do ensino fundamental. A única diferença é que agora temos que lidar com números negativos. Existem algumas regras básicas para lidar com sinais, que uma vez aprendidas, não trarão mais dificuldades. É preciso entretanto entender primeiro o porquê dessas regras.

Uma notícia boa é que as regras de sinais aprendidas para os números inteiros servem para os racionais e reais. Portanto nos capítulos seguintes não precisaremos mais estudar as regras de sinais, pois você aprenderá todas aqui.

Scanned by CamScanner

Adição de inteiros

"Sinais iguais, soma e repete o sinal; sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior". É claro que muitos alunos decoram essas regras, mas quem apenas decora em matemática, não vai muito longe. É preciso entender a razão, uma vez entendidas, a memorização é natural e automática. Vamos ilustrar com um pequeno exercício.

Dois jogadores A e B possuem cada um, R$ 10,00. Eles estão jogando e apostando dinheiro, sendo que no início de cada partida, combinam o valor a ser apostado. Na primeira partida, apostam R$ 5,00 e A vence. Na segunda partida, apostam R$ 10,00 e A vence. Na terceira partida, apostam R$ 10,00 e A vence, pela terceira vez. Na quarta partida, apostam R$ 10,00 e B vence. Na quinta partida, apostam R$ 20,00 e B vence. Com quanto dinheiro cada jogador ficou no final?

Vamos construir uma tabela indicando cada uma das partidas e o valor que cada um ficou no final de cada jogada. Complete a tabela de acordo com o enunciado do problema.

OBS.: Considere esse exemplo apenas na sua imaginação, pois na vida real existiriam dois absurdos aqui: primeiro, o jogo a dinheiro é proibido no Brasil, então você pode raciocinar com "fichas" ao invés de reais. A segunda questão é que nos jogos de verdade, para apostar um valor, o jogador precisa ter aquele valor disponível na hora, não pode ficar devendo para pagar depois. Então, neste exemplo, considere que é permitido ficar devendo para pagar depois.

Jogada		A possui	B possui
Inicial		10	10
1ª partida	A ganha 5		
2ª partida	A ganha 10		
3ª partida	A ganha 10		
4ª partida	B ganha 10		
5ª partida	B ganha 20		

Se você conseguiu preencher corretamente a tabela, então entendeu as adições de números inteiros (positivos e negativos):

1ª partida: Cada um tinha 10, e A ganha 5. Então B deve entregar 5 para A. A ficará com 15 e B ficará com apenas 5.

2ª partida: A estava com 15 e B estava com 5. Agora A ganha 10 novamente, então B deverá entregar 10 para A. Mas como B só possui 5, deverá entregar esses 5 para A, e ficará devendo os outros 5 para pagar depois. Sendo assim, B ficará com 5 negativos, ou seja, –5. A, que tinha 15, fica agora com 25, já que ganhou 10. Apesar de que, A não terá os 25 imediatamente, mas é como se tivesse, pois B pagará depois. Portanto A ficou com 25 e B ficou com –5.

3ª partida: A tem agora 25 e B tem –5, ou seja, ainda precisa arranjar 5 para pagar o que deve. Agora apostam novamente 10, e A vence. Como A tinha 25 e agora ganhou 10, ficará então com 35 (não significa que receberá agora). B estava em situação ruim e ficou ainda pior. Já estava com dívida de 5, e agora deve mais 10 por ter perdido esta partida. Ficou então devendo 5+10=15. Isso é o mesmo que dizer o seguinte: B tinha –5, agora perdeu 10 (isso é o mesmo que dizer que "ganhou –10". Ficou então com –15, enquanto A ficou com 35.

4ª partida: A tinha 35 e B tinha –15. Nessa partida, finalmente B ganhou 10. Como B estava devendo 15, esse ganho de 10 será usado para abater na sua dívida, mas não será suficiente para pagar a dívida toda. Dos 15 que já devida, abatendo os 10 que ganhou, ainda ficará

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Para somar dois números inteiros de mesmo sinal, basta somar os valores e dar ao resultado, o mesmo sinal que têm os números somados.

Em outras palavras, para somar números inteiros de mesmo sinal (os dois positivos ou os dois negativos), somamos os números normalmente, esquecendo o sinal, e no fim, colocamos no resultado o mesmo sinal que têm os números. A soma de dois positivos tem resultado positivo. A soma de dois negativos tem resultado negativo.

Exemplos:
(–15) + (–20) = –35
(–10) + (–50) = –60
(–3) + (–2) = –5
30 + 40 = 70
9 + 8 =17

OBS.: "30+40" também pode ser escrito como (+30)+(+40). Note que os sinais "+" junto dos números 30 e 40 tem a função de informar que são números positivos. Já o outro sinal "+" serve para indicar que esses valores estão sendo somados. Entretanto, não é obrigatório colocar o sinal positivo em números que são positivos, quando o sinal não é escrito, sabemos que o número é positivo, portanto basta escrever 30+40.

OBS.: Em alguns casos podemos eliminar os parênteses. Por exemplo, escrever (–15) + (–20) é o mesmo que escrever –15 + (–20). A eliminação dos parênteses em torno do número –15 não deixará dúvidas sobre a operação que queremos realizar: somar o número –15 com o número –20. Entretanto, não podemos eliminar os parênteses em torno do –20, pois ficaríamos com –15+–20. Não é correto colocar sinais lado a lado, nesse caso o uso dos parênteses é obrigatório.

Alunos da EPCAr

Vejamos se você entendeu isso, fazendo alguns exercícios:

Exercícios

E1)

a) (–3) + (–6) =	f) (–21) + (–4) =	k) (–3) + (–24) =	p) (–21) + (–11) =
b) (–3) + (–5) =	g) (–13) + (–33) =	l) (+7) + (+3) =	q) (+34) + (+42) =
c) (+5) + (+3) =	h) (–32) + (–14) =	m) (–26) + (–19) =	r) (–55) + (–20) =
d) (–5) + (–4) =	i) (+7) + (+9) =	n) (–29) + (–33) =	s) (+60) + (+30) =
e) (+16) + (+12) =	j) (–16) + (–22) =	o) (+3) + (+4) =	t) (–7) + (–18) =

Confira os resultados no final do capítulo. Vamos fazer mais alguns exercícios, mas dessa vez, lembre-se que em alguns casos os parênteses podem ser eliminados, acostume-se com isso.

E2)

a) (–2) + (–5) =	f) (–26) + (–3) =	k) (–2) + (–26) =	p) –12 + (–13) =
b) (–4) + (–2) =	g) (–14) + (–31) =	l) 6 + 9 =	q) +32 +22 =
c) (+5) + (+4) =	h) (–35) + (–21) =	m) –28 + (–17) =	r) –45 + (–10) =
d) (–3) + (–4) =	i) +5 + 8 =	n) (–19) + (–36) =	s) 40 + 30 =
e) +6 + (+12) =	j) (–15) + (–18) =	o) (+6) +3 =	t) (–9) + (–29) =

Scanned by CamScanner

Então você já aprendeu a somar números inteiros, positivos ou negativos, mas apenas quando os números têm o mesmo sinal (dois positivos ou dois negativos):

"Para somar números inteiros de mesmo sinal, some os números e repita o sinal".

Módulo ou valor absoluto

O que chamamos de módulo (ou valor absoluto) de um número, é o esse mesmo número com sinal eliminado. Por exemplo:

O módulo de –20 é 20.
O módulo de 35 é 35.
O módulo de –37 é 37.
O módulo de 0 é 0.

Existe um símbolo matemático para indicar o módulo. Basta colocar o número entre duas barras verticais (| |). Por exemplo:

$|21| = 21$
$|-13| = 13$

Usando a noção de módulo, podemos escrever de outra forma a regra para somar números inteiros de mesmo sinal:

"Para somar dois números inteiros de mesmo sinal, basta somar os seus módulos. O sinal do resultado será o mesmo sinal dos números que estão sendo somados".

Adição de inteiros de sinais diferentes

Somar números inteiros é fácil, desde que ambos tenham o mesmo sinal. Quando um é positivo e outro é negativo, é um pouco mais difícil, mas a regra pode ser entendida facilmente se fizermos a analogia do jogo já usada como exemplo:

a) (+10) + (–3) = +7
Na analogia do jogo, estamos considerando que a cada jogada, a quantia de um jogador sempre é somada ao resultado. O resultado pode ser positivo (quando o jogador ganha) ou negativo (quando o jogador perde). Então o cálculo (+10) + (–3) pode ser exemplificado pela situação em que o jogador tinha 10 pontos, e na jogada perdeu 3 pontos, ou seja, sua pontuação deve ser somada com –3. É claro que se o jogador tinha 10 pontos e perdeu 3 pontos, ficou com 7 pontos.

b) (–3) + (+10) = +7
O jogador tinha 3 pontos negativos, ou seja, tinha uma dívida de 3 pontos. Em uma jogada, ganhou 10 pontos, que foram suficientes para "zerar" a dívida e ainda sobraram 7 pontos. Observe que o resultado foi o mesmo do exemplo anterior, ou seja, (+10)+(–3) é o mesmo que (–3)+(+10). O sinal do resultado é +, o mesmo do 10, que é o número de maior módulo.

c) (+10) + (–16) = –6
Agora o jogador estava com 10 pontos e em uma única jogada perdeu 16. Seus 10 pontos foram perdidos, e ainda ficou devendo 6. Então (+10)+(–16) é igual a –6. Observe que o sinal do resultado é –, o mesmo do 16, que é o número de maior módulo.

Scanned by CamScanner

d) (–16) + (+10) = –6

Dessa vez o jogador já estava com uma dívida de 16 pontos. Em uma jogada, ganhou 10, mas esses 10 pontos não foram suficientes para acabar com a sua dívida. Os 10 pontos foram abatidos da dívida, mas ainda ficaram faltando 6 pontos para "zerar" a dívida. Então (–16) + (+10) = –6. Observe que (–16)+(+10) é o mesmo que (+10)+(–16).

e) Considere o seguinte problema:

Uma pessoa tinha uma quantidade positiva de pontos a e perdeu b. O resultado é positivo ou negativo?

Depende dos valores de *a* e *b*. Se o valor *a* for maior que *b*, o resultado será positivo. Se o gasto *b* for maior que *a*, o resultado será negativo.

Observe agora o seguinte, nos quatro exemplos acima:

- Estamos somando dois números inteiros, sendo um positivo e um negativo
- Em todos os casos, o resultado, em módulo, é obtido pela subtração dos dois valores
- O sinal do resultado é o mesmo do número de maior módulo que está sendo somado

Daí vem a regra para somar dois números inteiros de sinais diferentes:

Para somar dois números inteiros, sendo um positivo e um negativo, basta subtrair os módulos. O sinal do resultado será o mesmo do número de maior módulo.

Juntando esta regra, com a anterior para sinais iguais, podemos dizer, informalmente:

"Sinais iguais, soma e repete o sinal; sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior".

Alguns exemplos:

(–15) + (+20) = +5
(–30) + (+20) = –10
(–50) + (+20) = –30
(+40) + (–30) = +10
(–30) + (+40) = +10

Já vimos que na adição de números inteiros, podemos trocar as posições das parcelas e o resultado não se altera. Por exemplo, 20+30 é o mesmo que 30+20; (–20)+(–40) é o mesmo que (–40)+(–20); (+40)+(–30) é o mesmo que (–30)+(+40). Isso significa que a adição de números inteiros é uma *operação comutativa*, assim como também é, a adição de números naturais.

Vamos fazer mais alguns exercícios para fixar esta nova regra.

Exercícios

E3)

a) (–3) + (+6) =
b) (+2) + (–5) =
c) (+5) + (–4) =
d) (–5) + (+9) =
e) (+17) + (–12) =
f) (+25) + (–7) =
g) (–17) + (+36) =
h) (–21) + (+16) =
i) (–4) + (+8) =
j) (+12) + (–27) =
k) (+5) + (–23) =
l) (+7) + (–4) =
m) (–21) + (+13) =
n) (+28) + (–34) =
o) (–7) + (+4) =
p) (+22) + (–19) =
q) (+43) + (–46) =
r) (–51) + (+30) =
s) (+50) + (–32) =
t) (+5) + (–28) =

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Comparação de inteiros

Comparar dois números inteiros é dizer qual deles é o maior, e qual é o menor. Por exemplo, comparando 5 e 12, temos que 12 é maior que 5. Isso é muito fácil, mas pode ficar um pouco mais difícil quando temos números negativos.

Por exemplo, qual é o maior número: –15 ou –25?

Para responder à pergunta, temos que estender as noções de "maior" e "menor" para o caso de números negativos. Intuitivamente, considere que duas pessoas estão devendo dinheiro. A pessoa A deve 15 reais, e a pessoa B deve 25 reais. É fácil entender que quem deve mais é B. Mas se perguntássemos "quem tem mais dinheiro", a ideia seria diferente. Na verdade nem A nem B possuem dinheiro, ambos estão devendo. Mas se avaliássemos quem está em situação melhor, diríamos que é A, pois deve apenas 15. Se a pergunta fosse "quem tem uma dívida maior", a resposta seria B.

Outro exemplo: Qual das duas temperaturas é mais fria: –10°C ou –30°C? E se a pergunta fosse: Qual é a temperatura mais quente: –10°C ou –30°C?

É claro que isso tudo é uma grande confusão. Se você ficou confuso, então está com a razão. Quando estamos tratando de números negativos, é preciso explicar claramente o que significa "maior" e o que significa "menor". Isso também ocorre com números positivos:

Exemplo: Um local está com temperatura de +2°C, outro está com 10°C. Qual é o mais quente? Qual é o mais frio?

Quando estamos simplesmente tratando de números inteiros, o chamado "maior número" é aquele localizado mais à direita na reta numérica:



Exemplos:
+5 é maior que –1
–1 maior que –3
0 é maior que –5
+7 é maior que +5
+4 é maior que –2
–1 é maior que –1000

Quando não estamos preocupados com frio, calor, dívida, riqueza, mas simplesmente com números, convencionamos que o maior é aquele localizado mais à direita na reta numérica. Quanto mais à direita, maior é o número. Daí vêm as seguintes consequências:

1) Dados dois números positivos, o maior será aquele de maior módulo
2) Dados dois números negativos, o maior será aquele de menor módulo
3) Zero é menor que qualquer número positivo
4) Zero é maior que qualquer número negativo
5) Qualquer número positivo é maior que qualquer número negativo

Scanned by CamScanner

Exemplo:
Coloque em ordem crescente a seguinte sequência de números:
–5, 7, 90, 0, –30, 18, –12, 13, –10, 500, –1000

A sequência ordenada deverá começar pelos negativos, depois virá o zero, depois os positivos. Entre os negativos, o menor é aquele de maior módulo, e o maior é aquele de menor módulo. Entre os positivos, basta seguir a ordem crescente natural. Ficamos então com:

–1000, –30, –12, –10, –5, 0, 7, 13, 18, 90, 500

Existem símbolos matemáticos para indicar qual de dois números é maior e qual é o menor. Esses símbolos são > (maior) e < (menor). Escrevemos por exemplo:

$5 > 3$
$10 < 20$
$0 > -2$
$-10 < -5$

Muitos alunos confundem os dois sinais. Para evitar a confusão, basta lembrar que a "abertura" do símbolo fica sempre voltada para o número maior.

Exercícios

E8) Complete as sentenças com os símbolos < ou >

a) –23 __ 46	f) 25 __ –17	k) 45 __ –35	p) 22 __ –66
b) –32 __ –15	g) –37 __ 36	l) –77 __ –11	q) 53 __ –32
c) 31 __ –42	h) –31 __ –26	m) –22 __ –13	r) –82 __ –15
d) –25 __ 15	i) –4 __ 8	n) 90 __ –64	s) –70 __ –52
e) –29 __ –12	j) –21 __ –27	o) 19 __ 43	t) 16 __ –27

Subtração de inteiros

Antes de estudar a subtração de números inteiros precisamos apresentar dois conceitos:

1) Módulo ou valor absoluto
Já apresentado neste capítulo, o módulo de um número inteiro nada mais é que o próprio número sem sinal. Sabemos que quando um número não tem sinal indicado, significa que é positivo. Portanto o módulo de um número positivo é o próprio número, o módulo de um número negativo é o próprio número, porém com sinal tornado positivo. O módulo de zero é zero.

OBS.: O módulo de um número é interpretado geometricamente como sendo a distância do número até a origem (0).

2) Simétrico ou oposto
O simétrico ou oposto de um número inteiro é o próprio número, com sinal trocado. Por exemplo, o simétrico de 5 é –5. O simétrico de –8 é 8. O simétrico de 0 é 0.

Usando o conceito de simetria, podemos definir a operação de subtração com base na adição:

Subtrair um número é a mesma coisa que somar com o simétrico deste número.

Scanned by CamScanner

Exemplos:
8 – 5 = 8 + (–5) = 3
4 – 6 = 4 + (–6) = –2

Sendo assim, quem já sabe somar números positivos e negativos, também sabe subtraí-los.

E o que fazer para subtrair um número negativo? Por exemplo, 8 – (–3)? Usamos o mesmo conceito: subtrair é o mesmo que somar com o simétrico. O simétrico de –3 é 3. Então subtrair –3 é o mesmo que somar com +3.

8 – (–3) = 8 + (+3) = 11

Exemplo:
(–5) – (–11) = (–5) + (+11) = 6
(subtrair –11 é o mesmo que somar com o simétrico de –11, ou seja, 11)

Exemplo:
–2 – 7 = (–2) + (–7) = –9

Observe que os dois sinais "–" têm significados diferentes. O primeiro "–" é o sinal negativo de 2, formando assim o número –2. O segundo "–" e um sinal de subtração, indicando que o número à esquerda (–2) deve ser subtraído de 7. Os sinais, tanto "+" como o "–", podem indicar uma operação (adição ou subtração), ou indicar o sinal de um número inteiro (positivo ou negativo).

Exemplos:
Lembre-se: subtrair é o mesmo que somar com o simétrico. Então basta transformar a operação de subtração em adição, e inverter o sinal do segundo número.

(–4) – (+5) = (–4) + (–5) = –9
(+9) – (+3) = (+9) + (–3) = +6
(+5) – (–4) = (+5) + (+4) = +9
(+3) – (+9) = (+3) + (–9) = –6
(–6) – (–8) = (–6) + (+8) = +2
(–9) – (–5) = (–9) + (+5) = –4
(+8) – (+8) = (+8) + (–8) = 0
(–7) – (–7) = (–7) + (+7) = 0

Exercícios

E9)
a) (–3) – (–6) =
b) (–3) – (–5) =
c) (+5) – (+3) =
d) (–5) – (–4) =
e) (+16) – (+12) =
f) (–21) – (–4) =
g) (–13) – (–13) =
h) (–32) – (–14) =
i) (+7) – (+9) =
j) (–16) – (–22) =
k) (–3) – (–24) =
l) (+7) – (+3) =
m) (–26) – (–19) =
n) (–29) – (–33) =
o) (+3) – (+4) =
p) (–21) – (–11) =
q) (+34) – (+42) =
r) (–55) – (–20) =
s) (+60) – (+30) =
t) (–7) – (–18) =

E10)
a) (–7) – (+3) =
b) (+3) – (–9) =
c) (+4) – (–4) =
d) (+8) – (–11) =
e) (+15) – (–19) =
f) (+15) – (–9) =
g) (–18) – (+26) =
h) (–23) – (+15) =
i) (+13) – (–7) =
j) (+16) – (–14) =
k) (+8) – (–21) =
l) (+4) – (–5) =
m) (–34) – (+18) =
n) (–32) – (–42) =
o) (–22) – (+5) =
p) (+45) – (–18) =
q) (+38) – (–40) =
r) (–63) – (+32) =
s) (+72) – (–33) =
t) (–16) – (–24) =

Scanned by CamScanner

Lembre-se que o sinal dos números positivos pode ser eliminado. Também podem ser eliminados os parênteses do primeiro número de uma operação.

E11)
a) (–2) – (–5) =
b) (–4) – (–2) =
c) (+5) – (+4) =
d) (–3) – (–4) =
e) +6 – (+12) =
f) (–26) – (–3) =
g) (–14) – (–31) =
h) (–35) – (–21) =
i) +5 – 8 =
j) (–15) – (–18) =
k) (–2) – (–26) =
l) 6 – 9 =
m) –28 – (–17) =
n) (–19) – (–36) =
o) (+6) –3 =
p) –12 – (–13) =
q) +32 –22 =
r) –45 – (–10) =
s) 40 – 30 =
t) (–9) – (–29) =

E12)
a) –22 – 62 =
b) –19 – (–25) =
c) 44 – (–33) =
d) –18 – 21 =
e) –33 – (–18) =
f) 25 – (–13) =
g) –32 – 51 =
h) –16 – (–27) =
i) –9 – 13 =
j) –24 – (–50) =
k) 25 – (–52) =
l) –31 – (–23) =
m) –42 – (–20) =
n) 73 – (–54) =
o) 28 – 15 =
p) 65 – (–12) =
q) 37 – (–75) =
r) –76 – (–48) =
s) –20 – (–17) =
t) 39 – (–28) =

Preste atenção nos sinais, não vá somar quando for subtrair, e não vá subtrair quando for para somar.

E13)
a) –23 – 46 =
b) –12 – (–15) =
c) 51 – (–42) =
d) –15 – 15 =
e) –27 – (–12) =
f) 35 + (–27) =
g) –47 –26 =
h) –21 + (–46) =
i) –4 – 8 =
j) –12 + (–32) =
k) 15 + (–55) =
l) –17 – (–21) =
m) –25 + (–33) =
n) 98 – (–64) =
o) 17 + 38 =
p) 52 – (–67) =
q) 13 + (–26) =
r) –82 – (–10) =
s) –70 + (–52) =
t) 16 – (–37) =

No próximo exercício você deve indicar o significado de cada um dos sinais + ou – que aparecem. Os sinais podem indicar "positivo", "negativo", "adição" ou "subtração". Vejamos três exemplos:

(–4) – (+5) ➔ negativo, subtração, positivo
(+3) – (+9) ➔ positivo, subtração, positivo
–3 + (–9) ➔ negativo, adição, negativo

E14) Não precisa calcular, apenas indique o significado de cada sinal, como fizemos nos exemplos acima.

a) –23 – 46 =
b) –12 – (–15) =
c) 51 – (–42) =
d) –15 – 15 =
e) –27 – (–12) =
f) 15 + (–55) =
g) –17 – (–21) =
h) –25 + (–33) =
i) 98 – (–64) =
j) 17 + 38 =

Expressões com adição e subtração de inteiros

Na aritmética ensinada nas primeiras séries do ensino fundamental, lidamos apenas com números positivos, sejam naturais, sejam racionais (frações, números decimais, dízimas periódicas). Os números são agrupados com sinais das operações aritméticas (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, e até raízes), com a ajuda de parênteses, chaves e colchetes. Aquelas expressões, que chegam a assustar muitos alunos, também estão presentes nas séries superiores do ensino fundamental, mas dessa vez podem apresentar também números negativos e números irracionais. Vamos começar a estudar o assunto aqui, com expressões simples.

Na aritmética básica, lidamos apenas com números inteiros. Para formar expressões, precisamos ter pelo menos dois números e um sinal que represente uma operação. Por exemplo, partindo dos números 5 e 3, não podemos formar uma expressão como 5 3. Se

Scanned by CamScanner

juntarmos os dois números, sem espaço, teremos o número 53, mas se usarmos um espaço, teremos alguma coisa sem significado matemático: o número 5 ao lado do número 3. Não podemos operar os números, pois não está sendo informada, qual é a operação que deve ser feita. Para juntar esses números em uma operação matemática, devemos ter pelo menos um sinal, como 5+3, 5–3, 5/3, etc.

Quando estamos lidando com números relativos, faz sentido colocar números lado a lado, desde que convencionemos o seguinte: quando não existe indicada a operação a ser feita, considera-se que o sinal do segundo número indica a operação a ser realizada.

Alunos da EsPCEx

Por exemplo, no caso do 5 e do 3, colocados lado a lado, passamos a considerar que o sinal + do 3 é a operação a ser realizada. Escrevemos opcionalmente o 5 como +5 e obrigatoriamente o 3 como +3. Ficamos então com +5+3, que é o mesmo que 5 + 3. É uma expressão que dá resultado 8. Note que esta convenção não é obrigatória, por isso não é conveniente usá-la de forma indiscriminada. Sendo assim, devemos evitar expressões como "5 3", e usarmos ao invés disso, "5 + 3", que não deixa margem a dúvidas.

Um outro exemplo, vamos colocar lado a lado os números 3, –7, 5 e –9. Ficaríamos então com: 3–7+5–9. (convencionamos que os sinais dos números indicam implicitamente as operações a serem realizadas). É uma expressão válida, que pode ser facilmente calculada. Podemos usar agora dois métodos para fazer os cálculos:

1) Fazer as operações uma a uma, na ordem em que aparecem.
3–7 = –4
–4+5 = 1
1–9 = –8

2) Agrupar todos os positivos, agrupar todos os negativos, e somar (algebricamente) os resultados. Este processo é em geral, menos trabalhoso.
+3+5 = +8
–7–9 = –16
+8–16 = –8

Outro exemplo:
–5+6+12–11–7+9
Juntando os positivos: +6+12+9 = +27
Juntando os negativos: –5–11–7 = –23
Resultado: +27–23 = +4

Quando um aluno estuda números negativos pela primeira vez, é neste ponto onde começa a errar sinais, começa a não entender, dando início a uma deficiência que se prolonga pelo resto do estudo da matemática, inclusive nas séries posteriores. Observe novamente a expressão:

–5+6+12–11–7+9

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

$5 + 8 + 3x(7 - 8)$

pois o segundo 8 não faz parte da mesma adição que o primeiro 8. O segundo 8 está multiplicado por 3, e não simplesmente somado com o primeiro 8, então não pode ser cortado.

No exercício a seguir, simplifique o que for possível, e então calcule o resultado final.

Exercícios

E17)
a) –23 –40 +23 =
b) –12 –15 +12 =
c) 13 –42 –13 =
d) –15 –15 +30 =
e) –27 –12 +12 =
f) 35 –27 –35 +42 =
g) –47 +26 +11 –11 =
h) –21 +46 –13 +21 =
i) –33 –8 +22 +11 =
j) –12 +27 –15 +10 =
k) 15 –5 +3 –10 +12 =
l) –7 –21 +13 –17 +28 =
m) 5 +4 –2 +8 –8 –9 =
n) 8 –6 +8 –3 +6 –16 =
o) 7 +8 –11 –3 +3 –15 =

Eliminação de parênteses

Expressões matemáticas podem apresentar parênteses, chaves e colchetes. Esses símbolos, quando usados, servem para indicar a ordem na qual as operações devem ser realizadas.

Para resolver expressões que usam esses símbolos, é preciso conhecer duas coisas:

1) Precedência entre as operações
2) Precedência entre parênteses, colchetes e chaves

O cálculo de potências deve ser a primeira operação a ser calculada, depois as multiplicações e divisões, na ordem em que aparecem, e por último, adições e subtrações. Por exemplo, para calcular a expressão

$3.5+4.3^2$

A potência deve ser feita antes, ficaremos então com $3^2 = 9$. A expressão se reduzirá a 3.5+4.9. Como as multiplicações têm precedência, devemos resolvê-las primeiro. 3.5 resulta em 15 e 4.9 resulta em 36. A expressão se reduz então a 15+36. Finalmente realizamos a adição, que dá resultado 51. Esta é a ordem padrão para o cálculo.

Quando a intenção de quem cria a expressão, é que as operações sejam feitas em ordem diferente da padrão, devem ser indicadas entre parênteses, colchetes ou chaves. Devemos resolver primeiro as expressões que estão entre parênteses, depois as expressões que estão entre colchetes, finalmente as expressões que estão entre chaves. Recordemos por exemplo como calcular a expressão:

$200 \div \{ 2 . [(49 - 1496 \div 34)^2 - 5] - 30\}^2$

O cálculo ficará assim:

$200 \div \{ 2 . [(49 - 1496 \div 34)^2 - 5] - 30\}^2$	Calculamos primeiro os parênteses mais internos, a divisão deve ser feita antes da subtração. Ficamos com 1496 : 34 = 44.
$= 200 \div \{ 2 . [(49 - 44)^2 - 5] - 30\}^2$	Calculamos agora 49 – 44 = 5
$= 200 \div \{ 2 . [(5)^2 - 5] - 30\}^2$	Elevando 5 ao quadrado temos 25
$= 200 \div \{ 2 . [25 - 5] - 30\}^2$	25 menos 5 resulta em 20
$= 200 \div \{ 2 . [20] - 30\}^2$	A multiplicação 2x20 deve ser feita antes

Scanned by CamScanner

$= 200 \div \{ 40 - 30\}^2$ Agora fazemos 40–30
$= 200 \div \{ 10\}^2$ A potenciação deve ser feita antes da divisão
$= 200 \div 100$ Finalmente fazemos a divisão
$= 2$

A ordem das operações continuará sendo a mesma que você usava nas séries anteriores do ensino fundamental, a diferença é que a partir de agora aparecerão números negativos, frações negativas e números irracionais. Você aprenderá a resolver essas expressões complexas ao longo do livro. No momento, começaremos ensinando a técnica da *eliminação de parênteses.*

Considere a expressão:

+5 –7 +8 –3 +9 + (+4 –8 +10 +7)

A regra nos diz que devemos resolver primeiro a expressão entre parênteses, que no caso resultaria em +13 (confira!). A expressão seria reduzida a:

+5 –7 +8 –3 +9 + 13

Entretanto, ao invés de fazer dessa forma muitas vezes é mais simples eliminar os parênteses. Observe que dentro dos parênteses temos um –8 que poderia cortar com o +8 que está fora dos parênteses, e temos também um +7 que poderia cortar com o –7 que está fora dos parênteses. Entretanto, não podemos cortar um valor que está entre parênteses, com um valor que está fora dos parênteses. Os valores só podem ser cortados se fizerem parte da mesma sequência. A solução para o problema é eliminar os parênteses. Para isso, basta saber duas regras simples:

1) Quando um par de parênteses tem um sinal + antes, basta eliminar os parênteses e repetir o seu conteúdo.

2) Quando um par de parênteses tem um sinal – antes, basta eliminar os parênteses e inverter os sinais dos seus termos internos, ou seja, os positivos viram negativos, e os negativos viram positivos. Mas cuidado, esta segunda regra não pode ser usada quando dentro dos parênteses existem outros parênteses, seu uso é apenas quando temos uma sequência de valores com sinais + e –.

Usando essas regras, a eliminação dos parênteses ficaria assim:

+5 –7 +8 –3 +9 + (+4 –8 +10 +7) =
+5 –7 +8 –3 +9 +4 –8 +10 +7 =
+5 –~~7~~ +~~8~~ –3 +9 +4 –~~8~~ +10 +~~7~~ =
+5 –3 +9 +4 +10 = 25

Muitas vezes na álgebra, a eliminação de parênteses não é uma simples facilidade, mas sim, uma necessidade, ou seja, se não a fizermos, não conseguimos resolver o problema.

Vejamos agora um exemplo com a eliminação de parênteses precedidos por um sinal negativo.

+3–7+8+5–(6–3+9–7)

O par de parênteses está precedido por um sinal negativo, então para eliminá-lo, devemos inverter os sinais dos números no seu interior. Ficamos com:

Scanned by CamScanner

+3–7+8+5–6+3–9+7 = 4 (confira!)

Outro exemplo:

+5 –7 +8 –3 +9 –[+4 –(–8 +10 +7) –3] =

Observe que existem aqui dois níveis (parênteses dentro de colchetes). Não podemos eliminar todos de uma só vez. Devemos eliminar primeiro, os mais internos, que no caso, são os parênteses. Ficamos então com:

+5 –7 +8 –3 +9 –[+4 –(–8 +10 +7) –3] =
+5 –7 +8 –3 +9 –[+4 +8 –10 –7 –3] =
+5 –7 +8 –3 +9 –4 –8 +10 +7 +3 =

Na segunda linha do cálculo acima, eliminamos os parênteses internos, que estavam precedidos por um sinal negativo, invertendo os sinais dos números. Na terceira linha, fizemos a eliminação dos colchetes, que como estavam precedidos por um sinal negativo, os números do seu interior tiveram seus sinais invertidos. Agora como todos os números ficaram em uma só sequência, podemos fazer os cancelamentos permitidos e calcular a expressão:

+5 –7 +8 –3 +9 –4 –8 +10 +7 +3 =
+5 –7 +8 –3 +9 –4 –8 +10 +7 +3=
+5 +9 –4 +10 +3 =
= 23

Alunos do Colégio Militar

Note que temos dois caminhos que levam ao mesmo resultado:
1) Fazer as operações de todos os parênteses, antes de serem eliminados
2) ou então ir simplesmente eliminando os parênteses na ordem correta (a partir dos mais inteiros), para só no final realizar as operações.

Exercícios

E18) Faça a eliminação dos parênteses, a seguir use cancelamentos quando for possível e termine os cálculos só quando todo os parênteses estiverem eliminados. A seguir, repita os exercícios, realizando as operações à medida que for possível, ou seja, eliminando e calculando.

a) +3 –6 – (–2 –6 +8)
b) –5 + (–7 –3)
c) +9 –8 –5 + (–2 +9)
d) +4 +3 –7 – (5 –2)
e) –2 –8 – (–7 –3)
f) 5 – (–6 –8) – (+9 –4) – (–7 +3)
g) –5 + (–5 +3) – (–6 –8)
h) –1 –8 + (–2 +3) –7 + (–4 +5)
i) +12 + (+8 –6) – (+8 –5)
j) –9 + (–2 –4) + (–6 +9)
k) –6 +3 + (–2 –3) +2 – (–1 +5)
l) +4 –7– (7 –5) + (–4 –3)
m) +4 + (+2 –7) +5 – (+2 –3)
n) +5 –5 –(+6 –2) + (–2 –4)
o) +2 –5 + (–4 –7) – (–2 +5)

Scanned by CamScanner

E19) Faça a eliminação dos parênteses, a seguir use cancelamentos quando for possível e termine os cálculos.

a) +5–6+7–(–5–6+2+4)
b) –3+6+(–2+3–4)
c) +8–7+4–5+(–3–4+7+5)
d) +5+2–8–6–(12+4–6–20)
e) –9+3–5+4 –(–5+3–9+7)
f) 4 –(–5+6–7) –(–3+8–5) –(–6+2)
g) 3–2–7+(–3+2+5) –(–4 –9)
h) +4 –1 –8 +(–2+4+3) –7+(–4+5–6)
i) –3+12 +(+8 +4 –6) –(+6+8 –5)
j) –8 –9 +(+3 –2 –4) +(+5 –6 +9)
k) +3 –6 +3+(–2 +4 –3) +2 –(–1 –3+5)
l) –6 +4 –7–(7 –5 –5) +6 +(–4 +5 –3)
m) +4 –2 –8+(–3 +2 –7) +5 –(+5+2 –3)
n) +5 +3 –5–(–5 +6 –2) +3 +(–3 –2 –4)
o) +2 –5+4 +(–4 –7 –1) +4 –(–2 +5+2)

Parênteses, chaves e colchetes

Matematicamente, os símbolos (), [] e {} têm o mesmo valor. Na verdade, bastariam os parênteses, e o uso da regra: "Resolver primeiro os parênteses mais internos". Entretanto, para facilitar os cálculos por alunos mais novos, foram adotados também os colchetes "[]" e as chaves "{}". Isto ajuda um pouco as crianças a identificarem quais partes da expressão devem ser feitas antes. Por outro lado, o elaborador da questão fica na obrigação de respeitar a ordem do uso de (), [] e {} no enunciado. Por exemplo, não seria correto formular neste nível, uma questão como:

$$(5 - 4x\{30 - 18\} - [27 - 20])$$

Para manter coerência, os parênteses deveriam ser internos, e as chaves deveriam ser externas. Usar esses símbolos na ordem diferente do padrão seria uma confusão desnecessária. Matematicamente correto neste caso seria usar todos os símbolos como parênteses, e resolver primeiro aqueles mais internos.

Multiplicação e divisão de inteiros

As operações de multiplicação e divisão de números inteiros são muito parecidas com as operações correspondentes nos números naturais. A única diferença é a questão dos sinais. Os números que estão agora sendo multiplicados ou divididos podem ser positivos ou negativos, e o resultado também pode ser positivo ou negativo (é claro que o resultado também pode ser zero).

A regra é muitos simples:

Para multiplicar ou dividir dois números inteiros:
a) Sinais iguais, o resultado será positivo
b) Sinais diferentes, o resultado será negativo

Exemplos:
(+3).(+4) = +12
(–3).(+5) = –15
(+6).(–4) = –24
(–4).(–5) =+20

Tradicionalmente, esta regra de sinais é apresentada no ensino fundamental como uma propriedade a ser decorada, mas na verdade isto pode ser demonstrado. Tais demonstrações são feitas em cursos de matemática do ensino superior. Vamos justificar de forma simplificada, o porquê dessas regras de sinais.

A multiplicação de inteiros positivos é consequência da multiplicação de números naturais, que são sempre positivos e o resultado é sempre positivo (exceto no caso do 0). Para multiplicar um número inteiro positivo por um negativo, entende-se claramente porque o

Scanned by CamScanner

produto é negativo, já que tal multiplicação pode ser desmembrada em parcelas a serem somadas. Por exemplo:

$3 . (-5) = (-5) + (-5) + (-5) = -15$

Obviamente, a adição de parcelas negativas terá resultado negativo. Isto justifica o resultado de que a multiplicação de dois inteiros, um positivo e um negativo, terá um resultado negativo.

Um pouco mais difícil é a demonstração de que o produto de dois inteiros negativos tem como resultado um valor positivo. Para justificar (não demonstrar, pois a demonstração correta seria mais elaborada) esta regra de sinal, considere dois inteiros positivos, *a* e *b*, de tal forma que os números *–a* e *–b* sejam negativos. Partimos então da seguinte igualdade:

$-a . 0 = 0$

Isto nada mais é que uma propriedade da multiplicação: qualquer número inteiro multiplicado por 0, dá como resultado 0. Por outro lado, o número 0 pode ser obtido pela soma de qualquer número b com o seu simétrico, –b. Ficamos então com:

$-a . (b + (-b)) = 0$

A multiplicação de inteiros tem a chamada propriedade distributiva, ou seja, o número –a está multiplicando b e –b, ficamos então com:

$-a.b + (-a).(-b) = 0$

Somando a.b aos dois lados da igualdade, ficamos com:

$-a.b + a.b + (-a).(-b) = a.b$

Os números ab e –a.b são simétricos, sua soma é zero. Ficamos finalmente com:

$(-a).(-b) = a.b$

Este resultado mostra que o produto de dois números negativos (–a e –b, lembre-se que consideramos a e b positivos) é igual ao produto dos seus módulos, com o sinal positivo. Isto mostra por exemplo que $(-6) . (-8) = 6.8 = +48$. Fica assim justificada a propriedade de que o produto de dois números negativos tem como resultado, um valor positivo.

Como vemos, para multiplicar dois números relativos, multiplicamos normalmente seus módulos. O sinal do resultado dependerá dos sinais dos números que estão sendo multiplicados. Se os sinais forem iguais (++ ou – –), o resultado será positivo. Se os sinais dos dois números que estão sendo multiplicados forem diferentes (+ – ou – +), o resultado será negativo. Obviamente, se um dos dois números for zero (ou ambos), o resultado será zero.

A mesma regra é aplicada para a divisão. Inicialmente fazemos a divisão dos números, sem levar em conta o sinal (ou seja, dividimos os módulos dos números). Lembre-se que não existe divisão por zero. Para saber o sinal do resultado, basta verificar os sinais dos dois números da operação. Se os sinais forem iguais (+ + ou – –), o resultado será positivo. Se os sinais forem diferentes (+ – ou – +), o resultado será negativo.

Scanned by CamScanner

Exemplos:
(+48)÷(+6) = +8
(–32)÷(–8) = +4
(–28)÷(+4) = –7
(+21)÷(–7) = –3

Exemplo:
Escreva as expressões abaixo, usando o menor número possível de parênteses e de sinais, porém sem efetuar as operações:

a) (+3).(+4)
b) (–3).(+5)
c) (+6).(–4)
d) (–4).(–5)
e) (+48)÷(+6)
f) (–32)÷(–8)
g) (28)÷(+4)
h) (+21)÷(–7)
i) (–12).(–3)

Sabemos que não é obrigatório o uso do sinal nos números positivos. Por exemplo, +5+8 pode ser escrito como 5+8. O único sinal + que permanece nesse caso é o que indica a operação de adição. Parênteses também podem ser omitidos, desde que isso não resulte em dois sinais juntos, como ++, –., por exemplo. Sendo assim, podemos escrever as oito expressões acima da seguinte forma:

a) 3.4 = 12
b) –3.5 = –15
c) 6.(–4) = –6.4
d) –4.(–5) = 4.5
e) 48÷6
f) –32÷(–8) = 32÷8
g) –28÷4
h) 21÷(–7) = –21÷7
(–12).(–3) = 12.3

Produto com mais de dois fatores

A regra para sinais de multiplicação e divisão deve ser alterada para o caso de quando temos mais de duas parcelas. Por exemplo:

(–3).(+4).(–5).(–10) =

No exemplo acima temos uma multiplicação de quatro fatores. O módulo do resultado é o produto dos módulos, no caso, 3 x 4 x 5 x 10 = 600. Para saber o sinal, contamos quantos números negativos existem entre os fatores que estão sendo multiplicados. Se o número de fatores negativos for ímpar, o resultado será negativo. Se o número de fatores negativos for par, o resultado será positivo. No nosso caso são 3 fatores negativos, então o resultado será negativo.

(–3).(+4).(–5).(–10) = –600

É fácil entender o motivo desta regra. Um sinal positivo em uma multiplicação não altera o sinal do produto. Já um sinal negativo, se agrupado com um segundo sinal negativo, dá resultado positivo. Se os sinais negativos forem agrupados "de dois em dois", ficarão positivos. Quando sobra um sinal negativo sem agrupar (ou seja, quando o número de sinais negativos é ímpar), o produto será negativo.

Scanned by CamScanner

Exercícios

E20)
a) (–3) . (–6) =
b) (–3) . (–5) =
c) (+5) . (+3) =
d) (–5) . (–4) =
e) (+6) . (+12) =
f) (–28) ÷ (–4) =
g) (–13) . (–3) =
h) (–32) ÷ (–4) =
i) (+7) . (+9) =
j) (–6) . (–22) =
k) (–3) . (–24) =
l) (+7) . (+3) =
m) (–6) . (–9) =
n) (–27) ÷ (–3) =
o) (+3) . (+4) =
p) (–2) . (–11) =
q) (+3) . (+32) =
r) (–58) ÷ (–2) =
s) (+60) ÷ (+3) =
t) (–7) . (–8) =

E21)
a) (–2) . (–5) =
b) (–4) . (–2) =
c) (+5) . (+4) =
d) (–3) . (–4) =
e) +96 ÷ (+12) =
f) (–27) ÷ (–3) =
g) (–54) ÷ (–3) =
h) (–95) ÷ (–5) =
i) +5 .(– 8) =
j) (–45) ÷ (–9) =
k) (–2) . (–26) =
l) 6 .(– 9) =
m) –84 ÷ (–7) =
n) (–49) ÷ (–7) =
o) (+6) .(–3) =
p) –72 ÷ (–24) =
q) +32 ÷ (–2) =
r) –45 . (–2) =
s) 90 ÷ (–30) =
t) (–91) ÷ (–7) =

E22)
a) (–24) . (–5) =
b) (–42) . (–2) =
c) (+25) . (+4) =
d) (–30) . (–4) =
e) +960 ÷ (+12) =
f) (–270) ÷ (–3) =
g) (–108) ÷ (–3) =
h) (–850) ÷ (–5) =
i) +500 .(– 8) =
j) (–450) ÷ (–9) =
k) (–20) . (–26) =
l) 60 .(– 9) =
m) –840 ÷ (–7) =
n) (–490) ÷ (–7) =
o) (+65) .(–3) =
p) –720 ÷ (–24) =
q) +680 ÷ (–20) =
r) –45 . (–20) =
s) 900 ÷ (–30) =
t) (–630) ÷ (–7) =

E23)
a) –2.(–4).(3) =
b) –2.(–5).12 =
c) 5.(–4).(–3) =
d) –5.(–5).(–2) =
e) –7.(–2).3 =
f) 5.(–7).2 =
g) –4.2.11 =
h) –2.4.(–3).5 =
i) –4.(–8).2 =
j) –2.3.(–5).8 =
k) 5.(–5).2.(–4).2 =
l) –7.(–2).3.(–4) =
m) –5.3.(–2).3 =
n) 9.(–6).2.(–3) =
o) 7.3.(–2).(–3) =

Expressões combinando multiplicações e divisões

Podemos encontrar inúmeros tipos de expressões, combinando todas as operações matemáticas possíveis. Até agora vimos somente alguns tipos, a mais complexa foi a sequência de multiplicações. Vejamos agora como resolver uma expressão que tem somente multiplicações e divisões em sequência, como por exemplo:

(–6) . (+14) ÷ (–7) ÷ (–2) . (+4)

Note que esta expressão não tem adições e subtrações, só uma série de multiplicações e divisões. Quando isto ocorre, devemos realizar as multiplicações e divisões, na ordem em que aparecem. A regra de sinal é a mesma da sequência de multiplicações: quando o número de sinais negativos for ímpar, o resultado será negativo, caso contrário, será positivo. Ficamos então neste exemplo com:

6 . 14 = 84
84 ÷ 7 = 12
12 ÷ 2 = 6
6 . 4 = 24
O sinal é negativo, pois existem 3 fatores negativos. Portanto o resultado é –24.

Exercícios

E24)
a) –2.(–14)÷4 =
b) –3.(–5).12÷(–9) =
c) 5.(–4).(–3)÷(–15) =
d) –15.(–5)÷(–25) =
e) –27.(–2)÷18 =
f) 15.(–7).3÷(–9) =
g) –14÷2.11 =
h) –2.4.(–3)÷6 =
i) –14.(–4)÷2 =
j) –2.3.(–5)÷10 =
k) 5.(–5).(–4)÷10 =
l) –7.(–4)÷2.(–4) =
m) –5.3.(–2)÷3 =
n) 9.(–6)÷2.(–3) =
o) 7.6÷(–2)÷(–3) =

Scanned by CamScanner

Outra forma de resolver as sequências de multiplicações e divisões é formar uma fração, colocando no numerador o primeiro fator e todos os números que estão sendo multiplicados, e colocando no denominador todos os números que estão sendo divididos. A regra de sinal é a mesma. Por exemplo:

$$(-6) \cdot (+14) \div (-7) \div (-2) \cdot (+4) = -\frac{6 \times 14 \times 4}{7 \times 2}$$

A seguir usamos as regras de simplificação de frações. O 7 do denominador simplifica com o 14 do numerador. O 14, depois de simplificar com o 7, fica 2. Este 2 simplifica com o 2 que está no denominador. O resultado será então 6.4=24, e o sinal é negativo: –24.

Exercícios

E25) Repita o exercício 24 usando a técnica de simplificação que acabamos de apresentar.

Potenciação de números inteiros

Sabemos que uma potência nada mais é que um produto de fatores iguais. A mesma coisa valerá quando a base (o fator que se repete) é um número negativo. Apenas temos que conhecer a regra de sinal para o caso das bases negativas. Estamos portanto interessados em calcular:

A^B

onde B é um número natural (0, 1, 2, ...), chamado *expoente*, e A pode ser qualquer número inteiro (positivo, negativo ou zero), chamado *base*. Elevar o número A à potência B nada mais é que multiplicar A por si mesmo, com um total de B fatores:

$$A^B = \underbrace{A \times A \times A \times A \times \ldots \times A}_{\text{(B vezes)}}$$

As primeiras regras da potenciação são as mesmas já estudadas na aritmética:

1) Qualquer base elevada à potência 1 é igual à própria base.
$A^1 = A$

2) Qualquer base, que não seja 0, elevada ao expoente 0, é igual a 1.
$A^0 = 1$ $(A \neq 0)$

3) O número 1, elevado a qualquer expoente (no nosso caso estamos lidando com expoentes que sejam números naturais), é igual a 1.
$1^B = 1$, $B \in N$

4) O número 0, elevado a qualquer expoente inteiro positivo, é igual a 0.
$0^B = 0$, $B \in N^*$

OBS.: 0 não pode ser elevado a 0, nem a expoentes negativos.

Essas quatro regras tratam individualmente os casos de base ou expoente valendo 0 ou 1. Para outros números, vale a regra de multiplicar a base, tantas vezes quanto for o valor do expoente.

Scanned by CamScanner

Exemplos:

a) $(-4)^3 = (-4).(-4).(-4) = -64$

b) $(-3)^2 = (-3).(-3) = 9$

c) $(-5)^0 = 1$

d) $(-7)^1 = -7$

Para calcular potências onde a base é um número inteiro (positiva, negativa ou 0) e o expoente é um número natural (exceto 0^0, que não existe), fazemos o seguinte:

Profissionais da área de exatas / biomédica

1) Calculamos a potência normalmente, sem levar em conta o sinal.
2) Se a base for positiva, o resultado será positivo
3) Se a base for negativa:
   3.1) Quando o expoente da base negativa for par, o resultado será positivo
   3.2) Quando o expoente da base negativa for ímpar, o resultado será negativo

Note que esta regra de sinal é similar à da multiplicação com vários fatores, já que uma potência nada mais é que uma multiplicação de fatores iguais.

Exemplos:

a) $(-2)^6 = +64$
b) $(-3)^3 = -27$
c) $(-2)^5 = -32$
d) $(-2)^8 = 128$
e) $(-1)^{1000} = 1$
f) $4^3 = 64$
g) $(-200)^0 = 1$
h) $0^{30} = 0$

Exercícios

E26) Calcule as seguintes potências

a) $(-5)^2 =$
b) $(-3)^3 =$
c) $2^7 =$
d) $(-6)^3 =$
e) $8^2 =$
f) $6^2 =$
g) $(-4)^2 =$
h) $3^5 =$
i) $(-2)^5 =$
j) $5^2 =$
k) $(-7)^2 =$
l) $4^2 =$
m) $(-3)^4 =$
n) $(-2)^7 =$
o) $(-8)^2 =$

E27) Calcule as seguintes potências

a) $(-3)^3 =$
b) $(-4)^4 =$
c) $3^5 =$
d) $(-5)^3 =$
e) $10^2 =$
f) $9^2 =$
g) $(-3)^4 =$
h) $2^6 =$
i) $(-3)^4 =$
j) $12^2 =$
k) $(-9)^3 =$
l) $18^2 =$
m) $(-5)^4 =$
n) $(-2)^8 =$
o) $(-4)^3 =$

E28) Calcule as seguintes potências

a) $12^1 =$
b) $(-5.000.000)^0 =$
c) $(-173)^1 =$
d) $(-1)^{3001} =$
e) $0^{27} =$
f) $1912^1 =$
g) $(-534)^1 =$
h) $230^0 =$
i) $1^{20} =$
j) $1.234.567^0 =$
k) $0^9 =$
l) $7125^1 =$
m) $(-78)^0 =$
n) $1^2 =$
o) $(-512)^1 =$

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Exemplos:
a) $[2.(-5)]^2 = 2^2 . (-5)^2 = 4 \times 25 = 100$
é o mesmo que:
$[2.(-5)]^2 = [-10]^2 = 100$

b) $[(-6) \div 3]^2 = (-6)^2 \div 3^2 = 36 \div 9 = 4$
é o mesmo que:
$[(-6) \div 3]^2 = [-2]^2 = 4$

c) $[(-2)^3]^2 = (-2)^{3.2} = (-2)^6 = 64$
é o mesmo que:
$[(-2)^3]^2 = [-8]^2 = 64$

Essas propriedades podem servir para facilitar cálculos. Digamos que você precisa calcular:

$10^6 \div 5^6$

10^6 vale 1.000.000, e 5^6 vale 5.5.5.5.5.5 = 15.625. Agora temos que dividir 1.000.000 por 15.625, uma conta bastante trabalhosa, que resulta em 64. Fica muito mais fácil usar a propriedade:

$(a \div b)^x = a^x \div b^x$

isso é o mesmo que dizer que $a^x \div b^x = (a \div b)^x$. Então:

$10^6 \div 5^6 = (10 \div 5)^6 = 2^6 = 64$

Exercícios

E31) Multiplique as seguintes potências, e agrupe as que tiverem a mesma base, reduza a bases positivas, colocando o sinal à parte, quando for o caso.

a) $2^5.2^7.2^3$
b) $3^2.3.3^3$
c) $2^6.2^7.2^8$
d) $10^2.10^4$
e) $5^3.5^5.5^2.5^4$
f) $2^{51}.2^{10}.2^9$
g) $3^5.3^2$
h) $10^3.10.10^9$
i) $5^7.5^8$
j) $2^2.2^3.2^5.2^7$
k) $3^2.3.(-3)^3.10^2.10^4$
l) $-2^{51}.2^{10}.2^9.(-2)^5$
m) $-5^7.5^8$
n) $-2^5.(-2^7).(-2)^3.$
o) $5^3.5^5.(-5)^2.(-5^4)$

E32) Multiplique as seguintes potências, dando a resposta na forma de uma potência única
a) $3^5.5^5$
b) $2^7.5^7$
c) $2^2.3^2.5^2$
d) $4^5.6^5$
e) $5^5.5^5$
f) $10^3.8^3$
g) $a^5.b^5$
h) $2^6.10^6$
i) $2^{5000}.5^{5000}$
j) $5^7.5^7$
k) $(-2)^2.3^2.5^2$
l) $4^5.(-6)^5$
m) $-10^3.(-8)^3$
n) $(-2)^6.(-10)^6$
o) $-5^7.(-5)^7$

E33) Efetue as seguintes divisões
a) $3^5 \div 3^2$
b) $2^6 \div 2^3$
c) $5^7 \div 5^5$
d) $10^8 \div 10^3$
e) $7^5 \div 7^4$
f) $12^6 \div 12^3$
g) $6^9 \div 6^3$
h) $a^{50} \div a^{20}$
i) $100^8 \div 100^3$
j) $1000^3 \div 1000^2$
k) $-3^{15} \div (-3)^2$
l) $-(-10)^8 \div 10^3$
m) $6^9 \div (-6)^3$
n) $(-7)^5 \div 7^4$
o) $(-2)^6 \div (-2^3)$

E34) Efetue as seguintes divisões
a) $10^6 \div 5^6$
b) $12^3 \div 2^3$
c) $16^5 \div 4^5$
f) $9^5 \div 3^5$
g) $30^4 \div 6^4$
h) $14^2 \div 7^2$
k) $(-12)^3 \div 2^3$
l) $24^2 \div (-3)^2$
m) $-9^5 \div (-3)^5$

Scanned by CamScanner

d) 24^2+3^2
e) 15^4+5^4
i) $120^{10}+24^{10}$
j) 80^6+5^6
n) $(-30)^4+(-6)^4$
o) $-80^6+(-5)^6$

E35) Calcule as seguintes potências:

a) $(3.5)^2$
b) $(2.10)^3$
c) $(5.7)^5$
d) $(3.4)^4$
e) $(2/3)^7$
f) $(1/7)^{10}$
g) $(2/5)^3$
h) $(2/9)^2$
i) $(-2/3)^3$
j) $\left(\frac{2}{7.10}\right)^3$
k) $[(-3)/5]^2$
l) $[(-2).(-5)]^3$
m) $[2.(-3).5]^2$
n) $[(-1)^{99}/2]^3$
o) $\left(\frac{2.3}{-5}\right)^2$

E36) Exprimir as expressões como um produto de potências de fatores primos, sem repetição de bases. Ex: $4^2.6^3.9^4 = 2^2.2^2.2^3.3^3.3^4.3^4 = 2^7.3^{11}$. Use apenas bases positivas, e indique o sinal em separado, quando for o caso.

a) $6^2.10^3$
b) $2^2.6^5.9^3$
c) $6^2.8^5$
d) $10^3.20^4$
e) $15^3.9^4$
f) $4^3.6^2.10^3$
g) $2^4.4^4.8^2$
h) $9^3.18^2$
i) $6^3.12^4.18^2$
j) $5^4.10^2.25^3$
k) $-2^3.(-6)^3.9^2$
l) $(-15)^3.(-9)^4$
m) $-4^3.(-6)^2.10^5$
n) $-(-5)^4.(-10)^3.25^2$
o) $(-6)^5.12^6.(-18)^2$

E37) Exprimir as expressões como um produto de potências, agrupando as que forem de mesma base.

Ex: $2.x^2.y^3.5x^4 = 10.x^6.y^3$

a) $2x^2.z^3.x^5$
b) $3a^2.b^5.c^3 . 2\,a.b^2.c^2$
c) $5x^2.y^5 . 3y^4$
d) $2a^3.b^4 . 3a . 4b . 5ab$
e) $x^3.y^3 . 2xy . 3\,x^2.y^4$
f) $2x^3.y^2.z^3 . 3x^2.y^4.z^5$
g) $x^4.y^4.z^2 . 2x^2.y^2.z$
h) $a^3.b^2 . a^3.b^2$
i) $m^3.p^4.q^2 . 3m . 2n . 5q$
j) $5a^4.b^2.c^3 .2. a.b.c$
k) $-x^3.(-y)^3.z^2 .x.y.z$
l) $(-a)^3.(-b)^4$
m) $-a^3.(-b)^2.b^5$
n) $-(-a)^4.(-a)^3.a^2$
o) $(-a)^5.b^6.(-a.b)^2$

Expressões com números inteiros

Praticamente todo o estudo da álgebra exige a resolução de expressões numéricas ou literais. Literais, porque apresentam letras que representam números. Por exemplo, $\underline{x^2 - 3x + 5}$ é uma expressão algébrica do segundo grau, na qual $\underline{x}$ representa um número real qualquer. Para operar com essas expressões, é preciso ter habilidade algébrica, ou seja, saber operar e simplificar diversos tipos de expressões, das mais simples às mais complexas. Essas expressões podem envolver operações como:

- Adição, subtração, multiplicação e divisão
- Potências e raízes
- Frações algébricas
- Parênteses, colchetes e chaves
- Números e letras com sinais positivos ou negativos

A partir de agora você vai trabalhar com expressões numéricas, inicialmente com valores inteiros, positivos ou negativos. Dominando a técnica para números inteiros, ficará muito mais fácil manipular as expressões algébricas mais complexas.

As expressões algébricas apresentadas nesse capítulo terão apenas:

- Números inteiros
- Operações de adição, subtração, multiplicação e potências de números inteiros
- Parênteses, colchetes e chaves

Scanned by CamScanner

Para efetuar essas expressões, vamos usar os conceitos já apresentado nesse capítulo.

Sequência de adições e subtrações

Realizamos as operações na ordem em que aparecem. Para facilitar, podemos agrupar todos os positivos e agrupar todos os negativos, para calcular a soma algébrica final. Podemos ainda, antes iniciar a operação, fazer simplificações como já ensinamos neste capítulo.

Exemplo:
Calcular –5 +3 –8 +7 –6 +2 –9
–5 –8 –6 –9 = –28 (agrupando os negativos)
+3 +7 +2 = +12 (agrupando os positivos)
–28 +12 = –16 (operando a soma dos negativos com a soma dos positivos)

Exercícios

E38) Faça a eliminação dos parênteses, a seguir use cancelamentos quando for possível e termine os cálculos.

a) 6 –(–3+8–5) –(–5+6–7) –(–4+5)
b) 6–1–10+(–6+5+8) –(–3 –6)
c) +8 –5 –4 +(–7+10+7) –8+(–6+7–4)
d) –7+8 +(+12 +8 –2) –(+9+5 –8)
e) –6 –7 +(+5 –6 –8) +(+8 –3 +7)
f) +5 –8 +5+(–4 +6 –5) +4 –(–3 –5+7)
g) –9 +7 –10–(10 –8 –8) +9 +(–7 +8 –6)
h) +8 –6 –4+(–7 +6 –3) +9 –(+9+6 –7)
i) +7 +8 –2–(–3 +9 –7) +8 +(–8 –7 –9)
j) +6 –9+8 +(–8 –3 –5) +8 –(–6 +9+6)

Sequência de multiplicações e divisões

Nesse tipo de cálculo, realizamos as operações na ordem em que aparecem. Um método que torna o cálculo mais simples é formar uma fração, colocando no numerador o primeiro fator e todos os fatores que estão sendo multiplicados, e colocar no denominador, o produto de todos os fatores que estão depois de algum sinal de divisão. Quanto ao sinal, será negativo se o número de valores negativos da sequência for ímpar, e positivo se o número de fatores negativos da sequencia for par.

Exemplo:

$$(-6) \cdot (+14) \div (-7) \div (-2) \cdot (+4) = -\frac{6 \times 14 \times 4}{7 \times 2} = -24$$

Ou seja, o primeiro fator vai para o numerador. Entre os termos seguintes, todos os que têm antes um sinal de multiplicação, ficam no numerador. Todos aqueles que têm antes um sinal de divisão, ficam no denominador.

Exercícios

E39)
a) 25.(–4).3÷(–15) =
b) –24÷3.11 =
c) –12.4.(–3)÷6 =
d) –24.(–4)÷6 =
e) –2.3.(–6)÷18 =
f) 15.(–5).(–2)÷10 =
g) –9.(–4)÷2.(–4) =
h) –15.3.(–2)÷3 =
i) 9.(–4)÷2.(–6) =
j) 9.6÷(–3)÷(–2) =

Expressões com adição, subtração, multiplicação e divisão

Quando a multiplicação e a divisão se misturam com a adição e subtração, devemos primeiro resolver todas as multiplicações e divisões. Vejamos um exemplo simples:

Scanned by CamScanner

Exemplo:
7+5.(–3)

Seria errado somar 7+5, para depois multiplicar o resultado por –3. As multiplicações devem ser feitas antes das adições. Portanto o correto é fazer primeiro 5.(–3) = –15. Só então podemos operar 7–15 = –8.

7+5.(–3) =
7+(–15) = –8

Exemplo:
2.3+4.7–2.4.5+3.6 =

Muitos alunos erram devido à confusão de números agrupados no papel. Para não errar, dê um espaço maior entre os sinais de adição e subtração, e deixe mais juntos os números ligados pela multiplicação e divisão. Ficaria assim:

2.3 + 4.7 – 2.4.5 + 3.6 =
6 + 28 – 40 + 18 = 12

Quando existem divisões, a regra é a mesma: realize todas as multiplicações e divisões, para no final, realizar as adições e subtrações.

Exemplo:
2.3+40÷5.7–2.4.5+3.6÷9 =
2.3 + 40÷5.7 – 2.4.5 + 3.6÷9 =
6 + 56 – 40 + 2 = 24

Se existirem números negativos, realize normalmente as operações, levando em conta os sinais.

Exemplo:
2.3+(–40)÷5.7–2.4.(–5)+3.(–6)÷9 =
2.3 + (–40)÷5.7 – 2.4.(–5) + 3.(–6)÷9 =
6 + (–56) – (–40) + (–2) =
6 –56 +40 –2 = –12

Considere os sinais de multiplicação e divisão como "sinais fortes", que deixam os números "grudados", e os sinais de adição e subtração como "sinais fracos", cujas operações devem ser feitas depois.

Exercícios

OBS.: O símbolo "." Significa multiplicação

E40)
a) (–3).(–4) + (–2).(–24)
b) (–3).(–12) – (+6).(+3)
c) (+5).(+3) + (–7).(–4)
d) (–5).(–6) – (–27)÷(–3)
e) (+6).(+5) + (+3).(+9)
f) (–32)÷(–4) – (–3).(–11)
g) (–13).(–3) + (+2).(+22)
h) (–28)÷(–4) – (–28)÷(–2)
i) (+6).(+9) + (+30)÷(+3)
j) (–7).(–22) – (–6).(–8)
k) (–27)÷(–3) + (+5).(+4)
l) (–54)÷(–3) – 96÷(+12)
m) (–95)÷(–5) + (–49)÷(–7)
n) +5.(– 8) + 90÷(–30)
o) (–45)÷(–9) – 84÷(–7)

E41)
a) (–2).(–5) + (–2).(–26) – (–2).(–4).(3) =
b) (–4).(–2) – 6.(– 9) – 2.(–5).12 =
c) (+5).(+4) + 84÷(–7) – 5.(–4).(–3) =
d) (–3).(–4) – (–49)÷(–7) – 5.(–5).(–2) =
f) (–27)÷ (–3) – 72÷(–24) + 5.(–7).2 =
g) (–54)÷ (–3) + 32÷(–2) + 2.3.(–5).8 =
h) (–95)÷ (–5) – 45.(–2) + (–2).4.(–3).5 =
i) +5.(– 8) + 90÷(–30) + 4.2.11 =

Scanned by CamScanner

e) $+96 \div (+12) + (+6).(-3) - 7.(-2).3 =$ j) $(-45) \div (-9) - (-91) \div (-7) + (-4).(-8).2 =$

E42) a) $-2.(-14) \div 4 + 5.(-5).2.(-4).2 + 15.(-7).3 \div (-9) - 5.(-5).(-4) \div 10$
b) $-3.(-5).12 \div (-9) - 9.(-6).2.(-3) + (-14) \div 2.11$
c) $5.(-4).(-3) \div (-15) + 7.3.(-2).(-3) + (-7).(-4) \div 2.(-4)$
d) $-15.(-5) \div (-25) - 5.3.(-2).3 - (-5).3.(-2) \div 3 + (-14).(-4) \div 2 + 9.(-6) \div 2.(-3)$
e) $-27.(-2) \div 18 + 7.(-2).3.(-4) - 7.6 \div (-2) \div (-3) - 2.4.(-3) \div 6 + (-2).3.(-5) \div 10$

Parênteses, colchetes e chaves

Servem para mudar a ordem normal das operações. A regra é que devemos resolver primeiro os trechos das expressões que estão entre parênteses. É possível usar parênteses dentro de parênteses, mas para evitar confusão, convenciona-se usar também chaves e colchetes. O correto é usar mais internamente os parênteses, externamente os colchetes, e mais externamente ainda, as chaves. Matematicamente, todos esses símbolos têm o valor de parênteses, mas por clareza visual, convenciona-se esta ordem.

Exemplo:
$-5+6-(-7+4) =$
$-5+6-(-3) =$
$-5+6+3=$
$-5+9=4$

Exemplo:
$-6.14 \div (24 \div 6) =$
$-6.14 \div 4 =$
$-84 \div 4 = 21$

Exemplo:
$25-\{3.17-[-10+6.(8-4.(-2))+2+3]-4.(-4)\} \div (-4) =$

A expressão tem uma parte entre chaves, na qual encontramos uma parte entre colchetes, na qual encontramos uma parte entre parênteses, que é $(8-4.(-2))$. Esta deve ser resolvida primeiro. A seguir continuamos resolvendo, sempre partindo das expressões mais internas.

$(8-4.(-2)) =$
$8 - (-8) =$
$8 + 8 = 16$

$[-10+6.(16)+2+3] =$
$[-10 + 6.(16) + 2 + 3] =$
$[-10 + 96 + 2 + 3] = 91$

Portanto o conteúdo dos colchetes resulta em 91. Passamos agora a calcular o conteúdo entre chaves:

$\{3.17-91-4.(-4)\} =$
$\{3.17 - 91 - 4.(-4)\} =$
$\{51 - 91 - (-16)\} =$
$\{51 - 91 + 16\} = -24$

Scanned by CamScanner

O conteúdo entre chaves resulta em –24. Agora que os parênteses, colchetes e chaves foram eliminados, podemos resolver o restante da expressão:

$25-(-24)\div(-4) =$
$25 - (-24)\div(-4) =$
$25 - 6 = 19$

Exercícios

OBS.: O símbolo "." Significa multiplicação

E43)
a) $[2.3 - 3.5] + [5.3 - 2.7]$
b) $[18 - 2.7] . [25 - 2.11]$
c) $[2.3-4] \div [2.(3-4)]$
d) $[30 + 4.(-7)] . [40 - (-4).(-9)]$
e) $[26 - 3.(-2) - 4.(-2)] \div [20 - 60:4]$
f) $4.(-5).[5.(-5)-3.(-3)]$
g) $(3.(-5) + 4.3).[4.(-2) + (-2).(-3)]$
h) $[30\div2+9] \div [10 - (-2).(-3)]$
i) $[2.3 - 3.4 + 4.5] . [2.3 - 3.5]$
j) $[(-1).(-3)+ (-8)\div2] . [4-(-2).(-3)]$
k) $[-28 - 4.(-5)] . [-36 - 4.(-8)]$
l) $[2.3 - 2.3.4 + 3.4.5+8] \div [13.13 - 12.12]$
m) $1-2.[-4 -2.(2.(-3) - 5.(-8))]$
n) $10-3.[-4 -2.(4.(-2) - 15\div(-3).2)]$
o) $(-2).(-3) - \{4.(-2) + [2.(-1) + 2.(1.3 - 4.(-5))]\}$
p) $4.2 - \{18.(-2) - 4\div2.[-24\div(-8) -12\div2.(-5) + 5.(-2)]\}$
q) $[(-2).(-15)\div10 + 2.(-8)] . [-2.(-3)]$
r) $2.\{14\div7.3 +15\div5\div3.2.[36\div(-4) -2.(2.(-3) - 6.2))]\}$
s) $[3.(-2) + (-4).3] \div [19.(-2) - 4.(-5)]$
t) $\{(8.8 - 4)\div(-6) + (-21)\div(-7).[-2.(2.(-5) - 3.(-6))]\}\div(-2)$

E44)
a) $(-3).(-4) + (-2).(-12).[(-27)\div(-3) - (+5).(+4)]$
b) $(-3).(-12) - (+6).(+3).[(-95)\div(-5) - (-49)\div(-7)]$
c) $(+5).(+3).[(-54)\div(-3) - 96\div(+12)] + (-7).(-4)$
d) $[(-5).(-6) - (-27)\div(-3)].[5.(-8) + 90\div(-30)]$
e) $[(+6).(+5) + (+3).(+9)].[(-45)\div(-9) - 84\div(-7)]$
f) $(-32)\div(-4) - (-3).(-11).\{(-23).(-4) - (-2).(-4).[(-27)\div(-3) - (+5).(+4) -60]\}$
g) $(-13).(-3) + (+2).(+22).\div\{(-5).(-14) - (-2).(+3).[(-95)\div(-5) - (-49)\div(-7)]\}$
h) $(-28)\div(-4) - (-18)\div(-2).\{(+5).(+3).[(-54)\div(-3) - 96\div(+12)] - (-25).(-4)\}$
i) $[10 + (+6).(+9) + (+30)\div(+3).2]\div\{[(-5).(-6) - (-27)\div(-3)].[-5.(-8) + 78\div(-2)]\}$
j) $(-7).(-12) - (-6).(2).\{[(-6).(+5) - (+3).(-9)].[(135)\div(-9) - 98\div(-7)]\}$

Expressões com potências

Uma expressão envolvendo potências não é mais difícil que as expressões que possuem apenas adições, subtrações, multiplicações e divisões. A única coisa que você precisa saber é que as potências são realizadas antes das outras operações.

Exemplo:
$5+3.2^4 =$
$5 + 3.2^4 =$

Já sabemos que a adição deve ser feita depois da multiplicação. Devemos então resolver antes o termo 3.2^4. Não é para calcular primeiro 3.2=6, para depois calcular 6^4. O correto é calcular primeiro a potência, ou seja, $2^4 = 16$. Só então calculamos 3.16=48, e finalmente calculamos 5+48 = 53.

Scanned by CamScanner

$5 + 3.2^4 =$
$5 + 3.16 =$
$5 + 48 = 53$

Exemplo:
$5+(3.2)^2 =$

Nesse caso, a expressão entre parênteses deve ser calculada antes da potência. Ficamos então com $3.2 = 6$, para então calcular $6^2 = 36$. Finalmente fazemos a soma com 5, ficando com $5+36 = 41$.

Exemplo:
$(5+3.2)^2 =$

Mais uma vez temos que resolver primeiro a expressão entre parênteses, para só então calcular a potência. A expressão entre parênteses resulta em 11, então o resultado final é $11^2 = 121$.

Exemplo:
$-5^2 - (-4)^2 =$

No primeiro termo temos um 5 com um sinal negativo e com uma potência. A potência tem precedência, ou seja, devemos primeiro calcular $5^2 = 25$, para então atribuir o sinal negativo, ficando então com –25. A seguir, temos que subtrair $(-4)^2$. Se não fossem usados os parênteses, calcularíamos a potência primeiro ($4^2 = 16$), para então tratar o sinal. Como temos parênteses em torno de –4, este valor deve ser elevado à potência 2. Ficamos então com $(-4)^2 = 16$. Finalmente podemos operar os dois resultados obtidos:

$-5^2 - (-4)^2 =$
$-25 - 16 = -41$

O importante aqui é lembrar que para elevar um número negativo a uma potência, devemos sempre escrever o número negativo entre parênteses:

$(-4)^2 = 16$ (o número –4 está elevado ao quadrado)
$-4^2 = -16$ (o negativo de 4^2 = o negativo de 16 = –16)

Exemplo:
$2^{3^2} =$

Nessa expressão temos duas potências envolvidas. Como calculá-la? Qual número está elevado ao quadrado, o 3 ou o 2^3?

Nesse tipo de expressão, convenciona-se que as potências devem ser calculadas "de cima para baixo". Sendo assim, calculamos primeiro $3^2 = 9$. A seguir calculamos a próxima potência, que ficará $2^9 = 2.2.2.2.2.2.2.2.2 = 512$.

Exemplo:
$(2^3)^2 =$

Scanned by CamScanner

Parênteses, colchetes e chaves são usados nas expressões matemáticas para alterar a ordem normal das operações. Se não existissem parênteses nesta expressão, seu cálculo seria como já mostrado no exemplo anterior: $2^{3^2} = 512$. Entretanto dessa vez foram usados parênteses para alterar a ordem de cálculo. A regra é sempre as mesma: devemos primeiro resolver as expressões entre parênteses. No caso, calculamos $2^3 = 8$. Só então calculamos a outra potência, ficando com $8^2 = 64$.

$$2^{3^2} = 512, \text{ mas } \left(2^3\right)^2 = 64.$$

Exercícios

OBS.: O símbolo "." Significa multiplicação

E45)
a) $(-3)^2 + 2.3^2 =$
b) $(-2)^3 - 4^2 \div 2^3 =$
c) $2^7 + 3.(-2)^5 =$
d) $(-4)^3 - (20 \div 5)^2 =$
e) $5^3 - 5^2 + 5^1 - 5^0 =$
f) $3.2^2 =$
g) $2.(-3)^2 =$
h) $(-3.2)^3 =$
i) $(-35 \div (5.7))^{56} =$
j) $-2.13^2 =$
k) $(-5)^2 - 5^2 =$
l) $(-5)^3 - 5^3 =$
m) $(-2)^4 + (-2)^3 + (-2)^2 + (-2)^1 + (-2)^0 =$
n) $(-2)^8 \div (-2)^5 =$
o) $7^2 - 37^1 + (-1289)^0 =$

E46)
a) $(-2)^4+(-2)^3+(-2)^2+(-2)^1+(-2)^0$
b) $[2.(-3)^2 - 2.7] . [(-5)^2 - 2.3 - (-2)^4]$
c) $[2.3 - 2^2] \div [2.(3-4)]$
d) $[3^3+3^1 + 2^2.(-7)] . [5.2^3 - (-2^2).(-3^2)]$
e) $[26 - 3.(-2) - 2^2.(-2)] \div [2^2.5 - 60:4]$
f) $2^2.(-5).[5.(-5) - 3.(-3)]$
g) $(3.(-5) + (-2)^2.3).[2^2.(-2) + (-2).(-3)]$
h) $[30 \div 2 + 3^2] \div [10^1 - (-2).(-3)]$
i) $[2.3 - 3.(-2)^2 + 2^2.5] . [2.3 - 3.5]$
j) $[(-1).(-3)+(-2)^3 \div 2].[(-2)^2 - (-2).(-3)]$
k) $[-7.2^2 - 2^2.(-5)] . [-6^2 - 4.(-2)^3]$
l) $[2.3 - 3.2^3 + 3.2^2.5 + 2^3] \div [13^2 - 12^2]$
m) $1 - 2.[-(-2)^2 - 2.(2.(-3) - 5.(-2)^3)]$
n) $10 - 3.[-2^2 - 2.((-2)^3 - 15 \div (-3).2)]$
o) $(-2).(-3) - \{(-2)^3 + [2.(-1)^9 + 2.(1.3 - 2^2.(-5))]\}$
p) $2^3 - \{2.3^2.(-2) - 2^2 \div 2.[-24 \div (-2)^3 - 12 \div 2.(-5) + 5.(-2)]\}$
q) $[(-2).(-15) \div 10 + 2.(-2)^3] . [-2.(-3)]$
r) $2.\{14 \div 7.3 + 15 \div 5 \div 3.2.[6^2 \div (-2^2) - 2.(2.(-3) - 6.2))]\}$
s) $[3.(-2) + (-2^2).3] \div [(2^4+3^1).(-2) - (-2)^2.(-5)]$
t) $\{(2^6 - 2^2) \div (-6) + (-21) \div (-7).[-2.(2.(-5) - 3.(-6))]\} \div (-2)$

E47)
a) $(-3).(-2^2) + (-2).(-12).[(-3^3) \div (-3) - (+5).(+4)]$
b) $(-3).(2^2 - 2^4) - (+6).(+3).[(-95) \div (-5) - (-(-7)^2 \div (-7)]$
c) $[(+6).(+5) - (+3).(+9)].[(-5.3^2) \div (-3^2) - 84 \div (-7)]$
d) $[(-5).(-6) - (-3)^3 \div (-3)].[5.(-8) + 10.3^2 \div (-30)]$
e) $(+5).(+3).[(-2.3^3) \div (-3) + 3.(-2)^5 \div (+12)] + (-7).(-4)$
f) $(-13).(-3) + (+2).(+36).\div\{(-5).(-14) + (-2).[(1 - 3.2^5) \div (-5) + (1 - 6^2) \div (-5)]\}$
g) $(-2^5) \div (-4) - (-3).(-11).\{(-23).(-4) - (-2).(-4).[(-3^3) \div (-3) - (+5).(+4) - 60]\}$
h) $(-7).(-13) - (-4).(2).\{[(-6).(+5) - (+3).(-12)].[(3^3.5) \div (-3^2) - 2.7^2 \div (-7)]\}$

Propriedades da adição

Ao estudar os números naturais, você já aprendeu algumas propriedades das operações. Por exemplo, a *propriedade comutativa* da adição diz que a+b tem o mesmo valor e b+a. Eventualmente podem surgir em provas e concursos, questões teóricas que simplesmente perguntam os nomes dessas propriedades. Entretanto, sua aplicação aparece em todo momento, em questões de cálculo. Suponha por exemplo que você vai fazer o cálculo:

49 + 297 + 3

Scanned by CamScanner

Nem todos conseguem somar tão rapidamente os números 49 e 297. Entretanto, todos podem calcular rapidamente, "de cabeça", 297+3, que vale 300. Como a soma das duas últimas parcelas é 300, fica fácil agora somar este resultado com 49. O resultado final é 349. O que fizemos aqui foi usar a *propriedade associativa* da adição, que diz que:

$(a+b)+c = a+(b+c)$

Portanto é necessário conhecer as propriedades para usá-las, muitas vezes facilitando os cálculos, e também saber seus nomes para poder responder eventuais questões teóricas. As propriedades das operações, que você já aprendeu nas séries anteriores, para números naturais, também são válidas, e têm os mesmos nomes, no caso de números inteiros. Vamos então relembrar essas propriedades.

Propriedade de fechamento da adição

Essa propriedade diz que quando adicionamos dois números inteiros, o resultado será sempre um número inteiro. Escrevendo isso em linguagem matemática:

$x \in Z \text{ e } y \in Z \rightarrow (x+y) \in Z$

Lê-se: se x pertence ao conjunto dos números inteiros e y também pertence ao conjunto dos números inteiros, então o resultado da adição de x e y também pertence ao conjunto dos números inteiros.

Observe que nem todas as operações matemáticas possuem esta propriedade. Por exemplo, a divisão não a possui. Quando dividimos dois números inteiros, o resultado não necessariamente será um número inteiro.

A subtração de números naturais não possui propriedade de fechamento, mas a subtração de números inteiros possui. Dados dois números x e y, inteiros quaisquer (positivos ou negativos), o resultado x – y também será um número inteiro (que pode ser positivo ou negativo, ou mesmo 0). Podemos escrever essa propriedade na forma:

$x \in Z \text{ e } y \in Z \rightarrow (x-y) \in Z$

Já a operação de subtração de números naturais não possui propriedade de fechamento, pois pode resultar em um número negativo, que não pertence aos naturais.

Elemento neutro

O elemento neutro de uma operação é aquele que, quando operado com qualquer outro número, não altera o valor deste número.

A adição de números inteiros, assim como a dos números naturais, possui um elemento neutro, que é o zero, pois:

$\text{para todo } x \in Z \text{ , } x+0 = 0+x = x$

Já a subtração de números inteiros não possui elemento neutro. Apesar de x–0 ser igual a x, o resultado de 0–x não é igual a x. O elemento neutro, para que exista, precisa ser neutro nas duas ordens (operando à esquerda e à direita).

Scanned by CamScanner

Comutatividade

Uma operação é comutativa quando podemos inverter a ordem dos operandos sem alterar o resultado. A adição de números inteiros é comutativa, pois:

$$x \in Z \text{ e } y \in Z \rightarrow x+y = y+x$$

Associatividade

Já vimos como exemplo, a associatividade da operação de adição, que vale tanto nos números naturais quanto nos números inteiros, ou seja:

$$a \in Z, b \in Z \text{ e } b \in Z \rightarrow a+(b+c) = (a+b)+c$$

Por isso, quando temos uma expressão como:

$$-5-7+6-9+4-3$$

não precisamos necessariamente fazer os cálculos na ordem em que aparecem. Podemos inicialmente considerar a expressão como uma soma de números inteiros:

$$(-5)+(-7)+(+6)+(-9)+(+4)+(-3)$$

Note que os sinais que estão na frente dos números da expressão original não são os sinais das operações consideradas. A operação envolvida é uma adição de vários números, e os sinais de adição estão implícitos. Os sinais que aparecem são os sinais (positivos e negativos) que acompanham cada número. Por isso explicitamos os sinais "+" das adições envolvidas.

Graças à *comutatividade*, podemos alterar a ordem das parcelas, juntando todos os valores negativos e juntando todos os valores positivos.

$$(-5)+(-7)+(-9)+(-3)+(+4)+(+6)$$

Agora, graças à *associatividade*, podemos "juntar os positivos" e "juntar os negativos" da forma que acharmos mais conveniente. Por exemplo, como 5+7=12 e 9+3=23 e 4+6=10, podemos escrever:

$$(-12)+(-12)+(+10)$$

Agora podemos fazer 12+12=24, e fazer $-24+10 = -14$, ou fazer $-12+10 = -2$, e depois $-12 -2 = -14$. A associatividade nos permite operar em qualquer ordem, desde que os números façam parte de uma sequência de adições "vizinhas".

Propriedades da multiplicação

A multiplicação de números inteiros, assim como ocorre com a multiplicação de números naturais, têm propriedades muito parecidas com as da adição.

Fechamento

Quando multiplicamos dois números inteiros, o resultado será sempre um número inteiro.

$$x \in Z \text{ e } y \in Z \rightarrow x.y \in Z$$

Scanned by CamScanner

Elemento neutro

A multiplicação de números inteiros possui um elemento neutro, que é o número 1, já que:

para todo $x \in Z$, $x.1 = 1.x = x$

Comutatividade

A ordem dos fatores não altera o produto. Isso é o que diz a propriedade comutativa da multiplicação de inteiros:

$x \in Z$ e $y \in Z \rightarrow x.y = y.x$

Associatividade

Sabemos que em uma sequência de multiplicações, devemos realizá-las na ordem em que aparecem. Por exemplo, para calcular x.y.z, calculamos primeiro x.y e a seguir multiplicamos o resultado por z. A propriedade associativa da multiplicação diz que podemos opcionalmente combinar o segundo com o terceiro fatores, para então combinar o resultado com o primeiro, ou seja:

$(x.y).z = x.(y.z)$

Graças a esta propriedade, junto com a *comutatividade* já ensinada (x.y = y.x), os cálculos de multiplicações ficam bastante facilitados.

Distributividade

A distributividade é uma propriedade que envolve duas operações. Por exemplo, dizemos que entre os números inteiros, a multiplicação é distributiva em relação à adição. Vejamos o que isto significa através de uma expressão. Considere o cálculo:

10.(5+3)

Este cálculo pode ser feito de duas formas:

a) Calcular 5+3 =8, e a seguir 10.8 = 80
b) Distribuir o fator 10 entre as duas parcelas da adição: 10.5 + 10.3 = 50 + 30 = 80

Quando um fator está multiplicando o resultado de uma adição, podemos "distribuir" este fator pelas parcelas da adição, ficando com uma soma de multiplicações menores. Em linguagem matemática:

$x.(a + b) = x.a + x.b$

Trata-se de uma operação muito utilizada na álgebra. Quando a expressão tem somente números, é mais fácil realizar primeiro a expressão que está entre parênteses, para fazer a multiplicação no final. Entretanto na álgebra, é comum operar com letras ao invés de números (as letras nada mais são que representações de números). Nesses casos é mais recomendado usar a distributividade. Este conceito ficará claro nos capítulos seguintes, quando começarmos a usar expressões com letras e números.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Da mesma forma como existem os *cubos perfeitos*, existe a *raiz cúbica*. É fácil calcular a raiz cúbica de números que sejam cubos perfeitos. O símbolo da raiz cúbica é um radical com índice 3.

$\sqrt[3]{27} = 3$

$\sqrt[3]{64} = 4$

$\sqrt[3]{512} = 8$

$\sqrt[3]{1000} = 10$

Nos concursos para ingresso no ensino médio (Colégio Naval, EPCAr, Colégio Militar, etc.) podem surgir problemas envolvendo raízes de quadrados e cubos perfeitos, quanto aqueles que exigem o cálculo de radicais.

Exercícios

E48) Calcule os quadrados e cubos abaixo:

a) 20^2
b) 13^2
c) 8^2
d) 100^2
e) 80^2
f) 30^2
g) 14^3
h) 12^3
i) 8^3
j) 25^3
k) $(-5)^3$
l) $(-14)^2$
m) $(-13)^2$
n) $(-8)^3$
o) $(-5)^3$
p) $(-16)^2$
q) $(-15)^2$
r) $(-9)^3$
s) $(18)^2$
t) $(-30)^3$

Raiz quadrada e raiz cúbica de números inteiros

Alguns itens importantes devem ser aprendidos sobre a raiz quadrada, no que diz respeito aos sinais:

a) Não existe raiz quadrada de números negativo

Todo número positivo, ao ser elevado ao quadrado, dá resultado positivo. Todo número negativo, ao ser elevado ao quadrado, também dá resultado positivo. Exemplos:

$(-7)^2 = 49$
$(-9)^2 = 81$

Sendo assim, nunca um número poderá ser elevado ao quadrado e dar resultado negativo. Esta regra é válida para números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Por isso, números negativos não têm raiz quadrada.

$\sqrt{-49}$ não existe
$\sqrt{-81}$ não existe
$\sqrt{-144}$ não existe

Raízes quadradas de números negativos só existem no conjunto dos *números imaginários*, ou *números complexos*, estudados no ensino médio.

b) A expressão "raiz quadrada" e o símbolo "$\sqrt{\ }$" têm significados ligeiramente diferentes.

Para números positivos, ambos têm o mesmo significado. Quando lidamos com números negativos, os significados são ligeiramente diferentes.

A "raiz quadrada de N" é um número, positivo ou negativo, que elevado ao quadrado, dá como resultado, N. Por exemplo, (–3) é uma raiz quadrada de 9, pois se for elevado ao

Scanned by CamScanner

quadrado, dará como resultado, 9. O número 3 também é uma raiz quadrada da 9, pois se for elevado ao quadrado, também dará como resultado, 9. Dizemos então que 9 tem duas raízes quadradas, uma positiva e uma negativa. É correto então usar expressões como "uma raiz quadrada de 9", "a raiz quadrada positiva de 9", "a raiz quadrada negativa de 9". É diferente quando usamos o símbolo $\sqrt{9}$, que indica "a raiz quadrada positiva de 9". Esta definição para a "raiz quadrada" e uma convenção, adotada por muitos autores. Existem muitos autores que seguem outra definição, de que a expressão "raiz quadrada" indica apenas a positiva. Tanto uma definição como a outra estão corretas, desde que seja especificada qual convenção está sendo usada. Da mesma forma, ambos os grupos de autores e matemáticos convencionam que o símbolo "$\sqrt{\ }$" é usado para indicar a raiz quadrada positiva.

Neste livro convencionamos que o símbolo "$\sqrt{\ }$" indica a raiz quadrada positiva, e que a expressão "raiz quadrada" refere-se tanto à positiva quanto a negativa, sendo portanto especificado no texto, à qual raiz estamos nos referindo.

c) A raiz cúbica de um número positivo é também positivo.
Um número negativo fica negativo quando é elevado ao cubo, assim como um positivo fica positivo quando elevado ao cubo. Sendo assim, o sinal do cubo de um número acompanha o sinal do número original.

d) A raiz cúbica de um número negativo é também negativa
Números negativos também têm raiz cúbica. Veja o exemplo:

$5^3 = 125$, então a raiz cúbica de 125 é 5.
$(-5)^3 = -125$, então a raiz cúbica de –125 é –5.

Quando um número é cubo perfeito, porém negativo, sua raiz cúbica é também negativa, e tem o mesmo valor da raiz cúbica do seu simétrico.

Exemplo:
$\sqrt[3]{-64} = -4$, já que $(-4).(-4).(-4) = -64$

E49) Calcule as raízes abaixo:

a) $\sqrt{16} =$
b) $\sqrt{25} =$
c) $\sqrt{36} =$
d) $\sqrt{49} =$
e) $\sqrt{81} =$
f) $\sqrt{121} =$
g) $\sqrt{144} =$
h) $\sqrt{196} =$
i) $\sqrt{225} =$
j) $\sqrt{1024} =$
k) $\sqrt[3]{8000} =$
l) $\sqrt[3]{27} =$
m) $\sqrt[3]{64} =$
n) $\sqrt[3]{1000} =$
o) $\sqrt[3]{125} =$
p) $\sqrt[3]{27000} =$
q) $\sqrt[3]{216} =$
r) $\sqrt[3]{8} =$
s) $\sqrt[3]{1} =$
t) $\sqrt[3]{0} =$

E50) Calcule as raízes abaixo:

a) $\sqrt[3]{-8000} =$
b) $\sqrt[3]{-27} =$
c) $\sqrt[3]{-64} =$
d) $\sqrt[3]{-1000} =$
e) $\sqrt[3]{-125} =$
f) $\sqrt[3]{-27000} =$
g) $\sqrt[3]{-216} =$
h) $\sqrt[3]{-8} =$
i) $\sqrt[3]{-1} =$
j) $\sqrt[3]{0} =$

Raízes de ordem superior

A raiz quadrada e a raiz cúbica não são as únicas existentes. Da mesma forma como podemos elevar um número a qualquer potência inteira, podemos também fazer a operação inversa, que é extrair sua raiz. Por exemplo:

Scanned by CamScanner

$2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$

Sendo assim:

$\sqrt[5]{32} = 2$

Da mesma forma, como $(-2)^5 = (-2) \times (-2) \times (-2) \times (-2) \times (-2) = -32$, segue-se que:

$\sqrt[5]{-32} = -2$

Para raízes indicadas algebricamente, com o símbolo "$\sqrt{\ }$", valem as seguintes regras:

1) Raízes de números positivos são sempre positivos. Isto vale para raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, etc, ou seja, para qualquer índice da raiz.

2) Raízes de números negativos, com índice ímpar, são sempre negativas. Por exemplo, $\sqrt[5]{-32} = -2$.

3) Raízes de índice par só existem quando o número dentro do radical é positivo. Por exemplo, $\sqrt[4]{16} = 2$, mas $\sqrt[4]{-16}$ não existe.

Quando é usada a forma por extenso, como "raiz quadrada", "raiz quarta", "raiz sexta", valem as mesmas regras, com a diferença de que na regra 1 são válidos o resultado positivo e o negativo.

Exercícios

E51) Calcule as expressões abaixo, quando for possível:

a) $\sqrt[4]{81} =$
b) $\sqrt[4]{-16} =$
c) $\sqrt[5]{-32} =$
d) $\sqrt[5]{32} =$
e) $\sqrt[6]{-64} =$
f) $\sqrt[6]{64} =$
g) $\sqrt[4]{256} =$
h) $\sqrt[4]{-256} =$
i) $\sqrt[9]{-1} =$
j) $\sqrt[39]{0} =$

Valor numérico

Este assunto será muito usado no restante deste livro, a partir do capítulo 3, mas já iremos abordá-lo agora de forma simples. Uma das principais ferramentas da álgebra é operar com as chamadas *expressões algébricas*, que envolvem letras e números. As letras nada mais são que símbolos que representam números. Essas expressões possuem adições, subtrações, multiplicações, divisões, ou qualquer outra operação matemática, envolvendo os números e as letras. Considere por exemplo uma expressão simples como:

$P(x) = x^3 + 2x^2 + 4x + 5$

Esse tipo de expressão algébrica é chamada de *polinômio*. A letra x é chamada de *variável*, e representa um número qualquer. Uma expressão algébrica pode ter várias variáveis. Vejamos outros exemplos de expressões algébricas:

$a^3b^2 + 4a^2b^3 + 3ab^4$

Scanned by CamScanner

$(x+1)(y+2)(z+3)$

x^2+3x+2

Entre as inúmeras operações envolvendo expressões algébricas, uma delas que é simples porém importante, é o cálculo do *valor numérico*. As letras representam números quaisquer, porém no cálculo do valor numérico, queremos calcular o valor da expressão para valores particulares das suas variáveis.

Exemplo:
A velocidade de um veículo, medida em m/s (metros por segundo) é dada por $v = 2t^2 + 3t + 5$, onde t representa o tempo, medido em segundos. Calcule o valor da velocidade deste veículo no instante t=10 segundos.

Solução:
A expressão algébrica de v nada mais é que uma fórmula que dá a velocidade do veículo para qualquer instante t (ou seja, a velocidade varia de acordo com o tempo). O problema quer saber a velocidade no instante t=10. Basta então calcular o valor numérico da expressão para t=10. Ficamos então com:

$v = 2.10^2 + 3.10 + 5 = 200 + 30 + 5 = 235$ m/s

O cálculo do valor numérico de qualquer expressão consiste em substituir as letras dadas pelos respectivos valores numéricos.

Exercícios

E52) Calcule o valor numérico das seguintes expressões:

a) x^2-3x+8, para x=2
b) x^3+3x^2+5x+7, para x=–2
c) $a^2+2ab+b^2$, para a=1 e b=–2
d) $(a+1)(b-2)(c+3)$ para a=b=c=5
e) $(2x+1)/(x^2-8)$ para x=3
f) $x^2+y^2+z^2-2xyz$ para x=1, y=z=2
g) $5a+3b+4ab$, para a=1 e b=–1
h) $(x+2)[(y+3).(x^2-y)]$ para x=1, y=2
i) $x^y + y^x$, para x=2 e y=3
j) $\sqrt{x^2+y^2}$, para x=3 e y=4
k) $2^x + 2^y$, para x=1 e y=0
l) $(-3)^x + (-4)^y$, para x=3 e y=2
m) $(x+y)^{x-y}$, para x=4 e y=2
n) $3a^2-b^3$, para a=2 e b=–3
o) $|a^2 - b^2|$ para a=3 e b=4

Racional ou irracional?

Existem problemas que recaem em identificar se determinada expressão numérica é um valor inteiro, racional ou irracional.



A relação entre os diversos conjuntos numéricos envolvidos já foi apresentada no início deste capítulo. O conjunto mais estudado neste livro é o dos REAIS. Já o conjunto apresentado

Scanned by CamScanner

nesse capítulo é o dos INTEIROS. A figura mostra mais uma vez a relação entre esses conjuntos.

Exemplos de números naturais (N): 3, 5 10, 18, 234, 2001, 16.777.216, ...

Exemplos de números inteiros (Z): –12.000, –1024, –511, –121, –5, 28, 34, 77, 1.000.000

Números racionais são formados por frações irredutíveis, positivas ou negativas.

Exemplos de números racionais: $-\frac{1}{5}, \frac{47}{11}, \frac{13}{100}, -\frac{2}{5}, \frac{22}{17}, -\frac{99}{64}, \ldots$

Todos os números inteiros também são racionais.

Os números irracionais são aqueles que não podem ser expressos na forma de fração.

Exemplos de números irracionais: π, $\sqrt{2}$, $\sqrt{5}$, $\sqrt[3]{7}$, $\sqrt{2+\pi}$, $\sqrt{5-\sqrt{2}}$, ...

Neste capítulo mostramos que as operações de adição e multiplicação tanto com números naturais (N) quanto os inteiros (Z) possuem propriedades de fechamento:

Se a e b são naturais, então a + b é natural, e a.b é natural
Se a e b são inteiros, então a + b é inteiro, e a.b é inteiro

Veremos no capítulo seguinte que os números racionais e os números reais também possuem essas propriedades:

Se a e b são racionais, então a + b é racional, e a.b é racional
Se a e b são reais, então a + b é real, e a.b é real

Já os números irracionais não possuem essas propriedades. A própria figura que representa a relação entre esses conjuntos mostra que os irracionais têm uma estrutura diferente.

A figura mostra que $N \subset Z \subset Q \subset R$. Entretanto, o conjunto dos irracionais (I) não se encaixa nessa estrutura. Apenas podemos dizer que $I \subset R$, entretanto I não está contido, e não contém os conjuntos N, Z e Q. Nenhum elemento de I está contido em N, Z e Q.

Se a e b são irracionais, o valor a + b pode ou não ser um irracional.

Por exemplo:
a) Considere a = π e b = $\sqrt{2}$, que são ambos irracionais. A soma $\pi+\sqrt{2}$ é também irracional

b) Considere a = $3+\pi$ e b = $5-\pi$, ambos irracionais. Sua soma é 8, que é racional.

Analogamente, a diferença entre dos irracionais pode resultar em um número racional, ou em um irracional. Por exemplo, $3+\sqrt{5}$ e $10+\sqrt{5}$, ao serem subtraídos, resultam em um racional, mas π e $\sqrt[3]{7}$, se subtraídos, resultam em um irracional.

O mesmo ocorre com a multiplicação e a divisão de números irracionais. O resultado pode ser racional ou irracional.

Scanned by CamScanner

Exemplos:

$(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}-1)=2$, que é racional

$\pi \times \sqrt{5} = \pi\sqrt{5}$, que é irracional

$(2\sqrt{2}-2)\div(\sqrt{2}-1)=2$, que é racional

$\sqrt{5}\div\sqrt{2} = \sqrt{10}/2$, que é irracional

Os cálculos dessas expressões serão apresentados ao longo do livro. Por hora, é importante lembrar que:

Ao somar, subtrair, multiplicar ou dividir dois números irracionais, o resultado poderá ser um número racional ou um número irracional, não existe uma regra fixa. É preciso realizar o cálculo para identificar se o resultado será racional ou irracional.

Por outro lado, quando fazemos as mesmas operações com um racional e um irracional, o resultado será sempre um irracional, com uma exceção:

0.irracional = 0, que é racional
Para qualquer outro valor de número racional, temos racional.irracional = irracional

Exemplos:

$\pi + \frac{1}{2}$: Irracional
$2-\sqrt{3}$: Irracional
9π: Irracional
$\frac{\sqrt{3}}{7}$: Irracional

Exemplo: CMM 2009
Quaisquer que sejam o racional x e o irracional y, pode-se dizer que:

(A) xy é irracional
(B) yy é irracional
(C) x + y é racional
(D) x – y + $\sqrt{2}$ é irracional
(E) x + 2y é irracional

Solução:
(A) racional . irracional = irracional, exceto para 0.irracional = 0 (F)
(B) irracional . irracional : o resultado pode ser racional ou irracional (F)
(C) racional + irracional = irracional (F)
(D) racional + irracional + irracional: pode ser racional ou irracional (F)
(E) racional + irracional.2 = racional + irracional = irracional (V)

Resposta: (E)

Scanned by CamScanner

Exercícios

E53) Indique se as seguintes operações resultam em valor racional ou irracional

OBS: Lembre que $\sqrt{a}.\sqrt{b} = \sqrt{a.b}$

a) $\sqrt{2}+\sqrt[3]{5}$

b) $4+\sqrt{3}$

c) $(5+\sqrt{2})+(3-\sqrt{2})$

d) $(5+\pi)-(2+\pi)$

e) $6.\sqrt{3}$

f) π^2

g) $\sqrt{\pi}.\sqrt[3]{11}$

h) $\sqrt{5}.\sqrt{5}$

i) $\sqrt{5}.\sqrt{3}$

j) $\frac{\pi}{10}$

k) $\frac{\sqrt{17}}{\sqrt{17}}$

l) $\frac{\sqrt{3}+\pi}{\sqrt{2}+\pi}$

m) $\frac{\pi}{\sqrt{2}}$

n) $\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{2}}$

o) $\sqrt{2}.\sqrt{3}.\sqrt{6}$

p) $\frac{4-2\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}}$

q) $(435^0-1).\sqrt{7}$

r) $4,\overline{13} \div 1,\overline{4}$

s) $\pi^3+\sqrt[3]{\pi}$

t) $\sqrt{3}.\sqrt{27}$

Exercícios de revisão

E54)Efetue

a) 8 – (3 + 2)
b) 9 – (6 + 1)
c) 10 – (9 – 5)
d) 9 – (8 – 6)
e) 3 + (8 – 2)
f) 7 – (7 – 3)
g) 7 – (5 – 2)
h) 9 – (4 – 3)
i) 8 – (3 – 2)
j) 9 – (4 – 5)
k) (4 – 3) – (5 – 12)
i) (17 – 9) + (6 – 11)
m) (10 – 15) + (9 – 12)
n) (14 – 9) – (19 – 13)
o) (17 – 26) – (9 – 18)

E55) Simplifique

a) – (–3)
b) – (–5)
c) | 8 |
d) | –8|
e) | –5|
f) –| –13|
g) | 12 |
h) | |–5| – |–8| |
i) |a| – |–a|
j) –| –4|
k) –(–7)
i) – |10|
m) – (5 – |–5|)
n) | –(–3)|
o) – (–15)

E56) Calcule

a) 8 – 15
b) –13 + 7
c) –15 + 9
d) –12 –8
e) 9 + 3
f) –9 + 3
g) –15 + 20
h) –13 + 1
i) 20 – 17
j) 20 + (–17)
k) –7 –18
i) (–3) – (–8)
m) 45 – 61
n) –23 + 17
o) –20 –30

E57) Calcule

a) –2 – (–6 – (–5))
b) 1 – (–1 –6)
c) 4 – (–8 –15)
d) 8 – (14 – (–6))
e) –2 – (9 – (–5))
f) –4 – (9 – (–8))
g) –5 – (3 – (–11))
h) –1 – (11 – (–7))
i) (–2 – (–4)) – (5 – (–8))
j) 14 – (16 – (–3))
k) (8 – 5) – (–7 – 2)
i) (6 – (–9)) – (4 – (–3))
m) –8 – (–2 – (–7))
n) (5 – 7) – (–9 –3))
o) (–3 – (–5)) – (–8 – (–4))

E58) Calcule

a) (–9) + (–29) =
b) (+50) + (–32) =
c) (–63) + (+32) =
d) 70 + (–53) =
e) (–34) – (+18) =
f) –45 – (–10) =
g) 98 – (–64) =
h) –82 – (–10) =
i) –5 +3 –2 +8 –3 +9 =
j) –47 +26 +21 –11 =
k) 98 –64 +28 –32 +26 –12 =
i) –25 +33 –22 +18 –13 +19 =
m) 8 –6 +8 –3 +6 –16 =
n) –21 +46 –13 +21 =
o) 15 –5 +3 –10 +12 =

Scanned by CamScanner

E59) Calcule

a) $-5 + (-5 + 3) - (-6 - 8)$
b) $+4 + (+2 - 7) + 5 - (+2 - 3)$
c) $-3+12 +(+8 +4 -6) -(+6+8 -5)$
d) $+4 -1 -8 +(-2+4+3) -7+(-4+5-6)$
e) $+2 -5+4 +(-4 -7 -1) +4 -(-2 +5+2)$
f) $(+6) \cdot (+12) =$
g) $(-6) \cdot (-22) =$
h) $(-95) \div (-5) =$
i) $(+60) \div (+3) =$
j) $(-91) \div (-7) =$
k) $(-30) \cdot (-4) =$
i) $(-490) \div (-7) =$
m) $-2.4.(-3).5 =$
n) $7.3.(-2).(-3) =$
o) $-5.(-5).(-2) =$

E60) Calcule

a) $5.(-4).(-3) \div (-15) =$
b) $15.(-7).3 \div (-9) =$
c) $-7.(-4) \div 2.(-4) =$
d) $7.6 \div (-2) \div (-3) =$
e) $-14 \div 2.11 =$
f) $(-6)^3 =$
g) $(-2)^5 =$
h) $18^2 =$
i) $(-3)^3 =$
j) $(-4)^3 =$
k) $1234567^0 =$
i) $(-512)^1 =$
m) $(-1)^{3001} =$
n) $0^{27} =$
o) $230^0 =$

E61) Calcule e simplifique, deixe as potências indicadas

a) $4^5.6^5$
b) $(-2)^2.3^2.5^2$
c) $a^{50} \div a^{20}$
d) $6^9 \div (-6)^3$
e) $1000^3 \div 1000^2$
f) $120^{10} \div 24^{10}$
g) $(-30)^4 \div (-6)^4$
h) $24^2 \div (-3)^2$
i) $[2.(-3).5]^2$
j) $100^8 \div 100^3$
k) $10^8 \div 10^3$
i) $2^7.5^7$
m) $-2^{51}.2^{10}.2^9.(-2)^5$
n) $10^3.10.10^9$
o) $5^3.5^5.5^2.5^4$

E62) Calcule

a) $+8 -4+(-7+10+7) -8+(-6-4)$
b) $+6 -9 +(-8 -3 -5) +8 -(-6 +9)$
c) $9.6 \div (-3) \div (-2) =$
d) $15.(-5).(-2) \div 10 =$
e) $(+6).(+5) + (+3).(+9)$
f)) $(-28) \div (-4) - (-28) \div (-2)$
g) $(-45) \div (-9) - 84 \div (-7)$
h) $(-54) \div (-3) - 96 \div (+12)$
i) $(+6).(+9) + (+30) \div (+3)$
j)) $(-5).(-6) - (-27) \div (-3)$
k) $[2.3 - 3.5] + [5.3 - 2.7]$
i) $[2.3-4] \div [2.(3-4)]$
m) $4.(-5).[5.(-5)-3.(-3)]$
n) $[(-1).(-3)+ (-8) \div 2] . [4-(-2).(-3)]$
o) $[-28 - 4.(-5)] . [-36 - 4.(-8)]$

E63)

a) 23^0
b) -15^0
c) $(-12)^0$
d) 13^1
e) $(-12)^1$
f) -12^1
g) 1^{21}
h) 1^{-15}
i) $(-1)^{13}$
j) $(-1)^{-13}$
k) 0^{720}
i) 1^{720}
m) 720^1
n) 720^0
o) 1^0

E64) Calcule

a) 13^2
b) $(-13)^2$
c) $(-30)^3$
d) $\sqrt[3]{8000} =$
e) $\sqrt{1024} =$
f) $\sqrt[3]{1} =$
g) $\sqrt[3]{-27000} =$
h) $\sqrt[3]{-64} =$
i) $\sqrt[4]{256} =$
j) $\sqrt[5]{-32} =$
k) x^2-3x+8, para $x=2$
i) $5a+3b+4ab$, para $a=1$ e $b=-1$
m) $x^y + y^x$, para $x=2$ e $y=3$
n) $|a^2 - b^2|$ para $a=3$ e $b=4$
o) $x^2+y^2+z^2-2xyz$ para $x=1$, $y=z=2$

E65) Resolva as expressões:

a) $|-23 -46| +15 =$
b) $-12 -|15 +12| =$
c) $51 -|6^2 -(-8)^2| =$
d) $2^0-2^4 -5^2 -|2^2-5^2| =$
e) $(-3)^3 -|2^2-2^4| +6^2-2^5 =$
f) $|(2^2+2^3+2^4) - (3^2+3^3+3^4)| =$
g) $|1-2^5| - [(-5)^0 - (-5)^3] =$
h) $|1-2^2| . |1-3^2| . |1-4^2| =$
i) $|6^0-6^2| . |2.5^2-7^2| =$
j) $|a-b| - |b-a| =$
k) $(1+2+3+4+...+100)^2 - |1+2+3+4+...+100|^2$
i) $|2^0-2^1-2^2-2^3| + |(-2)^0 + (-2)^1 + (-2)^2 + (-2)^3|$
m) $|(-1).(-2).(-3).(-4).(-5)| \div |11^0-11^2|$
n) $|(-5)^3| + |(-5)|^3 + |(-3)^3| + |(-3)|^3 =$
o) $\sqrt{x^2} - |x| =$

Scanned by CamScanner

E66) Quanto vale a soma dos cubos de dois números inteiros simétricos?

E67) Qual é a temperatura mais fria, –25°C ou –35°C?

E68) Quando elevamos um número inteiro ao quadrado, e extraímos a raiz quadrada do resultado, qual é o valor obtido, em comparação com o número original?

E69) O cubo de um número inteiro pode ser menor que este número?

E70) Um número inteiro não se altera quando é elevado ao cubo. Qual é este número?

E71) O que é o módulo ou valor absoluto de um número inteiro? Qual é o seu símbolo?

E72) Um número inteiro não se altera quando é elevado ao quadrado. Qual é este número?

E73) Para quaisquer números a e b, $|a+b|$ é o mesmo que $|a| + |b|$?

E74) O que é o simétrico ou oposto de um número inteiro?

E75) O simétrico de um número pode ser positivo?

E76) Qual é o número inteiro cujo simétrico é ele próprio?

E77) Quais são os 5 maiores números inteiros negativos?

E78) O produto de dois números inteiros é um número negativo, e a soma desses dois números também é um valor negativo. Então podemos dizer certamente que:

(A) Os dois números são negativos
(B) Um número é positivo e outro é negativo, porém o negativo é o maior
(C) Os dois números são simétricos
(D) Os números têm sinais contrários, porém o negativo é o de maior módulo
(E) Impossível

E79) Marque V ou F nas afirmativas abaixo

( ) A subtração é a operação inversa da soma
( ) A adição e a multiplicação são operações associativas
( ) A adição e a subtração são operações comutativas
( ) O elemento neutro da divisão é o número 1
( ) Nos números inteiros, a multiplicação é distributiva em relação à adição
( ) A diferença entre dois números negativos será sempre um número negativo
( ) A soma de um número inteiro com o seu módulo nunca será zero
( ) O triplo de um número inteiro sempre será menor que o seu dobro
( ) Para quaisquer números a e b, $|a|+|b|$ nunca será menor que $|a+b|$
( ) O conjunto dos números inteiros é infinito

E80) Marque V ou F nas afirmativas abaixo

( ) $Z_+ = N$ (o conjunto dos inteiros não negativos é igual ao conjunto dos naturais)
( ) Na reta numérica, quanto mais à direita, maiores são os números
( ) Z_- é o conjunto dos inteiros negativos
( ) Entre 0 e 1 existem infinitos números racionais
( ) Os números π e $\sqrt{5}$ são irracionais

Scanned by CamScanner

( ) O número $\sqrt{25}$ é irracional
( ) Números irracionais possuem infinitas casas decimais que não se repetem
( ) Dívidas e temperaturas abaixo de zero são dois exemplos de números negativos na vida cotidiana
( ) Quanto maior é um número, menor será o seu simétrico, isso vale para positivos e negativos
( ) Em uma expressão algébrica, quando um par parênteses tem um sinal + antes, basta eliminar os parênteses e repetir o seu conteúdo.

E81) Marque V ou F nas afirmativas abaixo

( ) Para multiplicar potências de mesma base, basta repetir a base e somar os expoentes
( ) A raiz quadrada de um número n, indicada como $\sqrt{n}$, nunca poderá ser negativa
( ) Um número inteiro não se altera quando é elevado à potência 0
( ) Potências de expoente par serão sempre positivas, mesmo quando a base é negativa
( ) O cubo de um número inteiro pode ser negativo, mas seu quadrado será sempre positivo
( ) Em uma potência, dada uma base, quanto maior é o expoente, maior será o resultado
( ) $2^{3^2} = 64$

( ) Associativa e comutativa são duas propriedades da adição de inteiros
( ) A raiz cúbica de um número positivo pode ser um número negativo
( ) $\sqrt{3^2+4^2}$ é a mesma coisa que 3+4

E82) Sejam os conjuntos:

N = conjunto dos números naturais
Z = conjunto dos números inteiros
Q = conjunto dos números racionais
I = conjunto dos números irracionais
R = conjunto dos números reais

Indique quais afirmações são verdadeiras e quais são falsas

( ) $I \cup Q = R$
( ) $I \cap Q = \varnothing$
( ) $Z \cap Q = Z$
( ) Para todos os valores de $x \in Z$ e $y \in Z$, temos que $x/y \in Z$
( ) $Z \cap R = Z$
( ) $N \subset Z \subset Q \subset R$
( ) $R - I = Q$
( ) $Z - N = Z^*$
( ) Os conjuntos N e Z são infinitos
( ) O número 0 pertence a todos os conjuntos: N, Z, Q, I e R

E83) Em uma cidade no norte da Rússia, a temperatura interna de uma casa é 18°C. Em um dado instante, a temperatura ambiente externa era de 12°C negativos. Ao sair do interior para o exterior dessa casa, qual é a variação de temperatura que uma pessoa experimentaria?

E84) Quantos anos foram transcorridos entre 520 AC e 450 AC?

Scanned by CamScanner

E85) O planeta Vênus é um dos mais quentes do nosso sistema solar. Sua temperatura média é de 450°C. Enquanto isso, o planeta Plutão é um dos mais frios, com temperaturas médias de 250°C negativos. Quantos graus Plutão é mais frio que Vênus?

E86) Uma determinada loja teve os lucros (valores positivos) e prejuízos (valores negativos) mensais de acordo com a tabela abaixo, medidos em reais.

Janeiro	1300
Fevereiro	-1500
Março	3000

Abril	2200
Maio	-3200
Junho	4500

Julho	2400
Agosto	-2000
Setembro	3600

Outubro	4200
Novembro	5300
Dezembro	8500

Qual foi o trimestre de menor lucro, e qual foi o lucro total anual?

E87) Um avião levantou vôo de uma cidade A que está a 50 metros acima do nível do mar. Subiu 300 metros, depois desceu 40 metros, subiu mais 80 metros, desceu até a metade da altura que estava, em relação ao nível do mar, então subiu mais 100 metros. Quanto precisará agora descer para chegar ao chão na cidade B, localizada a 30 metros acima do nível do mar?

E88) No deserto de Gobi, localizado na Ásia, podem ser verificadas diferenças de temperatura de até 60°C entre o dia e a noite. Durante o dia, a temperatura chega a 50°C. A quanto chega a temperatura à noite?

E89) O isolamento térmico de um avião permite suportar diferenças de temperatura de até 60°C entre seu interior e seu exterior. Mantendo a temperatura interna do avião em 18°C, qual é mínima temperatura externa suportada?

E90) Se $x + y = 0$ e $x \neq 0$, qual é o valor de $\frac{x^{1237}}{y^{1237}}$?

E91) Qual é a ordem correta entre 3^{28}, 4^{14} e 5^{21}?

(A) $3^{28} < 4^{14} < 5^{21}$
(B) $4^{14} < 5^{21} < 3^{28}$
(C) $4^{14} < 3^{28} < 5^{21}$
(D) $3^{28} < 5^{21} < 4^{14}$
(E) $5^{21} < 3^{28} < 4^{14}$

CONTINUA NO VOLUME 2: 70 QUESTÕES DE CONCURSOS

Scanned by CamScanner



Vista aérea da Escola Naval, no Rio de Janeiro

Respostas dos exercícios

E1)

a) –9	c) 8	e) 28	g) –46	i) 16	k) –27	m) –45	o) 7	q) 76	s) 90
b) –8	d) –9	f) –25	h) –46	j) –38	l) 10	n) –62	p) –32	r) –75	t) –25

E2)

a) –7	c) 9	e) 18	g) –45	i) 13	k) –28	m) –45	o) 9	q) 54	s) 70
b) –6	d) –7	f) –29	h) –56	j) –33	l) 15	n) –55	p) –25	r) –55	t) –38

E3)

a) 3	c) 1	e) 5	g) 19	i) 4	k) –18	m) –8	o) –3	q) –3	s) 18
b) –3	d) 4	f) 18	h) –5	j) –15	l) 3	n) –6	p) 3	r) –11	t) –23

E4)

a) –4	c) 0	e) –4	g) 8	i) 6	k) –13	m) –16	o) –17	q) –2	s) 39
b) –6	d) –3	f) 6	h) –8	j) 2	l) –1	n) –74	p) 27	r) –31	t) –40

E5)

a) 3	c) 1	e) –5	g) 17	i) 4	k) –15	m) –14	o) –3	q) 42	s) 17
b) –2	d) –2	f) 27	h) 6	j) –19	l) 5	n) –11	p) 29	r) –46	t) –25

E6)

a) 23	c) 9	e) –39	g) –11	i) 4	k) –20	m) –38	o) 58	q) –23	s) –92
b) –27	d) 0	f) 18	h) –47	j) –39	l) –28	n) 64	p) –15	r) –92	t) –21

E7)

a) 40	c) 11	e) –51	g) 19	i) 4	k) –27	m) –62	o) 43	q) –38	s) –37
b) –44	d) 3	f) 12	h) –43	j) –74	l) –54	n) 19	p) 53	r) –124	t) 11

E8) Complete as sentenças com os símbolos < ou >

a) –23 < 46	f) 25 > –17	k) 45 > –35	p) 22 > –66
b) –32 < –15	g) –37 < 36	i) –77 < –11	q) 53 > –32
c) 31 > –42	h) –31 < –26	m) –22 < –13	r) –82 < –15
d) –25 < 15	i) –4 < 8	n) 90 > –64	s) –70 < –52
e) –29 < –12	j) –21 > –27	o) 19 < 43	t) 16 > –27

E9)

a) 3	c) 2	e) 4	g) 0	i) –2	k) 21	m) –7	o) –1	q) –8	s) 30

Scanned by CamScanner

b) 2 d) –1 f) –17 h) –18 j) 6 l) 4 n) 4 p) –10 r) –35 t) 11

E10)
a) –10 c) 8 e) 34 g) –44 i) 20 k) 29 m) –52 o) –27 q) 78 s) 105
b) 12 d) 19 f) 24 h) –38 j) 30 l) 9 n) 10 p) 63 r) –95 t) 8

E11)
a) –3 c) 1 e) –6 g) 17 i) –3 k) 24 m) –11 o) 3 q) 10 s) 10
b) –2 d) 1 f) –23 h) –14 j) 3 l) –3 n) 17 p) 1 r) –35 t) 20

E12)
a) –84 c) 77 e) –15 g) –83 i) –22 k) 77 m) –22 o) 13 q) 112 s) –3
b) 6 d) –39 f) 38 h) 11 j) 26 l) –8 n) 127 p) 77 r) –28 t) 67

E13)
a) –69 c) 93 e) –15 g) –73 i) –12 k) –40 m) –58 o) 55 q) –13 s) –122
b) 3 d) –30 f) 8 h) –67 j) –44 l) 4 n) 162 p) 119 r) –72 t) 53

E14)
a) –23 – 46 = Negativo, subtração
b) –12 – (–15) = Negativo, subtração, negativo
c) 51 – (–42) = Subtração, negativo
d) –15 – 15 = Negativo, subtração
e) –27 – (–12) = Negativo, subtração, negativo
f) 15 + (–55) = Adição, negativo
g) –17 – (–21) = Negativo, subtração, negativo
h) –25 + (–33) = Negativo, adição, negativo
i) 98 – (–64) = Subtração, negativo
j) 17 + 38 = Adição

E15)
a) –6 c) 0 e) –7 g) –2 i) –10 k) 14 m) 10 o) 3
b) –3 d) –13 f) 7 h) 0 j) 2 l) –9 n) 6

E16)
a) –54 c) –4 e) –6 g) –11 i) 21 k) –20 m) 10 o) –23
b) –15 d) –61 f) 12 h) 27 j) 23 l) –28 n) 44

E17)
a) –40 c) –42 e) –27 g) –11 i) –8 k) 15 m) –2 o) –11
b) –15 d) 0 f) 15 h) 33 j) 10 l) –4 n) –3

E18)
a) –3 c) 3 e) 0 g) 7 i) 11 k) –10 m) 5 o) –17
b) –15 d) –3 f) 18 h) –14 j) –12 l) –12 n) –10

E19)
a) 11 c) 5 e) 7 g) 11 i) 6 k) 0 m) –13 o) –12
b) 0 d) 3 f) 14 h) –12 j) –12 l) –2 n) –2

E20)
a) 18 c) 15 e) 72 g) 39 i) 63 k) 73 m) 54 o) 12 q) 96 s) 20
b) 15 d) 20 f) 7 h) 8 j) 132 l) 21 n) 9 p) 22 r) 29 t) 56

E21)
a) 10 c) 20 e) 8 g) 18 i) –40 k) 52 m) 12 o) –18 q) –16 s) –3
b) 8 d) 12 f) 9 h) 19 j) 5 l) –54 n) 7 p) 3 r) 90 t) 13

E22)
a) 120 c) 100 e) 80 g) 36 i) –4000 k) 520 m) 120 o) –195 q) –34 s) –30
b) 84 d) 120 f) 90 h) 170 j) 50 l) –540 n) 70 p) 30 r) 900 t) 90

Scanned by CamScanner

E23)

a) 24
b) 120
c) 60
d) –50
e) 42
f) –70
g) –88
h) 120
i) 64
j) 240
k) 400
l) –168
m) 90
n) 324
o) 126

E24) e E25)

a) 7
b) –20
c) –4
d) –3
e) 3
f) 35
g) –77
h) 4
i) 28
j) 3
k) 10
l) –56
m) 10
n) 81
o) 7

E26)

a) 25
b) –27
c) 128
d) –216
e) 64
f) 36
g) 16
h) 243
i) –32
j) 25
k) –128
l) 16
m) 81
n) –128
o) 64

E27)

a) 9
b) 256
c) 243
d) –125
e)100
f) 81
g) 81
h) 64
i) 81
j) 144
k) –729
l) 324
m) 625
n) 256
o) –64

E28)

a) 12
b) 1
c) –173
d) –1
e) 0
f) 1912
g) –534
h) 1
i) 1
j) 1
k) 0
l) 7125
m) 1
n) 1
o) –512

E29)

a) $3^6.(-2)^4$
b) $2^3.5^3.7^2$
c) $2^5.(-3)^2.7^3$
d) $2^4.(-5)^3.3^3$
e) $10^3.20^3$
f) $3^4.(-7)^2$
g) $-2^6.3^3$
h) $3^2.2^6.5^4$
i) $2^4.3^3.5^3$
j) $2^2.3^3.5^2.7^3$
k) $(-2)^5$
l) -2^8
m) $-2^2.3^2.5^3$
n) $2^4.3^2.5$
o) $2^8.3.5.7.11$

E30)

a) 1
b) 1
c) 1
d) 0
e) 0
f) 0
g) 3
h) 27
i) 1000
j) 98908093
k) 1
l) –1
m) 1
n) –1
o) 1

E31)

a) 2^{15}
b) 3^6
c) 2^{21}
d) 10^6
e) 5^{14}
f) 2^{70}
g) 3^7
h) 10^{13}
i) 5^{15}
j) 2^{17}
k) $-3^6.10^6$
l) 2^{75}
m) -5^{15}
n) -2^{15}
o) -5^{14}

E32)

a) 15^5
b) 10^7
c) 30^2
d) 24^5
e) 5^{10}
f) 80^3
g) $(ab)^5$
h) 20^6
i) 10^{5000}
j) 5^{14}
k) 30^2
l) -24^5
m) 80^3
n) 20^6
o) 5^{14}

E33)

a) 3^3
b) 2^3
c) 5^2
d) 10^5
e) 7
f) 12^3
g) 6^6
h) a^{30}
i) 100^5
j) 1000
k) -3^{13}
l) -10^5
m) -6^6
n) –7
o) -2^3

E34)

a) 2^6
b) 6^3
c) 4^5
d)8^2
e) 3^4
f) 3^5
g) 5^4
h) 2^2
i) 5^{10}
j) 16^6
k) -6^3
l) 8^2
m) 3^5
n) 5^4
o) -16^6

E35)

a) 15^2
b) 20^3
c) 35^5
d) 12^4
e) $2^7/3^7$
f) $1/(7^{10})$
g) $2^3/5^3$
h) $2^2/9^2$
i) $-2^3/3^3$
j) $1/(35^3)$
k) $3^2/5^2$
l) 10^3
m) 30^2
n) $-1/2^3$
o) $6^2/5^2$

E36)

a) $2^5.3^2.5^3$
b) $2^7.3^{11}$
c) $2^{17}.3^2$
d) $2^{11}.5^7$
e) $3^{11}.5^3$
f) $2^{13}.3^2.5^3$
g) 2^{18}
h) $2^2.3^{10}$
i) $2^{13}.3^{11}$
j) $2^2.5^{12}$
k) $2^6.3^7$
l) $-3^{11}.5^3$
m) $-2^{13}.3^2.5^5$
n) $2^3.5^{11}$
o) $-2^{21}.3^{15}$

E37)

a) $2x^7z^3$
b) $6a^3b^7c^5$
c) $15x^2y^9$
d) $120a^5b^6$
e) $6x^6y^8$
f) $6x^5y^6z^8$
g) $2x^6y^6z^3$
h) a^6b^4
i) $30m^4np^4q^3$
j) $10a^5b^3c^4$
k) $x^4y^4z^3$
l) $-a^3b^4$
m) $-a^3b^7$
n) a^9
o) $-a^7b^8$

Scanned by CamScanner

E38)
a) 11 c) –2 e) –10 g) –8 i) –2
b) 6 d) –10 f) 4 h) –2 j) –12

E39)
a) 20 c) 24 e) 2 g) –72 i) 108
b) –88 d) 16 f) 15 h) 30 j) 9

E40)
a) 60 c) 43 e) 57 g) 83 i) 64 k) 29 m) 26 o) 17
b) 18 d) 21 f) –25 h) –7 j) 106 l) 10 n) –43

E41)
a) 38 c) –52 e) 32 g) –238 i) 45
b) 182 d) –45 f) –58 h) 229 j) 56

E42)
a) 432 c) 66 e) 171
b) –421 d) 186

E43)
a) –8 c) –1 e) 8 g) 6 i) –126 k) 32 m) 145 o) –30 q) –78 s) 1
b) 12 d) 8 f) 320 h) 6 j) 2 l) 2 n) 34 p) 90 r) 120 t) 29

E44)
a) 276 c) 178 e) 969 g) 225 i) 4
b) –180 d) –903 f) –21772 h) –443 j) 120

E45)
a) 27 c) 32 e) 104 g) 18 i) 1 k) 0 m) 11 o) 13
b) –10 d) 80 f) 12 h) –216 j) –338 l) –250 n) –8

E46)
a) 11 c) –1 e) 8 g) 54 i) –126 k) 32 m) 145 o) –30 q) 78 s) 1
b) 12 d) 8 f) 320 h) 6 j) 2 l) 2 n) 34 p) 90 r) 120 t) 29

E47)
a) –252 c) 51 e) 178 g) -21772
b) –432 d) –903 f) 43 h) 43

E48)
a) 400 c) 64 e) 6400 g) 2744 i) 512 k) –125 m) 169 o) –125 q) 225 s) 324
b) 169 d)10000 f) 900 h) 1728 j) 15625 l) 196 n) –512 p) 256 r) –729 t)–27000

E49)
a) 4 c) 6 e) 9 g) 12 i) 15 k) 20 m) 4 o) 5 q) 6 s) 1
b) 5 d) 7 f) 11 h) 14 j) 32 l) 3 n) 10 p) 30 r) 2 t) 0

E50)
a) –20 c) –4 e) –5 g) –6 i) –1
b) –3 d) –10 f) –30 h) –2 j) 0

E51)
a) 3 c) –2 e) - g) 4 i) –1
b) - d) 2 f) 2 h) - j) 0

E52)
a) 6 c) 1 e) 7 g) –2 i) 17 k) 3 m) 36 o) 7
b) 1 d) 144 f) 1 h) –15 j) 5 l) –11 n) 39

Scanned by CamScanner

E53)
a) I b) I c) I d) I e) I f) I g) I h) R i) I j) I k) R l) I m) I n) R o) R p) R q) R r) R s) I t) R

E54)
a) 3 b) 2 c) 6 d) 7 e) 3 f) 4 g) 7 h) 10 i) 7 j) 10 k) 8 l) 3 m) –8 n) –1 o) 0

E55)
a) 3 b) 5 c) 8 d) 8 e) 5 f) –13 g) 12 h) –3 i) 0 j) –4 k) –7 l) –10 m) 0 n) 3 o) 15

E56)
a) –7 b) –6 c) –6 d) –20 e) 12 f) –6 g) –5 h) –12 i) –3 j) 3 k) –25 l) 5 m) –16 n) –6 o) –50

E57)
a) –1 b) 6 c) 27 d) –12 e) –16 f) –21 g) –19 h) –18 i) –11 j) –5 k) 12 l) 8 m) –13 n) 10 o) 6

E58)
a) –38 b) 18 c) –31 d) 18 e) –52 f) –35 g) 162 h) –72 i) 10 j) –11 k) 44 l) 10 m) –3 n) 33 o) 15

E59)
a) 7 b) 5 c) 6 d) –12 e) –12 f) 72 g) 132 h) 19 i) 20 j) 13 k) 120 l) 70 m) 120 n) 126 o) –50

E60)
a) –4 b) 35 c) –56 d) 7 e) –77 f) –216 g) –32 h) 324 i) –27 j) –64 k) 1 l) –512 m) –1 n) 0 o) 1

E61)
a) 24^5 b) 30^2 c) a^{30} d) -6^6 e) 1000 f) 5^{10} g) 5^4 h) 8^2 i) 30^2 j) 100^5 k) 10^5 l) 10^7 m) 2^{75} n) 10^{13} o) 5^{14}

E62)
a) –4 b) –14 c) 9 d) 15 e) 57 f) –7 g) 17 h) 10 i) 64 j) 21 k) –8 l) –1 m) 320 n) 2 o) 32

E63)
a) 1 b) –1 c) 1 d) 13 e) –12 f) –12 g) 1 h) 1 i) –1 j) –1 k) 0 l) 1 m) 720 n) 1 o) 1

E64)
a) 169 b) 169 c) –27000 d) 20 e) 32 f) 1 g) –30 h) –4 i) 4 j) –2 k) 6 l) –2 m) 17 n) 7 o) –3

E65)
a) 84 b) –39 c) 23 d) –61 e) –7 f) 89 g) –95 h) 360 i) 35 j) 0 k) 0 l) 18 m) 1 n) 304 o) 0

E66) zero

E67) –35°C

Scanned by CamScanner

E68) O número original, com sinal positivo.

E69) Sim, se o número for –2, –3, –4 ou outro inteiro menor.

E70) Pode ser 0, 1 ou –1.

E71) É o número com sinal positivo. O símbolo do módulo de x é $|x|$.

E72) 0 ou 1.

E73) Somente quando a e b têm o mesmo sinal, ou quando a=b=0.

E74) É o número com sinal trocado.

E75) Sim, quando o número é negativo.

E76) Zero. E77) –1, –2, –3, –4 e –5. E78) (D)

E79)
(V) A subtração é a operação inversa da adição, e não da "soma".
(F) A multiplicação é associativa em relação à adição
(F) Somente a adição é comutativa, a subtração não é.
(F) O elemento neutro tem que ser à direita e à esquerda
(V) Nos números inteiros, a multiplicação é distributiva em relação à adição
(F) A diferença entre dois números negativos será sempre um número negativo
(F) A soma de um número inteiro com o seu módulo nunca será zero
(F) Somente para os positivos
(V) Chama-se *Desigualdade triangular*
(V) O conjunto dos números inteiros é infinito

E80)
(V) $Z_+ = N$ (o conjunto dos inteiros não negativos é igual ao conjunto dos naturais)
(V) Na reta numérica, quanto mais à direita, maiores são os números
(F) Z_- é o conjunto dos inteiros negativos e mais o zero.
(V) Entre 0 e 1 existem infinitos números racionais
(V) Os números π e $\sqrt{5}$ são irracionais
(F) O número $\sqrt{25}$ é irracional (= 5)
(V) Números irracionais possuem infinitas casas decimais que não se repetem. Os algarismos se repetem, mas as sequências não se repetem de forma infinita.
(V) Dívidas e temperaturas abaixo de zero são dois exemplos de números negativos na vida cotidiana
(F) Quanto maior é um número, menor será o seu simétrico, isso vale para positivos e negativos
(V) Em uma expressão algébrica, quando um par parênteses tem um sinal + antes, basta eliminar os parênteses e repetir o seu conteúdo.

E81)
(V) Para multiplicar potências de mesma base, basta repetir a base e somar os expoentes
(V) A raiz quadrada de um número n, indicada como $\sqrt{n}$, nunca poderá ser negativa
(F) Um número inteiro não se altera quando é elevado à potência 0
(V) Potências de expoente par serão sempre positivas, mesmo quando a base é negativa
(F) exceção: 0^2 não é positivo

Scanned by CamScanner

(F) exceção: não vale para base igual a 1.
(F) 2^9 vale 512
(V) Associativa e comutativa são duas propriedades da adição de inteiros
(F) A raiz cúbica de um número positivo pode ser um número negativo
(F) $\sqrt{3^2+4^2}$ é a mesma coisa que 3+4

E82)
(V) $I \cup Q = R$
(V) $I \cap Q = \varnothing$
(V) $Z \cap Q = Z$
(F) Se $x \in Z$ e $y \in Z$, então $x/y \in Z$
(V) $Z \cap R = Z$
(V) $N \subset Z \subset Q \subset R$
(V) $R - I = Q$
(V) $Z - N = Z_-^*$
(V) Os conjuntos N e Z são infinitos
(F) não pertence a I

E83) 30°C negativos.

E84) 70 anos

E85) 700°C.

E86) 1º trimestre e R$ 28.300,00

E87) 265 m

E88) –10°C.

E89) –42°C.

E90) –1.

E91) (C) Sugestão: exprimir como a^7, b^7 e c^7.

■

Scanned by CamScanner

Capítulo 2

Números racionais

Também Reais e Irracionais

Já estudamos no capítulo 1, a relação entre os conjuntos Q, I e R. Este capítulo trata principalmente das operações no conjunto Q (Racionais), entretanto, praticamente todas elas aplicam-se também aos conjuntos I e R. No seu final serão apresentadas observações adicionais sobre I e R, além disso, praticamente todos os capítulos seguintes lidam com números reais e irracionais. Entretanto, do ponto de vista didático, é melhor apresentar as propriedades de I e R, usando inicialmente o conjunto Q, para depois estender as propriedades para os demais conjuntos.

Segurança, precisão, rapidez

Em praticamente todas as questões de matemática temos que realizar algum tipo de cálculo. Na maioria das questões, o cálculo é uma parte importante, mas não a principal. Em muitas questões, o cálculo é o objetivo principal, do tipo calcule isso, calcule aquilo. As questões dos concursos para a EPCAr apresentam cálculos bastante cansativos. Por exemplo, ao invés de apresentar uma expressão, apresentam quatro expressões e os respectivos valores e perguntam quais delas estão corretas. O aluno se vê obrigado a calcular as quatro expressões. Expressões nas provas do Colégio Naval são menos trabalhosas, mas requerem mais atenção, e o aluno tem que fazer uso das propriedades das operações. Questões do Colégio Militar têm estilo mais parecido com o do Colégio Naval. Questões das Olimpíadas de Matemática muitas vezes precisam de uma "sacada genial" para a resolução, e deve ser levado em conta que muitas vezes os outros concursos repetem questões da Olimpíada de Matemática.

Este capítulo tem um grande número de exercícios. Você deve resolver todos, com a máxima atenção. Você deve treinar para ter rapidez, pois nos concursos o tempo para a resolução de cada questão é muito pequeno. A precisão é necessária para que você não erre em contas. E você deve conhecer muito bem as propriedades das operações, para que não perca tempo pensando no caminho a ser tomado nos cálculos.

Inteiros e racionais

Você já estudou os números inteiros no capítulo 1, suas operações, expressões e resolveu diversos problemas. A boa notícia é que todas as operações aprendidas para os números inteiros são praticamente idênticas nos números racionais. Então você já sabe mais da metade do que precisa saber sobre os números racionais.

Os números racionais são todos os números inteiros, e ainda todos aqueles representados na forma de uma fração, na qual o numerador e o denominador são primos entre si. O sinal pode ser positivo ou negativo. O número zero, é claro, também é um número racional.

Scanned by CamScanner

Exemplos de números racionais:

2 –5, 0, 1, 137, –20, 11, 34, –9, –85, 2000, –1.000.000,

$\frac{1}{2}, -\frac{2}{5}, \frac{4}{7}, -\frac{41}{23}, \frac{16}{3}, \frac{49}{25}, -\frac{1}{200}, \frac{13}{35}, -\frac{10}{27}, \frac{26}{81}, \frac{32}{125}, -\frac{100}{3}$, etc.

Assim como ocorre com os conjuntos N e Z, o conjunto dos números racionais (indicado como Q) é também infinito.

A má notícia é que para conhecer os números racionais, é preciso saber trabalhar com as frações positivas, assunto que é ensinado até o 5º ano do ensino fundamental, e faz parte da *aritmética*. Infelizmente muitos alunos chegam ao 6º ano sem um bom domínio do assunto, que engloba:

- Frações ordinárias, frações decimais
- Frações próprias, impróprias, irredutíveis, número misto
- Frações decimais
- Dízimas periódicas simples e compostas
- Porcentagem
- Operações com frações
- Redução ao mesmo denominador
- MMC, MDC, divisibilidade, números primos

É recomendável que você revise os assuntos acima no seu livro de aritmética. Seja como for, faremos uma breve revisão de cada tópico necessário conforme apresentarmos os números racionais nesse capítulo.

Módulo e simétrico de um número racional

Assim como ocorre para os números inteiros, os números racionais apresentam:

a) Simétrico ou oposto:
É o número com o sinal trocado. Por exemplo, o simétrico de 4/3 é –4/3, o simétrico de –3/5 é 3/5, o simétrico de 0 é 0.

b) Módulo ou valor absoluto
É o número sem sinal. O módulo de –2/3 é 2/3, o módulo de 4/7 é 4/7, o módulo de 0 é 0. Para representar o módulo, colocamos o valor entre barras verticais (| |). Por exemplo:

$|-2/3| = 2/3$

Revisão de frações

Um mesmo número racional pode ser representado por infinitas frações diferentes. Considere por exemplo as frações 1/2 e 5/10. Essas duas frações não são iguais, mas sim, são equivalentes.

Frações iguais: São aquelas que possuem o mesmo numerador e mesmo denominador. Por exemplo, 1/2 e 1/2 são frações iguais.

Frações equivalentes: são frações que possuem o mesmo valor numérico. Essas frações, depois de simplificadas, ficam com numeradores e denominadores iguais. Por exemplo, 1/2 e 5/10.

Scanned by CamScanner

Ao considerarmos os valores numéricos dos números racionais, estamos levando em conta não as frações, mas os valores representados. Quando afirmamos que:

$$\frac{1}{2}=\frac{5}{10}$$

estamos dizendo que ambas as frações são representações diferentes do mesmo número racional. Não estamos afirmando que as frações são iguais, mas que ambas representam o mesmo número racional.

Fração é uma divisão

O que muitas vezes os alunos esquecem é que a fração é na verdade uma divisão. No exemplo da fração 3/8, equivale a dividir um objeto em 8 partes e usar 3 delas. Mas também equivale a tomar três objetos juntos e dividir o total por 8, como mostra a figura abaixo.



Na primeira parte da figura acima temos 3 unidades. Depois de juntar as três partes, dividimos este total por 8. Isso é 3 dividido por 8 (2ª parte da figura). Na terceira parte da figura dividimos uma unidade por 8 e tomamos 3 dessas partes. Isso também é 3/8.

O resultado da divisão (no exemplo, 3 dividido por 8) é o número racional que a fração representa.

Lembramos que os termos da fração são chamados de numerador (o de cima) e denominador (o de baixo). Correspondem ao dividendo e ao divisor da divisão representada por esta fração.

Simplificação e fração irredutível

O valor de uma fração não se altera quando dividimos o numerador e o denominador pelo mesmo valor inteiro. Isso é o que chamamos de *simplificar* a fração. Considere por exemplo a fração 72/96.

$$\frac{72}{96}=\frac{36}{48}=\frac{18}{24}=\frac{9}{12}=\frac{3}{4}$$

Se dividirmos o numerador e o denominador de 72/96 por 2, encontraremos 36/48, que é uma fração equivalente, ou seja, representa o mesmo número racional. A seguir podemos continuar dividindo o numerador e o denominador por 2, 2, e finalmente por 3, chegando a 3/4. Esta última fração não pode ser mais simplificada, ou seja, não existe nenhum número natural pelo qual podemos dividir simultaneamente 3 e 4 (ou seja, 3 e 4 são primos entre si). Dizemos então que a fração 3/4 é *irredutível*.

Scanned by CamScanner

Fração decimal, fração ordinária

Frações decimais são aquelas cujo denominador é uma potência de 10. Alguns exemplos:

$$\frac{3}{10}, \frac{1}{100}, \frac{200}{1000}, \frac{5}{10}, \frac{7}{100}, \frac{5000}{10000}$$

Os números racionais que são representados por frações decimais, podem também ser representados por *números decimais*, com um número finito de casas decimais. Exemplos:

$$\frac{3}{10} = 0{,}3 \quad \frac{1}{100} = 0{,}01 \quad \frac{5}{10} = 0{,}5 \quad \frac{725}{100} = 7{,}25$$

As frações cujo denominador não é uma potência de 10, são chamadas de *frações ordinárias*. Exemplos:

$$\frac{3}{5}, \frac{2}{7}, \frac{20}{60}, \frac{1}{5}, \frac{100}{4}$$

Fração própria, fração imprópria, fração aparente, número misto

Fração própria e aquela na qual o numerador é menor que o denominador. Em consequência disso, essas frações são sempre menores que a unidade. Exemplos:

$$\frac{3}{5}, \frac{2}{7}, \frac{200}{1000}, \frac{1}{5}$$

Já as *frações impróprias* são aquelas nas quais o numerador é maior ou igual ao denominador.

$$\frac{6}{5}, \frac{10}{7}, \frac{200}{30}, \frac{18}{9}, \frac{7}{7}$$

Essas frações podem ser convertidas em números mistos, que possuem uma parte inteira e uma parte fracionária. Basta realizar a divisão inteira, do numerador pelo denominador. O quociente será a parte inteira do número misto, e o resto será o numerador da sua parte fracionária.

Exemplos:

a) $\frac{13}{5} = 2\frac{3}{5}$

b) $\frac{23}{7} = 3\frac{2}{7}$

c) $\frac{7}{4} = 1\frac{3}{4}$

Quando uma fração tem o numerador que é múltiplo do denominador, o número racional resultante será inteiro, pois a divisão será exata. Essas são chamadas de *frações aparentes*. Exemplos:

$$\frac{15}{5}, \frac{28}{7}, \frac{200}{40}, \frac{20}{5}$$

Scanned by CamScanner

Porcentagem

A porcentagem é um tipo especial de fração, onde o denominador é igual a 100.

Exemplo:
Em um dia de chuva, 25% dos alunos faltaram, de uma turma de 32 alunos. Quantos compareceram?

A turma tem 32 alunos. Para saber o número de alunos que faltaram, temos que multiplicar o número total (32) pela fração correspondente à porcentagem, que é 25/100.

Faltaram: $32 \times \frac{25}{100} = 32 \times \frac{1}{4} = \frac{32}{4} = 8$

Explicando: A porcentagem 25% é representada como 25/100 na forma de fração. Essa fração pode ter o numerador e o denominador simplificados por 25, o que resulta em 1/4. Ficamos então com 32 x (1/4), que é o mesmo que 32/4=8. Como faltaram 8 alunos da turma de 32, compareceram 32 – 8 = 24.

Qualquer problema de porcentagem se transforma em um problema de fração, quando convertemos esta porcentagem para a fração correspondente. Basta lembrar que x% é o mesmo que x/100.

Dízimas periódicas

Números decimais podem ter uma parte inteira e uma parte decimal exata. Por exemplo, 3/4 é o mesmo que 0,75. Para chegarmos a este valor, basta realizar a divisão, inicialmente tratando com inteiros. Quando chegamos ao resto, colocamos uma vírgula depois do quociente e continuamos fazendo a divisão. Em muitos casos, como no exemplo do 3/4, a divisão termina e temos um número determinado de casas decimais. Em outros casos, a divisão não termina nunca, o resto nunca chega a zero e as casas decimais são repetidas indefinidamente. Por exemplo:

1/3 = 0,33333333333333333333333333333333333333333333333333...

Dizemos então que temos uma *dízima periódica*. A parte que se repete é chamada de período. No exemplo acima, o período é 3. Usamos reticências (...) para indicar que o período se repete indefinidamente.

Dependendo dos números, o período pode ter vários algarismos. Por exemplo:

11/7 = 1,571428571428571428571428571428...

Nesse caso, o período é 571428. Não é necessário escrever a dízima com tantas casas decimais. Basta colocar uma vez o período que se repetirá, seguido de reticências. A dízima periódica gerada pela fração 11/7 pode portanto ser escrita como 1,571428..., o que deixa claro que o período é a parte indicada após a vírgula, no caso, 571428. Em certos casos, ocorrem algumas casas decimais não repetitivas, chamadas *anteperíodo*, para depois começarem as repetições. Por exemplo:

145/18 = 13,611111111111111111111111111111...

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

$30 = 2.3.5$ (podemos representar a multiplicação pelo símbolo "x" ou por ".".
$49 = 7.7 = 7^2$
$12 = 2.2.3 = 2^2.3$
$80 = 2^4.5$
$120 = 2^3.3.5$

Fatorar um número é representá-lo como um produto de fatores primos. Quando existirem fatores primos repetidos, usamos potências. Para fatorar um número, fazemos sua divisão sucessivamente pelos números primos, em ordem crescente. Lembramos que um número primo é aquele que só pode ser dividido, com divisão exata, por ele mesmo ou pela unidade. Os números primos são:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, ...

Exemplo: Fatorar 120
$120 \div 2 = 60$
$60 \div 2 = 30$
$30 \div 2 = 15$ (agora não pode mais ser dividido por 2, passamos para o 3)
$15 \div 3 = 5$ (agora não pode mais ser dividido por 3, passamos para o 5)
$5 \div 5 = 1$

Então $120 = 2x2x2x3x5 = 2^3.3.5$

Para evitar erros, devemos armar as divisões no dispositivo abaixo. Vejamos o exemplo da fatoração do número 720.

720	2
360	2
180	2
90	2
45	3
15	3
5	5
1	$= 2^4.3^2.5$

MMC

Para fazer a adição ou a subtração de frações, é preciso que possuam o mesmo denominador. Por exemplo, não podemos adicionar diretamente 1/2+1/3, porque os denominadores são diferentes. Mas podemos representar ambas as frações com o denominador 6, ficando com:

$$\frac{1}{2} = \frac{3}{6} \text{ e } \frac{1}{3} = \frac{2}{6}$$

Podemos então escrever:

$$\frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{3+2}{6} = \frac{5}{6}$$

Vemos então que antes de adicionar frações, precisamos reduzi-las ao mesmo denominador, multiplicando os termos de cada uma delas por um número tal que os denominadores ficam iguais. No exemplo acima, multiplicamos os dois termos (numerador e denominador) de 1/2

Scanned by CamScanner

por 3, ficando com 3/6, e multiplicamos numerador e denominador de 1/3 por 2, ficando com 2/6.

Este denominador igual nada mais é que o MMC (mínimo múltiplo comum) entre os denominadores. Para encontrar o MMC entre dois ou mais números, usamos o dispositivo indicado abaixo. Mostraremos o exemplo do cálculo do MMC entre 24, 45 e 96. Fazemos sucessivamente a divisão desses três números pelos fatores primos (2, 3, 5, 7, 11, etc.). Enquanto pelo menos um dos números puder ser dividido, prosseguimos dividindo. Se um número não puder ser dividido, devemos repeti-lo.

24 - 45 - 96	2	Inicialmente dividimos por 2. O 45 é repetido
12 - 45 - 48	2	Mais uma vez podemos dividir por 2
6 - 45 - 24	2	Pela terceira vez dividimos por 2
3 - 45 - 12	2	O 3 e o 45 não podem, mas o 12 ainda pode ser dividido por 2
3 - 45 - 6	2	O 6 ainda pode ser dividido por 2.
3 - 45 - 3	3	Agora começaremos a dividir por 3
1 - 15 - 1	3	O 15 ainda pode ser dividido por 3
1 - 5 - 1	5	Agora dividimos todos por 5.
1 - 1 - 1		MMC = $2^5 . 3^2 . 5 = 1440$

Comparação de frações

Além da adição e da subtração, existe uma outra operação que requer a redução de frações ao mesmo denominador, que é a comparação de frações. Uma vez que todas tenham denominadores iguais, podemos então decidir qual é a maior e qual é a menor, comparando simplesmente seus numeradores. Vejamos um exemplo:

Exemplo:
Colocar em ordem crescente as seguintes frações:

$$\frac{1}{2}, \frac{2}{5} \text{ e } \frac{4}{7}$$

A primeira coisa a fazer é encontrar o MMC entre seus denominadores:

MMC (2, 5, 7) = 70

Para que as três frações fiquem com denominador 70, devemos multiplicar ambos os termos da primeira fração por 35, ambos os termos da segunda por 15, e ambos os termos da terceira por 10.

$$\frac{1\times35}{2\times35}, \frac{2\times14}{5\times14} \text{ e } \frac{4\times10}{7\times10}$$

Ficamos então com

$$\frac{35}{70}, \frac{28}{70} \text{ e } \frac{40}{70}$$

Vemos então que a terceira fração (40/70 = 4/7) é a maior das três. A segunda maior é a primeira (35/70 = 1/2), e a menor de todas é a segunda fração (28/70 = 2/5).

Scanned by CamScanner

Exercícios de revisão sobre frações

E1) Fatore os seguintes números:

a) 720	f) 320	k) 84	p) 384
b) 150	g) 512	l) 120	q) 625
c) 96	h) 630	m) 160	r) 900
d) 105	i) 1024	n) 180	s) 121
e) 144	j) 420	o) 240	t) 288

E2) Calcule o MMC entre:

a) 18 e 30	f) 200 e 320	k) 105 e 120	p) 10, 15 e 45
b) 36 e 48	g) 24, 36 e 60	l) 45, 72 e 150	q) 20, 24 e 30
c) 45 e 72	h) 35, 42 e 48	m) 25, 35, 45 e 55	r) 6 e 32
d) 120 e 144	i) 1, 2, 3, 4, 5 e 6	n) 1, 27, 12, 45 e 36	s) 30 e 10
e) 150 e 180	j) 10, 11, 12 e 15	o) 36, 54 e 12	t) 40 e 20

E3) Se A é um número natural, calcule o MMC entre A e 12.A

E4) Calcule o MMC entre $2^3.6^2.10^2$ e $2^2.9^2$. Indique o resultado na forma fatorada.

E5) Encontre um múltiplo de 36 e 24, compreendido entre 100 e 200.

E6) Encontre uma fração equivalente a 2/5 cujo numerador seja 32

E7) Encontre uma fração equivalente a 3/7 cujo denominador seja 56

E8) Encontre uma fração equivalente a 3/4 cuja soma dos termos seja 35

E9) Encontre uma fração equivalente a 5/8 onde o denominador seja 21 unidades maior que o denominador.

E10) Em uma estrada de 180 km, um motorista viajou 1/3 do total e parou para almoçar, depois percorreu 1/2 total e parou em um posto de gasolina. Qual fração da estrada representa o trecho restante?

E11) Transforme as seguintes frações impróprias em número misto:

a) 7/3	f) 18/7	k) 9/4	p) 20/3
b) 18/5	g) 39/35	l) 21/10	q) 48/5
c) 72/25	h) 17/3	m) 24/5	r) 100/7
d) 14/3	i) 25/3	n) 32/14	s) 9/2
e) 23/5	j) 11/5	o) 17/13	t) 25/7

E12) Transforme os seguintes números mistos em frações impróprias:

a) 3 1/2	f) 1 3/5	k) 1 1/3	p) 4 1/2
b) 5 1/4	g) 2 1/3	l) 2 3/7	q) 2 2/11
c) 7 3/5	h) 1 4/7	m) 2 5/9	r) 1 1/5
d) 11 1/3	i) 2 3/8	n) 1 3/10	s) 5 1/7
e) 2 3/7	j) 2 1/9	o) 3 1/3	t) 10 3/4

E13) Um ônibus enguiçou depois de percorrer 2/5 do seu trajeto. Ficaram faltando 12 km para chegar ao ponto final. Qual é a distância total do trajeto?

E14) Encontre uma fração equivalente a 3/8 cuja soma dos termos seja 55.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

E31) Dois carros partem em sentidos opostos, com a mesma velocidade, em uma estrada de 30 km, sendo um do km 0 em direção ao km 30, e o outro saindo do km 30 em direção ao km 0. Em qual quilômetro da estrada os dois se encontrarão?

E32) Como ficaria o problema anterior se o carro que parte do km 0 tiver o dobro da velocidade do carro que parte do km 30?

E33) E se o carro que parte do km 0 for 4 vezes mais rápido que o outro?

E34) Calcule as porcentagens:

a) 30% de 20	f) 125% de 20	k) 40% de 45	p) 5% de 80
b) 25% de 60	g) 12,5% de 40	l) 25% de 36	q) 100% de 237
c) 15% de 40	h) 300% de 80	m) 75% de 80	r) 19% de 200
d) 10% de 70	i) 80% de 14	n) 30% de 40	s) 15% de 60
e) 35% de 80	j) 75% de 20	o) 90% de 40	t) 12% de 100

E35) Qual das afirmativas abaixo é falsa?
(A) Frações equivalentes representam o mesmo número racional.
(B) Todo número misto é igual a uma fração imprópria.
(C) Uma fração que não é decimal é chamada *fração ordinária*.
(D) O numerador de uma fração nunca pode ser 0.
(E) Numa fração irredutível, o numerador e o denominador são primos entre si.

E36) Qual das afirmativas abaixo é falsa?
(A) A fração cujo denominador é uma potência de 10 é chamada fração decimal.
(B) Fração própria é aquela menor que a unidade
(C) O denominador de uma fração nunca pode ser 0.
(D) A divisão frações é uma operação distributiva em relação à adição
(E) Nas frações impróprias, o numerador é menor ou igual ao denominador

E37) Escreva as seguintes frações decimais na forma de números decimais:

a) 27/1000	f) 1/1000	k) 115/10	p) 13/1000
b) 456/10	g) 500/10	l) 217/10	q) 10/100
c) 12/10000	h) 27/10	m) 1178/100	r) 32/100
d) 5/100	i) 43/10	n) 36/100	s) 21/1000
e) 156/100	j) 77/100	o) 27/1000	t) 8192/1000

E38) Escreva as seguintes porcentagens na forma de fração decimal:

a) 20%	f) 1,25%	k) 10%	p) 40%
b) 5%	g) 162%	l) 1,5%	q) 60%
c) 1%	h) 200%	m) 4%	r) 90%
d) 1,3%	i) 18%	n) 25%	s) 75%
e) 0,5%	j) 12%	o) 32%	t) 35%

E39) Escreva as frações decimais correspondentes aos seguintes números decimais:

a) 0,3	f) 100,1	k) 1,3	p) 1,8
b) 1,2	g) 0,0002	l) 21,12	q) 0,7
c) 0,01	h) 0,000001	m) 0,001	r) 0,99
d) 1,75	i) 0,25	n) 0,005	s) 10,5
e) 3,24	j) 2,25	o) 12,5	t) 8,3

E40) Converta as seguintes frações ordinárias em números decimais:

a) 1/4	f) 15/4	k) 6/5	p) 7/2
b) 5/4	g) 3/25	l) 12/20	q) 3/2
c) 7/5	h) 3/20	m) 17/2	r) 1/8

Scanned by CamScanner

d) 2 1/5
e) 7/8
i) 3/8
j) 3/4
n) 5/8
o) 9/12
s) 9/5
t) 4/5

E41) Converta os seguintes números decimais em frações ordinárias irredutíveis

a) 1,25
b) 0,35
c) 0,75
d) 0,625
e) 0,125
f) 3,4
g) 7,2
h) 4,25
i) 5,2
j) 1,5
k) 1,6
l) 1,75
m) 2,2
n) 1,1
o) 2,5
p) 0,75
q) 0,6
r) 0,4
s) 0,2
t) 0,025

E42) Transforme as seguintes frações em dízimas periódicas

a) 1/3
b) 2/9
c) 4/6
d) 3/7
e) 4/3
f) 8/11
g) 1 2/9
h) 3 1/3
i) 5 3/7
j) 19/15
k) 5/6
l) 1/7
m) 7/3
n) 16/3
o) 5/9
p) 7/18
q) 5/3
r) 21/11
s) 7/9
t) 10/13

E43) Encontre a fração geratriz das seguintes dízimas periódicas:

a) 0,323232...
b) 1,777...
c) 3,1818...
d) 0,555...
e) 0,999...
f) 2,1333...
g) 0,1333...
h) 2,4141...
i) 2,666...
j) 8,333...
k) 16,666...
l) 5,111...
m) 0,444...
n) 0,0666...
o) 0,13232...
p) 0,058333...
q) 0,131313...
r) 0,7432432432...
s) 0,00666...
t) 5,4747...

Lidando com sinais

Operações com números racionais envolvendo frações são praticamente idênticas às operações com frações feitas em séries anteriores do ensino fundamental. O único detalhe que causa um pouco de confusão para quem aprende números racionais pela primeira vez é o uso dos sinais. Se tomarmos um certo numerador e um certo denominador (tomemos como exemplo, 2/15) e levarmos em conta todas as possibilidades de sinais, diversos números racionais podem ser formados (veremos que na verdade só existem dois valores, 2/15 e –2/15):

$$+\frac{+2}{+15}, +\frac{+2}{-15}, +\frac{-2}{+15}, +\frac{-2}{-15}, -\frac{+2}{+15}, -\frac{+2}{-15}, -\frac{-2}{+15} \text{ e } -\frac{-2}{-15}$$

Sabemos que o sinal antes de um número positivo é opcional. Também é opcional colocar + antes de um número racional Então podemos eliminar sinais positivos desnecessários das frações acima. Ficamos então com as possibilidades:

$$\frac{2}{15}, \frac{2}{-15}, \frac{-2}{15}, \frac{-2}{-15}, -\frac{2}{15}, -\frac{2}{-15}, -\frac{-2}{15} \text{ e } -\frac{-2}{-15}$$

Levando em conta apenas o sinal do numerador e do denominador, lembramos que a divisão entre dois números de mesmo sinal dá resultado positivo, e de sinais diferentes dá resultado negativo. Então recalculando as oito frações acima, ficamos com:

a) $\frac{2}{15} = \frac{2}{15}$ (nada a recalcular)

b) $\frac{2}{-15} = -\frac{2}{15}$

Scanned by CamScanner

c) $\frac{-2}{15} = -\frac{2}{15}$

d) $\frac{-2}{-15} = \frac{2}{15}$

e) $-\frac{2}{15} = -\frac{2}{15}$ (nada a recalcular)

f) $-\frac{2}{-15} = \frac{2}{15}$

g) $-\frac{-2}{15} = \frac{2}{15}$

h) $-\frac{-2}{-15} = -\frac{2}{15}$

Dos exemplos (d) e (h) acima, vemos que dois sinais negativos, um no numerador e um no denominador, podem ser simplificados e eliminados. No caso geral, sendo a e b números inteiros quaisquer:

$$\frac{-a}{-b} = \frac{a}{b}$$

Outro exemplo:

$$\frac{-4}{-7} = \frac{4}{7}$$

Dos exemplos (b) e (c) acima, vemos que um sinal negativo do numerador ou do denominador podem ser transferidos para a fração. No caso geral, sendo a e b números inteiros quaisquer:

$$\frac{-a}{b} = -\frac{a}{b}, \text{ e } \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b}$$

Outros exemplos:

$$\frac{-4}{7} = -\frac{4}{7}$$

$$\frac{5}{-8} = -\frac{5}{8}$$

Essas não são na verdade novas regras de sinais. São consequências de regras já apresentadas no capítulo 1. Qualquer fração, com um sinal positivo ou negativo numerador, um sinal positivo ou negativo no denominador, e um sinal positivo ou negativo na própria fração, pode ser considerada como uma sequência com uma multiplicação e uma divisão. Por exemplo:

$$-\frac{4}{-7} = (-1) \times (+4) \div (-7)$$

Scanned by CamScanner

A regra de sinal é simples: se for um número par de negativos, o resultado será positivo, e se for um número ímpar de negativos, ou resultado será negativo. O número (-1) está representando o sinal negativo antes da fração. Se a fração não tivesse sinal, representaríamos isso por um fator (+1). Levando em conta esses três sinais (o da fração, o do numerador e o do denominador), podemos considerar que dois sinais negativos sempre se cancelam, pois quando multiplicamos ou dividimos (-1) por (-1), o resultado será +1. Por isso:

$$-\frac{4}{-7}=\frac{4}{7}$$

Ao formarmos qualquer fração usando números negativos, o resultado será sempre igual a uma fração com numerador e denominador positivos, e com um sinal na frente da fração que poderá ser positivo (opcional) ou negativo. Por isso não é usual escrever frações como

$$\frac{4}{-7}, \frac{-5}{-3}, \frac{-2}{3}, -\frac{-3}{8}, \text{ etc.}$$

Apesar de não ser errado usar as formas acima, é de praxe representar esses números racionais usando numeradores e denominadores positivos, adicionando um sinal negativo na frente da fração, quando for o caso:

$$-\frac{4}{7}, \frac{5}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{3}{8}, \text{ etc.}$$

Exercícios

E44) Reescreva as frações abaixo, usando numeradores e denominadores positivos, e quando for o caso, um sinal negativo antes da fração:

a) $-\frac{5}{-3}=\frac{5}{3}$

b) $\frac{-4}{9}=-\frac{4}{9}$

c) $\frac{-3}{-2}=$

d) $-\frac{-7}{-8}=$

e) $-\frac{-6}{5}=$

f) $\frac{4}{-5}=$

g) $-\frac{7}{-11}=$

h) $\frac{-5}{12}=$

i) $\frac{-9}{-4}=$

j) $-\frac{-1}{-6}=$

k) $-\frac{-2}{9}=$

l) $\frac{2}{-7}=$

m) $-\frac{2}{-3}=$

n) $\frac{-7}{13}=$

o) $\frac{-3}{-11}=$

p) $-\frac{-2}{-5}=$

q) $-\frac{4}{-13}=$

r) $\frac{-7}{10}=$

s) $\frac{-23}{-17}=$

t) $-\frac{-3}{100}=$

Simplificação

Um dos objetivos deste capítulo é que você aprenda a resolver expressões complexas, como as do capítulo anterior, porém usando números racionais. Por isso vamos aos poucos apresentar expressões cada vez mais complexas. Começaremos com um tipo de expressão bastante básico, formada apenas por uma fração, cujo numerador é uma expressão e cujo denominador é outra expressão. Por exemplo:

$$\frac{[2 \times 4-2^2] \div [2 \times (3-4)]}{(-2) \times (-3)-\{(-2)^3+[2 \times (-1)^9+2.(1 \times 3-2^2 \times (-5))]\}}$$

Observe que tanto o numerador como o denominador são expressões com números inteiros, como as que estudamos no capítulo passado. Vamos resolver cada um deles separadamente

Scanned by CamScanner

(nos cálculos abaixo usamos "." para multiplicação, ao invés de "x", para lembrar que esta notação é muito comum):

Numerador:

$[2.4-2^2] \div [2.(3-4)] = [8-4] \div [2.(-1)] = 4 \div (-2) = -2$

Denominador:

$(-2).(-3) - \{(-2)^3 + [2.(-1)^9 + 2.(1.3 - 2^2.(-5))]\} = 6 - \{-8 + [2.(-1) + 2.(3 - 4.(-5))]\}$

$= 6 - \{-8 + [-2 + 2.(3 + 20)]\} = 6 - \{-8 + [-2 + 46]\} = 6 - \{-8 + -2 + 46\} = 6 - \{36\} = -30$

Sendo assim, a fração será igual a:

$$\frac{-2}{-30} = \frac{2}{30} = \frac{1}{15}$$

Portanto resolvemos o numerador e o numerador, depois tratamos o sinal da fração, e finalmente simplificamos. Quando encontramos em uma expressão, frações cujo numerador ou denominador seja uma expressão complexa, devemos antes resolver essas expressões, e se possível simplificá-las, ficando com frações mais fáceis de operar.

Exercícios

E45) Resolva as expressões do numerador e do denominador, a seguir simplifique a fração resultante.

a) $-\frac{5+2}{-3+5} =$

b) $\frac{7-4}{7-2} =$

c) $\frac{-3+(-2)^3}{(-2)^2-(-2)^0} =$

d) $-\frac{1-2^3}{1-3^2} =$

e) $-\frac{2^1-2^3}{2^0+2^2} =$

f) $-\frac{\sqrt{(-4)^2}+\sqrt[3]{(-4)^3}}{-(-99)^0-(-3)\times\left[(-1)^3-(-4)^2\right]} =$

g) $\frac{\sqrt{(-2)^2}+(-2)^3\times(-3)^2}{10\times(1+2+3+4)} =$

h) $-\frac{-\sqrt[3]{(-2)^3}}{\sqrt{(-25)^0}-\sqrt{(-2)^4}} =$

i) $\frac{(-2)^0+(-2)^3}{(-3)^3+(-3)^2+(-3)^1+(-3)^0} =$

j) $-\frac{-(-2).(-5)+(-18)\div(-2)}{(-6)\times(-7)-(-6)\times(-2)^3} =$

k) $\frac{-(-2)^{2^2}}{5^2-5\times(-3)^2} =$

l) $-\frac{(-4)\times(-5)-(-5)^2}{-(-7)^0-(-7)^2} =$

m) $-\frac{2+(-2)^5}{(-5)^2\times(-2)^2} =$

n) $\frac{10^0-10^1}{5.(-4)-2.(-8)} =$

o) $\frac{2.(-15)+(-5)^2}{\sqrt{64}-\sqrt{(-4)^2}} =$

p) $-\frac{-\sqrt{(-2)^2}}{\sqrt{(-3^2)^2}} =$

q) $\frac{2}{1+(-2)^3} =$

r) $-\frac{1+(-2)^3}{(-5)^2-6^2} =$

s) $\frac{(-2)^2}{(-2)^2-(-3)^2} =$

t) $\frac{(-3)^3\div(-3)^2}{10^1-10^2} =$

Adição e subtração de números racionais

Números racionais podem aparecer na forma de fração, na forma de números decimais exatos, na forma de dízimas periódicas, como números inteiros, e como positivos ou negativos. Em relação aos sinais, lidamos da mesma forma como fazemos para números inteiros:

1) Para adicionar dois números racionais de mesmo sinal, somamos seus módulos e repetimos o sinal

Exemplo:

$-2,4 - 3,2 = -5,6$

2) Para adicionar dois números racionais de sinais contrários, subtraímos seus módulos e damos ao resultado, o sinal da parcela de maior módulo.

Scanned by CamScanner

Exemplo:
$-1,2 + 1,6 = +0,4$

3) Em uma sequência de adições, podemos agrupar todos os positivos, e agrupar todos os negativos, e fazer a soma algébrica no final.

Exemplo:
$-1,2 + 1,6 - 2,4 - 3,2 + 4,5 = (-1,2 - 2,4 - 3,2) + (1,6 + 4,5) = -6,8 + 6,1 = -0,7$

A única dificuldade é que podem aparecer na mesma expressão números decimais com diversas representações diferentes: frações, números decimais, dízimas. Quando isso ocorre, devemos converter todos eles para a mesma forma, por exemplo, fração. Em alguns casos podemos usar todos na forma de números decimais, evitando as frações. Vejamos alguns exemplos.

Exemplo:
$0,333... - 0,7 + 2/5 - 1/6$

Nesse caso somos obrigados a trabalhar com frações, já que 0,333... é dízima periódica, que não pode ser representada como um número decimal exato. A fração 1/6 também resulta em uma dízima. Devemos então converter todos para a forma de fração.

$0,333... = 1/3$
$0,7 = 7/10$

Ficamos então com uma adição de três números racionais na forma de fração. É recomendável que nessa etapa façamos a simplificação das frações, quando for possível. Neste exemplo nenhuma das quatro frações envolvidas pode ser simplificada. Ficamos com:

$$\frac{1}{3} - \frac{7}{10} + \frac{2}{5} - \frac{1}{6}$$

Para adicionar algebricamente as frações, devemos reduzir todas ao mesmo denominador. O MMC entre 3, 10, 5 e 6 é 30.

MMC(3, 10, 5, 6) = 30

Sendo assim, multiplicaremos os dois termos da primeira fração por 10, para que fique com o denominador 30. Na segunda multiplicaremos por 3, na terceira por 6 e na quarta por 6. Ficamos então com:

$$\frac{1\times10}{30} - \frac{7\times3}{30} + \frac{2\times6}{30} - \frac{1\times5}{30} =$$

$$\frac{10}{30} - \frac{21}{30} + \frac{12}{30} - \frac{5}{30}$$

Agora que as frações têm o mesmo denominador, podemos somar algebricamente seus numeradores. É preciso entretanto prestar atenção nos sinais. Os números 21 e 5 aparecerão com sinais negativos. Ficamos com:

Scanned by CamScanner

$$\frac{10-21+12-5}{30}$$

Finalmente podemos calcular a soma algébrica dos números que ficaram no numerador da fração. 10 – 21 + 12 – 5 = –4, então o resultado é:

$\frac{-4}{30}$, o mesmo que $-\frac{4}{30}$

Podemos ainda simplificar o numerador e o denominador por 2, e o resultado será:

$$-\frac{2}{15}$$

Tudo o que aprendemos sobre expressões numéricas com números inteiros, pode ser aplicado a números racionais. A sequência de adições e subtrações é o tipo de expressão mais simples. Vejamos mais um exemplo:

Exemplo:

$$\frac{5}{12}+\frac{2}{9}-\frac{7}{4}+\frac{5}{6}-\frac{1}{2}-2$$

Temos uma sequência de adições e subtrações de frações, e ainda uma subtração de um número inteiro (2). Todas as frações são irredutíveis, e teremos que converter todas elas para o mesmo denominador. Antes porém será preciso converter o número 2 para fração, ficará 2/1.

$$\frac{5}{12}+\frac{2}{9}-\frac{7}{4}+\frac{5}{6}-\frac{1}{2}-\frac{2}{1}$$

Agora calculamos o MMC entre os denominadores:

MMC(12, 9, 4, 6, 2, 1) = 36

Devemos então reduzir todas as frações ao denominador 36. Para isso multiplicaremos os termos das frações, respectivamente, por 3, 4, 9, 6, 18 e 36.

$$\frac{5\times3}{36}+\frac{2\times4}{36}-\frac{7\times9}{36}+\frac{5\times6}{36}-\frac{1\times18}{36}-\frac{2\times36}{36}=$$

$$\frac{15+8-63+30-18-72}{36}=$$

Agora podemos adicionar algebricamente todos os positivos do numerador, e fazer o mesmo com todos os negativos:

15 + 8 + 30 = 53
–63 –18 –72 = –153

Ficamos então com:

Scanned by CamScanner

$$\frac{53-153}{36}=\frac{-100}{36}$$

Podemos simplificar o numerador e o denominador por 4. O resultado será:

$$\frac{-100}{36}=\frac{-25}{9}=-\frac{25}{9}$$

Lembramos que é de praxe deixar positivos os termos da fração, e quando for o caso, manter o sinal negativo fora da fração.

A maior dificuldade que os alunos têm nesse ponto não é lidar com os sinais negativos, e sim, a matéria esquecida sobre operações com frações. Por isso vamos primeiro fazer alguns exercícios com operações que envolvam apenas adição e subtração de frações. Depois passaremos a outros exercícios que lidarão com números racionais negativos.

Comparação de números racionais

Já vimos que para comparar frações é preciso reduzi-las ao mesmo denominador. O mesmo ocorre quando lidamos com números racionais, quando podemos encontrar frações positivas ou negativas:

a) Qualquer número positivo é maior que qualquer número negativo

b) O número 0 é menor que qualquer número positivo, e maior que qualquer número negativo.

c) Entre números positivos, o maior é aquele que possui maior módulo

d) Entre números negativos, o maior é aquele que possui menor módulo.

Para comparar números inteiros e frações, devemos transformar os números inteiros em frações aparentes (denominador 1) e reduzir todas ao mesmo denominador. Se tivermos que comparar frações com números decimais, devemos converter os números decimais para frações decimais, e reduzir todas ao mesmo denominador.

Exemplo:
Colocar em ordem crescente os números 13/3, –4/5, –3, –2,5, 4, 10/3, 17/3, 10,666...

Como existem frações entre os números indicados, temos que converter todos para frações, e reduzir todas elas ao mesmo denominador.

–3 = –3/1
–2,5 = –25/10 = –5/2
4 = 4/1
10,666... = 10 + 0,666... = 10 + 2/3 = 32/3

Ficamos então com:

$$\frac{13}{3}, -\frac{4}{5}, -\frac{3}{1}, -\frac{5}{2}, \frac{4}{1}, \frac{10}{3}, \frac{17}{3}, \frac{32}{3}$$

Scanned by CamScanner

A próxima etapa é reduzir todos ao mesmo denominador. O MMC entre 3, 5 e 2 é 30. Devemos então reduzir todas as frações ao denominador 30:

$$\frac{13\times10}{3\times10}, -\frac{4\times6}{5\times6}, -\frac{3\times30}{1\times30}, -\frac{5\times15}{2\times15}, \frac{4\times30}{1\times30}, \frac{10\times10}{3\times10}, \frac{17\times10}{3\times10}, \frac{32\times10}{3\times10}$$

Nesse caso é conveniente deixar os sinais negativos no numerador.

$$\frac{130}{30}, \frac{-24}{30}, \frac{-90}{30}, \frac{-75}{30}, \frac{120}{30}, \frac{100}{30}, \frac{170}{30}, \frac{320}{30}$$

Finalmente podemos colocar as frações em ordem crescente, primeiro as negativas, depois as positivas. Entre as negativas, as menores são as que têm menor módulo. Entre as positivas, as maiores são as que têm maior módulo.

$$\frac{-90}{30}, \frac{-75}{30}, \frac{-24}{30}, \frac{100}{30}, \frac{120}{30}, \frac{130}{30}, \frac{170}{30}, \frac{320}{30}$$

Normalmente é preciso dar a resposta usando os números originais do enunciado. Ficamos então com:

–3, –2,5, –4/5, 10/3, 4, 13/3, 17/3, 10,666...

É de praxe usar os sinais "<" (menor) e ">" (maior) para separar números dispostos em ordem crescente ou decrescente. Ficamos então com:

–3 < –2,5 < –4/5 < 10/3 < 4 < 13/3 < 17/3 < 10,666...

Exercícios

E46) Efetue as seguintes operações com frações e números decimais, dê a resposta em forma de fração

a) 3/2 + 4/5 – 1/7
b) 1/4 + 3/7 + 2
c) 16/3 – 16/4
d) 1/9 – 0,1
e) 1,6 – 0,333...
f) 3/10 + 2/5 + 1/2 – 1/3
g) 3/11 + 8/7
h) 1/2 + 0,25 + 1/8
i) 1/2 – 1/4 – 0,125
j) 4 – 3/10 + 0,2
k) 3 2/3 + 4 1/5 – 1/10
l) 5 1/2 + 1 1/3 – 0,4
m) 2 1/7 + 3 1/5
n) 2,666... – 0,6
o) 0,2 + 0,3 – 1/5 – 1/6
p) 1 5/6 + 3 5/12 + 2 5/18 + 1/3
q) 1 –1/2 + 0,25 – 1/8 + 1/16
r) 1 + 1/2 + 0,2 + 3/7 – 0,7
s) 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 + 1/6
t) 1 + 1/2 + 3 + 1/5 + 5 + 0,2

E47) Encontre o menor número inteiro que seja maior que os números racionais dados

a) 10,25
b) 4,38
c) 5 2/3
d) 0,333...
e) –0,7
f) –13,23
g) 15,777...
h) –1,333...
i) 0,93
j) 45/7
k) 52/3
l) –10/3
m) 37/21
n) –2,666...
o) 3,141592653
p) 2,718281828
q) –4,3817454545...
r) 5 13/73
s) 3 47/40
t) –1/13

E48) Efetue as seguintes operações

a) 4/5 – 9/7
b) – 3/7 + 1
c) 16/7 – 16/5
d) 2/7 – 3/10
e) – 2/3 + 1/2
f) – 2/5 + 1/2
g) 3/8 – 8/7
h) 1/3 – 5/8
i) 1/2 – 7/8
j) – 3/10 –1/5
k) 3 2/5 + 4 1/7
l) 5 1/3 + 1 1/4
m) 2 1/8 – 2 1/6
n) 5/7 – 7/5
o) –1/5 – 1/6
p) 1 5/12 –7/3
q) –1/2 + 1/16
r) 3/5 – 7/10
s) –7/5 + 5/6
t) 1/2 – 3

Scanned by CamScanner

E49) Efetue as seguintes operações

a) 3/2 + 4/5 – 1/6
b) 1/4 + 3/8 + 3
c) 5/3 – 12/5
d) 2/9 – 3/10
e) 1,8 – 1/5 –1/2
f) 3/10 + 2/5 + 1/2 – 1/3
g) 3/11 – 8/7 + 1
h) 1/2 –3/4 + 5/7
i) 1/2 – 0,75 – 5/8
j) 4 – 7/10 + 2/5
k) 3 2/3 + 4 1/5 – 0,3
l) 2 1/2 + 1,333... – 0,4
m) 2 3/7 – 3 1/5 + 0,3
n) 1,666... – 3/5
o) 0,2 + 0,3 – 1/5 – 1/6
p) 1 1/6 – 3 5/9 – 2 7/18 + 0,333...
q) 1 –1/2 + 3/4 –| 5/8 + 7/16 |
r) 1 –1/2 + 0,2 –9/7 – 7/10
s) 1/2 –2/3 + | –3/4 + 4/5 | + 5/6
t) 1 –3/2 + 3 –4/5 + 0,4

E50) Efetue as seguintes operações:

a) 0,6 + 0,666... – 1,333...
b) 1 1/7 – 0,333 – 1,5
c) 0,25 –1,32 + 0,38 –5
d) 0,111... – 0,333... + 0,1
e) 7/8 – 5/6 + 0,25
f) 1/2 – 2/3 + 3/5 – 5/6
g) 0,2 + 0,333... –11/15
h) 4/5 + 0,6 –0,666...
i) 2/3 – 1/4 –1/5 –5/6
j) 1/2 – 1/3 + 1/5 + 1,333...
k) 4/5 – 1/7 –1/10
l) 2/3 – 1/6 + 1/2
m) 0,333... – 0,333
n) 0,999... – 0,333
o) 1/2 + 2/3 – 3/4
p) 3/5 – 1/2 + 5/6
q) 1/3 + 1/30 – 0,333...
r) 1 – 0,999...
s) 2/3 – 4/5 + 3/4
t) 1/16 – 1/8 + 1/3

E51) Use os sinais =, < ou > para comparar os números racionais

a) 3/7 ___ 4/7
b) 2/3 ___ 2/5
c) –1/5 ___ 0
d) –10/3 ___ –3
e) –1/3 ___ –1/5
f) 1 2/5 ___ 4/3
g) 0,333 ___ 0,3...
h) 4 2/35 ___ 5 1/77
i) –2,38 ___ –2,37997
j) 1/5 ___ 20%
k) –10% ___ –1/8
l) 1/3 ___ 3/10
m) –1/3 ___ –0,3
n) 7/10 ___ 2/3
o) –8/3 ___ –2,5
p) 7/5 ___ 4/3
q) –0,222... ___ –3/10
r) –10 ___ –9,9
s) –1/5 ___ –1/4
t) 5/6 ___ 0,9

E52) Use os sinais =, < ou > para comparar os números racionais

a) 4/5 ___ 0,75
b) 0,666 ___ 2/3
c) –4/7 ___ –5/8
d) 9/8 ___ 8/7
e) –9/13 ___ –7/10
f) 4/5 ___ –2/3
g) 7/10 ___ 0
h) –2/3 ___ 1/2
i) –3 ___ 2
j) –0,6 ___ 0,1
k) 0,666 ___ 0,666...
l) 0,3 ___ 3/10
m) 0,999 ___ 1
n) 0,999... ___ 1
o) –0,4 ___ –30/7
p) –3/5 ___ –2/3
q) 4/5 ___ 5/6
r) 5/8 ___ 5/9
s) –0,222 ___ –0,222...
t) 0 ___ –47/147

E53) Use os sinais =, < ou > para comparar os números racionais, mas sem realizar cálculos (faça de cabeça)

a) 14,22... ___ 14 83/97
b) 0 ___ –3,17921792...
c) –5,1212... ___ –6,333...
d) 1,3181 ___ 2,21289
e) 0,333333 ___ 0,333...
f) 4 7/239 ___ 5 13/777
g) 25,15 ___ 100/4
h) –2,1313... ___ 0,218
i) 715/113 ___ 700/113
j) 23/59 ___ 23/61
k) –18/73 ___ –18/71
l) 11% ___ –12,375%
m) 0,9175 ___ 73/72
n) –0,999... ___ –1
o) 0,377... ___ 0,37775
p) 1/256 ___ 2/500
q) 1,333... ___ 3/2
r) 4/7 ___ 4/9
s) –2/7 ___ –2/9
t) 1/5 ___ 1/6

Multiplicação e divisão de números racionais

A multiplicação e a divisão de números racionais são idênticas às multiplicações e divisões de frações. A única diferença é o tratamento de sinal. A regra é a mesma apresentada no capítulo 1: se o número de fatores negativos for par, o resultado será positivo; se o número de fatores negativos for ímpar, o resultado será negativo.

Inicialmente vamos recordar a multiplicação de frações, através de exemplos:

Exemplo:

$$\frac{4}{5}\times\frac{2}{7}=\frac{4\times2}{5\times7}=\frac{8}{35}$$

Para multiplicar frações, o resultado será uma fração cujo numerador é o produto dos numeradores, e cujo denominador é o produto dos denominadores. Normalmente será desejável simplificar fatores comuns no numerador e no denominador ("corta-corta").

Scanned by CamScanner

Exemplo:

$$\frac{8}{25}\times\frac{15}{28}=\frac{2}{5}\times\frac{3}{7}$$

Nesse exemplo podemos simplificar o 8 e o 28 por 4, ficarão 2 e 7. Podemos também simplificar o 15 e o 25 por 5, ficarão 3 e 5. Nesse tipo de cálculo, devemos procurar fatores que possam dividir simultaneamente um número que apareça no numerador e um número que apareça no denominador. Ficaremos então com:

$$\frac{2}{5}\times\frac{3}{7}=\frac{6}{35}$$

A divisão de frações é tão simples quanto a multiplicação. Para dividir frações, fazemos uma multiplicação na qual a primeira fração é repetida, e segunda é invertida.

Exemplo:

$$\frac{2}{5}\div\frac{3}{7}=\frac{2}{5}\times\frac{7}{3}=\frac{14}{15}$$

Dividir por uma fração é o mesmo que multiplicar pela inversa dessa fração.

As regras de sinais são as mesmas para multiplicação e divisão de números inteiros.

Exemplos:

a) $\left(-\frac{2}{5}\right)\times\left(-\frac{7}{3}\right)=+\frac{14}{15}$ (o produto de dois negativos dá resultado positivo)

b) $\left(-\frac{2}{5}\right)\times\left(\frac{7}{3}\right)=-\frac{14}{15}$ (o produto de um positivo por um negativo dá resultado negativo)

c) $\left(+\frac{2}{5}\right)\div\left(-\frac{4}{15}\right)=-\frac{2}{5}\times\frac{15}{4}=-\frac{1}{1}\times\frac{3}{2}=-\frac{3}{2}$

No exemplo acima, primeiro tratamos o sinal, que será negativo. Depois transformamos a divisão na multiplicação pelo inverso. A seguir simplificamos, e finalmente encontramos o resultado final.

d) $-4\times\left(-\frac{5}{12}\right)=\left(-\frac{4}{1}\right)\times\left(-\frac{5}{12}\right)=+\frac{1}{1}\times\frac{5}{3}=\frac{5}{3}$

No exemplo acima, multiplicamos um número inteiro (–4) por uma fração (–5/12). Para isso, transformamos o –4 na fração aparente –4/1. A seguir tratamos o sinal (produto de dois negativos será positivo) e fazemos a simplificação de 4 e 12 por 4, ficamos então com o resultado +5/3. Também é correto simplificar diretamente o 4 com o 12, sem transformar o 4 em fração. Ficaríamos com:

$$-4\times\left(-\frac{5}{12}\right)=+1\times\frac{5}{3}=\frac{5}{3}$$

e) $\left(-\frac{2}{5}\right)\times\left(1\frac{2}{3}\right)=-\frac{2}{5}\times\frac{5}{3}=-\frac{2}{3}$

Scanned by CamScanner

No exemplo acima, o detalhe importante foi transformar o número misto 1 2/3 em uma fração imprópria, resultando em 5/3. Para essa transformação, o denominador da nova fração é igual ao denominador do número misto. Já o numerador é obtido com a soma do numerador do número misto com o produto da parte inteira pelo denominador. Genericamente falando, se a, b e c são números naturais, temos:

$$a\frac{b}{c}=\frac{a.c+b}{c}$$

Quando o número misto começa com um sinal negativo, consideramos que este sinal se aplica a toda a fração:

$$-2\frac{3}{5}=-\left(2\frac{3}{5}\right)=-\frac{13}{5}$$

CUIDADO: Não confunda número misto com multiplicação de inteiro por fração. Veja bem a diferença entre os três números abaixo:

$$3\times\frac{3}{5},\ 3.\frac{3}{5}\ \text{e}\ 3\frac{3}{5}$$

Os dois primeiros são a multiplicação de 3 por 3/5. O terceiro não é uma multiplicação, e sim, o número misto 3 3/5, que é igual a 3 + 3/5. Muitas vezes a omissão de um sinal algébrico indica multiplicação, mas não no caso de números mistos.

Inverso ou recíproco

Dada uma fração a/b, chamamos a sua fração simétrica ou recíproca de b/a. No caso particular de números inteiros, o inverso ou recíproco de a é 1/a. Vejamos alguns exemplos:

O inverso de 4/5 é 5/4
O inverso de 2/3 é 3/2
O inverso de 3/10 é 10/3
O inverso de 5 é 1/5
O inverso de 3 é 1/3
O inverso de 1/4 é 4.
O inverso de 1/10 é 10.

O número 0 não tem inverso, mas números negativos possuem inversos negativos:

O inverso de –3/7 é –7/3
O inverso de –4/9 é –9/4
O inverso de –4 é –1/4
O inverso de –1/6 é –6

Não confunda *inverso* ou *recíproco* com *simétrico* ou *oposto*:

O simétrico ou oposto de um número a é –a.
O inverso ou recíproco de um número a é 1/a.

Um detalhe importante é que quando multiplicamos um número racional pelo seu inverso, o resultado é sempre 1.

Scanned by CamScanner

$(4/5) \times (5/4) = 1$
$(2/3) \times (3/2) = 1$
$(3/10) \times (10/3) = 1$
$5 \times 1/5 = 1$
$3 \times 1/3 = 1$
$(1/4) \times 4 = 1$
$(1/10) \times 10 = 1$
$(-3/7) \times (-7/3) = 1$
$(-4/9) \times (-9/4) = 1$
$(-4) \times (-1/4) = 1$
$(-1/6) \times (-6) = 1$

Fração de fração

Em matemática, a palavra "de" tem o sentido de multiplicação. Quando temos que calcular uma parte "de" um valor, basta escrever uma expressão com esta parte multiplicada por este valor.

Exemplos:

A metade de $3/5 = \frac{1}{2} \times \frac{3}{5} = \frac{3}{10}$

20% de $1/6 = \frac{20}{100} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{5} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{30}$

O triplo de $4/5 = 3 \times \frac{4}{5} = \frac{12}{5}$

Expressões com adição, subtração, multiplicação e divisão de racionais

Para resolver essas expressões devemos observar as regras já ensinadas até agora. Devemos resolver primeiro as multiplicações e divisões na ordem em que aparecem, e as adições e subtrações por último.

Exemplo:

$$\frac{3}{4} \div \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \times \frac{2}{7}$$

Nessa expressão temos apenas números positivos, o que facilita um pouco. Temos uma divisão de frações somada com uma multiplicação. Multiplicações e divisões devem ser resolvidas primeiro. Só depois realizamos as adições e subtrações. Ficamos então com:

$$\frac{3}{4} \div \frac{1}{2} = \frac{3}{4} \times \frac{2}{1} = \frac{3}{2}$$
$$\frac{1}{3} \times \frac{2}{7} = \frac{2}{21}$$

Agora podemos adicionar os dois resultados:

$$\frac{3}{2} + \frac{2}{21} = \frac{3 \times 21}{42} + \frac{2 \times 2}{42} = \frac{63 + 4}{42} = \frac{67}{42}$$

Scanned by CamScanner

Exemplo:

$$\left(-\frac{1}{3}\right)\times\frac{4}{5}+\frac{2}{5}\div\left(-\frac{2}{7}\right)$$

Esta expressão tem uma multiplicação e uma divisão de racionais. Resolvemos cada uma separadamente, mas agora devemos prestar atenção nos sinais:

$$\left(-\frac{1}{3}\right)\times\frac{4}{5}=-\frac{4}{15}$$

$$\frac{2}{5}\div\left(-\frac{2}{7}\right)=-\frac{2}{5}\times\frac{7}{2}=-\frac{7}{5}$$

Agora devemos adicionar os dois resultados:

$$-\frac{4}{15}-\frac{7}{5}=-\left(\frac{4}{15}+\frac{7}{5}\right)=-\left(\frac{4}{15}+\frac{7\times3}{15}\right)=-\frac{4+21}{15}=-\frac{25}{15}=-\frac{5}{3}$$

Nesse tipo de expressão é preciso tomar muito cuidado para não errar os sinais.

A maior dificuldade dos alunos não é manipular os sinais, e sim, lembrar das operações com frações positivas, ensinadas nas primeiras séries do ensino fundamental. Vamos portanto fazer antes alguns exercícios com frações positivas, para depois operar com sinais.

Organize o rascunho

O desenvolvimento de cálculos, muitas vezes feito no rascunho, não pode ser uma bagunça. Muitos alunos fazem as contas, em uma sequência da esquerda para a direita, depois continuam no canto oposto do papel, depois abaixo, então passam para a parte de cima da folha, então passam a escrever de baixo para cima, e da direita para a esquerda, sempre aproveitando todos os espaços do papel. Fazendo dessa forma, corremos o risco de errar as contas. Faça as contas de forma organizada, em linhas correndo de cima para baixo, e preenchendo as linhas da esquerda para a direita, como são formadas as páginas de um livro.



A bagunça no rascunho dificulta os cálculos.

Scanned by CamScanner

Resolver expressões complexas é uma habilidade exigida em todos os concursos que envolvem matemática. No caso do Colégio Naval, EPCAr e Colégio Militar, praticamente todas os anos essas questões são cobradas. Como já foi apresentado neste livro, o macete da palavra "PEMDAS" ajuda a lembrar a ordem das operações, nem sempre esclarece o que deve ser feito. Ao visualizar uma sequência de operações, considere a multiplicação e a divisão, juntamente com as potências, como uma forte ligação entre os números. Considere a adição e a subtração como ligações mais fracas. Por exemplo, ao visualizar a expressão

$$\frac{1}{3}\times\frac{2}{5}+\frac{4}{3}\div\frac{5}{2}-\frac{5}{2}\div\frac{3}{5}$$

Procure identificar grupos com valores "unidos" pela multiplicação, divisão e potência, e considere como "separadores" a adição e a subtração. Desenhe no rascunho, antes de escrever a expressão, um diagrama simples desses grupos. Por exemplo, para a expressão acima, temos três grupos ligados pelos sinas "+" e "–", que devem ser representados como:

O primeiro grupo é calculado como $\frac{1}{3}\times\frac{2}{5}$, o segundo como $\frac{4}{3}\div\frac{5}{2}$ e o terceiro como $\frac{5}{2}\div\frac{3}{5}$. Aprenda a sempre olhar a expressão e identificar os grupos, antes de começar a calcular. Depois de calculados, preencha os valores nos "círculos" do diagrama. Você não é obrigado a resolver dessa forma, mas utilize algum tipo de marcação para que você não se perca no meio dos cálculos.

Nas expressões que envolvem parênteses, colchetes e chaves, o potencial para erro é grande, principalmente quando esses separadores estão aninhados (ou seja, uns dentro dos outros). Nossa sugestão para que você não se perca nos cálculos é manter esses símbolos no meio dos cálculos, mesmo depois de determinados seus valores. Por exemplo, se uma expressão está dentro de colchetes, e seu valor é calculado como 2/5, não escreva simplesmente 2/5, mas sim, [2/5]. Assim você vai lembrar de onde veio aquele valor e não irá se "perder" na expressão. Ficará também mais fácil revisar os cálculos.

Recomendamos ainda que você resolva as expressões duas vezes. Se os valores encontrados nas duas vezes forem iguais, provavelmente o cálculo está correto. Ao fazer isso, resolva a expressão pela segunda vez, usando uma ordem diferente da que você usou da primeira vez. Se resolver das duas vezes exatamente na mesma sequência, é grande a chance de cometer o mesmo erro duas vezes. Por exemplo, ao somar um grupo de frações, some todas elas, positivas e negativas. Na segunda vez, faça de forma diferente, somando todas as positivas e depois todas as negativas, depois some algebricamente os resultados.

Em certas provas, o espaço para rascunho é pequeno. Habitue-se então a fazer o rascunho a lápis e apagá-lo para reaproveitamento.

Scanned by CamScanner

Exercícios

E54) Calcule

a) $\frac{2}{5}\times\frac{3}{8}=$

b) $\frac{12}{7}\times\frac{1}{2}=$

c) $\frac{7}{11}\times\frac{1}{2}=$

d) $\frac{120}{72}\times\frac{91}{7}=$

e) $\frac{18}{15}\times\frac{105}{14}=$

f) $\frac{13}{23}\times\frac{46}{65}=$

g) $\frac{3}{4}\times\frac{200}{33}=$

h) $\frac{18}{25}\times\frac{35}{33}\times\frac{22}{15}=$

i) $\frac{1}{2}\times\frac{3}{4}\times\frac{5}{6}=$

j) $\frac{12}{21}\times\frac{8}{65}\times\frac{24}{16}\times\frac{91}{75}=$

k) $1\frac{1}{2}\times4\frac{1}{3}=$

l) $2\frac{4}{5}\times3\frac{4}{7}=$

m) $3\frac{2}{3}\times1\frac{5}{22}=$

n) $5\frac{3}{2}\times1\frac{3}{7}=$

o) $3\frac{3}{7}\times2\frac{1}{3}=$

p) $4\times\frac{7}{2}=$

q) $5\times\frac{6}{7}=$

r) $3\times\frac{5}{6}=$

s) $0{,}2\times\frac{4}{3}=$

t) $0{,}333...\times\frac{12}{5}=$

E55) Calcule

a) A metade de 3/4
b) A terça parte de 2/5
c) 2/3 de 360
d) 2/3 de 4/5
e) 1/2 de 3 7/8
f) 4/7 de 280
g) 1/3 de 22
h) 20% de 4/7
i) a metade de 10% de 8
j) 1/2 de 1/3 de 1/4
k) 1/5 de 20% de 2/5
l) 2/3 de 3/5 de 5/2
m) 4/5 de 20% de 30
n) 1/3 da metade de 60
o) A quarta parte de 2/3
p) Um quinto da metade de 33
q) O triplo da metade de 7
r) A metade de 1/3 de 720
s) a metade de 1/3 de 7/8
t) 10% da metade de 4/5

E56) Calcule:

a) O inverso de 2
b) O inverso de 10
c) O recíproco de 3/5
d) O recíproco de 4/7
e) O inverso de 1/6
f) O inverso de 24/7
g) O inverso de 2/9
h) O recíproco de 2/9
i) O inverso de 20
j) O recíproco de 1/7
k) O inverso de -2/5
l) O recíproco de -5
m) O inverso de -1/18
n) O recíproco de -2/7
o) O inverso de 0,2
p) O inverso do inverso de 4/7
q) O recíproco do inverso de -2/9
r) O inverso do simétrico de 4/11
s) O oposto do recíproco de 15
t) O inverso do recíproco de -4/13

E57) Efetue as seguintes divisões, dando a resposta na forma de frações irredutíveis:

a) $\frac{6}{7}\div\frac{12}{35}=$

b) $\frac{12}{5}\div\frac{16}{65}=$

c) $\frac{1}{3}\div\frac{4}{15}=$

d) $3\div\frac{4}{5}=$

e) $15\div\frac{3}{2}=$

f) $\frac{16}{27}\div12=$

g) $\frac{15}{16}\div8=$

h) $2\frac{4}{5}\div1\frac{3}{4}=$

i) $2\frac{1}{7}\div\frac{3}{7}=$

j) $3\frac{1}{2}\div\frac{1}{4}=$

k) $\frac{12}{26}\div\frac{72}{65}=$

l) $\frac{48}{35}\div\frac{32}{84}=$

m) $\frac{24}{15}\div\frac{28}{21}=$

n) $\frac{12}{36}\div\frac{30}{15}=$

o) $\frac{105}{91}\div\frac{84}{65}=$

p) $8\div\frac{7}{3}=$

q) $\frac{33}{5}\div6=$

r) $1{,}6\div\frac{4}{5}=$

s) $\frac{12}{21}\div0{,}3=$

t) $0{,}3\div0{,}666...=$

E58) Calcule

a) $-\frac{4}{5}\times\frac{3}{14}=$

b) $\left(-\frac{12}{35}\right)\times\left(-\frac{5}{2}\right)=$

c) $\left(-\frac{21}{84}\right)\times\frac{4}{7}=$

d) $-\frac{2}{7}\times\frac{3}{16}=$

f) $\left(-\frac{18}{25}\right)\times\frac{45}{32}=$

g) $\left(-\frac{3}{4}\right)\times\left(-\frac{2}{3}\right)=$

h) $\left(-\frac{27}{35}\right)\times\frac{-21}{33}\times\left(-\frac{22}{15}\right)=$

i) $\left(-\frac{7}{12}\right)\times\left(-\frac{33}{70}\right)\times\left(-\frac{25}{22}\right)=$

k) $1\frac{3}{11}\times\left(-2\frac{1}{5}\right)=$

l) $-2\frac{5}{6}\times\left(-3\frac{3}{5}\right)=$

m) $-\frac{2}{3}\times\left(-1\frac{5}{7}\right)=$

n) $5\frac{3}{5}\times\left(-1\frac{3}{7}\right)=$

p) $5\times\left(-\frac{3}{10}\right)=$

q) $(-4)\times\frac{5}{8}=$

r) $3\times\left(-\frac{7}{6}\right)=$

s) $-0{,}2\times\left(-\frac{8}{3}\right)=$

Scanned by CamScanner

e) $\frac{20}{32}\times\left(-\frac{15}{24}\right)=$

j) $\left(-\frac{52}{21}\right)\times\left(-\frac{8}{65}\right)\times\left(-\frac{28}{16}\right)=$

o) $-3\frac{3}{7}\times\left(-2\frac{1}{3}\right)=$

t) $0{,}333...\times\left(-\frac{16}{3}\right)=$

E59) Calcule:

a) $-\frac{6}{7}\div\frac{18}{105}=$

b) $\left(-\frac{26}{15}\right)\div\frac{52}{45}=$

c) $\left(-\frac{1}{7}\right)\div\left(-\frac{2}{21}\right)=$

d) $-4\div\frac{12}{5}=$

e) $25\div\left(-\frac{5}{3}\right)=$

f) $\frac{24}{5}\div(-16)=$

g) $-\frac{25}{16}\div(-20)=$

h) $2\frac{2}{9}\div\left(-2\frac{1}{4}\right)=$

i) $\left(-\frac{6}{7}\right)\div\left(-\frac{3}{14}\right)=$

j) $-3\frac{1}{5}\div\frac{4}{25}=$

k) $\frac{12}{13}\div\left(-\frac{24}{65}\right)=$

l) $-\frac{12}{35}\div\frac{21}{49}=$

m) $\frac{4}{5}\div\left(-\frac{2}{3}\right)=$

n) $-\frac{12}{25}\div\left(-\frac{4}{15}\right)=$

o) $\frac{10}{9}\div\left(-\frac{4}{27}\right)=$

p) $-4\div\frac{5}{3}=$

q) $\left(-\frac{21}{5}\right)\div 6=$

r) $-1{,}8\div\left(-\frac{3}{5}\right)=$

s) $\frac{6}{7}\div(-0{,}3)=$

t) $-0{,}6\div(-0{,}222...)=$

E60) Resolva as seguintes expressões:

OBS.: Lembre-se que para multiplicar ou dividir frações, não e preciso que tenham o mesmo denominador.

a) $\left(\frac{8}{3}+\frac{1}{2}\right)\times\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{6}\right)$

b) $\left(\frac{2}{3}-\frac{2}{5}\right)\div\left(\frac{1}{5}+\frac{3}{8}\right)$

c) $\left(\frac{4}{5}-\frac{3}{4}\right)\times\left(\frac{2}{7}+\frac{1}{3}\right)$

d) $\left(\frac{5}{7}-\frac{1}{3}\right)\times\left(\frac{1}{3}+\frac{2}{7}\right)$

e) $\left(\frac{2}{3}-\frac{1}{2}\right)\times\left(\frac{4}{5}+\frac{1}{6}\right)$

f) $\left(\frac{3}{4}-\frac{1}{3}\right)\div\left(\frac{2}{5}+\frac{4}{3}\right)$

g) $\left(2\frac{8}{3}+1\frac{1}{2}\right)\times\left(2\frac{1}{5}-1\frac{1}{6}\right)$

h) $\left(2\frac{2}{3}-1\frac{2}{5}\right)\div\left(\frac{1}{5}+1\right)$

i) $\left(2-\frac{3}{4}\right)\times\left(1+\frac{1}{3}\right)$

j) $\left(5-\frac{1}{3}\right)\times\left(4+\frac{1}{7}\right)$

E61) Resolva as seguintes expressões:

a) $\left[\left(\frac{3}{5}-\frac{2}{7}\right)\times\left(\frac{3}{4}+\frac{1}{8}\right)\right]\div\left(\frac{5}{2}-\frac{2}{5}\right)$

b) $\left[\frac{2}{3}\times\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{8}\right)+\left(\frac{5}{4}\div\frac{9}{2}\right)\right]\div\left(\frac{4}{7}-\frac{1}{2}\right)$

c) $\left[\left(1-\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}\right)\times\left(\frac{2}{3}\div\frac{4}{3}\right)\right]\div\left(\frac{2}{3}+\frac{1}{4}\right)$

d) $\left[\left(\frac{2}{5}-\frac{1}{7}\right)+\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{8}\right)-\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{7}\right)\right]\div\left(\frac{7}{2}-\frac{1}{5}\right)$

e) $\left[\left(2-\frac{1}{2}\times\frac{1}{5}\right)\times\left(\frac{4}{5}\div\frac{2}{25}\right)\right]\div\left(\frac{5}{3}+\frac{1}{4}\right)$

f) $\frac{2}{3}\times\frac{4}{5}+\frac{5}{9}\div\frac{25}{3}$

g) $\frac{12}{9}\times\frac{6}{5}+\frac{1}{6}\times\frac{5}{4}$

h) $\frac{15}{16}\div\frac{10}{8}-\frac{3}{4}\div\frac{9}{2}$

i) $\frac{4}{5}\div\frac{8}{3}+\frac{14}{5}\times\frac{3}{7}$

j) $\frac{1}{3}\times\frac{2}{5}-\frac{4}{3}\div\frac{5}{2}+\frac{5}{2}\div\frac{3}{5}-\frac{1}{2}\div\frac{3}{5}$

Scanned by CamScanner

ALUNOS DA EPCAr

Lembre-se que as provas da Aeronáutica "pegam pesado" nos cálculos.

E62) Resolva as seguintes expressões:

a) $-\frac{4}{5}\times\frac{3}{14}+0{,}6.(-0{,}222...)=$

b) $\left(-\frac{18}{25}\right)\times\frac{45}{32}\times 2\frac{2}{9}\div\left(-2\frac{1}{4}\right)=$

c) $1\frac{3}{11}\times\left(-2\frac{1}{5}\right)\ -\frac{25}{16}\div(-20)=$

d) $5\times\left(-\frac{3}{10}\right)-\frac{25}{16}\div(\frac{5}{4})=$

e) $\left(-\frac{12}{35}\right)\times\left(-\frac{5}{2}\right)-1{,}8\div\left(-\frac{3}{5}\right)=$

f) $\left(-\frac{3}{4}\right)\times\left(-\frac{2}{3}\right)\ -\frac{6}{7}\div\frac{18}{105}=$

g) $-2\frac{5}{6}\times\left(-3\frac{3}{5}\right)-\frac{25}{16}\div\frac{5}{8}=$

h) $(-4)\times\frac{5}{12}\ -\frac{9}{7}\div\frac{18}{35}=$

i) $\left(-\frac{21}{84}\right)\times\frac{4}{7}-\frac{12}{13}\div\left(-\frac{24}{65}\right)=$

j) $-3\frac{3}{7}\times\left(-2\frac{1}{3}\right)-4\div\frac{5}{3}=$

k) $\left(-\frac{52}{21}\right)\times\left(-\frac{8}{65}\right)\times\left(-\frac{28}{16}\right)+\left(-\frac{6}{7}\right)\div\left(-\frac{3}{14}\right)=$

l) $\left(-\frac{27}{35}\right)\times\frac{-21}{33}\times\left(-\frac{22}{15}\right)+\left(-\frac{1}{7}\right)\div\left(-\frac{2}{21}\right)=$

m) $0{,}333...\times\left(-\frac{16}{3}\right)\ -\frac{12}{35}\div\frac{21}{49}=$

n) $\frac{20}{32}\times\left(-\frac{15}{24}\right)-\frac{4}{5}\div\left(-\frac{2}{3}\right)=$

o) $-0{,}2\times\left(-\frac{8}{3}\right)-\frac{12}{25}\div\left(-\frac{4}{15}\right)=$

p) $\left(-\frac{7}{12}\right)\times\left(-\frac{33}{70}\right)\times\left(-\frac{25}{22}\right)-\frac{24}{5}\div(-16)=$

q) $-\frac{2}{7}\times\frac{3}{16}\ +\left(-\frac{26}{15}\right)\div\frac{52}{45}=$

r) $5\frac{3}{5}\times\left(-1\frac{3}{7}\right)-1{,}8\div\left(-\frac{3}{5}\right)=$

s) $3\times\left(-\frac{7}{6}\right)+\left(-\frac{21}{5}\right)\div 6=$

t) $-\frac{2}{3}\times\left(-1\frac{5}{7}\right)-\frac{6}{7}\div(-0{,}3)=$

Propriedades das operações com números racionais

As propriedades das operações com números naturais e inteiros são válidas também para os números racionais. Assim como ocorre nesses outros conjuntos, a subtração e a divisão não possuem propriedades notáveis. Não são comutativas nem associativas, e não possuem elemento neutro. Já a adição e a multiplicação possuem várias propriedades.

Scanned by CamScanner

Propriedade de fechamento da adição

Dizemos que o conjunto Q é fechado em relação à adição, pois se adicionarmos dois elementos quaisquer de Q, o resultado também será um elemento do conjunto Q. Em palavras mais simples, a soma de dois números racionais sempre será um número racional. Isto significa que é impossível, por exemplo, adicionar dois números racionais e encontrar como resultado um número irracional.

Para todo $x \in Q$ e todo $y \in Q$, $(x+y) \in Q$

Ou seja, *"a soma de números racionais é também um número racional"*.

(**OBS.**: Por outro lado, é possível o contrário, adicionar dois números irracionais e encontrar um resultado racional).

Exemplo:
$4/5 \in Q$ e $-3/7 \in Q$, a soma $(4/5) + (-3/7) = 13/35 \in Q$

Isso parece óbvio, mas nem todas as operações possuem a propriedade do fechamento. Considere uma operação fictícia chamada ®, definida por:

$x \circledR y = \sqrt[y]{x}$

Por exemplo, $16 \circledR 2 = \sqrt[2]{16} = 4$

Esta operação não é fechada em Q, basta verificar com um exemplo:

$5 \circledR 2 = \sqrt[2]{5}$, que é um número irracional, ou seja, não pertence a Q. Esta operação é bastante comum na matemática, é encontrada em algumas calculadoras científicas, entretanto não possui a propriedade de fechamento em Q.

Além da adição, uma outra propriedade que possui fechamento em Q é a subtração, ou seja, se subtrairmos dois números racionais quaisquer, o resultado sempre será um número racional.

Para todo $x \in Q$ e todo $y \in Q$, $(x-y) \in Q$

Propriedade do elemento neutro da adição

O número zero é elemento neutro da adição em Q, assim como ocorre nas adições de números naturais e de números inteiros:

Para todo $x \in Q$, $x+0 = x$ e $0+x = x$

Observe que para ser elemento neutro, o número tem que ser operando tanto à esquerda quanto na direita, e dar o mesmo resultado. O número 0 não é elemento neutro da subtração, pois apesar de $x - 0$ ser igual a x, $0 - x$ não é igual a x, então não satisfaz inteiramente as condições para ser elemento neutro.

Scanned by CamScanner

Propriedade comutativa da adição

Esta propriedade permite que calculemos y+x ou x+y, chegando ao mesmo resultado. Muitos a conhecem como "a ordem das parcelas não altera a soma". Matematicamente falando, temos:

Para todo $x \in Q$ e todo $y \in Q$, $x+y = y+x$

Exemplo:
$5/3 + 4/5 = 4/5 + 5/3$

Propriedade associativa da adição

Ao encontrarmos uma expressão na forma x+y+z, podemos realizar primeiro x+y, para então adicionar o resultado com z, ou então realizar primeiro y+z, para depois adicionar este resultado a x. Muitas vezes é mais fácil combinar os números em uma outra ordem, facilitando cálculos. Por exemplo:

$4 + 1/5 + 4/5$

Observamos que se adicionarmos 1/5 + 4/5, encontraremos 1. Para terminar o cálculo basta fazermos 4+1=5. Se fizéssemos as contas na ordem em que aparecem, poderia ser mais demorado.

Para todo $x \in Q$, todo $y \in Q$ e todo $z \in Q$, $(x+y)+z = x+(y+z)$

Propriedade de fechamento da multiplicação

O produto de dois números racionais sempre será um número racional, é o que diz a propriedade de fechamento da multiplicação:

Para todo $x \in Q$ e todo $y \in Q$, $x.y \in Q$

Já vimos que nem todas as operações apresentam a propriedade do fechamento. No caso do conjunto dos racionais, a adição e a multiplicação são dois exemplos de operações fechadas.

Propriedade do elemento neutro da multiplicação

O número 1 é o elemento neutro da multiplicação nos números racionais, ou seja, qualquer número multiplicado por 1, tanto na ordem normal quanto na ordem inversa, resulta no próprio número.

Para todo $x \in Q$, $x.1 = x$ e $1.x = x$

Propriedade comutativa da multiplicação

A multiplicação é comutativa nos naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais e até nos números complexos, ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto. Especificando para os racionais, temos:

Para todo $x \in Q$ e todo $y \in Q$, $x.y = y.x$

Sendo assim, podemos inverter a ordem dos fatores durante o cálculo, o que podem em alguns casos reduzir o trabalho. Exemplo:

Scanned by CamScanner

$$\frac{4}{5}\times\frac{3}{7}\times\frac{5}{4}=\frac{3}{7}$$

Se trocarmos as posições dos dois primeiros fatores, ficaremos com as frações 4/5 e 5/4 juntas. Essas frações, multiplicadas, resultam em 1. Então o cálculo será reduzido a 3/7 multiplicado por 1, que resulta em 3/7.

Propriedade associativa da multiplicação

Dizemos que uma operação é associativa quando temos três valores operados, e podemos operar os dois primeiros e depois o terceiro, ou então operar os dois últimos, para depois operar com o primeiro:

$(x.y).z = x.(y.z)$

A multiplicação de números racionais possui essa propriedade:

Para todo $x\in Q$, todo $y\in Q$ e todo $z\in Q$, $(x.y).z = x.(y.z)$

É graças às propriedades associativa e comutativa, combinadas, que podemos fazer simplificações em longas sequências de multiplicações, "cortando" fatores em qualquer numerador com qualquer denominador.

Propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição e subtração

A propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição diz que:

$x.(a+b) = x.a + x.b$

e

$(a+b).x = a.x + b.x$

Quando estamos operando com números, normalmente é mais vantajoso resolver o conteúdo dos parênteses (no caso a adição de a e b), para depois fazer a multiplicação. Entretanto quando estivermos operando com letras, a opção de usar a distributividade será muito útil.

A multiplicação de racionais também é distributiva em relação à subtração:

$x.(a-b) = x.a - x.b$

e

$(a-b).x = a.x - b.x$

Potências de números racionais – expoentes positivos

Até agora estamos usando a mesma definição de potência que foi usada para números naturais:

$$A^B = \underbrace{A\times A\times A\times A\times\ldots\times A}_{\text{(B vezes)}}$$

Scanned by CamScanner

Estamos considerando que B, o expoente, é um número inteiro e positivo. Tudo ficará um pouco mais complicado quando o expoente não for mais um número inteiro. Na próxima seção estudaremos o caso do expoente inteiro negativo. No capítulo 14 estudaremos os casos em que o expoente é uma fração, ou um número qualquer.

Elevar um número racional a um expoente inteiro positivo é uma operação exatamente igual à que foi estudada em séries anteriores, durante o estudo das frações. A única diferença aqui é que a base poderá ser negativa. Considere então que queremos calcular A^B, onde A é um número racional (positivo ou negativo) na forma de fração, e que B é um inteiro positivo. Sendo assim:

$$A^B = \left(-\frac{n}{d}\right)^B = \underbrace{\left(-\frac{n}{d}\right)\times\left(-\frac{n}{d}\right)\times\left(-\frac{n}{d}\right)\times\left(-\frac{n}{d}\right)\times\ldots\times\left(-\frac{n}{d}\right)}_{\text{(B fatores)}}$$

Este resultado terá um sinal, que poderá ser + ou −, e um módulo que será uma fração na forma: n^B / d^B, ou seja, elevamos o numerador e o denominador ao expoente dado. Se o número original for positivo, o resultado será sempre positivo. Se o número original for negativo, tudo dependerá do expoente B: Se B for par, o resultado será positivo, se B for ímpar, o resultado será negativo (o produto de um número ímpar de fatores negativos é negativo).

Exemplos:

a) $\left(\frac{2}{3}\right)^4 = \frac{2^4}{3^4} = \frac{16}{81}$ (base positiva: resultado será positivo, não importando o expoente)

b) $\left(-\frac{2}{3}\right)^4 = +\frac{2^4}{3^4} = \frac{16}{81}$ (base negativa, mas expoente par: resultado positivo)

c) $\left(-\frac{2}{3}\right)^3 = -\frac{2^3}{3^3} = -\frac{8}{27}$ (base negativa e expoente ímpar: resultado será negativo)

É muito fácil entender essas regras de sinais, nem é preciso memorizar. Sabemos que o produto de números positivos é sempre positivo, por isso as potências de base positiva serão sempre positivas.

Quando multiplicamos números positivos e negativos, cada dois fatores negativos fornecem um resultado positivo. Então se o número de fatores negativos for par, teremos positivos multiplicados por positivos, e o resultado final será positivo.

Mas quando multiplicamos vários fatores negativos, em um número ímpar de vezes, cada dupla resultará em um número positivo. Sendo ímpar o número de fatores, sobrará um negativo, mantendo então o resultado final também negativo. Ou seja, as regras de sinais são as mesmas válidas para bases inteiras.

A ordem correta

Muitos alunos erram expressões com potências porque não identificam corretamente a qual valor a potência se aplica. Por exemplo, veja uma forma errada de escrever 3/5 elevado ao quadrado:

Scanned by CamScanner

$$\frac{3^2}{5}$$

Da forma como está escrito, ficamos em dúvida sobre qual é o valor que está sendo elevado ao quadrado, se é apenas o 3 ou se é a fração 3/5. Alguém pode argumentar que está claro que é o 3/5 que está elevado ao quadrado, pois se fosse apenas o 3, o traço de fração estaria maior, para englobar o 3 e o expoente 2. Não é uma boa ideia contar com sutilizas como esta para entender as operações matemáticas. Devemos deixar tudo bem claro, usando parênteses. Por exemplo:

$\left(\frac{3}{5}\right)^2$: Isto é a fração 3/5 elevada ao quadrado

$\frac{3^2}{5}$: Isto é o número 3, elevado ao quadrado, e o resultado (9) é dividido por 5

O correto é considerar que um expoente se aplica ao valor que está à sua esquerda, muitas vezes um único número. Por exemplo:

4.3^2 : Apenas o número 3 está elevado ao quadrado, e o resultado, é multiplicado por 4

Se nossa intenção na expressão acima for elevar ao quadrado o produto 4.3, temos que usar parênteses:

$(4.3)^2$: Agora sim, o produto 4.3=12 está sendo elevado ao quadrado

A mesma coisa ocorre quando temos sinais. Veja por exemplo a diferença entre as duas expressões abaixo:

-3^2 : Temos o valor de 3^2, com sinal negativo, que resulta em –9

$(-3)^2$: O número –3 está elevado ao quadrado (com sinal e tudo), e o resultado é +9

Para não cometer esses erros é preciso ter disciplina na hora de escrever as expressões no papel.

Não esqueça, quando não são usados parênteses, as potências são calculadas primeiro, depois as multiplicações e divisões, e por último as adições e subtrações. O uso de parênteses permite alterar essa ordem padrão.

A ordem de cálculo nas expressões numéricas e algébricas é uma simples questão de convenção, apesar de seguir uma lógica. Por exemplo, a potência nada mais é que uma série de multiplicações, enquanto a multiplicação nada mais é que uma série de adições. Por isso, calculamos primeiro as potências, depois as multiplicações (e divisões também, na ordem em que aparecem, e depois adições e subtrações, também na ordem em que aparecem. Em caso de dúvida, a formulação da questão pode utilizar parênteses, que são resolvidos antes das demais operações. Seguindo esta lógica, muitos professores ensinam ao aluno para seguirem a ordem dada pela palavra PEMDAS, que significa parênteses – expoente – multiplicação –

Scanned by CamScanner

divisão – adição – subtração. O problema é que este "macete" dá a entender que multiplicações sempre devem ser feitas antes das divisões, o que é errado. Por exemplo, qual seria a forma correta de calcular:

$24 \div 2 \times 3$?

Usando o "macete" PEMDAS, o aluno seria levado a realizar primeiro a multiplicação, depois a divisão, ficando então com:

$24 \div 2 \times 3 = 24 \div 6 = 4$ (ERRADO !!!)

O correto é realizar multiplicações e divisões na ordem em que aparecem, ficando então com:

$24 \div 2 \times 3 = 12 \times 3 = 36$ (CERTO !!!)

O correto seria então apresentar o "PEMDAS" da seguinte forma:

P
E
M ou D
A ou S

Outra questão importante é o uso de parênteses, chaves e colchetes. As crianças são orientadas a realizar primeiro as operações entre parênteses, depois aquelas entre colchetes e finalmente as que estão entre chaves. Para que isto funcione, cabe ao formulador da questão respeitar também esta ordem.

Por exemplo,

$$25-\left\{3.17-\left[-10+6.(8-4.(-2))+2+3\right]-4.(-4)\right\} \div (-4)$$

Entretanto, matematicamente os parênteses, chaves e colchetes têm significados semelhantes. A mesma expressão acima poderia ser escrita usando somente parênteses:

$$25-(3.17-(-10+6.(8-4.(-2))+2+3)-4.(-4)) \div (-4)$$

A mesma expressão poderia (apesar de não ser usual) ser escrita desrespeitando a posição tradicional:

$$25-(3.17-\{-10+6.[8-4.[-2]]+2+3\}-4.(-4)) \div [-4]$$

Claro que uma questão colocada dessa forma em uma prova seria uma "armadilha" para confundir os alunos.

A regra correta e geral para este caso seria: resolver primeiro, os separadores mais internos, e por último, os mais externos. Tanto é assim que nas linguagens de computador, somente parênteses são usados, não existem chaves nem colchetes nas expressões matemáticas.

Fica portanto mantida a regra ensinada nos primeiros anos do ensino fundamental, de resolver primeiro parênteses, colchetes e chaves, mas somente se o formulador da questão obedecer à mesma ordem convencionada. A regra mais rigorosa é de resolver as expressões, da mais interna para a mais externa, independente de serem usados parênteses, colchetes ou chaves.

Scanned by CamScanner

Exercícios

E63) Calcule as seguintes potências:

a) $\left(\frac{1}{3}\right)^2 =$
b) $\left(\frac{2}{3}\right)^2 =$
c) $\left(\frac{4}{5}\right)^2 =$
d) $\left(\frac{2}{5}\right)^3 =$
e) $\left(\frac{3}{10}\right)^3 =$
f) $\left(\frac{4}{9}\right)^2 =$
g) $\left(\frac{5}{8}\right)^2 =$
h) $\left(\frac{3}{7}\right)^2 =$
i) $\left(\frac{2}{3}\right)^3 =$
j) $\left(\frac{10}{3}\right)^3 =$
k) $\left(\frac{7}{10}\right)^2 =$
l) $\left(\frac{8}{9}\right)^2 =$
m) $\left(\frac{3}{8}\right)^2 =$
n) $\left(\frac{2}{3}\right)^3 =$
o) $\left(\frac{7}{10}\right)^3 =$
p) $\left(\frac{1}{2}\right)^5 =$
q) $\left(\frac{1}{10}\right)^4 =$
r) $\left(\frac{5}{2}\right)^3 =$
s) $\left(\frac{5}{3}\right)^3 =$
t) $\left(\frac{2}{3}\right)^5 =$

E64) Calcule as seguintes potências:

a) $\left(-\frac{1}{9}\right)^2 =$
b) $\left(-\frac{2}{3}\right)^3 =$
c) $-\left(-\frac{3}{10}\right)^4 =$
d) $\left(-\frac{1}{2}\right)^5 =$
e) $\left(\frac{9}{7}\right)^2 =$
f) $\left(\frac{7}{100}\right)^2 =$
g) $\left(-\frac{5}{9}\right)^2 =$
h) $\left(-\frac{1}{4}\right)^3 =$
i) $\left(-\frac{2}{10}\right)^4 =$
j) $-\left(\frac{2}{5}\right)^3 =$
k) $\left(-\frac{4}{11}\right)^0 =$
l) $\left(-\frac{2}{7}\right)^2 =$
m) $\left(\frac{3}{11}\right)^2 =$
n) $\left(-\frac{12}{13}\right)^2 =$
o) $\left(\frac{3}{10}\right)^3 =$
p) $-\left(-\frac{1}{3}\right)^4 =$
q) $\left(-\frac{3}{2}\right)^5 =$
r) $-\left(\frac{10}{7}\right)^2 =$
s) $\left(-\frac{9}{13}\right)^2 =$
t) $\left(-\frac{3}{5}\right)^4 =$

Os números racionais também podem aparecer nas formas de números decimais, dízimas periódicas, número misto ou porcentagem. Para calcular potências desses números, é conveniente convertê-los antes para a forma de fração. A única exceção fica por conta dos números decimais, que podem ser elevados com relativa facilidade ao quadrado ou ao cubo.

Exemplo:
Calcule $(1,2)^2$

Para multiplicar números decimais (no caso, 1,2 x 1,2), multiplicamos normalmente os números sem vírgula. O número de casas decimais do resultado será igual à soma dos números de casas decimais dos fatores. Como 1,2 tem uma casa decimal, o produto 1,2 x 1,2 terá 2 casas decimais. Já que 12.12=144, ficamos com:

1,2 x 1,2 = 1,44

Outros exemplos:
a) $0,3^2 = (3/10)^2 = 9/100$

b) $(-0,333...)^3 = (-1/3)^3 = -1/27$

Scanned by CamScanner

c) $(40\%)^2 = (2/5)^2 = 4/25$

d) $(1\ 3/5)^2 = (8/5)^2 = 64/25 = 2\ 14/25$

Exercícios

E65) Calcule as seguintes potências, dando o resultado na forma decimal ou fração. Caso o gabarito esteja em outra forma que sua resposta, confirme a igualdade:

a) $(-1,4)^2$ =
b) $(10\%)^3$ =
c) $0,444...^2$ =
d) $(1\ 1/2)^3$ =
e) $(-0,666...)^2$ =
f) $1,5^2$ =
g) $0,2^3$ =
h) $(-0,5)^2$ =
i) $1,2^3$ =
j) $(1\ 1/10)^3$ =
k) $(-2,5)^2$ =
l) $(0,1)^3$ =
m) $(-0,222...)^2$ =
n) $0,5^3$ =
o) $(1\ 3/5)^2$ =
p) $0,6^3$ =
q) $-0,4^2$ =
r) $0,5^4$ =
s) $(-0,32783287...)^0$ =
t) $(0,01)^2$ =

Propriedades das potências

As propriedades das operações na maioria das vezes servem para facilitar os cálculos. Considere por exemplo a expressão:

$$2^{10} \times 5^{10} =$$

É fácil calcular 2^{10}, o resultado é 1024. Mas 5^{10} é bem mais trabalhoso, dá 9.765.625. Mas sabemos que $2^{10}.5^{10} = (2.5)^{10} = 10^{10}$, a partir de uma propriedade básica das potências. Calcular 10^{10} é bem fácil, pois é uma potência de 10, basta escrever 1 seguido de 10 zeros. Então o resultado e 10.000.000.000. O mesmo resultado que encontraríamos se fizéssemos 1024x9.765.625, só que por um caminho bem mais simples. As expressões complicadas que aparecem em provas, quase sempre ficam mais simples com o uso de algumas propriedades das suas operações. O que fizemos aqui, ao resolver a expressão por um caminho mais rápido, foi um tipo de simplificação.

As propriedades das potências cuja base é um número racional são as mesmas das potências cujas bases são números naturais ou inteiros. Sendo x um número racional qualquer (exceto 0), e sendo **a** e **b** números naturais, temos:

a) $x^1 = x$ Ex: $(5/3)^1 = 5/3$

b) $x^0 = 1$ Ex: $(-4/7)^0 = 1$

c) $x^a.x^b = x^{a+b}$ Ex: $(2/5)^2.(2/5)^4 = (2/5)^6$

d) $x^a.y^a = (x.y)^a$ Ex: $(4/3)^3.(5/2)^3 = [(4/3).(5/2)]^3 = [10/3]^3$

e) $x^a/x^b = x^{(a-b)}$ Ex: $(3/5)^5 \div (3/5)^3 = (3/5)^2$

f) $x^a/y^a = (x/y)^a$ Ex: $(4/9)^2 \div (2/15)^2 = [(4/9)\div(2/15)]^2 = [10/3]^2$

g) $(x^a)^b = x^{a.b}$ Ex: $[(2/3)^2]^3 = (2/3)^6$

As propriedades acima também valem para x=0, exceto para 0^0, que não é permitido.

Lembre-se que essas propriedades nada mais são que consequências da definição de potência. Por exemplo, a propriedade (d):

Scanned by CamScanner

$x^a = x.x....x$ (a vezes)
$x^b = x.x.x....x$ (b vezes)
$x^a.x^b = (x.x...x).(x.x.x...)$ (a+b vezes)

Exercícios

E66) Aplique a propriedade $x^1=x$

a) $\left(-\frac{1}{3}\right)^1 =$ c) $\left(-\frac{4}{5}\right)^1 =$ e) $(-0{,}333...)^1 =$ g) $(-2{,}18)^1 =$

b) $\left(\frac{1}{2}\right)^1 =$ d) $\left(5\frac{2}{7}\right)^1 =$ f) $(3{,}14)^1 =$ h) $\left(-\frac{2}{5}\right)^1 =$

E67) Aplique a propriedade $x^0=1$

a) $\left(-\frac{1}{7}\right)^0 =$ c) $\left(\frac{4}{3}\right)^0 =$ e) $(-5{,}333...)^0 =$ g) $\left(-\frac{2}{3}\right)^0 =$

b) $\left(-\frac{2}{5}\right)^0 =$ d) $\left(2\frac{4}{7}\right)^0 =$ f) $\left(\frac{4}{9}\right)^0 =$ h) $(-6{,}02)^0 =$

E68) Aplique a propriedade $x^a.x^b = x^{a+b}$

a) $\left(-\frac{1}{5}\right)^2 \times \left(-\frac{1}{5}\right)^3 =$ c) $\left(-\frac{2}{3}\right)^2 \times \left(-\frac{2}{3}\right)^3 =$ e) $\left(-\frac{3}{5}\right)^1 \times \left(-\frac{3}{5}\right)^2 =$ g) $\left(\frac{2}{5}\right)^1 \times \left(\frac{2}{5}\right)^3 =$

b) $\left(\frac{1}{2}\right)^4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^3 =$ d) $\left(\frac{1}{10}\right)^4 \times \left(\frac{1}{10}\right)^3 =$ f) $\left(-\frac{1}{2}\right)^2 \times \left(-\frac{1}{2}\right)^3 =$ h) $\left(-\frac{3}{10}\right)^2 \times \left(-\frac{3}{10}\right)^3 =$

E69) Aplique a propriedade $x^a.y^a = (x.y)^a$

a) $\left(\frac{1}{3}\right)^2 \times \left(\frac{3}{2}\right)^2 =$ c) $\left(-\frac{3}{10}\right)^4 \times \left(-\frac{5}{3}\right)^4 =$ e) $\left(-\frac{5}{9}\right)^5 \times \left(-\frac{9}{10}\right)^5 =$ g) $\left(-\frac{5}{3}\right)^6 \times \left(-\frac{3}{50}\right)^6 =$

b) $\left(-\frac{2}{3}\right)^3 \times \left(\frac{5}{2}\right)^3 =$ d) $\left(\frac{5}{6}\right)^4 \times \left(-\frac{2}{5}\right)^4 =$ f) $\left(-\frac{3}{20}\right)^3 \times \left(-\frac{5}{3}\right)^3 =$ h) $\left(-\frac{6}{40}\right)^2 \times \left(\frac{20}{27}\right)^2 =$

E70) Aplique a propriedade $x^a/x^b = x^{(a-b)}$

a) $\left(-\frac{1}{2}\right)^4 \div \left(-\frac{1}{2}\right)^2 =$ c) $\left(\frac{1}{10}\right)^8 \div \left(\frac{1}{10}\right)^5 =$ e) $\left(\frac{1}{3}\right)^4 \div \left(\frac{1}{3}\right)^3 =$ g) $\left(-\frac{2}{5}\right)^9 \div \left(-\frac{2}{5}\right)^6 =$

b) $\left(\frac{2}{5}\right)^7 \div \left(\frac{2}{5}\right)^5 =$ d) $\left(\frac{2}{3}\right)^8 \div \left(\frac{2}{3}\right)^4 =$ f) $\left(\frac{3}{10}\right)^5 \div \left(\frac{3}{10}\right)^3 =$ h) $\left(-\frac{1}{2}\right)^{11} \div \left(-\frac{1}{2}\right)^7 =$

E71) Aplique a propriedade $x^a/y^a = (x/y)^a$

a) $\left(-\frac{6}{15}\right)^2 \div \left(-\frac{14}{30}\right)^2 =$ c) $\left(\frac{5}{15}\right)^2 \div \left(-\frac{8}{3}\right)^2 =$ e) $\left(-\frac{2}{1}\right)^3 \div \left(\frac{3}{1}\right)^3 =$ g) $\left(\frac{20}{36}\right)^5 \div \left(-\frac{10}{9}\right)^5 =$

b) $\left(-\frac{3}{21}\right)^{10} \div \left(-\frac{10}{35}\right)^{10} =$ d) $\left(\frac{6}{33}\right)^4 \div \left(\frac{35}{77}\right)^4 =$ f) $\left(-\frac{26}{10}\right)^3 \div \left(\frac{39}{35}\right)^3 =$ h) $\left(\frac{35}{105}\right)^7 \div \left(\frac{20}{6}\right)^7 =$

Scanned by CamScanner

E72) Aplique a propriedade $(x^a)^b = x^{a.b}$

a) $\left[\left(-\frac{2}{3}\right)^3\right]^2 =$

b) $\left[\left(\frac{2}{5}\right)^5\right]^3 =$

c) $\left[\left(-\frac{1}{10}\right)^2\right]^4 =$

d) $\left[\left(-\frac{3}{10}\right)^{10}\right]^2 =$

e) $\left[\left(\frac{4}{5}\right)^2\right]^3 =$

f) $\left[\left(-\frac{1}{3}\right)^1\right]^2 =$

g) $\left[\left(-\frac{1}{2}\right)^6\right]^3 =$

h) $\left[\left(\frac{2}{7}\right)^2\right]^3 =$

Os exercícios acima foram fáceis porque já informam qual é a propriedade de potências a ser utilizada. Podem ficar mais difíceis se essas propriedades não forem informadas. Você precisará então memorizar essas propriedades, mas isso não é difícil:

a) Expoente 1: o resultado é o próprio número_____ $x^1 = x$

b) Expoente 0: o resultado é sempre 1_____ $x^0 = 1$

OBS: Não é permitido 0^0.

As propriedades (c), (d), (e) e (f) dizem respeito a multiplicações e divisões de potências, com bases ou expoentes iguais. Expoentes são adicionados ou subtraídos quando as bases são iguais. Bases são mutliplicadas ou divididas quando os expoentes são iguais.

Multiplicação de potências:

c) Bases iguais, somar os expoentes_____ $x^a.x^b = x^{a+b}$

d) Expoentes iguais, multiplicar as bases_____ $x^a.y^a = (x.y)^a$

Divisão de potências:

e) Bases iguais, subtrair os expoentes_____ $x^a/x^b = x^{(a-b)}$

f) Expoentes iguais, dividir as bases_____ $x^a/y^a = (x/y)^a$

g) Potência de uma potência: multiplique os expoentes_____ $(x^a)^b = x^{a.b}$

Exercícios

E73) Aplique as propriedades de potências e calcule o resultado na forma de fração ou de uma única potência.

a) $\left(-\frac{3}{5}\right)^1 \times \left(-\frac{3}{5}\right)^2 =$

b) $\left(\frac{2}{3}\right)^2 \times \left(\frac{2}{3}\right)^3 =$

c) $-\left(\frac{2}{5}\right)^1 \times \left(\frac{2}{5}\right)^3 =$

d) $\left(\frac{1}{2}\right)^2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^4 =$

f) $\left(-\frac{3}{11}\right)^0 =$

g) $\left(\frac{4}{17}\right)^1 =$

h) $\left(-\frac{1}{999}\right)^0 =$

i) $\left(-\frac{23}{45}\right)^1 =$

k) $\left(-\frac{2}{5}\right)^3 \times \left(\frac{3}{2}\right)^3 =$

l) $\left(\frac{10}{3}\right)^2 \times \left(\frac{6}{5}\right)^2 =$

m) $\left(\frac{18}{5}\right)^3 \times \left(-\frac{10}{9}\right)^3 =$

n) $\left(-\frac{3}{10}\right)^4 \times \left(\frac{25}{3}\right)^4 =$

p) $\left(-\frac{15}{32}\right)^2 \div \left(-\frac{10}{16}\right)^2 =$

q) $\left(-\frac{24}{42}\right)^3 \div \left(\frac{15}{28}\right)^3 =$

r) $\left(\frac{24}{16}\right)^4 \div \left(-\frac{30}{20}\right)^4 =$

s) $\left(\frac{48}{72}\right)^2 \div \left(\frac{16}{36}\right)^2 =$

Scanned by CamScanner

e) $\left(\frac{-3}{10}\right)^2 \times \left(\frac{-3}{10}\right)^3 =$ j) $\left(\frac{923}{777}\right)^0 =$ o) $\left(\frac{14}{35}\right)^2 \times \left(\frac{15}{10}\right)^2 =$ t) $\left(\frac{42}{105}\right)^5 \div \left(-\frac{30}{15}\right)^5 =$

E74) Aplique as propriedades de potências e calcule o resultado na forma de fração ou de uma única potência.

a) $\left(-\frac{1}{5}\right)^2 \times \left(-\frac{1}{5}\right)^3 =$ f) $\left(\frac{2}{3}\right)^2 \times \left(-\frac{9}{5}\right)^2 =$ k) $\left(-\frac{2}{3}\right)^5 \div \left(-\frac{2}{3}\right)^2 =$ p) $\left(-\frac{18}{35}\right)^2 \div \left(-\frac{9}{7}\right)^2 =$

b) $\left(\frac{1}{2}\right)^4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^3 =$ g) $\left(-\frac{15}{14}\right)^3 \times \left(\frac{7}{12}\right)^3 =$ l) $\left(-\frac{1}{2}\right)^7 \div \left(-\frac{1}{2}\right)^5 =$ q) $\left(\frac{15}{22}\right)^5 \div \left(-\frac{105}{77}\right)^5 =$

c) $\left(-\frac{3}{10}\right) \times \left(-\frac{3}{10}\right)^3 =$ h) $\left(\frac{3}{14}\right)^4 \times \left(\frac{7}{15}\right)^4 =$ m) $\left(\frac{2}{5}\right)^6 \div \left(\frac{2}{5}\right)^3 =$ r) $\left(-\frac{2}{15}\right)^4 \div \left(\frac{14}{35}\right)^4 =$

d) $\frac{2}{5} \times \left(\frac{2}{5}\right)^2 \times \left(\frac{2}{5}\right)^2 =$ i) $\left(\frac{21}{5}\right)^5 \times \left(\frac{5}{14}\right)^5 =$ n) $\left(-\frac{3}{5}\right)^7 \div \left(-\frac{3}{5}\right)^4 =$ s) $\left(\frac{10}{35}\right)^3 \div \left(\frac{6}{14}\right)^3 =$

e) $\left(-\frac{1}{2}\right)^2 \times \left(-\frac{1}{2}\right)^6 =$ j) $\left(\frac{15}{2}\right)^6 \times \left(\frac{1}{5}\right)^6 =$ o) $\left(\frac{11}{37}\right)^6 \div \left(\frac{11}{37}\right)^5 =$ t) $\left(-\frac{1}{5}\right)^6 \div \left(-\frac{6}{15}\right)^6 =$

E75) Aplique as propriedades de potências e exprima o resultado em potências de x

a) $x^2.x^3 =$ f) $x^7 \div x^2 =$ k) $(x^2)^3 =$ p) $(2x^2).(4x^3) =$
b) $x^5.x^2 =$ g) $x^6 \div x^4 =$ l) $(x^3)^4 =$ q) $(4x^3).(5x^4) =$
c) $x^7.x^2 =$ h) $x^{10} \div x^6 =$ m) $(x^4)^6 =$ r) $(3x^4).(x^2) =$
d) $x.x.x =$ i) $x^5 \div x^4 =$ n) $(x^5)^3 =$ s) $(2x^5)^3 =$
e) $x.x^2.x^3.x^4.x^5 =$ j) $x^7 \div x^7 =$ o) $(x^2)^{30} =$ t) $(3x^2)^4 =$

Não existe propriedade específica para casos em que as bases são diferentes e os expoentes são diferentes. Nesses casos é preciso desenvolver todas as potências e fazer as simplificações possíveis.

Exemplo:

$$\left(\frac{15}{8}\right)^4 \times \left(\frac{12}{15}\right)^6$$

Note que as bases são diferentes e os expoentes também são diferentes. A primeira coisa a fazer é fatorar todos os números, e a seguir fazer as simplificações possíveis.

$$\left(\frac{3\times5}{2^3}\right)^4 \times \left(\frac{2^2\times3}{3\times5}\right)^6$$

Podemos simplificar a segunda fração por 3, ficando com:

$$\left(\frac{3\times5}{2^3}\right)^4 \times \left(\frac{2^2}{5}\right)^6$$

Agora elevamos cada numerador e denominador à potência apropriada. Na primeira fração, ambos serão elevados à quarta potência, e na segunda fração, ambos serão elevados à sexta potência. Nessa operação devemos lembrar das propriedades da potência de potência e da potência de produto.

Scanned by CamScanner

$$\left(\frac{3\times5}{2^3}\right)^4\times\left(\frac{2^2}{5}\right)^6=\frac{3^4\times5^4}{2^{12}}\times\frac{2^{12}}{5^6}$$

Podemos agora simplificar o 2^{12}, e simplificar 5^4 e 5^6, dividindo ambos por 5^4, ficará 1 no numerador e 5^2 no denominador ($5^6 \div 5^4 = 5^2$). O resultado será:

$$\frac{3^4\times5^4}{2^{12}}\times\frac{2^{12}}{5^6}=\frac{3^4}{1}\times\frac{1}{5^2}=\frac{81}{25}$$

Como vemos, quando não encontramos bases iguais ou expoentes iguais para aplicar as propriedades de potências, ainda assim conseguimos realizar os cálculos, apesar de dar um pouco mais de trabalho.

Como vemos, em expressões que envolvam potências, podemos encontrar exemplos em que as propriedades de potências de mesma base ou expoente podem ser aplicadas ou não. Também encontramos exemplos em que os números são expressos em diversas formas: números inteiros, frações, dízimas periódicas, números decimais ou porcentagens. Em geral a expressão fica mais simples quando convertemos todos os números para frações, mas nem sempre.

Exercícios

E76) Calcule as seguintes expressões e dê o resultado na forma de fração:

a) $(0{,}666...)^3 \cdot (1{,}2)^2 =$

b) $(2{,}333...)^2 \div \left(1\frac{5}{9}\right) =$

c) $(0{,}999...)^{100}.(1{,}0101)^0 =$

d) $1{,}6^3 \div 1{,}2^2 =$

e) $0{,}5^5 \div 0{,}75^3 =$

f) $1{,}6^2 \cdot (1{,}666...)^3 =$

g) $\left(-\frac{2}{3}\right)^2 \div \frac{2^3}{3^3} =$

h) $(1{,}666...)^2 \cdot 1{,}5^3 =$

i) (50% de $3{,}666...)^2 =$

j) $2{,}25 \cdot (0{,}666...)^3 =$

k) $0{,}2^3 \cdot 1{,}5^2 =$

l) $\left(2\frac{1}{2}\right)^3 \times \left(3\frac{1}{5}\right) =$

m) $(0{,}444...)^2 \cdot 1{,}5^3 =$

n) $(0{,}666...)^2 \div (0{,}222...)^3 =$

o) $(0{,}8333...)^2.1{,}6^3 =$

p) $1{,}2^3 \cdot (1{,}333...)^2 =$

q) $\left(-\frac{35}{6}\right)^2 \times \left(\frac{3}{10}\right)^3 =$

r) $1{,}5^2 \div 5{,}25 =$

s) $[(0{,}333...)^2 \cdot 1{,}5^3]^2 =$

t) $(0{,}444...)^2 \cdot 2{,}25^3 =$

Saber calcular expressões é importante, mas muitas vezes, uma questão de cálculo aparentemente complexa tem solução extremamente simples quando são utilizadas tais propriedades. Considere o exemplo:

CN 97

Resolvendo-se a expressão

$$\frac{\left\{\left[\left(\sqrt[3]{1{,}331}\right)^{12/5}\right]^0\right\}^{-7,2}-1}{8^{33}+8^{33}+8^{33}+8^{33}+8^{33}}\times\frac{1}{2^{302}}$$

encontra-se:

(A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1 (E) 0

Alunos do Colégio Naval:
Precisam "detonar" as expressões numéricas e encontrar seus atalhos.

Scanned by CamScanner

Solução:
A expressão levaria a cálculos bastante "indigestos", entretanto a resposta não necessita de cálculos. Basta observar a expressão entre colchetes, que é complexa mas está elevada a zero. Sabemos que qualquer número elevado a zero é igual a 1, desde que não seja 0^0. Certamente a expressão entre colchetes não vale zero, pois é a raiz cúbica de um número positivo, elevado a um expoente positivo. Ao elevamos 1 à potência 7,2, permanece o resultado 1, pois se elevarmos 1 a qualquer potência o resultado será 1. Subtraindo 1, ficamos com o denominador zero. Zero dividido por qualquer número vale zero (somente não é permitido 0/0). Este numerador zero da primeira fração, dividido pelo numerador que certamente é um valor positivo, resulta em zero. Multiplicando pela segunda fração, não importa o seu valor, o resultado será zero.

Isto mostra que muitas vezes expressões extremamente complicadas são resolvidas sem contas, apenas aplicando as propriedades das operações.

Um outro exemplo está presente em uma tese de mestrado na qual o autor sustenta que é inútil ensinar os alunos a realizarem cálculos complexos, entretanto a questão é muito fácil, bastando usar as propriedades das operações. Provavelmente o responsável pela discussão considerou-a uma questão com cálculos complexos por não ter vislumbrado a solução mais simples, que usa apenas propriedades das potências de expoente zero e base 1.

Exemplo: Determine o valor de x em:

$$\left(\frac{4\frac{5}{6}-\sqrt[6]{64}-2\frac{7}{9}+0{,}8}{\frac{11}{x+9}}\right)\cdot\left(\frac{\frac{8}{x}}{7+\sqrt{81}}\right)=0$$

O produto de dois números vale zero quando pelo menos um deles vale zero. Os números deste problema são frações, portando basta que um dos denominadores seja zero para que a expressão seja igual a zero. O segundo numerador, 8/x, não pode ser zero, pois seu numerador é 8. O numerador da primeira fração dá um pouco de trabalho para calcular, mas é fácil observar que também não pode ser zero. A primeira fração é menor que 0,5, o quarto termo é 0,8, então não chegam a 1,3. Os termos do meio são negativos, e seu total em módulo é maior que 4. Sendo assim este numerador é negativo, e não zero. Apenas analisando esses dois numeradores concluímos que este produto nunca será zero, para valor algum de x. Sendo assim a equação não tem solução: nenhum valor de x a satisfaz. Trata-se de uma equação impossível.

Os dois exemplos acima mostram que conhecer as propriedades das operações matemáticas pode resolver certos problemas sem a necessidade de contas. Aliás, são problemas cuja solução deve ser feita sem contas. Servem para testar se o aluno conhece as propriedades das operações matemáticas. Não são problemas para o aluno realizar cálculos absurdos.

Potências de números racionais – expoentes negativos

No estudo dos números naturais, dos números inteiros e até esta parte do estudo dos números racionais, lidamos somente com potências com expoentes inteiros positivos (e o expoente zero, é claro).

Scanned by CamScanner

Sabemos que elevar um número a a uma potência n significa formar um produto com n fatores a, ou seja:

$a^n = \underbrace{a.a.a.a.....a}_{\text{(n vezes)}}$

Mas o que seria elevar um número *a* a uma potência -n?

$a^{-n} = ?$

Podemos descobrir o que significa a^{-n} aplicando uma fórmula já vista nas propriedades das potências:

$a^x.a^y = a^{x+y}$

Essa fórmula vale para qualquer número racional a, e para quaisquer expoentes inteiros naturais x e y (exceto caso seja formado 0^0). Se esta fórmula valesse também para expoentes negativos, poderíamos fazer x=n e y=-n, ficando com:

$a^n \cdot a^{-n} = a^{n-n} = a^0 = 1$

Então, a^{-n} e a^n são números que, quando multiplicados, dão resultado 1. Já vimos que isso é uma característica do inverso de um número racional: ao multiplicarmos um número pelo seu inverso, o resultado é 1. Concluímos então que a^{-n} é o inverso de a^n. Escrevemos então:

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

Essa relação vale para qualquer número *a* que seja natural, inteiro ou racional. Vale também para números irracionais e para números reais. Só não vale para a=0, ou seja, o número 0 não pode ser elevado a expoentes negativos, caso contrário resultaria em um denominador nulo, e sabemos que a divisão por zero não existe.

Exemplos:

$$5^{-2} = \frac{1}{5^2}; \quad (-4)^{-3} = \frac{1}{(-4)^3}; \quad 7^{-1} = \frac{1}{7}$$

Esse último resultado é importante: $a^{-1} = 1/a$, ou seja, elevar um número à potência -1 é a mesma coisa que encontrar o seu inverso.

Vejamos agora o que ocorre quando a é um número racional. A fórmula $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ pode ser escrita como:

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} = \frac{1^n}{a^n} = \left(\frac{1}{a}\right)^n$$

Então, se a for um número racional, na forma x/y, o inverso de a será y/x. Ficamos então com:

Scanned by CamScanner

$$\left(\frac{x}{y}\right)^{-n}=\left(\frac{y}{x}\right)^{n}$$

Em outras palavras, elevar um número racional a uma potência negativa, é o mesmo que inverter este número racional (trocar de lugar o numerador com o denominador) e tornar o expoente positivo.

Exemplos:

$$\left(\frac{5}{3}\right)^{-2}=\left(\frac{3}{5}\right)^{2};\quad \left(\frac{7}{10}\right)^{-5}=\left(\frac{10}{7}\right)^{5};\quad 3^{-5}=\left(\frac{1}{3}\right)^{5}=\frac{1}{3^5}$$

Note que para inverter uma fração, trocamos de lugar o numerador com o denominador. Para inverter um número inteiro, formamos uma fração com numerador 1, e com denominador igual ao número. Note ainda que o inverso de uma fração que tem numerador 1, é um número inteiro.

Ex: O inverso de 1/5 é 5.

Exercícios

E77) Calcule as seguintes expressões

a) O inverso de $(1/2)^2$ =
b) $(3/4)^{-2}$ =
c) 10^{-2} =
d) $(2/3)^{-3}$ =
e) $1/(4^{-2})$ =
f) $(1/7)^{-2}$ =
g) $(3/2)^{-3}$ =
h) $(1/2)^{-5}$ =
i) 8^{-2} =
j) 10^{-3} =
k) $(2/5)^{-3}$ =
l) $(3/10)^{-3}$ =
m) $(5/3)^{-2}$ =
n) $1/(10^{-2})$=
o) $(1/5)^{-3}$ =
p) $1/(4^{-2})$ =
q) $(1/3)^{-3}$ =
r) $3/(10^{-2})$ =
s) $(3/10)^{-2}$ =
t) $(3/5)^{-3}$ =

E78) Calcule as seguintes expressões

a) $\left(-\frac{1}{5}\right)^{2}\times\left(-\frac{1}{5}\right)^{-3}$
b) $\left(-\frac{2}{3}\right)^{8}\times\left(-\frac{2}{3}\right)^{-5}$
c) $\left(-\frac{3}{5}\right)^{-4}\times\left(-\frac{3}{5}\right)^{2}$
d) $\left(\frac{2}{5}\right)^{-1}\times\left(\frac{2}{5}\right)^{3}$
e) $\left(\frac{1}{10}\right)^{-4}\times\left(\frac{1}{10}\right)^{3}$
f) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-8}\times\left(\frac{1}{2}\right)^{3}$
g) $\left(-\frac{1}{2}\right)^{2}\times\left(-\frac{1}{2}\right)^{-7}$
h) $\left(-\frac{3}{10}\right)^{6}\times\left(-\frac{3}{10}\right)^{-3}$
i) $\left(\frac{1}{3}\right)^{-2}\times\left(\frac{3}{2}\right)^{-2}$
j) $\left(-\frac{3}{10}\right)^{-4}\times\left(-\frac{5}{3}\right)^{-4}$
k) $\left(-\frac{5}{9}\right)^{-5}\times\left(-\frac{9}{10}\right)^{-5}$
l) $\left(-\frac{2}{3}\right)^{-3}\times\left(\frac{5}{2}\right)^{-3}$
m) $\left(-\frac{3}{20}\right)^{-3}\times\left(\frac{5}{3}\right)^{-3}$
n) $\left(-\frac{1}{2}\right)^{4}\div\left(-\frac{1}{2}\right)^{-2}$
o) $\left(\frac{1}{3}\right)^{-4}\div\left(\frac{1}{3}\right)^{-3}$
p) $\left(-\frac{5}{3}\right)^{-6}\times\left(-\frac{3}{50}\right)^{-6}$
q) $\left(\frac{5}{6}\right)^{-4}\times\left(-\frac{2}{5}\right)^{-4}$
r) $\left(-\frac{6}{40}\right)^{-2}\times\left(\frac{20}{27}\right)^{-2}$
s) $\left(\frac{1}{10}\right)^{8}\div\left(\frac{1}{10}\right)^{-5}$
t) $\left(\frac{2}{5}\right)^{-9}\div\left(\frac{2}{5}\right)^{-6}$

E79) Calcule as seguintes expressões

a) $\left(\frac{2}{5}\right)^{-7}\div\left(\frac{2}{5}\right)^{-5}$
b) $\left(-\frac{6}{15}\right)^{-2}\div\left(\frac{14}{30}\right)^{-2}$
f) $\left(\frac{5}{15}\right)^{-2}\div\left(-\frac{8}{3}\right)^{-2}$
g) $\left(\frac{3}{21}\right)^{-10}\div\left(\frac{10}{35}\right)^{-10}$
k) $\left(-\frac{2}{1}\right)^{-3}\div\left(\frac{3}{1}\right)^{-3}$
l) $\left(\frac{6}{33}\right)^{-4}\div\left(\frac{35}{77}\right)^{-4}$
p) $\left(\frac{20}{36}\right)^{-5}\div\left(-\frac{10}{9}\right)^{-5}$
q) $\left(-\frac{26}{10}\right)^{-3}\div\left(\frac{39}{35}\right)^{-3}$

Scanned by CamScanner

c) $\left(\frac{2}{3}\right)^{8} \times \left(\frac{2}{3}\right)^{-4}$ h) $\left(\frac{35}{105}\right)^{-7} \div \left(\frac{20}{6}\right)^{-7}$ m) $\left[\left(-\frac{2}{3}\right)^{-2}\right]^{-3}$ r) $\left[\left(-\frac{1}{2}\right)^{-6}\right]^{3}$

d) $\left(\frac{3}{10}\right)^{-3} \div \left(\frac{3}{10}\right)^{-5}$ i) $\left[\left(-\frac{2}{3}\right)^{-3}\right]^{2}$ n) $\left[\left(-\frac{2}{5}\right)^{-5}\right]^{3}$ s) $\left[\left(-\frac{1}{3}\right)^{-1}\right]^{2}$

e) $\left(-\frac{1}{2}\right)^{3} \div \left(-\frac{1}{2}\right)^{-4}$ j) $\left[\left(-\frac{1}{10}\right)^{2}\right]^{-4}$ o) $\left[\left(-\frac{3}{10}\right)^{10}\right]^{-2}$ t) $\left[\left(\frac{2}{7}\right)^{-2}\right]^{-3}$

Raízes de números racionais

No capítulo 14, estudaremos os números irracionais, faremos exercícios envolvendo cálculos complexos com raízes quadradas, cúbicas e de ordem superior, como:

$$\frac{\sqrt{2-\sqrt{3+2\sqrt{5}}}}{1-2\sqrt[3]{5+2\sqrt{3}}}$$

Este tipo de cálculo é sempre cobrado nas questões de concursos como Colégio Naval, EPCAr e Colégio Militar, para admissão no ensino médio.

Neste capítulo veremos expressões mais simples, envolvendo apenas raízes quadradas e raízes cúbicas, de números que são quadrados perfeitos e cubos perfeitos. Você já aprendeu no capítulo 1, raízes como:

$\sqrt{400} = 20$
$\sqrt{289} = 17$
$\sqrt{225} = 15$
$\sqrt{64} = 8$
$\sqrt[3]{27} = 3$
$\sqrt[3]{64} = 4$
$\sqrt[3]{512} = 8$
$\sqrt[3]{1000} = 10$
$\sqrt[3]{-216} = -6$
$\sqrt[3]{-64} = -4$

Todos os números acima são quadrados perfeitos ou cubos perfeitos, por isso suas raízes quadradas ou cúbicas, respectivamente, são números inteiros.

Vamos fazer o mesmo agora, porém com números racionais. Se elevarmos um número racional ao quadrado, o resultado será uma fração onde o numerador e o denominador são quadrados perfeitos. Podemos então extrair a raiz quadrada desse resultado e encontrar um número racional.

Exemplo:
Considere o número racional 2/5.

Scanned by CamScanner

$$\left(\frac{2}{5}\right)^2 = \frac{4}{25}$$

Apesar da noção de quadrado perfeito ser aplicada apenas a números naturais, podemos usar o mesmo princípio em frações cujo numerador e denominador sejam quadrados perfeitos. A raiz quadrada de uma fração é outra fração, obtida com a raiz quadrada do numerador e a raiz quadrada do denominador:

$$\sqrt{\frac{4}{25}} = \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{25}} = \frac{2}{5}$$

Acabamos então de mostrar como calcular a raiz quadrada de uma fração: é uma outra fração, obtida pela divisão da raiz quadrada do numerador, pela raiz quadrada do denominador.

Outro exemplo:

$$\sqrt{\frac{9}{49}} = \frac{\sqrt{9}}{\sqrt{49}} = \frac{3}{7}$$

Algumas vezes é preciso simplificar a fração para que seu numerador e denominador se tornem quadrados perfeitos. Por exemplo:

$$\sqrt{\frac{18}{50}} = \sqrt{\frac{9}{25}} = \frac{\sqrt{9}}{\sqrt{25}} = \frac{3}{5}$$

Nem sempre os números serão quadrados perfeitos, e nesses casos temos que deixar os radicais indicados. Isto é o que chamamos de *cálculo de radicais*, assunto que será abordado no capítulo 14. No presente capítulo lidaremos apenas com raízes exatas.

Lembre-se que só é possível extrair a raiz quadrada de números positivos. Já a raiz cúbica existe, para números positivos e para negativos. A raiz cúbica de um número positivo é positiva. A raiz cúbica de um número negativo é negativa.

Exemplos:

$$\sqrt[3]{\frac{64}{125}} = \frac{\sqrt[3]{64}}{\sqrt[3]{125}} = \frac{4}{5}$$

$$\sqrt[3]{-\frac{216}{1000}} = -\frac{\sqrt[3]{216}}{\sqrt[3]{1000}} = -\frac{6}{10}$$

Podem aparecer também raízes de números decimais ou dízimas periódicas. O modo mais fácil de calcular essas raízes é converter os valores para frações, assim recaímos em calcular raízes de números naturais no numerador e no denominador.

Exemplo:

$$\sqrt{0{,}25} = \sqrt{\frac{25}{100}} = \frac{\sqrt{25}}{\sqrt{100}} = \frac{5}{10} = 0{,}5$$

Nesses casos podemos deixar o resultado na forma de fração ou na forma de número decimal.

Scanned by CamScanner

Exemplo:

$$\sqrt{0,444...} = \sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{9}} = \frac{2}{3} = 0,666...$$

Também podemos nesse caso, deixar o resultado na forma de fração ou de dízima ou número decimal.

Exercícios

E80) Calcule as seguintes raízes quadradas:

a) $\sqrt{\frac{1}{4}}$
b) $\sqrt{\frac{4}{9}}$
c) $\sqrt{\frac{25}{81}}$
d) $\sqrt{\frac{49}{36}}$
e) $\sqrt{\frac{64}{81}}$
f) $\sqrt{\frac{1}{100}}$
g) $\sqrt{\frac{4}{25}}$
h) $\sqrt{\frac{81}{4}}$
i) $\sqrt{\frac{16}{121}}$
j) $\sqrt{\frac{9}{100}}$
k) $\sqrt{\frac{25}{144}}$
l) $\sqrt{\frac{81}{64}}$
m) $\sqrt{\frac{16}{49}}$
n) $\sqrt{\frac{81}{169}}$
o) $\sqrt{\frac{25}{64}}$
p) $\sqrt{\frac{144}{25}}$
q) $\sqrt{\frac{4}{169}}$
r) $\sqrt{\frac{100}{256}}$
s) $\sqrt{\frac{81}{196}}$
t) $\sqrt{\frac{225}{144}}$

E81) Calcule as raízes cúbicas:

a) $\sqrt[3]{-\frac{27}{64}}$
b) $\sqrt[3]{\frac{8}{125}}$
c) $\sqrt[3]{-\frac{1}{1000}}$
d) $\sqrt[3]{\frac{343}{27}}$
e) $\sqrt[3]{-\frac{64}{216}}$
f) $\sqrt[3]{\frac{125}{27}}$
g) $\sqrt[3]{-\frac{512}{27}}$
h) $\sqrt[3]{\frac{64}{343}}$
i) $\sqrt[3]{-\frac{216}{27}}$
j) $\sqrt[3]{-\frac{1}{1000}}$
k) $\sqrt[3]{-\frac{512}{27}}$
l) $\sqrt[3]{\frac{216}{343}}$
m) $\sqrt[3]{-\frac{64}{1000}}$
n) $\sqrt[3]{-\frac{729}{125}}$
o) $\sqrt[3]{\frac{1}{512}}$
p) $\sqrt[3]{-\frac{729}{64}}$
q) $\sqrt[3]{-\frac{125}{512}}$
r) $\sqrt[3]{\frac{1}{216}}$
s) $\sqrt[3]{-\frac{1000}{27}}$
t) $\sqrt[3]{\frac{8}{729}}$

E82) Calcule e dê o resultado na forma de fração:

a) $\sqrt{0,111...}$
b) $\sqrt[3]{-0,125}$
c) $\sqrt{1,44}$
d) $\sqrt{0,0289}$
e) $\sqrt{1\frac{11}{25}}$
f) $\sqrt{0,81}$
g) $\sqrt[3]{0,027}$
h) $\sqrt{6,25}$
i) $\sqrt[3]{3\frac{3}{8}}$
j) $\sqrt{7\frac{1}{9}}$
k) $\sqrt{1,777...}$
l) $\sqrt{2,56}$
m) $\sqrt[3]{-0,216}$
n) $\sqrt[3]{0,001}$
o) $\sqrt{1\frac{24}{25}}$
p) $\sqrt{0,36}$
q) $\sqrt[3]{0,512}$
r) $\sqrt{2,25}$
s) $\sqrt{0,04}$
t) $\sqrt[3]{2\frac{10}{27}}$

Scanned by CamScanner

Cuidado com o sinal negativo

É preciso saber lidar corretamente com sinais negativos que aparecem em raízes quadradas e cúbicas. Vamos analisar os casos possíveis, através de exemplos.

a) Raiz cúbica de número negativo

Quando elevamos um número ao cubo, ele mantém o seu sinal. Se for positivo, o cubo será positivo. Se for negativo, o cubo será negativo.

Exemplos:

$$\left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{1}{27}; \qquad \left(-\frac{2}{5}\right)^3 = -\frac{8}{128}$$

Por isso, quando extraímos a raiz cúbica, o sinal do resultado é o mesmo sinal do número que está dentro do radical:

$$\sqrt[3]{\frac{1}{27}} = \frac{1}{3}; \qquad \sqrt[3]{-\frac{8}{125}} = -\frac{2}{5}$$

b) Sinal negativo fora do radical

Por outro lado, pode aparecer um sinal negativo fora do radical. Este sinal não tem relação alguma com a raiz. A raiz deve ser calculada normalmente, e o sinal é aplicado sobre a raiz depois de calculada. Considere que um sinal negativo antes de uma raiz é a mesma coisa que multiplicar (–1) pelo resultado da raiz.

Exemplos:

$$-\sqrt[3]{\frac{1}{8}} = (-1)\times\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2}; \qquad -\sqrt[3]{-\frac{27}{125}} = (-1)\times\left(-\frac{3}{5}\right) = \frac{3}{5}$$

Pode também aparecer um sinal negativo fora da raiz quadrada. Como a raiz quadrada é sempre positiva, o sinal negativo fora do radical tornará o resultado negativo.

Exemplos:

$$-\sqrt{\frac{4}{25}} = -\frac{2}{5}; \qquad -\sqrt{\frac{9}{100}} = -\frac{3}{10}$$

c) Raiz de número negativo não existe

Não podemos extrair a raiz quadrada de números negativos, pois não existem números que fiquem negativos ao serem elevados ao quadrado.

Exemplos:

$\sqrt{-\frac{4}{25}}$ não existe; $\sqrt{-81}$ não existe; $\sqrt{-100}$ não existe

Por outro lado, o radical pode ter uma expressão, que depois da calculada, torne-se positiva, sendo assim a raiz quadrada existe:

Exemplos:

$\sqrt{|-81|} = \sqrt{81} = 9$; Nesse caso, foi calculado o módulo de –81, resultando em +81.

Scanned by CamScanner

$\sqrt{\left|-\frac{4}{9}\right|}=\sqrt{\frac{4}{9}}=\frac{2}{3}$; O módulo tornou o resultado do radical positivo

$\sqrt{(-5)^2}=\sqrt{25}=5$; Ao elevarmos –5 ao quadrado, o resultado é +25

$\sqrt{\left(-\frac{3}{10}\right)^2}=\sqrt{\frac{9}{100}}=\frac{3}{10}$; Elevando ao quadrado o número –3/10, o resultado é positivo

d) Raiz quadrada de um quadrado

Um dos erros mais comuns entre os estudantes é considerar que a raiz quadrada de um número ao quadrado é o próprio número, ou seja:

$\sqrt{x^2}=x$ ➔ ERRADO! ERRADO! ERRADO! ERRADO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

por exemplo,

$\sqrt{(-5)^2}=-5$ ➔ ERRADO! ERRADO! ERRADO! ERRADO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

o correto é:

$\sqrt{x^2}=|x|$

A raiz quadrada de um número ao quadrado, é o módulo deste número. O resultado da raiz quadrada sempre deve ser positivo. Por exemplo:

$\sqrt{(-5)^2}=|-5|=5$ ➔ CERTO! CERTO! CERTO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Exercícios

E83) Calcule as raízes, prestando a máxima atenção nos sinais
(o que é uma redundância, pois sempre temos que prestar máxima atenção no sinais)

a) $-\sqrt[3]{-\frac{8}{125}}$

b) $-\sqrt{\frac{9}{25}}$

c) $-\sqrt{\left(-\frac{1}{5}\right)^2}$

d) $\sqrt{(-8)^2}$

e) $\sqrt{\left(-\frac{3}{4}\right)^0}$

f) $-\sqrt[3]{\frac{1}{1000}}$

g) $-\sqrt[3]{-(-8)^2}$

h) $\sqrt{-\frac{64}{49}}$

i) $-\sqrt{\frac{64}{49}}$

j) $\sqrt{\frac{-25}{-64}}$

k) $\sqrt[3]{-\frac{64}{729}}$

l) $\sqrt{-5^2}$

m) $\sqrt{\left(-\frac{3}{5}\right)^2}$

n) $-\sqrt{\left|-\frac{9}{25}\right|}$

o) $-\sqrt{-\frac{64}{49}\times 0}$

p) $-\sqrt[3]{-\left(-\frac{1}{2}\right)^3}$

q) $-\sqrt{-36}$

r) $\sqrt[3]{x^3}$

s) $\sqrt{(-x)^2}$

t) $\sqrt[3]{(-x)^3}$

Scanned by CamScanner

Expoentes 1/2 e 1/3

Até agora só trabalhamos com expoentes inteiros. Na verdade um expoente pode ser qualquer número real, mas em certas condições, o resultado não existe. Vejamos agora os primeiros casos de expoentes que não são inteiros, mas sim frações. Comecemos apresentando os expoentes 1/2 e 1/3:

a) Expoente 1/2:
Elevar um número ao expoente 1/2 nada mais é que extrair a sua raiz quadrada.

Exemplos:

$25^{1/2} = \sqrt{25} = 5$

$4^{1/2} = \sqrt{4} = 2$

$7^{1/2} = \sqrt{7}$ (nesse caso, como 7 não tem raiz exata, devemos deixar indicado dessa forma)

$$\left(\frac{4}{25}\right)^{1/2} = \sqrt{\frac{4}{25}} = \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{25}} = \frac{2}{5}$$

Assim como todas as propriedades, a definição da potência ½ é uma regra que precisa ser conhecida e memorizada, porém nada mais é que uma consequência de propriedades anteriores. Vamos por exemplo demonstrar porque elevar um número a ½ é o mesmo que extrair sua raiz quadrada. Considere que x é um número positivo e queremos determinar $x^{1/2}$. Se multiplicarmos $x^{1/2}$ por $x^{1/2}$ podemos usar a propriedade de que, multiplicando potências de mesma base, os expoentes são somados. Então:

$$x^{1/2} . x^{1/2} = x^{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}} = x$$

Sendo assim, $x^{1/2}$ é um número que, multiplicado por ele mesmo (ou seja, elevado ao quadrado) resulta em x. Esta é exatamente a definição de raiz quadrada, portanto:

$$x^{1/2} = \sqrt{x}\,.$$

b) Expoente 1/3:
Elevar um número ao expoente 1/3 nada mais é que extrair a sua raiz cúbica.

Exemplos:

$27^{1/3} = 3$

$64^{1/3} = 4$

$10^{1/3} = \sqrt[3]{10}$ (como 10 não tem raiz cúbica exata, devemos deixar indicado dessa forma)

$$\left(\frac{27}{1000}\right)^{1/3} = \sqrt[3]{\frac{27}{1000}} = \frac{\sqrt[3]{27}}{\sqrt[3]{1000}} = \frac{3}{10}$$

Scanned by CamScanner

c) Expoente p/q

Elevar um número ao expoente p/q nada mais é que extrair sua raiz *q-ésima* e elevar o resultado à potência *p*.

Exemplo:

$$4^{5/2} = \left(4^{1/2}\right)^5 = \left(\sqrt{4}\right)^5 = 2^5 = 32$$

d) Expoente 2/3 = 0,666...

Elevar um número ao expoente 2/3 é o mesmo que extrair sua raiz cúbica e elevar o resultado ao quadrado. É uma consequência da regra de elevação à potência p/q, onde p=2 e q=3.

Exemplos:

$$27^{2/3} = \left(27^{1/3}\right)^2 = 3^2 = 9$$

$$64^{2/3} = \left(64^{1/3}\right)^2 = 4^2 = 16$$

$$125^{2/3} = \left(125^{1/3}\right)^2 = 5^2 = 25$$

$$1000^{2/3} = \left(1000^{1/3}\right)^2 = 10^2 = 100$$

$$\left(\frac{27}{125}\right)^{2/3} = \left(\sqrt[3]{\frac{27}{125}}\right)^2 = \left(\frac{\sqrt[3]{27}}{\sqrt[3]{125}}\right)^2 = \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{9}{25}$$

e) Expoente 1,5 = 3/2

Elevar um número ao expoente 3/2 é a mesma coisa que extrair sua raiz quadrada e elevar o resultado ao cubo. É uma consequência da regra de elevação à potência p/q, onde p=3 e q=2. Somente números não negativos podem ser elevados a esse expoente.

Exemplos:

$$9^{3/2} = \left(9^{1/2}\right)^3 = 3^3 = 27$$

$$25^{3/2} = \left(25^{1/2}\right)^3 = 5^3 = 125$$

$$36^{3/2} = \left(36^{1/2}\right)^3 = 6^3 = 216$$

$$100^{3/2} = \left(100^{1/2}\right)^3 = 10^3 = 1000$$

$$\left(\frac{25}{36}\right)^{3/2} = \left(\sqrt{\frac{25}{36}}\right)^3 = \left(\frac{\sqrt{25}}{\sqrt{36}}\right)^3 = \left(\frac{5}{6}\right)^3 = \frac{125}{216}$$

f) Expoentes –1/2, –1/3, –2/3, –3/2

Para lidar com expoentes negativos, basta inverter a base e tornar o expoente positivo.

Scanned by CamScanner

Exemplo:

$$25^{-1/2} = \left(\frac{1}{25}\right)^{1/2} = \sqrt{\frac{1}{25}} = \frac{\sqrt{1}}{\sqrt{25}} = \frac{1}{5}$$

$$1000^{-1/3} = \left(\frac{1}{1000}\right)^{1/3} = \sqrt[3]{\frac{1}{1000}} = \frac{\sqrt[3]{1}}{\sqrt[3]{1000}} = \frac{1}{10}$$

$$\left(\frac{27}{125}\right)^{-2/3} = \left(\frac{125}{27}\right)^{2/3} = \left(\sqrt[3]{\frac{125}{27}}\right)^2 = \left(\frac{\sqrt[3]{125}}{\sqrt[3]{27}}\right)^2 = \left(\frac{5}{3}\right)^2 = \frac{25}{9}$$

Exercícios

E84) Calcule as seguintes potências:

a) $-36^{1/2}$

b) $\left(\frac{4}{9}\right)^{1/2}$

c) $1000^{1/3}$

d) $\left(-\frac{1}{27}\right)^{2/3}$

e) $25^{3/2}$

f) $(-64)^{1/2}$

g) $-\left(\frac{25}{81}\right)^{1/2}$

h) $64^{2/3}$

i) $-\left(-\frac{64}{125}\right)^{2/3}$

j) $-81^{3/2}$

k) $(-64)^{1/3}$

l) $\left(-\frac{81}{100}\right)^{1/2}$

m) $(-64)^{2/3}$

n) $\left(\frac{25}{81}\right)^{3/2}$

o) $-(-144)^{3/2}$

p) $216^{1/3}$

q) $\left(-\frac{27}{125}\right)^{1/3}$

r) $64^{-2/3}$

s) $\left(\frac{9}{49}\right)^{-3/2}$

t) $64^{-3/2}$

A raiz quadrada negativa?

Existe um problema potencial que pode resultar em erros em problemas relacionados com a raiz quadrada. O problema já foi apresentado no capítulo 1, e convém repeti-lo aqui.

1) Existem duas formas de referencia à raiz quadrada. Essas duas formas têm significados ligeiramente diferentes:

a) Com o símbolo $\sqrt{\ }$

b) por extenso: "a raiz quadrada de..."

O símbolo $\sqrt{\ }$ significa "a raiz quadrada positiva de", o que é diferente de dizer simplesmente "a raiz quadrada de". Quando indicamos, por exemplo, $\sqrt{9}$, estamos nos referindo apenas ao valor positivo, que é +3. Isto é uma definição adotada pelos matemáticos e autores de livros. Já a expressão "raiz quadrada", por extenso, indica o número que elevado ao quadrado, resulta no número dado. Quando escrevemos "raiz quadrada de 9", estamos nos referindo ao número que elevado ao quadrado, resulta em 9. Sendo assim, temos duas possibilidades: +3 ou –3. Dizemos então que a raiz quadrada positiva de 9 é 3, e a raiz quadrada negativa de 9 é –3. Em resumo, $\sqrt{9}$ vale 3, porém "raiz quadrada de 9" existem duas, a positiva +3 e a negativa –3. Apesar dessa convenção ser usada pela maioria dos matemáticos, sua aceitação não é 100% universal. O que é universal é o fato da expressão $\sqrt{x}$, em um cálculo, equação ou fórmula matemática, indicar somente o valor positivo da raiz de x. Já a expressão por extenso quase sempre indica duas possibilidades, a positiva a e negativa. Uma questão de prova pode considerar o contrário, ou seja, que "a raiz quadrada" indica apenas o valor positivo, mas isto

Scanned by CamScanner

deve ser deixado claro no enunciado, para evitar confusão. Se não for deixado claro, o uso da expressão "a raiz quadrada" indica que é considerada apenas a positiva, enquanto "uma raiz quadrada" ou "a raiz quadrada positiva" ou "a raiz quadrada negativa" indica que ambas são consideradas.

É errado escrever, por exemplo, $\sqrt{9} = \pm 3$, pois o uso do símbolo $\sqrt{\ }$ nos obriga a considerar apenas a raiz positiva. O correto é $\sqrt{9} = 3$.

É errado escrever $\sqrt{x^2} = x$. O correto é $\sqrt{x^2} = |x|$. Se x for negativo, por exemplo, $x = -3$, temos que $(-3)^2 = 9$, e $\sqrt{9} = 3$. Se considerássemos que $\sqrt{x^2} = x$, estaríamos dizendo que $\sqrt{(-3)^2} = -3$, o que estaria errado. Já $\sqrt{(-3)^2} = |-3|$ estaria correto, resultando em 3.

É diferente quando temos uma equação da forma $x^2 = 9$. Não está sendo especificada raiz quadrada alguma. Na resolução da equação, temos duas soluções. A equação $x^2 = 9$ significa que "x é um número que elevado ao quadrado resulta em 9". A equação tem duas soluções, que são as raízes quadradas de 9, ou seja, 3 e –3. A partir de $x^2 = 9$ chegamos a x=3 ou x=–3, mas isto não é exatamente a mesma coisa que escrever "$\sqrt{9} = \pm 3$", que está errado, pois $\sqrt{9} = 3$.

Já foram exploradas em concursos, questões que visavam avaliar se o aluno possui este entendimento correto, ou se tem o conceito equivocado. Em alguns casos, a própria banca examinadora se engana, apresentando uma solução errada.

Vejamos alguns exemplos:

CMSM 2011

Com a descoberta dos números irracionais foi necessário verificar as propriedades dos números incluindo agora essa nova classe. Das alternativas abaixo marque a única que é VERDADEIRA:

(A) a soma de dois números irracionais é um número irracional.

(B) $\sqrt{x^2} = x$, para todo $x \in \Re$.

(C) se x e y são números reais tais que $(x-y)x = 2(x-y)$, então x=2.

(D) o produto de dois números irracionais pode ser um número racional.

(E) $\frac{1}{x}$ é o inverso do número real x, qualquer que seja $x \in \Re$.

Chamamos atenção ao item (B) da questão. É errado que para todo x real, $\sqrt{x^2} = x$. Isto é válido apenas para x positivo ou zero. O correto seria indicar $\sqrt{x^2} = |x|$. A resposta correta, de acordo com o gabarito, também correto, é (D).

Outro exemplo:

CMB 2006

A expressão $\sqrt{\left(\sqrt[3]{63}+4\right)^2} + \sqrt{\left(\sqrt[3]{63}-4\right)^2}$ é igual a:

(A) 0 (B) $2\sqrt[3]{63}$ (C) 8 (D) $\sqrt[3]{63}$ (E) 4

Scanned by CamScanner

Um aluno distraído irá considerar que $\sqrt{x^2} = x$, ficando então com:

$$\sqrt{\left(\sqrt[3]{63}+4\right)^2} + \sqrt{\left(\sqrt[3]{63}-4\right)^2} = \sqrt[3]{63}+4+\sqrt[3]{63}-4 = 2\sqrt[3]{63}$$, resposta (B)

Totalmente errado, pois não é correto que $\sqrt{x^2} = x$. Ao extrair a raiz quadrada da expressão que está elevada ao quadrado, o sinal tem que ser tornado positivo. O termo $\left(\sqrt[3]{63}+4\right)$ é obviamente positivo, mas o termo $\left(\sqrt[3]{63}-4\right)$ é negativo! Basta observar que a raiz cúbica de 63 é menor que a raiz cúbica de 64, ou seja, 4. Se subtrairmos a raiz cúbica de 63, de 4 unidades, resultará um valor negativo. Sendo assim, é preciso tornar a expressão positiva invertendo seu sinal, ficando então com $\left(4-\sqrt[3]{63}\right)$. Portanto a expressão resulta em:

$$\sqrt{\left(\sqrt[3]{63}+4\right)^2} + \sqrt{\left(\sqrt[3]{63}-4\right)^2} = \sqrt[3]{63}+4+4-\sqrt[3]{63} = 8$$

A resposta certa é a letra (C). Obviamente esta questão necessita de conhecimentos de cálculo de radicais (capítulo 14), entretanto é possível que o sinal da raiz é usado como "pegadinha" em provas de concursos.

Por outro lado, existem casos em que a própria banca cometeu este erro.

CMB 2005

Simplificando a expressão $\sqrt{a^6 - \frac{4}{5}a^3 + 0{,}16}$, obtém-se:

(A) $a+\frac{2}{5}$ (B) $a^3-\frac{2}{5}$ (C) $a^2+\frac{2}{5}$ (D) $a^3+\frac{2}{5}$ (E) $a^3+0{,}4$

A expressão que está dentro do radical é um quadrado perfeito:

$$a^6 - \frac{4}{5}a^3 + 0{,}16 = \left(a^3 - \frac{2}{5}\right)^2$$

Seríamos tentados a usar

$$\sqrt{a^6 - \frac{4}{5}a^3 + 0{,}16} = \sqrt{\left(a^3 - \frac{2}{5}\right)^2} = a^3 - \frac{2}{5}$$ (resultante da fórmula do quadrado da soma, cap. 4)

Porém, o correto é $\left|a^3 - \frac{2}{5}\right|$, pois não podemos garantir que $a^3 - 2/5$ seja positivo.

A banca não atentou para este detalhe e não considerou o módulo. É uma questão digna de anulação.

Expressões com números racionais

Uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos alunos na álgebra é o cálculo de expressões. Esses cálculos são muito cobrados no 6º, 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental, e sobretudo em provas de concursos. Com os conhecimentos que temos até o momento já podemos resolver grande parte dos cálculos que envolvem números inteiros ou racionais, positivos o negativos, com adição, subtração, multiplicação, divisão, potências e raízes. Esses cálculos ficarão mais difíceis nos próximos capítulos, com o cálculo de radicais e o cálculo algébrico

Scanned by CamScanner

(expressões algébricas com letras e números). Ainda assim, os conhecimentos que você tem até agora são suficientes para resolver expressões bastante complexas, até mesmo já propostas em provas de concursos.

Exemplo (CN-2000):

O valor da expressão:

$$\left(\sqrt[3]{-\frac{16}{27}+\frac{16}{9}.(0{,}333...+1)-\left(-\frac{3}{4}\right)^{-2}}\right)^{\frac{\sqrt{25}}{2}+3} \quad \text{é}$$

(A) $\sqrt[3]{-\frac{1}{3}}$ (B) $\sqrt[3]{\frac{2}{3}}$ (C) 0 (D) 1 (E) -1

Solução:

A expressão nada mais é que uma raiz cúbica elevada a um expoente estranho: $\frac{\sqrt{25}}{2}+3$, que é igual a 5/2 + 3 = 11/2. Vamos então calcular a expressão que está dentro do radical:

$$-\frac{16}{27}+\frac{16}{9}.(0{,}333...+1)-\left(-\frac{3}{4}\right)^{-2}=-\frac{16}{27}+\frac{16}{9}.\left(\frac{1}{3}+1\right)-\left(\frac{4}{3}\right)^{2}=$$

Até agora apenas transformamos a dízima 0,333... na fração 1/3, e tratamos a fração –3/4 que está elevada a –2; ficará positiva porque o expoente é par, e invertemos esta fração para que o expoente –2 se torne 2.

$$-\frac{16}{27}+\frac{16}{9}.\left(\frac{1}{3}+1\right)-\left(\frac{4}{3}\right)^{2}=-\frac{16}{27}+\frac{16}{9}.\frac{4}{3}-\frac{16}{9}=-\frac{16}{27}+\frac{64}{27}-\frac{16}{9}$$

Reduzindo as três frações ao mesmo denominador, ficamos com:

$$-\frac{16}{27}+\frac{64}{27}-\frac{16}{9}=-\frac{16}{27}+\frac{64}{27}-\frac{48}{27}=\frac{-16+64-48}{27}=\frac{0}{27}=0$$

Agora podemos extrair a raiz cúbica deste resultado, e elevá-lo a 11/2:

$$\left(\sqrt[3]{0}\right)^{\frac{11}{2}}=(0)^{\frac{11}{2}}=0$$

Resposta: (C) 0

Exemplo (CN-1997):

Resolvendo-se a expressão

$$\frac{\left\{\left[\left(\sqrt[3]{1{,}331^{12/5}}\right)\right]^{0}\right\}^{-7/2}-1}{8^{33}+8^{33}+8^{33}+8^{33}+8^{33}}\times\frac{1}{2^{302}}$$

Scanned by CamScanner

encontra-se:

(A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1 (E) 0

Solução:

É muito importante saber calcular expressões, e também conhecer as propriedades das operações numéricas. Questões aparentemente complexas podem ser na verdade bastante simples, visando não necessariamente verificar a habilidade do aluno com contas, mas também conhecer certas propriedades simplificadoras. Por exemplo, desconfie sempre do expoente zero. Sabemos que elevando qualquer número (exceto 0) ao expoente zero, o resultado é 1.

Note que aquela raiz cúbica, que ainda está elevada a 12/5, está também elevada a 0, e qualquer número elevado a 0 (desde que não seja 0^0) vale 1. O número 1 está então elevado a -7/2, e sabemos que elevando 1 a qualquer potência (inclusive potências não inteiras e negativas) resulta em 1. Temos então uma fração com numerador 1 – 1, que dá zero. A primeira fração resulta em zero, não importa o valor do seu denominador. Multiplicando zero pela segunda fração, o resultado será zero.

Resposta:

(E) 0

Algumas vezes podem aparecer em provas, expressões complicadas que se transformam em expressões simples, quando recaímos em potências com 0 ou 1 na base ou no expoente. Na maioria das vezes entretanto, é preciso realizar todos os cálculos. Vamos encontrar portanto expressões que envolvem:

- Adição, subtração, multiplicação e divisão de números racionais
- Conversões de formatos (dízimas para frações, etc.)
- Uso de parênteses, chaves e colchetes
- Potências e raízes

Basta então saber realizar essas operações, conhecer as suas propriedades (o que muitas vezes simplifica os cálculos) e saber a ordem em que devem ser realizadas.

Uma coisa é certa: as bancas de concursos adoram propor questões envolvendo expressões numéricas e expressões algébricas (com letra). Praticamente todas as provas, em todos os anos, apresentam este tipo de questão.

Exercícios

E85) Resolva as seguintes expressões

a) $\frac{12}{7}\times\frac{1}{2}+0{,}333...\times\left(-\frac{16}{3}\right)$

b) $\frac{1}{2}\times\frac{3}{4}\times\frac{5}{6}+2\frac{2}{9}\times\left(-2\frac{1}{4}\right)$

c) $0{,}333...\times\frac{12}{5}+\frac{20}{32}\div\left(-\frac{15}{24}\right)$

k) $\left(-\frac{5}{9}\right)^{-2}\times\left[\left(-\frac{2}{3}\right)^{3}\right]^{2}$

l) $-\left(\frac{10}{7}\right)^{2}\times\left[\left(-\frac{1}{3}\right)^{1}\right]^{-2}$

m) $-\left(-\frac{3}{10}\right)^{2}\times\left[\left(\frac{2}{3}\right)^{2}\right]^{3}$

Scanned by CamScanner

d) $\frac{18}{15}\times\frac{105}{14}-\frac{2}{7}\times\frac{3}{16}$

e) $1\frac{1}{2}\times 4\frac{1}{3}-\frac{2}{3}\times\left(-1\frac{5}{7}\right)$

f) $5\times\frac{6}{7}+\frac{4}{5}\times\frac{3}{14}$

g) $\frac{7}{11}\times\frac{1}{2}+5\times\left(-\frac{3}{10}\right)$

h) $\frac{12}{26}\div\frac{72}{65}+-3\frac{1}{5}\div\frac{4}{25}$

i) $\frac{12}{23}\div 0{,}3+\left(\frac{2}{3}-\frac{2}{5}\right)\div\left(\frac{1}{5}+\frac{3}{8}\right)$

j) $2\frac{1}{7}\div\frac{3}{7}+\left(5-\frac{1}{3}\right)\times\left(4+\frac{1}{7}\right)$

n) $\left(2\frac{1}{2}\right)^5\times\left[-\left(\frac{2}{5}\right)^2\right]^3$

E86) Resolva as seguintes expressões

a) $\frac{4}{5}\times\frac{1}{6}+\frac{2}{3}\times\frac{7}{2}$

b) $\frac{5}{3}\times\frac{2}{5}-\frac{2}{9}\times\frac{3}{5}$

c) $\frac{1}{4}\times\frac{2}{3}+\frac{1}{5}\times\frac{7}{3}$

d) $\frac{2}{21}\times\frac{7}{5}+\frac{4}{9}\times\frac{1}{8}$

e) $\frac{5}{2}\times\frac{4}{3}+\frac{1}{9}\times\frac{15}{2}$

f) $-\frac{2}{3}\times\left(-\frac{9}{5}\right)-\left(-\frac{4}{3}\right)\times\frac{5}{2}$

g) $\left(-\frac{2}{3}\right)\times\frac{5}{4}+\left(-\frac{3}{5}\right)\times\frac{1}{2}$

h) $\left(-\frac{1}{2}\right)\times\frac{1}{3}-\left(-\frac{1}{4}\right)\times\left(-\frac{1}{5}\right)$

i) $-\frac{2}{3}\times\left(-\frac{4}{3}\right)+\frac{2}{5}\times\left(-\frac{4}{9}\right)$

j) $\frac{1}{12}\times\left(-\frac{4}{5}\right)-\left(-\frac{3}{4}\right)\times\left(-\frac{1}{5}\right)$

k) $\left(1-\frac{1}{2}\right)\times\left(2-\frac{1}{3}\right)\div\left(3-\frac{1}{4}\right)+\left[\frac{2}{3}-\frac{1}{5}\times\left(-\frac{7}{3}\right)\right]$

l) $\left[\frac{4}{9}-\frac{2}{3}+\frac{1}{5}\right]\div\left[\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{6}\right]$

m) $\left[\frac{9}{10}-\frac{2}{5}+\frac{1}{2}\right]\times\left[-\frac{2}{3}+\frac{5}{6}+\frac{1}{2}\right]$

n) $\left[-\frac{1}{2}+1\frac{1}{3}+1\frac{1}{5}\right]\div\left[-\frac{1}{5}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right]$

o) $\left[2\frac{1}{3}-\frac{4}{5}-\frac{1}{2}\right]\div\left[\frac{1}{3}+\frac{2}{5}-\frac{1}{2}\right]$

p) $\left[\frac{5}{2}\times\frac{4}{3}-\frac{1}{9}\times\frac{15}{2}\right]\times\left[\frac{1}{2}-\frac{15}{36}\times\frac{4}{5}+\frac{2}{15}\times\frac{25}{8}\times\frac{4}{5}\right]$

q) $\left[-\frac{2}{3}+\frac{1}{5}\right]\div\left[\frac{1}{2}-\frac{2}{3}+\frac{5}{6}\right]-\left[\frac{1}{2}-\frac{3}{5}\right]\times\left[\frac{1}{2}+\frac{2}{3}-\frac{3}{5}\right]$

r) $-\frac{1}{2}-\left\{\frac{2}{3}\times\left[\left(-\frac{1}{3}\right)\times\left(-\frac{3}{5}\times\frac{5}{3}\right)-\frac{1}{2}\right]+\frac{1}{5}\times\frac{7}{3}\right\}-\frac{2}{3}$

E87) Resolva as seguintes expressões

a) $1-\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{1-\dfrac{1}{1+\frac{1}{2}}}}+\dfrac{1}{1+\dfrac{2}{1+\dfrac{3}{1+\frac{1}{4}}}}$

k) $\left[\left(\frac{0{,}19^0}{\sqrt[3]{-8}}\right)\times\left(-\frac{2}{(-2)^2-1}\right)+\frac{(-2)^2}{27^{2/3}+1}\div\left(\frac{64^{2/3}-64^{1/3}}{1+81^{0.5}}\right)\right]$

Scanned by CamScanner

b) $\left[-0{,}666\ldots\times\left(\frac{5}{3}\right)^{-1}-\left(-\frac{2}{3}\right)^{2}\times\frac{2^{2}}{5}\right]$

c) $\frac{(5+3)^{2}-(5-3)^{2}}{(-1).(-2).(-3).(-4).(-5)}$

d) $1+\left\{1+\left[1+\left(1+2^{-1}\right)^{-1}\right]^{-1}\right\}$

e) $\frac{\left(\frac{1}{3}-1\frac{1}{2}\right)^{2}}{2-\frac{3}{4}-\frac{5}{8}}-\frac{\frac{1}{5}-\frac{1}{2}}{\left(\frac{1}{3}+\frac{3}{5}-1\right)}$

f) $\frac{3+\frac{2}{5}-\frac{1}{3}}{\left(2-\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{15}\right)}\times\left(1+\frac{1}{4}\right)^{2}\times\left(1+\frac{1}{3}\right)^{2}$

g) $\frac{1^{1}+1^{-1}+11^{0}+111^{0}}{\left[(-1)^{1}+(-1)^{-1}\right]\times\left[(-1)^{0}+0^{1}\right]}$

h) $\sqrt[3]{\sqrt{1{,}777\ldots}\times\sqrt{0{,}444\ldots}\times\sqrt{0{,}111\ldots}}$

i) $\left[\left(1-\frac{1}{2}\times\frac{1}{5}\right)\times\left(\frac{4}{5}\div\frac{4^{3/2}}{125^{2/3}}\right)\right]\div\sqrt{12.\left(\frac{4}{3}+\frac{3}{4}\right)}$

j) $\frac{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}}{\frac{4}{3}+\frac{3}{4}}-\frac{\frac{1}{2}+\frac{4}{5}}{\frac{13}{5}\div\frac{2}{3}}\div\frac{\frac{1}{2}-\frac{1}{3}}{\frac{5}{6}\times\frac{7}{3}}$

E88) Resolva as seguintes expressões

a) $\left[\left(\frac{1}{2}\right)^{2}-\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}\right]\div\sqrt{4-\left(\frac{6}{5}\right)^{2}}$

b) $\left(\frac{8}{3}\right)^{-1}\div\left(\frac{3}{4}\right)+\frac{\frac{2}{3}+\frac{4}{5}}{\frac{2}{3}-\frac{4}{5}}-\left[\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\right)\Big/\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)\right]$

c) $\left(\frac{2/3}{5/3}\right)\times\frac{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\sqrt{0{,}33\ldots^{0}}}$

d) $\frac{2^{0}}{2^{2}}\times\frac{2^{2}-2^{1}}{2^{2}-2^{0}}+\frac{2^{0}}{3^{2}-2^{2}}\times\frac{2^{3}-2^{0}}{2^{2}-2^{0}}$

l) $\left[\sqrt{\frac{4}{25}}\div\left(-\frac{\left(2^{-2}\right)^{-1/2}}{\left(2^{-5}\right)^{1-0{,}999\ldots}}\right)-\frac{2^{-2}}{9^{1/2}}\div\left(\frac{\sqrt{(-3)^{2}}}{(-2)^{3}}\right)^{-1}\right]$

m) $\left[0{,}555\ldots\div\left(-\frac{2}{3}\right)^{2}+\left(-\frac{3}{5}\right)^{-1}\times\sqrt{\frac{25}{36}}\right]$

n) $\left[0{,}333\ldots\times\left(-\frac{1}{2}\right)+\left(-\frac{2}{3}\right)\div\left(-\sqrt{2^{-2}}\right)\right]$

o) $\left(-\frac{25(-3)^{-3}}{2}\right)\div\left(-\sqrt{\frac{3^{2}+4^{2}}{(-2)^{2}}}\right)-2.\left(-\frac{9}{5}\right)^{-2}\div\left(\frac{3}{5}\right)^{-2}$

p) $\left[7^{-1}\times\left[(-7)^{2}+(-7)^{0}\right]\div\left(-\frac{1/14}{(-5)^{-2}}\right)-3^{4}.5^{-3}\div\frac{-9^{3/2}}{(-125)^{2/3}}\right]$

q) $\left[\frac{2^{-1}}{5^{-1}}\times\left(0^{5}-\left(\frac{2}{5}\right)^{2}\right)\times3^{-1}+0{,}6^{2}\div(-0{,}666\ldots)\right]$

r) $\left[\left(2\frac{1}{2}\right)\div\left(-\frac{2}{3}\right)-\frac{6}{5^{2}-5}\times\left(\frac{5.2^{-2}}{3}-\frac{1}{2}\right)\times\left(1\frac{1}{3}\right)\right]$

k) $-\frac{2^{1}}{2^{0}+2^{2}}\times\frac{\sqrt{(-4)^{2}}}{\sqrt{\left|-1+(-2)^{3}\right|}}-\frac{0{,}31^{0}}{2^{2}-2^{0}}\div\frac{\sqrt{(-5)^{2}}}{0{,}999\ldots^{15}}$

l) $\frac{1}{(-2)^{3}}\left[\frac{2}{5}\times\frac{(0{,}222\ldots-0{,}333\ldots)^{0}}{\left((-2)^{2}-(-2)^{0}\right)}-\frac{-\sqrt{(-2)^{2}}}{\sqrt[3]{(-3)^{3}}}\right]$

m) $\left(-\frac{1}{8}\right)^{-2/3}\times\sqrt[3]{-\frac{125}{27}}+\left(1/9\right)^{3/2}\sqrt{3^{2}+4^{2}}$

n) $-0{,}666\ldots\times(-1{,}333\ldots)+0{,}4\times(-0{,}444\ldots)$

Scanned by CamScanner

e) $\frac{2^2+2^0}{2^1}\times\frac{2^2}{2^2-2^0}\div\frac{2^0}{2^3+2^0}\times\frac{2^4-2^0}{2^3-2^2}$

f) $\left(\frac{0,666...}{1,666...}\right)\times\frac{0,5-0,333...}{0,222...-0,333...}$

g) $(1,5)^{-1}-\left(\frac{\sqrt[3]{-64}+\sqrt[3]{125}}{\sqrt{64}-\sqrt[3]{125}}\right)$

h) $(-1,5)^{-1}\times\left(\frac{4}{5}\right)^{-1}+\left(-\frac{5}{3}\right)^{-1}\times 2^{-1}$

i) $\frac{(-2)^0+(-2)^1}{(-3)^3+(-3)^2+(-3)^1+(-3)^0}=$

j) $\left[\sqrt{\frac{25}{9}}+\sqrt{\frac{64}{25}}-\sqrt{\frac{121}{225}}\right]\times\left[\sqrt{\frac{49}{36}}-\sqrt{\frac{25}{36}}\right]$

o) $-3\times(1,25)^{-2}\times(3,333...)-0,666...\times(-1,666...)^{-1}$

p) $\left(\frac{\sqrt{11^2-10^2+2^2}}{\sqrt{13^2-12^2}}\right)^5\times\frac{\sqrt{10^3+(-8)^3+(-6)^3-(-2)^4}}{(-2)^0+(-2)^1+(-2)^2}$

q) $\sqrt{10^{-1}\times 0,333...\times\left[\left(\frac{2}{3}\right)\times\sqrt{1+\left(\frac{3}{4}\right)^2}+\left(-\frac{3}{5}\right)\times\frac{1}{2}\right]}$

r) $\left[\frac{3^2}{3^2+3^0}-\frac{2}{5}+\frac{1}{2}\right]\times[-0,666...+0,8333...+0,5]$

s) $\sqrt{\frac{1}{30}\times\left[\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right]}\times\sqrt[3]{30\times\left[-\frac{1}{2}+\frac{2}{3}-\frac{3}{5}\right]+5}$

t) $\sqrt{\frac{3}{5}\times\left[0,4\times 0,1666...+0,666...\times\left(3\frac{1}{2}\right)\right]}$

E89) Efetue as seguintes operações, usando as propriedades das potências

a) $x^2.x^3$
b) $4.(x^2.x^3)$
c) $4.x^2.x^3$
d) $x.x$
e) $x.5$
f) $x.(x+5)$
g) $x^2.(x^3+5)$
h) $(5x^3+3x^2)/x$
i) $(x^2)^3$
j) $(3x)^2$
k) $(5x^2)^3$
l) $(x^3)^{1/3}$
m) $x.(1+x)$
n) $x.(1+x^3)$
o) $x.(x^2+x^3)$
p) $2x.(x^2+x^3)$
q) $2x.(x^2-x^3)$
r) $2x.(3x^2-4x^3)$
s) $2x.3x^2.4x^3$
t) $(3x^2)^3$

Extração de raiz quadrada

Normalmente nos exercícios e questões de provas, quando é necessário extrair a raiz quadrada, aparecem apenas quadrados perfeitos, para que os cálculos sejam facilitados. Por isso o aluno deve conhecer os quadrados perfeitos, pelo menos os mais comuns. Na vida prática entretanto pode surgir a necessidade de extrair a raiz quadrada de números grandes, e que não sejam quadrados perfeitos. Felizmente as mais simples calculadoras manuais possuem uma tecla de raiz quadrada. Uma questão maldosa em uma prova pode envolver o cálculo de uma raiz quadrada de um número grande, ou um número do qual o aluno tenha esquecido. Uma solução para o problema é saber calcular a raiz quadrada manualmente. Por exemplo, pode aparecer algo como:

$\sqrt{6889}$

A primeira coisa a fazer é separar o número em grupos de 2 algarismos, da direita para a esquerda. Na raiz, cada grupo dará origem a um algarismo. No exemplo:

68.89
(d) (u)

Note que usamos um ponto para separar os grupos (sempre da direita para a esquerda), mas não se trata de um ponto decimal, e sim, um separador. Como ficamos com dois grupos, a raiz quadrada deste número terá dois dígitos. Indicamos como (d) e (u), os algarismos das dezenas e das unidades da raiz quadrada que estamos tentando calcular. Cada um dos grupos é um número entre 00 e 99, e cada um deles dá origem a um algarismo.

Scanned by CamScanner

A seguir olhamos para primeiro grupo (o mais à esquerda), no caso, 68. Este número foi obtido a partir do quadrado do algarismo das dezenas. Fica claro então que o algarismo das dezenas é 8, pois 8^2 é 64 (menor que 68), e 9^2=81 (maior que 68). Este primeiro algarismo é encontrado de tal forma que seu quadrado seja menor que o grupo (no caso, 68), e de tal forma que o próximo algarismo (no caso, 9) tenha um quadrado maior que o grupo. É fácil então descobrir o algarismo, de acordo com o valor do grupo:

Grupo de 01 a 03 → algarismo =1
Grupo de 04 a 08 → algarismo =2
Grupo de 09 a 15 → algarismo =3
Grupo de 16 a 24 → algarismo =4
Grupo de 25 a 35 → algarismo =5
Grupo de 36 a 48 → algarismo =6
Grupo de 49 a 63 → algarismo =7
Grupo de 64 a 80 → algarismo =8
Grupo de 81 a 99 → algarismo =9

Suponha agora que tenhamos a certeza absoluta de que o número dado é um quadrado perfeito. Já sabemos que a raiz quadrada tem dois dígitos e começa com 8, então tem a forma 8x (80, 81, 82, 83, ... ou 89). O número do qual estamos querendo extrair a raiz é 6889. Olhamos agora para o seu algarismo das unidades, no caso, 9. Este algarismo está relacionado com o quadrado do algarismo das unidades da raiz (nossa raiz, ainda desconhecida, tem a forma 8x). Então o algarismo x é tal que, se elevado ao quadrado, dá um resultado que termina com 9. Portanto este algarismo x só pode ser 3 ou 7. Podemos agora decidir qual deles é, por eliminação, testando 83 e 87.

$83^2 = 83 \times 83 = 6889$

Encontramos então o número que, se elevado ao quadrado, dá resultado 6889, que é 83. Este método permite que você encontre raízes quadradas de números que sejam quadrados perfeitos, até 9999. Se o número não for quadrado perfeito, o resultado será uma raiz inexata, como mostraremos a seguir.

Vejamos agora como extrair a raiz quadrada de números maiores. Por exemplo:

$\sqrt{328329}$

O método manual para extração de raiz quadrada, há décadas não é pedido em provas de concursos. Ainda assim, vamos apresentá-lo aqui, seu uso não é tão difícil.

O processo de extração é o seguinte:

1) Arme um dispositivo similar ao da conta de divisão, colocando o número a ser extraída a raiz no lugar do dividendo. A raiz que será encontrada ficará no lugar do divisor.

328329 |—

2) Separe o número de dois em dois dígitos, da direita para a esquerda. Neste exemplo a raiz quadrada terá 3 algarismos, pois o número original ficou dividido em 3 grupos.

32.83.29 |—

Scanned by CamScanner

3) O primeiro grupo tem valor 32, e dará origem ao primeiro algarismo (centenas) da raiz. Como 32 está entre acima de 25 e abaixo de 36, o algarismo procurado é 5. Se fosse 25, ainda seria 5, mas se fosse 36, seria 6.

```
32.83.29 | 5
```

4) Coloca-se no lugar do quociente, o dobro do algarismo encontrado (dobro de 5, que é 10), e abaixo do grupo trabalhado, o quadrado do número encontrado (quadrado de 5, que é 25).

```
32.83.29 | 5
25       | 10
```

5) Subtraímos o valor do grupo processado (no caso, 32) do quadrado do dígito encontrado (no caso, 25), e colocamos o resultado abaixo (no caso, 7). Abaixamos o próximo grupo (83), ficando então com 783.

```
32.83.29 | 5
25       | 10
 7 83
```

```
78÷10 = 7
```

6) Note que até o momento a raiz quadrada encontrada é 5 (não está completa), e o seu dobro é 10. O próximo número a ser processado é 783. Tiramos o último algarismo deste número, ficando com 78. Agora dividimos este valor pelo dobro da raiz até o momento. Ficamos com 78/10 = 7. Este número é o candidato a ser o próximo dígito da raiz.

```
32.83.29 | 57
25       | 10
 7 83
```

7) Temos agora que confirmar se este dígito encontrado (7) está correto. Se não estiver, temos que reduzir seu valor (no caso para 6, e testar novamente). Para testar, escrevemos este dígito em dois lugares: à direita da raiz (5, ficará 57) e à direita do dobro da raiz (10, ficará 107).

```
32.83.29 | 57
25       | 107
 7 83
```

8) Agora multiplicamos o dobro da raiz, já acrescido do novo algarismo a ser testado (no caso, 7) pelo próprio algarismo a ser testado (7). O resultado encontrado deve ser subtraído do valor "abaixado" pela última vez (no caso, 783). Se for possível fazer a subtração, este valor (no caso 7) fica confirmado. A nova raiz calculada até o momento se torna 57, e o seu dobro se torna 114. Se não for possível (encontrado valor maior), repetimos o teste com o próximo algarismo menor (seria 6).

```
32.83.29 | 57
25       | 107x7=749
 783     | 114
-749
  34
```

9) Abaixamos o próximo grupo: 29, formando 3429. Eliminamos o algarismo das unidades, ficamos com 342. Dividimos este valor pela raiz encontrada até o momento: 342÷114=3 Este valor deve ser escrito à direita da raiz e à direita do dobro da raiz.

```
342÷114= 3
```

```
32.83.29 | 573
25       | 107x7=763
 783     | 1143x3=3429
-749
 3429
```

10) Como a divisão foi exata, a raiz foi encontrada. Se não fosse exata, teríamos que testar o dígito. Por exemplo, se encontrássemos 4 teríamos que testar se 1144x4 é menor que o número em processamento (no

```
32.83.29 | 573
25       | 107x7=763
 783     | 1143x3=3429
-749
```

Scanned by CamScanner

caso, 3429). Se não fosse, diminuiríamos 1 unidade no novo dígito da raiz e repetiríamos o teste.

```
 3429 |
-3429 |
    0 |
```

11) A raiz quadrada foi encontrada com exatidão: 573, ou seja, o número original dado é um quadrado perfeito.

Este processo também funciona para raízes inexatas, ou seja, encontrar a raiz quadrada de números que não são quadrados perfeitos. A diferença é que termos casas decimais. Vamos exemplificar com o cálculo da raiz quadrada de 3, com 3 casas decimais.

Calcule $\sqrt{3}$ com aproximação de 0,001

1) Como queremos 3 casas decimais, vamos colocar 3 grupos de 00 depois da vírgula.

```
3,00.00.00 |
           |
```

2) O primeiro grupo a ser processado é 3. A raiz é 1, e o dobro da raiz encontrada até agora é 2.

```
3,00.00.00 | 1
           | 2
```

3) Subtraímos do primeiro grupo (3), o quadrado da raiz até agora (1), ficamos com 2. Abaixamos o próximo grupo (00), ficamos com 200. Note que acabamos de passar pela vírgula, então a vírgula na raiz ficará à direita do 1.

```
3,00.00.00 | 1
1          | 2
200        |
```

4) Eliminando o algarismo das unidades de 200, ficamos com 20. Dividimos agora 20 pelo dobro da raiz até o momento (no caso, 2). Não podemos ter um dígito 10, então usaremos 9. A seguir testamos se este dígito 9 pode ser usado: acrescentamos o 9 à direita da raiz atual (ficará 29) e multiplicamos pelo dígito 9.

```
20:2 = 10 → 9

3,00.00.00 | 1
1          | 29x9=261
200        | 28x8=224
189        | 27x7=189 (OK)
 1100      |
```

5) Este valor (261) é maior que 200, então não pode ser usado. Fazemos o mesmo teste com 8, e finalmente com o 7, que é aprovado. 27x7=189, e subtraindo de 200, restam 11.

```
3,00.00.00 | 1
1          | 29x9=261
200        | 28x8=224
189        | 27x7=189 (OK)
  11       |
```

6) Abaixamos 00, ficando com 1100. O número 7 aprovado vai para a raiz, fica 17. O dobro da raiz passa a ser 34.

Fazemos então 110:34 = 3

```
110:34=3

3,00.00.00 | 1,7
1          | 29x9=261
200        | 28x8=224
189        | 27x7=189 (OK)
 1100      | 34
```

7) O número 3 é testado, fazendo 343x3=1029, que é menor que 1100, portanto o 3 é aprovado.

```
3,00.00.00 | 1,7
1          | 27x7=189 (OK)
200        | 343x3=1029 (OK)
189        |
 1100      |
```

Scanned by CamScanner

8) O próximo dígito da raiz é então 3. O dobro da raiz é agora 346.
Fazendo 1100-1029 encontramos 71. O próximo valor é 7100.

```
3,00.00.00 | 1,73
1          | 27x7=189 (OK)
200        | 343x3=1029 (OK)
189        | 346
 1100
 1029
  7100
710:346=2
```

9) Fazendo 710:346 encontramos 2, que deve ser testado. 3462x2=6924, que é menor que 7100, então o 2 é aprovado.

Chegamos então à raiz de 3, com precisão de 3 casas decimais: 1,732. O processo poderia continuar indefinidamente.

```
3,00.00.00 | 1,732
1          | 27x7=189   OK
200        | 343x3=1029 OK
189        | 3462x2=6924 OK
 1100
 1029
  7100
  6924
```

Hoje existem calculadoras e computadores, mas no passado, raízes quadradas eram calculadas manualmente dessa forma. Para facilitar o trabalho, eram publicadas tabelas com esses valores prontos para serem usados, com várias casas decimais de precisão. Veja alguns exemplos, com precisão de 31 casas decimais:

$\sqrt{2}$ = 1,41421356237309504880168872420 97
$\sqrt{3}$ = 1,73205080756887729352744634150 59
$\sqrt{5}$ = 2,23606797749978969640917366873 13
$\sqrt{6}$ = 2,44948974278317809819728407470 59
$\sqrt{7}$ = 2,64575131106459059050161575363 93
$\sqrt{10}$ = 3,16227766016837933199889354443 27
$\sqrt{11}$ = 3,31662479035539984911493273667 07
$\sqrt{13}$ = 3,60555127546398929311922126747 05

O número de casas decimais desses números é infinito. São números irracionais, seus dígitos decimais não apresentam padrões repetitivos, como ocorre com as dízimas periódicas.

A partir desses números irracionais, podemos calcular outras raízes. Por exemplo, sabendo a raiz quadrada de 3 podemos calcular a raiz quadrada de 12. Tomemos a raiz de 3 com 3 casas decimais (1,732). Escrevemos 12 como 4x3 e aplicamos propriedades de potências:

$\sqrt{12} = \sqrt{4 \times 3} = \sqrt{4} \times \sqrt{3} = 2 \times \sqrt{3} = 2 \times 1{,}732 = 3{,}464$, aproximadamente

O cálculo manual de raízes quadradas costumava ser ensinado na 6ª série (atual 7º ano), mas o cálculo de radicais, como no exemplo acima, é ensinado tipicamente no último ano do ensino fundamental.

Números irracionais

Os números racionais são aqueles que podem ser expressos como uma fração p/q, onde p e q são inteiros primos entre si, sendo que q é diferente de zero. Permitindo que p e q sejam inteiros, o resultado poderá ter um sinal positivo ou negativo, por exemplo, 3/5 e –3/5.

Scanned by CamScanner

Os números irracionais são aqueles que não podem ser expressos na forma p/q, com p e q inteiros. Os números irracionais são infinitos, assim como ocorre com os racionais. Por exemplo, $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$ são irracionais. Um problema clássico da álgebra é demonstrar que $\sqrt{2}$ é um número irracional.

Exemplo: Provar que $\sqrt{2}$ é um número irracional.

Esta demonstração já foi explorada em uma questão de concurso para o CMSM. Para provar que $\sqrt{2}$ é um número irracional, devemos demonstrar que este número não pode ser expresso na forma p/q, com p e q inteiros. Vamos demonstrar isso usando o *método do absurdo*. Partimos da suposição de que $\sqrt{2}$ pode ser expresso na forma p/q, com p e q inteiros primos entre si, e com q diferente de zero, e mostramos que esta suposição resulta em uma afirmação absurda. Suponha portanto que:

$$\sqrt{2} = p/q$$

Elevando ao quadrado, ficamos com:

$$2 = p^2/q^2$$

que é o mesmo que

$$2q^2 = p^2$$

Isto indica que o número p deve ser par, já que seu quadrado é par. Podemos então chamar p de 2k, onde k é a metade de p. Sendo assim, p^2 é o mesmo que $(2k)^2 = 4k^2$.

$$2q^2 = 4k^2$$

Simplificando por 2, ficamos com

$$q^2 = 2k^2$$

Como q^2 é um número par, então q tem que ser par. Ficamos então com:

p é par
q é par

Isto é uma contradição, pois partimos do princípio de que p e q são inteiros primos entre si. Chegamos então a um absurdo, resultante da suposição inicial de que $\sqrt{2}$ é um número da forma p/q. Logo:

$\sqrt{2}$ não pode ser expresso na forma p/q, com p e q primos entre si, logo $\sqrt{2}$ é irracional.

Podemos usar o mesmo método para mostrar que $\sqrt{3}$ e $\sqrt{5}$ são irracionais, entre outros infinitos valores.

Números irracionais possuem infinitas casas decimais que não se repetem na mesma sequência de dígitos. Em certas situações, é conveniente representar os números irracionais de forma

Scanned by CamScanner

aproximada, com um número reduzido de casas decimais. Na álgebra, tipicamente deixamos a indicação de raiz, sem aproximação.

A maioria das propriedades apresentadas para os números racionais, como associatividade, distributividade, comutatividade, aplicam-se igualmente aos números irracionais. Entretanto, algumas não se aplicam, por exemplo, o fechamento. A soma, a diferença, o produto ou a divisão de números irracionais nem sempre resultam em um número irracional. Por exemplo, $(1+\sqrt{2})$ e $(1-\sqrt{2})$ são irracionais, mas sua soma vale 2, que não é irracional. Os números irracionais também não possuem elemento neutro aditivo nem neutro multiplicativo, pois os números 0 e 1 não pertencem aos irracionais.

No capítulo 14 estudaremos o cálculo de radicais, e aprenderemos a manipular algebricamente os números irracionais.

Números reais

Juntando todos os números racionais e todos os números irracionais temos o conjunto dos números reais. A relação entre esses conjuntos já foi apresentada no capítulo 1:



Podemos escrever:

$R = Q \cup I$

Ou seja, o conjunto R (Reais) é a união dos conjuntos Q e I (Racionais e Irracionais).

Todas as propriedades e operações válidas para os Racionais, são também válidas para os números reais. Uma diferença importante é que nem sempre podemos fazer manualmente cálculos com números reais, já que suas formas podem ser extremamente complexas. Por exemplo, se é fácil calcular 1/2 + 3/5, é extremamente complexo calcular, por exemplo,

$$\frac{\sqrt{5-\sqrt[3]{7}}}{2\sqrt{2}} - \frac{2-5\sqrt{3}}{\sqrt{17}-\pi}$$

Na Geometria, por exemplo, é comum ocorrerem cálculos que envolvem raízes quadradas ou cúbicas e o número π.

Scanned by CamScanner

A partir do próximo capítulo e até o final do livro, consideramos que o conjunto de trabalho é o conjunto dos números reais. Todas as técnicas que aprenderemos valem para quaisquer números reais. Obviamente os problemas que envolvem cálculo numérico só podem ser resolvidos manualmente com números, digamos, fáceis de manipular.

Exemplo: Calcule $\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)$

Podemos usar a propriedade distributiva da multiplicação, que vale para os números reais:

$$\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)=\sqrt{3}\cdot\sqrt{3}-\sqrt{3}\cdot\sqrt{2}+\sqrt{2}\cdot\sqrt{3}-\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}$$

Usaremos a seguinte propriedade (resulta da comutatividade da multiplicação):

$$\sqrt{a}\cdot\sqrt{b}=\sqrt{a\cdot b}$$

Sendo assim,

$\sqrt{3}\cdot\sqrt{3}=\sqrt{3\cdot 3}=\sqrt{9}=3$

$\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}=\sqrt{2\cdot 2}=\sqrt{4}=2$

$\sqrt{3}\cdot\sqrt{2}=\sqrt{2\cdot 3}=\sqrt{6}$

Ficamos então com:

$$\sqrt{3}\cdot\sqrt{3}-\sqrt{3}\cdot\sqrt{2}+\sqrt{2}\cdot\sqrt{3}-\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}=3-\sqrt{6}+\sqrt{6}-2=1$$

Muitas vezes ocorre isso nos problemas que envolvem operações com números irracionais. Uma operação com valores relativamente complexos pode resultar em um valor simples. Isto ocorre somente porque o formulador da questão escolheu os valores cuidadosamente para que o resultado seja simples. Sem este cuidado, as operações podem resultar em valores bastante complicados.

Muitas questões de concursos envolvem a propriedade de fechamento em relação aos conjuntos numéricos. Em relação aos irracionais, a propriedade de fechamento não existe.

O conjunto dos irracionais não possui elemento neutro (nem 0, o neutro aditivo, nem 1, o neutro multiplicativo).

A soma de números irracionais nem sempre é um número irracional.
Exemplo:

$$\left(5+\sqrt{3}\right)+\left(8-\sqrt{3}\right)=13$$

O produto de números irracionais nem sempre é um número irracional.
Exemplo:

$$\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)=1$$

Da mesma forma, a subtração e a divisão de números irracionais nem sempre resulta em um número irracional.

Tais conceitos costumam ser pedidos em provas, em questões do tipo (V) ou (F).

Scanned by CamScanner

Operando com números reais

Este capítulo apresentou as principais operações algébricas envolvendo números racionais:

- Adição e subtração
- Multiplicação e divisão
- Potências e raízes
- Expressões com números racionais

A boa notícia é que praticamente todas essas operações aplicam-se também aos números irracionais. Como o conjunto dos reais (R) é a união dos conjuntos Q (racionais) e I (irracionais), concluímos que praticamente tudo o que foi ensinado sobre operações com números racionais, vale também para números reais. Isto vale inclusive para as propriedades comutativa, associativa a distributiva. Quando consideramos os números reais, valem ainda as propriedades de fechamento e elemento neutro. Apenas os irracionais são um conjunto incomum, pois não possui o elemento neutro e nem a propriedade de fechamento.

São válidas as propriedades das potências e raízes para os números reais. Por exemplo:

$$\sqrt{a^4} = a^2$$

Ou mais genericamente:

$$\sqrt[n]{a^p} = a^{\frac{p}{n}}$$

Exemplo: (CN 64)

Dê a expressão mais simples de $\dfrac{\frac{\sqrt[4]{a}}{\sqrt[6]{a}} \div \sqrt[8]{a}}{\frac{\sqrt[3]{a}.\sqrt[9]{a}}{\sqrt{a}}}$

Solução:

$$\frac{\frac{\sqrt[4]{a}}{\sqrt[6]{a}} \div \sqrt[8]{a}}{\frac{\sqrt[3]{a}.\sqrt[9]{a}}{\sqrt{a}}} = \frac{a^{1/4} \times a^{-1/6} \times a^{-1/8}}{a^{1/3} \times a^{1/9} \times a^{-1/2}} = a^{\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{6}-\frac{1}{8}-\frac{1}{3}-\frac{1}{9}+\frac{1}{2}\right)}$$

O expoente de **a** será então:

$$\frac{1}{4}-\frac{1}{6}-\frac{1}{8}-\frac{1}{3}-\frac{1}{9}+\frac{1}{2}=\frac{1}{72}$$

Resposta: $\sqrt[72]{a}$

Apenas deve ser tomado cuidado com as bases negativas. Por exemplo, se **a** for negativo, **p** for ímpar e **n** for par, a expressão é inválida. Da mesma forma como não podemos extrair a raiz quadrada de um número negativo, surge restrição com uma raiz genérica como a desse exemplo. Se **a** for negativo e **p** for ímpar, então a^p será negativo. Dessa foram uma raiz *n*-

Scanned by CamScanner

ésima, com **n** par, deste número negativo, será uma expressão inválida ou não definida (que muitos chamam informalmente de impossível).

Outra operação não permitida é a elevação de números negativos a expoentes irracionais. Por exemplo, $(-2)^{3/5}$ é uma expressão perfeitamente válida, definida como:

$$\sqrt[5]{(-2)^3} = \sqrt[5]{-8} = -\sqrt[5]{8}$$

Entretanto a definição de um número elevado a um expoente irracional não é desta forma. A definição acima são serve para expressões como:

$$5^{\sqrt{2}}$$

A definição desse tipo de potência é matéria do ensino médio. A fórmula para esse tipo de potência é:

$$a^x = 10^{x.\log(a)}$$

Ou seja, este tipo de potência é baseada em *logaritmo*. Como não existem logaritmos de números negativos, não é definida a potência de expoente irracional para bases negativas. Para definir esse tipo de potência, é preciso utilizar números complexos, assunto que também faz parte da matemática do ensino médio.

Portanto não é permitida uma expressão como

$$(-5)^{\sqrt{2}}$$

Ainda assim é permitido que apareçam questões envolvendo expressões com expoentes irracionais que torna-se possível sem a necessidade do uso de logaritmos. Por exemplo:

$$\left(5^{\sqrt{2}}\right)^{\sqrt{2}} = 5^{\sqrt{2}.\sqrt{2}} = 5^2 = 25$$

Este cálculo está correto porque permanece válida a propriedade $(a^x)^y = a^{xy}$, mesmo quando x e y são números irracionais.

Exercícios de revisão

E90) Calcule

a) $\left(-\frac{12}{35}\right)\times\left(-\frac{5}{2}\right)$

b) $\left(\frac{5}{15}\right)^2+\left(-\frac{8}{3}\right)^2$

c) $\frac{2.(-15)+(-5)^2}{\sqrt{64}-\sqrt{(-4)^2}} =$

f) $\frac{12}{21}\times\frac{8}{65}\times\frac{24}{16}\times\frac{91}{75}$

g) $\frac{\sqrt{(-2)^2}+(-2)^3\times(-3)^2}{10\times(1+2+3+4)} =$

h) $\left(2\frac{8}{3}+1\frac{1}{2}\right)\times\left(2\frac{1}{5}-1\frac{1}{6}\right)$

k) $\left(-\frac{7}{12}\right)\times\left(-\frac{33}{70}\right)\times\left(-\frac{25}{22}\right)$

l) $1\frac{3}{11}\times\left(-2\frac{1}{5}\right)-\frac{25}{16}+\left(-\frac{125}{32}\right) =$

m) $-2\frac{5}{6}\times\left(-3\frac{3}{5}\right)-\frac{25}{16}+\frac{5}{8} =$

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

e) $-\frac{25}{16} \div (-20) =$ j) $\left(-\frac{3}{20}\right)^3 \times \left(-\frac{5}{3}\right)^3$ o) $\left(\frac{-3}{10}\right)^2 \times \left(\frac{-3}{10}\right)^3$

E93) Simplifique

$$\sqrt{\sqrt{\sqrt{\left[\frac{98+\left(2^5-19\right)}{3(13)-2}\right]^{\left(\frac{1768}{221}\right)}}}}$$

(A) 9 (B) 3 (C) $\sqrt{3}$ (D) $3^{\sqrt{2}}$ (E) $\frac{95}{37}$

E94) (CN) Calcule

Calcule o valor de $\left[8^{1/3}+\left(\frac{1}{25}\right)^{-1/2}+0{,}017^0\right]\times\frac{1}{0{,}888...}$

E95) (CN) Achar o valor de $6\cdot\left(\sqrt[3]{3{,}375}+\sqrt{1{,}777...}+\sqrt[5]{32^{-1}}\right)$

(A) $\sqrt[3]{3}+\sqrt{2}$ (B) 20 (C) $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ (D) $17+\sqrt{5}$ (E) $\frac{48}{7}$ (F) N.R.A.

E96) Se a e b são números positivos tais que $a^{3/2} = 8$ e $b^{2/3} = 4$, calcule **b – a.**

(A) 0 (B) 2 (C) 4 (D) 6 (E) 8

E97) Simplifique $\frac{x^3y^{-2}}{\left(x^{-2}y^3\right)^{-2}}$

(A) $\frac{1}{xy^4}$ (B) $\frac{x}{y^4}$ (C) $\frac{y^4}{x}$ (D) $\frac{x^7}{y^3}$ (E) $\frac{x^7}{y^4}$

E98) Sabe-se que **p** é um número natural maior que 1. Então, calcule o valor da expressão $\sqrt[p]{\frac{2^{1+p}+2^{1+p}+2^p}{5}}$

(A) 1/5 (B) 2 (C) 4 (D) p/2 (E) p/5

E99)O numeral $\left(5^{0,1999..}\right)^{180}$ possui quantos divisores?

(A) 10 (B) 18 (C) 19 (D) 36 (E) 37

E100) A expressão mais simples de $4^{13} + 4^{13} + 4^{13} + 4^{13}$ é:

(A) 4^{14} (B) 16^{13} (C) 4^{52} (D) 4^{17} (E) 17^4

E101) Das sentenças abaixo, assinale a que não é verdadeira:

(A) $(2/3)^2 = (3/2)^{-2}$ (B) $(0,1)^{-2} = 1/100$ (C) $x^{-1} = x$, se $x=1$ (D) $(-2)^0 = 1$ (E) $(2/3) < (3/2)$

Scanned by CamScanner

E102) Quantos divisores tem o número $216^{1,333...}$?

(A) 25 (B) 20 (C) 15 (D) 16 (E) NRA

E103) Efetue e simplifique $\frac{4^0+1,333...}{\left[-\frac{1}{3}\right]^3}-\frac{1^5-2^3}{0,1}$

E104) CEFETQ 2001

Calcule o valor da expressão $\sqrt[3]{\frac{(0,005)^2.0,000075}{10}} \div \left(10^{-4}.2^{-1/3}.3^{1/3}\right)$

E105) CN 75 - Calcular a soma dos termos da maior fração própria irredutível, para que o produto dos seus termos seja 60.

(A) 17 (B) 23 (C) 32 (D) 61 (E) 19 (F) NRA

E106) CN 76 - A raiz cúbica de um número N, é 6,25. Calcular a raiz sexta desse número N.

(A) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ (B) 2,05 (C) $2\sqrt{5}$ (D) 2,5 (E) 1,5

E107) CN 82 - Na expressão $\frac{(0,125)^{b-a}}{8^{a-b}}+21\left(\frac{b}{a}\right)^0+a^b=191$, **a** e **b** são números inteiros positivos, **a + b** vale:

(A) 15 (B) 14 (C) 13 (D) 12 (E) 11

E108) Se $2^x = 1/4$, então x^x é igual a:

(A) 2 (B) 4 (C) –4 (D) 1/4 (E) –1/4

E109) Qual das seguintes afirmativas é sempre verdadeira para quaisquer números reais a, b e c?

(A) Se a<b, então ac < bc (B) Se a < b, então $a^2 < b^2$ (C) Se a<b, então $a^3 < b^3$
(D) Se ac < bc, então a < b (E) Se a > b, então 1/a > 1/b

E110) Para qualquer número real x, $\sqrt{x^2}$ é sempre igual a:

(A) x (B) –x (C) 1 (D) |x| (E) $2\sqrt{x}$

E111) Quanto vale x + y, sabendo que $4^y = 1$ e que $5^x = 1/5$?

(A) 1 (B) 0 (C) –1 (D) –3/4 (E) x e y não podem ser determinados

E112) Sendo a, b e c reais positivos, e n um inteiro positivo, qual das seguintes afirmativas não é necessariamente verdadeira?

(A) $a(b + c) = ab + ac$ (B) $(ab)^n = a^n b^n$ (C) $(a/b)^n = a^n/b^n$
(D) $(a + b)^n = a^n + b^n$ (E) $\sqrt{\frac{a}{b}}=\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$

Scanned by CamScanner

E113) Simplifique $\frac{9x^2y^3z^{-1}}{12x^3y^{-3}z^2}$

E114) Se a = 256, calcule $\sqrt{a\sqrt{a\sqrt{a}}}$

(A) 2 (B) 4 (C) 32 (D) 64 (E) 128

E115) Resolver a equação $9^{(1-2x)} = 81^{(x-1)}$

E116) Qual das seguintes afirmativas não é verdadeira para todos os valores de x?

(A) $|x| \geq 0$ (B) $x \leq |x|$ (C) $|-x| = x$ (D) $|x| = |-x|$ (E) $-|-x| \leq 0$

E117) Simplifique $\sqrt{4x^5y^{10}z^8\sqrt{81x^2y^4z^4\sqrt{256x^8}}}$

E118) Simplifique $\left(\frac{\left(x^{3/4}y^{-5/6}\right)}{\left(x^{-4/5}y^{2/3}\right)}\right)^{-2}$

E119) Coloque em ordem crescente, sabendo que a é um número real maior que 1.
$-(-a)^3$, $-a^3$, $(-a)^4$, $-a^4$.

E120) Simplifique $\frac{4^{2x+1}\cdot 8^3}{16^x\cdot 32^2 - 2^{4x+7}\cdot 64}$

E121) Calcule $(0{,}0049)^{3/2} + (0{,}2)^4 + (0{,}04)^{-1/2}$

E122) Encontre x em $2^x.4^x.8^x = 1/16$

E123) Qual dos números abaixo é o maior?

(A) 2^{3^4} (B) 2^{4^3} (C) 4^{3^2} (D) 4^{2^3} (E) 3^{2^4}

E124) Simplifique $\frac{(-a)^7 + \left(\frac{1}{a}\right)^{-4}}{-a^2 - \left(\frac{-1}{a}\right)^{-5}}$

E125) Encontre P em $\sqrt{\frac{x}{y}\sqrt[3]{\frac{y}{x}\sqrt[4]{\frac{x}{y}}}} = \left(\frac{y}{x}\right)^P$

E126) Calcule a expressão $\frac{4\left[(17-10)^3 + \left(\frac{17+200}{31}\right)\sqrt{36}\right]}{3^2(7+4) + \frac{22\times 9^{\frac{3}{2}}}{18}}$

Scanned by CamScanner

E127) Simplifique $\frac{3^{5007}-3^{5003}}{3^{5008}+3^{5002}}$

(A) 7/8 (B) 1/3 (C) 4/5 (D) 31/59 (E) 24/73

E128) Se $x + 2y = 0$ e $x \neq 0$, calcule $\left(\frac{x}{y}\right)^{2014}+\left(\frac{y}{x}\right)^{-2014}$.

(A) $1/2^{2028}$ (B) 2^{2015} (C) 2^{2028} (D) $1/2^{2015}$ (E) 1

E129) Dados $m = 1{,}46666\ldots$ e $n = 0{,}407407\overline{407}\ldots$, calcule m/n.

(A) 66/185 (B) 18/5 (C) 36/11 (D) 3 (E) 120/37

E130) A expressão abaixo é igual ao número racional a/b, e **a** e **b** não têm fatores comuns. Encontre **a + b**.

$$\frac{\frac{2}{3}-\frac{5}{18}}{\frac{10}{24}+\frac{20}{36}}$$

(A) 7 (B) 37 (C) 72 (D) 84 (E) 98

E131) Uma das expressões abaixo tem um valor diferente das demais. Qual é este valor?

I) $(-1)^{-12}$ II) $-(10/23)^0$ III) $-2^{-1} - 2^{-1}$ IV) $-1^{-1} \cdot 1^{-1}$ V) $-(1)^{1/4}$

(A) −2 (B) −1 (C) 0 (D) 1 (E) 2

E132) Qual dos seguintes valores abaixo é o maior?
1^{48}, 2^{42}, 3^{36}, 4^{30}, 5^{24}, 6^{18}, 7^{12}, 8^6, 9^0.

E133) CN 52 - Calcular a expressão $\left[2^{-1}+\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}-1207^0+4^{3/2}\right]$

E134) CN 54 - Efetue $\sqrt{200}\times\sqrt[3]{108}$ e simplifique o resultado

E135) CMR 97 - O valor de $\frac{15^{30}}{45^{15}}$ é:

(A) 1 (B) $\left(\frac{1}{3}\right)^{15}$ (C) 5^{15} (D) $\left(\frac{1}{5}\right)^{15}$ (E) 3^{15}

E136) CMR 95 - Calcule o valor simplificado da expressão abaixo:

$$4.\frac{3-1{,}2\times 2^{-2}}{1-\frac{0{,}006}{0{,}15}}$$

E137) OBM 2008 - Quantos dos números abaixo são maiores que 10? (Sugestão: eleve os números ao quadrado)
$3\sqrt{11}$, $4\sqrt{7}$, $5\sqrt{5}$, $6\sqrt{3}$, $7\sqrt{2}$

Scanned by CamScanner

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

E138) CMF 2008 - Simplificando a expressão $\sqrt{\frac{8^6+4^{15}}{8^8+4^6}}$, obtemos o valor: (Sugestão: passar as potências para a base 2 e simplificar)

(A) 8 (B) 10 (C) 4 (D) 2 (E) 16

E139) CMPA 2009 - O valor da expressão $\sqrt{43+\sqrt{31+\sqrt{21+\sqrt{13+\sqrt{7+\sqrt{3+\sqrt{1}}}}}}}$ é:

(A) 1 (B) 3 (C) 7 (D) 9 (E) 13

E140) CN 2013 - Qual é o valor da expressão (Sugestão: não se assuste com os números, enfrente-os e lembre-se das propriedades das potências)

$$\left[\left(3^{0,333..}\right)^{27}+2^{2^{17}}-\sqrt[5]{239+\sqrt[3]{\frac{448}{7}}}-\left(\sqrt[3]{3}\right)^{3^3}\right]^{\sqrt[7]{92}} \quad ?$$

(A) 0,3 (B) $\sqrt[3]{3}$ (C) 1 (D) 0 (E) –1

E141) EPCAr 2005 - O valor da expressão $\left[\left(\frac{1}{2}\right)^3-(169)^{0,5}\times(128)^{-\frac{1}{7}}\right]\times 0,002$ é:

(A) $-12,750 \times 10^{-3}$ (B) $-12,750 \times 10^{-6}$ (C) $12,750 \times 10^{-6}$ (D) $12,750 \times 10^{-3}$

Detonando uma prova – Questão 11

Um aluno que se prepara para concursos deve testar seus conhecimentos, resolvendo uma prova completa, somente depois que completa seu curso e está totalmente preparado. Claro que questões de prova, específicas sobre cada assunto ensinado nos capítulos, são bem vindas. No caso dos concursos para Colégio Naval, EPCAr e Colégio Militar, é altamente recomendável que o aluno continue os estudos do presente livro resolvendo as questões de prova do VOLUME 2.

Abrimos uma exceção apresentando as soluções da prova do CN 2015/2016, relativas aos assuntos ensinados no livro (apenas não abordamos as questões de geometria). São ao todo 14 questões de álgebra e aritmética que podem ser tranquilamente resolvidas com o que está ensinado no livro. O aluno deve estudar essas questões somente ao final de cada capítulo. Neste livro as questões estão localizadas nos seguintes capítulos:

Questão 1	Capítulo 17		Questão 9	Capítulo 21
Questão 2	Capítulo 9		Questão 10	Capítulo
Questão 3	Capítulo 5		Questão 11	Capítulo 2
Questão 4	Capítulo 13		Questão 12	Capítulo 10
Questão 5	Capítulo 11		Questão 16, 18	Capítulo 11
Questão 6	Capítulo 10		Questão 19	Capítulo 11
Questão 7			Questão 20	Capítulo 20

Scanned by CamScanner

CN 2015 – Questão 11

Seja n um número natural e # um operador matemático que aplicado a qualquer número natural, separa os algarismos pares, os soma, e a esse resultado, acrescenta tantos zeros quanto for o número obtido. Por exemplo, #(3256) = 2 + 6 = 8, logo fica: 800000000. Sendo assim, o produto [#(20]. [#(21]. [#(22]. [#(23]. [#(24]... [#(29] possuirá uma quantidade de zeros igual a:

(A) 46 (B) 45 (C) 43 (D) 41 (E) 40

A solução está no final do capítulo

CONTINUA NO VOLUME 2: 120 QUESTÕES DE CONCURSOS

Respostas dos exercícios

E1)

a) $720 = 2^4.3^2.5$
b) $150 = 2.3.5^2$
c) $96 = 3^5.3$
d) $105 = 3.5.7$
e) $144 = 2^4.3^2$
f) $320 = 2^6.5$
g) $512 = 2^9$
h) $630 = 2.3^2.5.9$
i) $1024 = 2^{10}$
j) $420 = 2^2.3.5.7$
k) $84 = 2^2.3.7$
l) $120 = 2^3.3.5$
m) $160 = 2^5.5$
n) $180 = 2^2.3^2.5$
o) $240 = 2^4.3.5$
p) $384 = 2^7.3$
q) $625 = 5^4$
r) $900 = 2^2.3^2.5^2$
s) $121 = 11^2$
t) $288 = 2^5.3^2$

E2)

a) 90 b) 144 c) 360 d) 720 e) 900 f) 1600 g) 360 h) 1680 i) 60 j) 660 k) 840 l) 1800 m)17325 n) 540 o) 108 p) 90 q) 120 r) 96 s) 30 t) 40

E3) 12.A E4) $2^7.3^4.5^2$ E5) 144 E6) 32/80 E7) 24/56

E8) 15/20 E9) 35/56 E10) 1/6

E11)

a) 2 1/3 b) 3 3/5 c)2 22/25 d) 4 2/3 e) 4 3/5 f) 2 4/7 g)1 4/35 h) 5 2/3 i) 8 1/3 j) 2 1/5 k) 2 1/4 l) 2 1/10 m) 4 4/5 n)2 4/14 o)1 4/13 p)6 2/3 q) 9 3/5 r) 13 9/7 s) 4 1/2 t) 3 4/7

E12)

a) 7/2 b) 21/4 c) 38/5 d) 34/3 e) 17/3 f) 8/5 g) 7/3 h) 11/7 i) 19/8 j) 19/9 k) 4/3 l) 17/7 m) 23/9 n) 13/10 o) 10/3 p) 9/2 q) 24/11 r) 6/5 s) 36/7 t) 43/4

E13) 20 km E14) 15/40 E15) 45 km E16) R$ 120,00 E17) 17/18

E18) 17/12, 4/3, 11/12, 4/5, 2/3, 7/12, 1/3

E19)

a) 20/3 b) 13/20 c) 5/13 d) 7/10 e) 7/16 f) 3/37 g) 5/4 h) 2/15 i) 4/3 j) 9/2 k) 3/10 l) 7/12 m) 2/3 n) 4/15 o) 2/5 p) 2/5 q) 2/5 r) 3/10 s) 3/8 t) 2/5

E20) 6/16, 9/24, 12/32 E21) 14/15 E22) 9/48 E23) 45/30-20/30-8/30-1/30-20/30

E24) José acertou mais questões (10, contra 8) mas José tirou maior nota (8,00 contra 6,25)

E25) 48 E26) 3/8 E27) 500 há E28) João E29) Segundo

E30) 7,2 E31) km 15 E32) km 20 E33) km 24

Scanned by CamScanner

E34)

a) 6	c) 6	e) 28	g) 5	i) 11,2	k) 36	m) 60	o) 36	q) 237	s) 9
b) 15	d) 7	f) 25	h) 240	j) 15	l) 9	n) 12	p) 4	r) 38	t) 12

E35) (D) E36) (D)

E37)

a)0,027	c)0,0012	e)1,56	g)50	i)4,3	k)11,5	m)11,78	o)0,027	q)0,10	s)0,021
b)45,6	d)0,05	f)0,001	h)2,7	j)0,77	l)21,7	n)0,36	p)0,013	r)0,32	t)8,192

E38)

a) 0,2	c) 0,01	e) 0,005	g) 1,62	i) 0,18	k) 0,1	m) 0,04	o) 0,32	q) 0,6	s) 0,75
b) 0,05	d) 0,013	f)0,0125	h) 2,00	j) 0,12	l) 0,015	n) 0,25	p) 0,4	r) 0,9	t) 0,35

E39)

a)3/10	c)1/100	e)324/100	g)2/10000	i)25/100	k)13/10	m)1/1000	o)125/10	q)7/10	s)105/10
b)12/10	d)175/100	f)1001/10	h)1/1000000	j)225/100	l)2112/100	n)5/1000	p)18/10	r)99/100	t)83/10

E40)

a) 0,25	c) 1,4	e) 0,875	g) 0,12	i) 0,375	k) 1,2	m) 8,5	o) 0,75	q) 1,5	s) 1,8
b) 1,25	d) 2,25	f) 3,75	h) 0,15	j) 0,75	l) 0,6	n) 0,625	p) 3,5	r) 0,125	t) 0,8

E41)

a) 5/4	c) 3/4	e) 1/8	g) 36/5	i) 26/5	k) 8/5	m) 11/5	o) 5/2	q) 3/5	s) 1/5
b) 7/20	d) 5/8	f) 17/5	h) 17/4	j) 3/2	l) 7/4	n) 11/10	p) 3/4	r) 2/5	t) 1/40

E42)

a) 0,333...	f) 0,7272...	k) 0,8333...	p) 0,38...
b) 0,222...	g) 1,222...	l) 0,142857	q) 1,666...
c) 0,666...	h) 3,333...	m) 2,333...	r) 1,9090...
d) 0,428571...	i) 5,428571...	n) 5,333...	s) 0,777...
e) 1,333...	j) 19/15	o) 0,555...	t) 0,769230...

E43)

a) 32/99	f) 2 2/15	k) 16 2/3	p) 7/120
b) 1 7/9	g) 2/15	l) 5 1/9	q) 13/99
c) 3 2/11	h) 2 41/99	m) 4/9	r) 55/74
d) 5/9	i) 2 2/3	n) 1/15	s) 1/150
e) 1	j) 8 1/3	o) 131/990	t) 5 47/99

E44)

a) $\frac{5}{3}$	c) $\frac{3}{2}$	e) $\frac{6}{5}$	g) $\frac{7}{11}$	i) $\frac{9}{4}$	k) $\frac{2}{9}$	m) $\frac{2}{3}$	o) $\frac{3}{11}$	q) $\frac{4}{3}$	s) $\frac{23}{17}$
b) $-\frac{4}{9}$	d) $-\frac{7}{8}$	f) $-\frac{4}{5}$	h) $-\frac{5}{12}$	j) $-\frac{1}{6}$	l) $-\frac{2}{7}$	n) $-\frac{7}{13}$	p) $-\frac{2}{5}$	r) $-\frac{7}{10}$	t) $\frac{3}{100}$

E45)

a) $-\frac{7}{2}$	c) $-\frac{11}{3}$	e) $\frac{6}{5}$	g) $-\frac{7}{10}$	i) $\frac{7}{20}$	k) $\frac{4}{5}$	m) $\frac{3}{10}$	o) $-\frac{5}{4}$	q) $-\frac{2}{7}$	s) $-\frac{4}{5}$
b) $\frac{3}{5}$	d) $-\frac{7}{8}$	f) 0	h) $-\frac{2}{3}$	j) $\frac{1}{6}$	l) $-\frac{1}{10}$	n) $\frac{9}{4}$	p) $\frac{2}{9}$	r) $-\frac{7}{11}$	t) $\frac{1}{33}$

E46)

Scanned by CamScanner

a) $\frac{151}{70}$ c) $\frac{4}{3}$ e) $\frac{19}{15}$ g) $\frac{109}{77}$ i) $\frac{1}{8}$ k) $\frac{233}{30}$ m) $\frac{187}{30}$ o) $\frac{2}{5}$ q) $\frac{11}{16}$ s) $\frac{29}{20}$
b) $\frac{75}{28}$ d) $\frac{1}{90}$ f) $\frac{13}{15}$ h) $\frac{7}{8}$ j) $\frac{39}{10}$ l) $\frac{193}{30}$ n) $\frac{31}{15}$ p) $\frac{283}{36}$ r) $\frac{71}{35}$ t) $\frac{99}{10}$

E47)
a) 11 c) 6 e) 0 g) 16 i) 1 k) 18 m) 2 o) 4 q) –4 s) 5
b) 5 d) 1 f) –13 h) –1 j) 7 l) –10 n) –2 p) 3 r) 6 t) 0

E48)
a) $-\frac{17}{35}$ c) $-\frac{32}{35}$ e) $-\frac{1}{6}$ g) $-\frac{43}{56}$ i) $-\frac{3}{8}$ k) $\frac{264}{35}$ m) $-\frac{1}{24}$ o) $-\frac{11}{30}$ q) $-\frac{7}{16}$ s) $-\frac{17}{30}$
b) $\frac{4}{7}$ d) $-\frac{1}{70}$ f) $\frac{1}{10}$ h) $-\frac{7}{24}$ j) $-\frac{1}{2}$ l) $\frac{79}{12}$ n) $-\frac{24}{35}$ p) $-\frac{11}{12}$ r) $-\frac{1}{10}$ t) $-\frac{5}{2}$

E49)
a) $\frac{32}{15}$ c) $-\frac{11}{15}$ e) $\frac{11}{10}$ g) $\frac{10}{77}$ i) $-\frac{7}{8}$ k) $\frac{227}{30}$ m) $-\frac{33}{70}$ o) $\frac{2}{15}$ q) $\frac{3}{16}$ s) $\frac{43}{60}$
b) $\frac{29}{8}$ d) $-\frac{7}{90}$ f) $\frac{13}{15}$ h) $\frac{13}{28}$ j) $\frac{37}{10}$ l) $\frac{103}{30}$ n) $\frac{16}{15}$ p) $-\frac{40}{9}$ r) $-\frac{9}{7}$ t) $\frac{21}{10}$

E50)
a) $-\frac{1}{15}$ c) $-5,69$ e) $\frac{7}{24}$ g) $-\frac{1}{5}$ i) $-\frac{37}{60}$ k) $\frac{39}{70}$ m) $\frac{1}{3000}$ o) $\frac{5}{12}$ q) $\frac{1}{30}$ s) $\frac{37}{60}$
b) $-\frac{29}{42}$ d) $-\frac{11}{90}$ f) $-\frac{2}{5}$ h) $-\frac{11}{5}$ j) $\frac{17}{10}$ l) 1 n) $\frac{2}{3}$ p) $\frac{14}{15}$ r) 0 t) $\frac{13}{48}$

E51)
a) 3/7 < 4/7
b) 2/3 > 2/5
c) –1/5 < 0
d) –10/3 < –3
e) –1/3 < –1/5
f) 1 2/5 > 4/3
g) 0,333 < 0,3...
h) 4 2/35 < 5 1/77
i) –2,38 < –2,37997
j) 1/5 = 20%
k) –10% > –1/8
l) 1/3 < 3/10
m) –1/3 < –0,3
n) 7/10 > 2/3
o) –8/3 < –2,5
p) 7/5 > 4/3
q) –0,222... > –3/10
r) –10 < –9,9
s) –1/5 > –1/4
t) 5/6 < 0,9

E52)
a) 4/5 > 0,75
b) 0,666 < 2/3
c) –4/7 > –5/8
d) 9/8 < 8/7
e) –9/13 > –7/10
f) 4/5 > –2/3
g) 7/10 > 0
h) –2/3 < 1/2
i) –3 < 2
j) –0,6 < 0,1
k) 0,666 < 0,666...
l) 0,3 = 3/10
m) 0,999 < 1
n) 0,999... = 1
o) –0,4 > –30/7
p) –3/5 > –2/3
q) 4/5 < 5/6
r) 5/8 > 5/9
s) –0,222 > –0,222...
t) 0 > –47/147

E53)
a) 14,22... < 14 83/97
b) 0 > –3,17921792...
c) –5,1212... > –6,333...
d) 1,3181 < 2,21289
e) 0,333333 < 0,333...
f) 4 7/239 < 5 13/777
g) 25,15 > 100/4
h) –2,1313... < 0,218
i) 715/113 > 700/113
j) 23/59 > 23/61
k) –18/73 > –18/71
l) 11% > –12,375%
m) 0,9175 < 73/72
n) –0,999... = –1
o) 0,377... > 0,37775
p) 1/256 < 2/500
q) 1,333... < 3/2
r) 4/7 > 4/9
s) –2/7 < –2/9
t) 1/5 > 1/6

E54)
a) $\frac{3}{20}$ c) $\frac{7}{22}$ e) 9 g) $\frac{50}{11}$ i) $\frac{5}{16}$ k) $\frac{13}{2}$ m) $\frac{9}{2}$ o) 8 q) $\frac{30}{7}$ s) $\frac{4}{15}$
b) $\frac{6}{7}$ d) $\frac{65}{3}$ f) $\frac{2}{5}$ h) $\frac{28}{25}$ j) $\frac{48}{375}$ l) 10 n) $\frac{65}{7}$ p) 14 r) $\frac{5}{2}$ t) $\frac{4}{5}$

Scanned by CamScanner

E55)

a) $\frac{3}{8}$ b) $\frac{2}{15}$ c) 240 d) $\frac{8}{15}$ e) $\frac{31}{16}$ f) 160 g) $\frac{22}{3}$ h) $\frac{4}{35}$ i) $\frac{2}{5}$ j) $\frac{1}{24}$ k) $\frac{2}{125}$ l) 1 m) $\frac{24}{5}$ n) 10 o) $\frac{1}{6}$ p) $\frac{33}{10}$ q) $\frac{21}{2}$ r) 120 s) $\frac{7}{48}$ t) $\frac{1}{25}$

E56)

a) 1/2 b) 1/10 c) 5/3 d) 7/4 e) 6 f) 7/24 g) 9/2 h) 9/2 i) 1/20 j) 7 k) –5/2 l) –1/5 m) –18 n) –7/2 o) 5 p) 4/7 q) –2/9 r) –11/4 s) –1/15 t) –4/13

E57)

a) $\frac{5}{2}$ b) $\frac{39}{4}$ c) $\frac{5}{4}$ d) $\frac{15}{4}$ e) 10 f) $\frac{4}{81}$ g) $\frac{15}{128}$ h) $\frac{8}{5}$ i) 5 j) $\frac{7}{8}$ k) $\frac{5}{12}$ l) $\frac{18}{5}$ m) $\frac{6}{5}$ n) $\frac{1}{6}$ o) $\frac{75}{84}$ p) $\frac{24}{7}$ q) $\frac{11}{10}$ r) 2 s) $\frac{40}{21}$ t) $\frac{9}{20}$

E58)

a) $-\frac{6}{35}$ b) $\frac{6}{7}$ c) $-\frac{1}{7}$ d) $-\frac{3}{56}$ e) $-\frac{25}{64}$ f) $-\frac{81}{80}$ g) $\frac{1}{2}$ h) $-\frac{18}{25}$ i) $-\frac{1}{16}$ j) $-\frac{8}{15}$ k) $-\frac{14}{5}$ l) $\frac{51}{5}$ m) $\frac{8}{7}$ n) -8 o) 8 p) $-\frac{3}{2}$ q) $-\frac{5}{2}$ r) $-\frac{7}{2}$ s) $\frac{8}{15}$ t) $-\frac{16}{9}$

E59)

a) -5 b) $-\frac{1}{6}$ c) $\frac{3}{2}$ d) $-\frac{5}{3}$ e) -15 f) $-\frac{3}{10}$ g) $\frac{5}{64}$ h) $-\frac{80}{81}$ i) 4 j) -20 k) $-\frac{5}{2}$ l) $-\frac{4}{5}$ m) $-\frac{6}{5}$ n) $\frac{9}{5}$ o) $-\frac{15}{2}$ p) $-\frac{12}{5}$ q) $-\frac{7}{10}$ r) 3 s) $-\frac{20}{7}$ t) $\frac{27}{10}$

E60)

a) $\frac{19}{180}$ b) $\frac{32}{69}$ c) $\frac{13}{300}$ d) $\frac{104}{441}$ e) $\frac{29}{180}$ f) $\frac{25}{104}$ g) $\frac{1147}{180}$ h) $\frac{19}{18}$ i) 2 j) $\frac{58}{3}$

E61)

a) $\frac{11}{84}$ b) $\frac{49}{6}$ c) $\frac{5}{11}$ d) $\frac{4}{21}$ e) $\frac{228}{23}$ f) $\frac{3}{5}$ g) $\frac{217}{120}$ h) $\frac{7}{12}$ i) $\frac{3}{2}$ j) $\frac{44}{15}$

E62)

a) $-\frac{32}{105}$ b) 1 c) $-\frac{871}{320}$ d) $-\frac{11}{4}$ e) $\frac{27}{7}$ f) $-\frac{9}{2}$ g) $\frac{77}{10}$ h) $-\frac{25}{6}$ i) $\frac{33}{14}$ j) $\frac{28}{5}$ k) $\frac{52}{15}$ l) $\frac{39}{50}$ m) $-\frac{116}{45}$ n) $\frac{259}{320}$ o) $\frac{7}{3}$ p) $-\frac{1}{80}$ q) $-\frac{87}{56}$ r) -5 s) $-\frac{42}{10}$ t) 4

E63)

Scanned by CamScanner

a) $\frac{1}{9}$ c) $\frac{16}{25}$ e) $\frac{27}{1000}$ g) $\frac{25}{64}$ i) $\frac{8}{27}$ k) $\frac{49}{100}$ m) $\frac{9}{64}$ o) $\frac{243}{1000}$ q) $\frac{1}{10000}$ s) $\frac{125}{27}$

b) $\frac{4}{9}$ d) $\frac{8}{125}$ f) $\frac{16}{81}$ h) $\frac{9}{49}$ j) $\frac{1000}{27}$ l) $\frac{64}{81}$ n) $\frac{8}{27}$ p) $\frac{1}{32}$ r) $\frac{125}{8}$ t) $\frac{32}{243}$

E64)

a) $\frac{1}{81}$ c) $-\frac{81}{10000}$ e) $\frac{81}{49}$ g) $\frac{25}{81}$ i) $\frac{16}{10000}$ k) 1 m) $\frac{9}{121}$ o) $\frac{27}{1000}$ q) $-\frac{243}{32}$ s) $\frac{81}{169}$

b) $-\frac{8}{27}$ d) $-\frac{1}{32}$ f) $\frac{49}{10000}$ h) $-\frac{1}{64}$ j) $-\frac{8}{125}$ l) $\frac{4}{49}$ n) $\frac{144}{169}$ p) $-\frac{1}{81}$ r) $-\frac{100}{49}$ t) $\frac{81}{625}$

E65)

a) 1,96 c) 16/81 e) 4/9 g) 0,008 i) 1,728 k) 6,25 m) 4/81 o) 64/25 q) –0,16 s) 1

b) 0,001 d) 27/8 f) 2,25 h) 0,25 j) 1,331 l) 0,001 n) 0,125 p) 0,216 r) 0,0625 t) 0,0001

E66)

a) $-\frac{1}{3}$ c) $-\frac{4}{5}$ e) $-0,333...$ g) $-2,18$

b) $\frac{1}{2}$ d) $5\frac{2}{7}$ f) 3,14 h) $-\frac{2}{5}$

E67)

a) 1 c) 1 e) 1 g) 1

b) 1 d) 1 f) 1 h) 1

E68)

a) $-\frac{1}{3125}$ c) $-\frac{32}{243}$ e) $-\frac{27}{125}$ g) $\frac{8}{125}$

b) $\frac{1}{128}$ d) $\frac{1}{10000000}$ f) $-\frac{1}{32}$ h) $-\frac{243}{100000}$

E69)

a) $\frac{1}{4}$ c) $\frac{1}{16}$ e) $\frac{1}{32}$ g) $\frac{1}{10000000000}$

b) $-\frac{125}{27}$ d) $\frac{1}{81}$ f) $\frac{1}{64}$ h) $\frac{1}{81}$

E70)

a) $\frac{1}{4}$ c) $\frac{1}{1000}$ e) $\frac{1}{3}$ g) $-\frac{8}{125}$

b) $\frac{4}{25}$ d) $\frac{16}{81}$ f) $\frac{9}{100}$ h) $\frac{1}{16}$

E71)

a) $\frac{36}{49}$ c) $\frac{1}{64}$ e) $-\frac{8}{27}$ g) $-\frac{1}{32}$

b) $\frac{1}{1024}$ d) $\frac{16}{625}$ f) $-\frac{343}{27}$ h) $\frac{1}{10000000}$

E72)

a) $\frac{64}{729}$ c) $\frac{1}{100000000}$ e) $\frac{4^6}{5^6}$ g) $\frac{1}{2^{18}}$

b) $\frac{2^{15}}{5^{15}}$ d) $\frac{3^{20}}{10^{20}}$ f) $\frac{1}{9}$ h) $\frac{64}{7^6}$

E73)

a) $-\frac{27}{125}$ c) $-\frac{16}{625}$ e) $-\frac{243}{100000}$ g) $\frac{4}{17}$ i) $-\frac{23}{45}$ k) $-\frac{27}{125}$ m) -8 o) $\frac{9}{25}$ q) $-\frac{16^3}{15^3}$ s) $\frac{81}{16}$

b) $\frac{32}{729}$ d) $\frac{1}{64}$ f) 1 h) 1 j) 1 l) 16 n) $\frac{625}{16}$ p) $\frac{9}{16}$ r) 1 t) $-\frac{1}{3125}$

E74)

a) $-\frac{1}{3125}$ c) $\frac{81}{10000}$ e) $\frac{1}{256}$ g) $-\frac{125}{512}$ i) $\frac{243}{32}$ k) $-\frac{8}{27}$ m) $\frac{8}{125}$ o) $\frac{11}{37}$ q) $-\frac{1}{3125}$ s) $\frac{8}{27}$

Scanned by CamScanner

b) $\frac{1}{128}$ d) $\frac{32}{3125}$ f) $\frac{36}{25}$ h) $\frac{1}{10000}$ j) $\frac{729}{64}$ l) $\frac{1}{4}$ n) $-\frac{27}{125}$ p) $\frac{4}{25}$ r) $\frac{1}{81}$ t) $\frac{1}{64}$

E75)

a) x^5 c) x^9 e) x^{15} g) x^2 i) x k) x^6 m) x^{24} o) x^{60} q) $40x^7$ s) $8x^{15}$
b) x^7 d) x^3 f) x^5 h) x^4 j) 1 l) x^{12} n) x^{15} p) $8x^5$ r) $3x^6$ t) $81x^8$

E76)

a) $\frac{32}{75}$ c) 1 e) $\frac{2}{27}$ g) $\frac{3}{2}$ i) $\frac{121}{36}$ k) $\frac{9}{500}$ m) $\frac{2}{3}$ o) $\frac{128}{45}$ q) $\frac{147}{160}$ s) $\frac{9}{64}$
b) $\frac{35}{18}$ d) $\frac{128}{45}$ f) $\frac{320}{27}$ h) $\frac{200}{243}$ j) $\frac{2}{3}$ l) 50 n) $\frac{81}{2}$ p) $\frac{384}{125}$ r) $\frac{3}{7}$ t) $\frac{9}{4}$

E77)

a) 4 c) 0,01 e) 16 g) 8/27 i) 0,001 k) 125/8 m) 9/25 o) 125 q) 27 s) 100/9
b) 16/9 d) 27/8 f) 49 h) 1/64 j) 125/8 l) 1000/27 n) 100 p) 16 r) 300 t) 125/27

E78)

a) -5 c) $\frac{25}{9}$ e) 10 g) 32 i) 4 k) 32 m) -64 o) $\frac{1}{3}$ q) 81 s) $\frac{1}{10^{13}}$
b) $-\frac{8}{27}$ d) $\frac{4}{25}$ f) 32 h) $-\frac{27}{1000}$ j) 16 l) $-\frac{27}{125}$ n) $\frac{1}{64}$ p) 1000000 r) 81 t) $\frac{125}{8}$

E79)

a) $\frac{25}{4}$ c) $\frac{16}{81}$ e) $-\frac{1}{128}$ g) 1024 i) $\frac{729}{64}$ k) $-\frac{1}{216}$ m) $\frac{64}{729}$ o) $\frac{10^{20}}{3^{20}}$ q) $-\frac{27}{147}$ s) 9
b) $\frac{49}{36}$ d) $\frac{9}{100}$ f) $\frac{1}{64}$ h) 10^7 j) 10^8 l) $\frac{625}{16}$ n) $-\frac{5^{15}}{2^{15}}$ p) -32 r) 2^{18} t) $\frac{2^6}{7^6}$

E80)

a) $\frac{1}{2}$ c) $\frac{5}{9}$ e) $\frac{8}{9}$ g) $\frac{2}{5}$ i) $\frac{4}{11}$ k) $\frac{5}{12}$ m) $\frac{4}{7}$ o) $\frac{5}{8}$ q) $\frac{2}{13}$ s) $\frac{9}{14}$
b) $\frac{2}{3}$ d) $\frac{7}{6}$ f) $\frac{1}{10}$ h) $\frac{9}{2}$ j) $\frac{3}{10}$ l) $\frac{9}{8}$ n) $\frac{9}{13}$ p) $\frac{12}{5}$ r) $\frac{5}{8}$ t) $\frac{5}{4}$

E81)

a) $-\frac{3}{4}$ c) $-\frac{1}{10}$ e) $-\frac{2}{3}$ g) $-\frac{8}{3}$ i) -2 k) $-\frac{8}{3}$ m) $-\frac{2}{5}$ o) $\frac{1}{8}$ q) $-\frac{5}{8}$ s) $-\frac{10}{3}$
b) $\frac{2}{5}$ d) $\frac{7}{3}$ f) $\frac{5}{3}$ h) $\frac{4}{7}$ j) $-\frac{1}{10}$ l) $\frac{6}{7}$ n) $-\frac{9}{5}$ p) $-\frac{9}{4}$ r) $\frac{1}{6}$ t) $\frac{2}{9}$

E82)

a) 1/3 c) 1,2 e) 6/5 g) 3/10 i) 3/2 k) 4/3 m) –3/5 o) 7/5 q) 4/5 s) 1/5
b) –1/2 d) 17/100 f) 3/10 h) 5/2 j) 8/3 l) 8/5 n) 1/10 p) 3/5 r) 3/2 t) 4/3

E83)

a) $\frac{2}{5}$ c) $-\frac{1}{5}$ e) 1 g) 4 i) $-\frac{8}{7}$ k) $-\frac{4}{9}$ m) $\frac{3}{5}$ o) 0 q) Impossível s) $|x|$
b) $-\frac{3}{5}$ d) 8 f) $-\frac{1}{10}$ h) Impossível j) $\frac{5}{8}$ l) 5 n) $-\frac{3}{5}$ p) $-\frac{1}{2}$ r) x t) $-x$

Scanned by CamScanner

E84)

a) -6 c) 10 e) 125 g) $-\frac{5}{9}$ i) $-\frac{16}{25}$ k) -4 m) 16 o) Impossível q) $-\frac{3}{5}$ s) $\frac{343}{27}$

b) $\frac{2}{3}$ d) $\frac{1}{9}$ f) Impossível h) 16 j) -729 l) Impossível n) $\frac{125}{729}$ p) 6 r) $\frac{1}{16}$ t) $\frac{1}{512}$

E85)

a) $-\frac{58}{63}$ c) $-\frac{1}{5}$ e) $\frac{107}{14}$ g) $-\frac{13}{11}$ i) $\frac{152}{69}$ k) $\frac{64}{225}$ m) $-\frac{16}{2025}$

b) $-\frac{75}{16}$ d) $\frac{501}{56}$ f) $\frac{156}{35}$ h) $-\frac{235}{12}$ j) $\frac{73}{3}$ l) $-\frac{900}{49}$ n) $-\frac{2}{5}$

E86)

a) $\frac{37}{15}$ c) $\frac{38}{30}$ e) $\frac{25}{6}$ g) $-\frac{17}{15}$ i) $\frac{32}{45}$ k) $-\frac{73}{75}$ m) $\frac{1}{3}$ o) $\frac{13}{7}$ q) $-\frac{14}{25}$

b) $\frac{8}{15}$ d) $\frac{17}{90}$ f) $\frac{68}{15}$ h) $-\frac{13}{60}$ j) $-\frac{13}{60}$ l) $-\frac{1}{15}$ n) -61 p) $\frac{11}{12}$ r) $\frac{-137}{90}$

E87)

a) $\frac{149}{108}$ c) $-\frac{1}{2}$ e) $-\frac{209}{90}$ g) -2 i) $\frac{9}{20}$ k) $\frac{2}{3}$ m) $-\frac{5}{36}$ o) $-\frac{11}{27}$ q) $-\frac{101}{150}$

b) $-\frac{34}{45}$ d) $\frac{13}{5}$ f) $\frac{50}{9}$ h) $\frac{2}{3}$ j) $-\frac{157}{45}$ l) $-\frac{27}{160}$ n) $\frac{7}{6}$ p) $-\frac{17}{5}$ r) $-\frac{223}{60}$

E88)

a) $-\frac{5}{4}$ c) $\frac{7}{10}$ e) $\frac{11}{3}$ g) $\frac{1}{3}$ i) $\frac{7}{20}$ k) $-\frac{3}{5}$ m) $-\frac{175}{27}$ o) -6 q) $\frac{2}{15}$ s) $-\frac{1}{3}$

b) -15 d) $\frac{7}{10}$ f) $-\frac{3}{5}$ h) $-\frac{17}{15}$ j) $-\frac{2}{9}$ l) $\frac{1}{15}$ n) $\frac{32}{45}$ p) $\frac{16}{3}$ r) $\frac{2}{3}$ t) $\frac{6}{5}$

E89)

a) x^5 c) $4x^5$ e) $5x$ g) x^5+5x^2 i) x^6 k) $125x^6$ m) $x+x^2$ o) x^3+x^4 q) $2x^3-2x^4$ s) $24x^6$

b) $4x^5$ d) x^2 f) x^2+5x h) $5x^2+3x$ j) $9x^2$ l) x n) $x+x^4$ p) $2x^3+2x^4$ r) $6x^3-8x^4$ t) $27x^6$

E90)

a) $\frac{6}{7}$ c) $-\frac{5}{4}$ e) $\frac{5}{28}$ g) $-\frac{7}{10}$ i) $-\frac{27}{343}$ k) $\frac{5}{16}$ m) $\frac{77}{10}$ o) $\frac{1267}{18}$

b) $\frac{1}{64}$ d) -64 f) $\frac{16}{125}$ h) $\frac{1147}{180}$ j) $-\frac{1}{3125}$ l) $-\frac{34}{5}$ n) 0

E91)

a) $\frac{3^8}{5^8 \times 2^5}$ c) $-\frac{34}{45}$ e) $\frac{9}{20}$ g) $\frac{16}{3}$

b) -61 d) $-\frac{27}{160}$ f) $\frac{6}{5}$ h) $-\frac{3}{5}$

E92)

Scanned by CamScanner

a) $-\frac{79}{100}$ c) $\frac{9}{20}$ e) $\frac{5}{64}$ g) $\frac{217}{120}$ i) $\frac{144}{169}$ k) $\frac{28}{5}$ m) $\frac{1}{64}$ o) $-\frac{243}{100000}$

b) $\frac{28}{25}$ d) $\frac{1}{2}$ f) $\frac{19}{18}$ h) $\frac{1000}{27}$ j) $\frac{1}{64}$ l) $-\frac{8}{125}$ n) $\frac{1}{9}$

E93) 3 E94) 9 E95) (B) E96) (C) E97) (C)

E98) (B) E99) (37) E100) (A) E101) (B) E102) (A)

E103) 7 E104) 5 E105) (A) E106) (D) E107) (A)

E108) (D) E109) (C) E110 (D) E111) (C) E112) (D)

E113) $\frac{3y^6}{4x^3}$ E114) (E) E115) x = 3/4 E116) (C)

E117) $12.x^5.y^6.|z^5|$, se x>0. E118) $\frac{y^3}{x^{\frac{31}{10}}}$ E119) $(-a)^4, -(-a)^3, -a^3, -a^4$

E120) –2/7 E121) 5,001943 E122) 2/3 E123) (A)

E124) $-a^2$ E125) –9/24 E126) 35/3 E127) (E) E128) (B)

E129) (B) E130) (A) E131) (D) E132) 4^{30} E133) 11,5

E134) $60\sqrt[6]{2}$ E135) (C) E136) 45/4 E137) (C) E138) (A)

E139) (C) E140) (1) E141) (A)

Detonando uma prova – Questão 11

CN 2015 – Questão 11

Seja n um número natural e # um operador matemático que aplicado a qualquer número natural, separa os algarismos pares, os soma, e a esse resultado, acrescenta tantos zeros quanto for o número obtido. Por exemplo, #(3256) = 2 + 6 = 8, logo fica: 800000000. Sendo assim, o produto [#(20]. [#(21]. [#(22]. [#(23]. [#(24]... [#(29] possuirá uma quantidade de zeros igual a:

(A) 46 (B) 45 (C) 43 (D) 41 (E) 40

Solução:

Tomar somente os algarismos pares, somá-los e acrescentar tantos zeros quanto for esta soma.

#20 = 200
#21 = 200
#22 = 40000
#23 = 200
#24 = 6000000
#25 = 200
#26 = 800000000
#27 = 200
#28 = 100000000000
#29 = 200

Scanned by CamScanner

Contanto os zeros: $2 + 2 + 4 + 2 + 6 + 2 + 8 + 2 + 10 + 2 = 40$

Como os números serão multiplicados, surgirão zeros adicionais, devido ao produto dos valores além dos zeros do final de cada número. Multiplicando esses valores ficamos com:

$2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 6 \cdot 2 \cdot 8 \cdot 2 \cdot 10 \cdot 2$

Este produto contribuirá com um zero adicional, devido ao fator 10. Apesar de existirem vários fatores 2, não existem fatores 5 que possam compor um 10 adicional.

Sendo assim, o produto terminará com $1 + 40 = 41$ zeros.

Resposta: (D)

Scanned by CamScanner

Capítulo 3

Expressões algébricas

Este capítulo é uma introdução às expressões algébricas simples. Entretanto, toda a álgebra consiste em utilizar expressões algébricas, portanto o assunto será continuado em outros capítulos, apresentando tópicos cada vez mais avançados.

Questões clássicas

No volume 2 deste livro, a maioria das questões são de concursos posteriores a 2000, entretanto neste volume 1 apresentamos questões clássicas, ou seja, questões caídas em concursos antigos. Note que em um concurso atual, é pequena a chance de caírem questões idênticas às antigas (apesar de ainda aparecerem). Entretanto, as questões antigas são excelentes para exercitar o conteúdo da álgebra, e elas servem como base para as questões atuais. Por exemplo, é difícil atualmente uma questão pedir apenas o MDC entre expressões algébricas, entretanto as questões atuais pedem outros resultados mais elaborados, para os quais será preciso, durante a resolução, calcular o MDC, uma fatoração e outras técnicas básicas. Portanto, nos concursos atuais, é considerado que as operações básicas (que eram pedidas nos concursos antigos) são consideradas como "conteúdo dominado" para a resolução das questões modernas. Sem o conhecimento das questões clássicas, não é possível resolver as questões das provas atuais. Uma questão caída, por exemplo, no Colégio Naval em 1953, nunca deve ser encarada como "isso não cai mais", mas como "preciso saber fazer isso para resolver as questões modernas".

Termos e expressões

Você já conhece os termos e as expressões desde os primeiros anos do ensino fundamental. Por exemplo, ao realizar uma operação de adição como 5+3, dizemos que o 5 e o 3 são os termos da adição. Também está acostumado a trabalhar com expressões, desde as mais simples, como a do exemplo acima, até expressões mais complexas e trabalhosas para calcular, porém envolvendo somente números. Agora você conhecerá os *termos algébricos* e as *expressões algébricas*.

Termo algébrico

O termo algébrico é uma multiplicação de números e letras. As letras representam números. Os números e as letras que os representam, são a princípio desconhecidos, ou seja, podem assumir qualquer valor real. Podemos calcular o valor de uma expressão algébrica, desde que sejam dados os valores dessas letras. Quando temos equações que envolvem essas expressões, podemos muitas vezes descobrir os valores dessas letras, que nesse caso são chamadas de *incógnitas*. Isto será abordado a partir do capítulo 9.

Scanned by CamScanner

Exemplos:
$2x$
$4x^2$
$-3ab$
$5x^2y^3$
$-4ab^2c^2$

Todo termo algébrico pode ser dividido em duas partes:

- Parte numérica ou coeficiente
- Parte literal

Exemplos:
$2x^5y^3$:
Coeficiente: 2
Parte literal: x^5y^3

$-3abc^2$:
Coeficiente: -3
Parte literal: abc^2

12:
Coeficiente: 12
Parte literal: não tem (considera-se 1)

Este último não é um *termo algébrico*, mas sim, um *termo*, já que não possui parte literal.

As letras da parte literal são chamadas de *variáveis*.

Termos semelhantes

Dizemos que dois termos algébricos são *semelhantes* quando possuem a mesma parte literal, podendo ter coeficientes diferentes.

Exemplos:
$4x^3$ e $-12x^3$
$4abc$ e $6abc$
$2x$ e $-5x$
$-4mp^2$ e $10mp^2$
$6xyz$ e $-2xyz$

Uma característica importante dos termos semelhantes é que podem ser somados algebricamente. Por exemplo, $3x+7x$ é igual a $10x$. É como dizer "3 laranjas + 7 laranjas é igual a 10 laranjas". Para somar termos semelhantes, basta somar algebricamente seus coeficientes e repetir a parte literal.

Exemplos:
$4x^3 - 12x^3 = -8x^3$
$4abc + 6abc = 10abc$
$2x - 5x = -3x$
$-4mp^2 + 10mp^2 = 6mp^2$
$6xyz - 2xyz = 4xyz$

Scanned by CamScanner

Por outro lado, não podemos efetuar a adição de termos que não sejam semelhantes. Uma adição como 3x+2y não pode ser efetuada como fazemos em 3+2=5. Devemos deixar o resultado indicado, simplesmente como 3x+2y, nesse caso. É claro que se forem indicados os valores de x e y, podemos substituí-los e encontrar o número resultante.

Redução de termos semelhantes

Reduzir os termos semelhantes em uma expressão algébrica é realizar todas as adições algébricas possíveis de tal forma que não haja repetição. Nem sempre conseguimos juntar todos os termos semelhantes, em alguns casos podemos apenas reduzi-los.

Exemplo:
Reduzir os termos semelhantes da expressão $3x + 7y + 4x - 2y + x^2 + 5$

3x e 4x são semelhantes ➔ $3x+4x=7x$
7y e –2y são semelhantes ➔ $7y - 2y = 5y$

Ficamos então com:
$7x + 5y + x^2 + 5$

Exemplo:

Reduzir os termos semelhantes da expressão $\sqrt{\frac{1+2x+4x+x^2}{1-x-2x^2+5x^2}}$

No numerador do radicando, podemos reduzir 2x+4x=6x. No denominador podemos reduzir $-2x^2+5x^2 = 3x^2$. Ficamos então com a expressão:

$$\sqrt{\frac{1+6x+x^2}{1-x+3x^2}}$$

Essa expressão é equivalente à anterior, entretanto ainda possui termos semelhantes:
6x e –x são semelhantes
x^2 e $3x^2$ são semelhantes

Entretanto, esses termos semelhantes que restaram não podem ser juntados através de soma algébrica. Quando uma expressão tem apenas adições e subtrações de termos, é possível eliminar totalmente os termos semelhantes. Quando existem frações ou expressões mais complexas, pode não ser possível agrupar todos os semelhantes.

Expressões algébricas

Uma *expressão algébrica* é uma combinação de operações matemáticas nas quais estão envolvidos termos algébricos. Tipicamente são envolvidas as operações estudadas no capítulo anterior:

Exemplos:

1) $\frac{\sqrt{4x^2+3xy}}{(x-1)} \times \left(1-\frac{y}{x}\right)^{10}$ é uma expressão algébrica

2) 2x é uma expressão algébrica (é também um termo algébrico)

Scanned by CamScanner

3) $(3a^2b^3 + 5ab + 7)$ é uma expressão algébrica

4) $x^3 + 4x^2 + 5x + 18$ é uma expressão algébrica

Valor numérico

As letras de uma expressão algébrica representam números quaisquer. O *valor numérico* de uma expressão algébrica é o resultado numérico obtido quando especificamos valores particulares para cada uma de suas letras.

Exemplo:
Calcule o valor numérico da expressão algébrica abaixo para $x = 1$ e $y = -2$

$4x^2y^3 - 2x - 3y$

Substituindo x por 1 e y por –2, ficamos com:

$4.1^2.(-1)^3 - 2.1 - 3.(-1) =$
$4.(-1) - 2 + 3 =$
$-4 - 2 + 3 = -3$

Exercícios

E1) Reduzir os termos semelhantes das seguintes expressões algébricas

a) $2x + 5 + 3a + 6 - 4ax$
b) $2x + 3y + 4x - 6y + 8x - 4y + 10x - 8y$
c) $x + y + z + 3x + 5y + 4z + 6xyz$
d) $4x + 5y + 3x^2 + 2xy + 5y^2 - 12x - 15y + 4x^2$
e) $3x^2 + 2y^2 - 3x + 5x^2 - 2xy + 3x - 2y + x - 4x^2 - 2y^2 - 3xy$
f) $2xy + 4y^3 - 5x^2 + 5xy^2 + 3xy - 9y^3 + 4x^2 - 3x$
g) $3m^2n + 4p^2q + 5nm^2 + 4qp^2 + 2mp + 4nq$
h) $2x^2 - 3y^2 + 12x - 10y + 3x^2 + 5y^2 - 2x + y - 12$
i) $2xyz + 4xz + 6zy + 3xy - 8zx + 3yz + 3yzx$
j) $2x^2 + 5y^2 - 6x + 4x^2 - 7xy + 6x - 3y - 9x^2 - 5y^2 - 6xy$
k) $a^3 + a^2b + ab^2 + b^3 + a^2b + ab^2 + ba^2 + b^2a$
l) $2x^2 + 5xy - 3y^2 + 6 + 2x - 3y + 4 + 4xy + 6x - 4y + 12$
m) $-6xy + 2x^2 - 3x^3 + 8xy + 2x + 3x^2 + 6y + 4x$
n) $4a^2b + 3a^2 - 6b^2 + 4ba^2 - 2ab + 2b^2 + 3b^2a + 6ba$
o) $x^2y^3 - 3x^2y^2 + 4xy - 3x^3y^2 + 2x^2y^2 - 3x^2y^3$
p) $3ab + 2a^2 - 5b^2 + 2a^2b - 4ab + 3b^2 + 2ab^2 + 5ab$
q) $5x^2 + 2x^3 + 4x - 7 + 3x^2 - 5x^3 - 12x + 15$
r) $3x^2y + 2xy + 4xy^2 + 3yx - 7y^2x - 8yx^2 + 10$
s) $2ab + -4a^2b + 6ab^2 - 4a^2 - 3b^2 + 5ba + 2b^2a + 3ba^2$
t) $3x^2 - 4y^2 + 18x - 8y + 7x^2 + 9y^2 - 12x + 2y - 10$

E2) Calcule os valores numéricos das seguintes expressões algébricas, dados os valores de suas variáveis

a) $x^2 + 3x + 2$ para $x=3$
b) $a^2 + 3ab + b^2$ para $a=1$ e $b= -1$
c) $3x+5 - y^2 + 3xy$ para $x=2$ e $y=3$
d) $x^3 + 4x^2 - 3x + 7$ para $x=2$
e) $3/x + 4/y$ para $x=5$ e $y=6$
f) $x^2 - 3x + 7$ para $x= -4$
g) $9 - x^2$ para $x= -5$
h) $x^3 - x + 1$ para $x=2$
i) $(x+1).(y-2).(z+3)$; para $x=2$, $y=1$ e $z= -5$
j) $x^9 - x^8y + x^7y^2 - x^6y^3$; para $x=1$ e $y= -1$
k) $1/(x+y) + 2/xy + (xy)^{-1/2}$ para $x=1$ e $y=4$
l) $abc + a+b+c$ para $a=1$, $b=2$ e $c=3$
m) $a^2 + b^2 + c^2 + 3abc$ para $a=2$, $b= -2$ e $c=3$
n) $3x+2y + 4xy(x-y)$ para $x=2$ e $y=1$
o) $(x^2 - y^2)/3 + (2x + 3xy)/4$ para $x=2$ e $y= -2$
p) $(x-1).(x-2).(x-3).(x-4).(x-5).(x-6).(x-7)$ para $x=5$
q) $(a-4).(b^7 + 10b^6 + b^5)$ para $a=4$ e $b=5$
r) $(x-3).(x+4).(x+5).(x+6)$ para $x=3$
s) $-4x^8 + 10x^7 + 3x^6 + 60x^5$ para $x= -1$
t) $3^4x^6 - 3^2x^8 + 10x$ para $x=3$

Classificação de expressões algébricas

Podemos formar infinitos tipos de expressões algébricas, bastando partir de expressões numéricas e colocar letras no lugar de números. Podemos usar várias letras, e cada uma com potências diferentes, e combiná-las por adições, subtrações, multiplicações, divisões, potências e raízes. Sendo assim, podemos formar expressões algébricas, das mais simples às mais complicadas. Na maior parte da álgebra, é mais comum a ocorrência de expressões algébricas

Scanned by CamScanner

simples. A primeira coisa que precisamos para estudar essas expressões é classificá-las, ou seja, identificar certas características importantes.

Toda expressão algébrica pode ser classificada em *racional* ou *irracional*

Expressão algébrica racional é aquela em que suas variáveis aparecem somente elevadas a potências inteiras.

Expressão algébrica irracional é aquela em que existem variáveis elevadas a potências que não sejam números inteiros, por exemplo, raízes.

Exemplos:

$5x^2 + 4xy^3 + 25y$: racional

$\sqrt{5}.x^2 + 4x^3$: racional também, pois os coeficientes podem ter raízes

$\sqrt{1-x^2} + 2xy$: irracional, porque existe parte literal dentro de um radical.

$\frac{1-x^3}{1+xy}$: racional, as letras estão elevadas a expoentes inteiros e não em radicais

Se a expressão for *racional*, é possível ainda classificá-la em *inteira* ou *fracionária*.

Expressão algébrica racional inteira é aquela que é racional e não possui variáveis em denominadores.

Expressão algébrica racional fracionária é aquela que é racional e possui variáveis em denominadores.

Exemplos:

$5x^2 + 4xy^3$: racional inteira

$\frac{1-x^3}{1+xy}$: racional fracionária

$\frac{x}{2} + \frac{y}{3}$: racional inteira, pois não existe letra em denominador

Note que se uma expressão algébrica for irracional, não há interesse em classificá-la em inteira ou fracionária. A classificação em inteira ou fracionária se aplica apenas a expressões racionais.

Exercícios

E3) Classifique as expressões algébricas em
(I) irracional, (RI) racional inteira ou (RF) racional fracionária

a) $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{25}$

b) $x\sqrt{8-3\sqrt{5}} + y\sqrt{1+\sqrt{5}}$

c) $x^4 + 2y^4 + x^{1/2}$

d) $2x^{-3} + 3y^2$

e) $x^4 - 2x^3 + 5x^2 + 4x - 7$

f) $\frac{x^4 - 2x^3}{6} + \frac{5x^2 + 4x - 7}{5}$

k) $x\frac{y^2 - 5}{3} + y\frac{x^3 - 2x^7}{\sqrt{3}}$

l) $3x + x^{-3} + 5$

m) $\frac{x^4}{3} + 2\sqrt[3]{7}x + \sqrt{2}.3^{-5}$

n) $x^2 + 3x + 5 + \sqrt{y}$

o) $x^3 + x^2 + x^1 + x^0 + x^{-1} + x^{-2} + x^{-3}$

p) $\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1} + \frac{1}{x^2-1}$

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Grau de um monômio ou polinômio

O grau de um monômio é a soma dos expoentes das suas variáveis.

Exemplos:

$5x^2$	2º grau
$3x^5$	5º grau
$2x^2y^4$	6º grau
$4abc$	3º grau

O grau de um polinômio é o maior entre os graus dos seus monômios. Em outras palavras, determinamos o grau de cada um dos seus monômios. O grau máximo encontrado é o grau do polinômio.

Exemplos:

x^2+3x+5	2º grau
$x^2y+3x+y^2$	3º grau
$xy^3+4x^2y+xy+1$	4º grau
x^2+3x+5^4	2º grau (o 5^4 não conta, somente as letras)
3^7x^2+3x+5	2º grau (o 3^7 não conta, somente as letras)

Polinômio homogêneo

Dizemos que um polinômio é homogêneo quando todos os seus termos possuem o mesmo grau.

Exemplos:

$4x^3+2xy^2+x^2y$	Polinômio homogêneo de 3º grau
$2x^2+y^2+5$	Polinômio *não homogêneo* do 2º grau (devido ao 5, que é de grau 0)

Polinômio em x

Um polinômio em x, ou P(x), é aquele que possui uma única variável x. É claro que podemos ter qualquer outra letra ao invés do x.

Exemplos:

x^2+3x+5	Polinômio em x do 2º grau
y^3+3y^2+4y+7	Polinômio em y do 3º grau
$x^4-2x+50$	Polinômio em x do 4º grau

Polinômio completo

Polinômio completo é aquele que tem todos os termos possíveis, desde o grau do polinômio, até o grau zero (termo independente).

Exemplos:

y^3+3y^2+4y+7	Polinômio em y completo, do 3º grau
x^2+3x+5	Polinômio em x completo, do 2º grau

Mais uma vez lembramos que apesar da noção de polinômio completo ser usado para uma só variável, o conceito se aplica também a mais de uma variável. Por exemplo, um polinômio em x e y, do 3º grau, pode ter as seguintes combinações de partes literais:

3º grau: x^3, y^3, x^2y ou xy^2
2º grau: x^2, y^2 ou xy

Scanned by CamScanner

1º grau: x, y

Sendo assim, um polinômio em x e y completo do 3º grau deve ter termos com todas as opções de partes literais indicadas acima, e mais o termo independente. Exemplo:

$5x^3 + 4y^3 - 2x^2y + 3xy^2 + 3x^2 + 6y^2 - 2xy + 3x + 4y + 7$

Completar e ordenar P(x)

Mais adiante veremos como realizar operações com polinômios. Muitas dessas operações exigem que os polinômios estejam ordenados e completos. Isto significa que os graus dos seus monômios devem ser dispostos em ordem decrescente, do grau máximo até o grau 0 (termo independente). Além disso, muitas vezes é preciso que o polinômio esteja completo, ou seja, que aparecem termos de todos os graus. Para isso, quando não existir o termo de um certo grau, colocamos este termo com coeficiente zero.

Exemplo:
Ordenar o polinômio $3x + 12 + x^5 - 2x^2$
Colocando os termos em ordem decrescente de grau, ficamos com:

$x^5 - 2x^2 + 3x + 12$

Exemplo:
Completar o polinômio acima

Devemos adicionar os termos de grau 4 e 3, com coeficientes zero. Ficamos com:

$x^5 + 0x^4 + 0x^3 - 2x^2 + 3x + 12$

Exercícios

E4) Dados os polinômios abaixo, indique o grau, se são completos (C) ou homogêneos (H)

a) $3x^2y + x^2 + 3y^2$
b) $x^2y^3 - 3x^2y^2 + 4xy - 3x^3y^2 + 2x^2y^2 - 3x^2y^3$
c) $3x^6 + 9x^4 - 8x^2$
d) $a^3 + 3ab^2 + b^3$
e) $x^3 + y^3 + z^3 + 2^3$
f) $1 - x^3 + x^5 - 3x^4$
g) $x^5 + 3^{10}x^2 + 2^{20}x + 2^{30}$
h) $x^6y^3 + 2^7x^3 + 3^9x^8$
i) $5x^5 + 2x^2 + 3x^4 + 5$
j) $1 - x^4$
k) $3a + b + b^2$
l) $3x^2 + 3x + x^4$
m) $x^2 + y^2 + 3xy$
n) $x^2y + xy^3 + 2x + 2y$
o) $2^6x^2 + 2^4x + 2^2$
p) $z^2 + x^2 + y^2 + 3xyz$
q) $x^2 + y^2 + 2x + y + 5$
r) $x^3 - 2^6$
s) $0x^4 + 2x^2 + 3x + 5$
t) $x^2 + y^2 + 6xy + 0x + 0y$

E5) Complete e ordene os polinômios abaixo

a) $18 + x^5$
b) $x^4 + 2x$
c) $2x^5 + 3x^4 - 4x^2$
d) $3 + 2x + 3x^4 + 4x^5$
e) $3ab + 2a + 4b + 5$
f) $3x + 2 + 5x^3$
g) $x^5 + 3x^4 - 2x + 5$
h) $x^7 + 7$
i) $4a^2 + 4b^2 + 4$
j) $y^4 + 2y^2 + 1$
k) $3x^2 + 2y^2 + 4x + 3y + 6$
l) $x^2 + 2y^2 + 6xy$
m) $3x^2 - 4x + 2x^4$
n) $x - x^4$
o) $6x^5 + 4x^2 + 2x^4 + 7$
p) $9 - 2x^3 + 3x^5 - 3x^4$
q) $6x - 8 + 4x^3$
r) $3ab + b^2 + 6$
s) $x^3 - x^5$
t) $2x^2 - 2x^4 + 2$

Scanned by CamScanner

Operações com monômios

Mostraremos agora as operações com monômios que tenham qualquer número de variáveis. A partir dessas operações poderemos partir para as operações com polinômios.

Adição e subtração de monômios

Só é possível adicionar ou subtrair monômios que sejam semelhantes, ou seja, que tenham a mesma parte literal. Para realizar a operação, fazemos a adição ou a subtração dos seus coeficientes e repetimos a parte literal.

Exemplos:

$4x + 3x = 5x$
$3x^2 - 5x^2 = -2x^2$
$4ab + 5ab = 9ab$
$-3xy^2 + 7xy^2 = 4xy^2$
$-3abc - 5abc = -8abc$

Quando os monômios não têm a mesma parte literal, devemos simplesmente deixar a operação indicada:

Exemplos:

$2x + 3y = 2x + 3y$
$x^2 + 4x = x^2 + 4x$
$x^{10} - x^9 = x^{10} - x^9$
$-3abc + x^2 = -3abc + x^2$

Isto não significa que a adição ou subtração não exista ou não possa ser realizada. Essas operações existem, apenas não temos como unir os monômios em um só, o resultado fica obrigatoriamente na forma de binômio, já que não existirão termos semelhantes para reduzir.

Exercícios

E6) Efetue as operações

a) $2x + 7x$
b) $4y - 3y + 10y$
c) $5x^2 + 3x^2 - 10x^2$
d) $3x^3 - 6x^3 + 8x^3$
e) $4x^2 + 3x^2 - 9x^2$
f) $3ab + 5ab - 7ab$
g) $10xy + 3xy - 4xy$
h) $2x + 5 + 3x + 8$
i) $x + y + z + x + y - z$
j) $4b + 5 + 3a - 3 + 2a + b$
k) $-6xy + 2xy - 4xy$
l) $2z^2 + 3z^2 - 8z^2$
m) $3abc + 2abc - 7abc$
n) $2x^2y + 3x^2y + 4yx^2$
o) $3a + 2b + 4a - 7b$
p) $2xyz + 3yxz + 4zyx$
q) $2b + 5 + 5b + 8$
r) $2x^2 - 7x^2 - 5x^2$
s) $2abc + 3cab - 8bca$
t) $5x + 2x + 3x - 8x$

Multiplicação de monômios

A multiplicação de monômios funciona da mesma forma que a multiplicação de números fatorados. Em anos anteriores do ensino fundamental, surgiam problemas como o do exemplo abaixo:

$2^3.3^4.5^2 \cdot 2^4.3^2.5^3$

Ao multiplicarmos os dois produtos, tudo vira um produto só, e podemos agrupar as potências de mesma base (repetir a base e adicionar os expoentes). No caso, ficamos com:

$2^{3+4}.3^{4+2}.5^{2+3} = 2^7.3^6.5^5$

Note que juntamos apenas bases iguais (base 2, base 3, base 5).

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Exercícios

E8) Efetue as operações

a) $(2x^2)^5 =$
b) $(-4x^3)^3 =$
c) $(7x^5)^2 =$
d) $[(3x^2)^2]^2 =$
e) $(-5x)^3 =$
f) $(-2ab^3)^2 =$
g) $(4(ac)^2)^3 =$
h) $(-3x^2)^2 =$
i) $(-x^3)^7 =$
j) $(2x^2y^3)^4 =$
k) $(4y^2)^3 =$
l) $(-3ax^2)^3 =$
m) $(2x^3)^4 =$
n) $(-4x^2)3 =$
o) $5x^{2^3} =$
p) $(-2x)^5 =$
q) $(-3xy^2)^4 =$
r) $(2x^3)^{-2} =$
s) $(-2x^2)^{-3} =$
t) $(5x^2)^3 =$

Divisão de monômios

Quando dividimos um monômio por outro, o resultado também será um monômio, desde que o primeiro seja múltiplo do segundo, ou seja, as letras do segundo monômio têm que aparecer no primeiro, com expoentes iguais ou maiores. O coeficiente do primeiro não precisa ser múltiplo do coeficiente do segundo.

Exemplo:
Dividir $5x^3y^2$ por $-4xy^2$

Ao dividirmos os coeficientes, o resultado será $-5/4$, o mesmo que $-1,25$. Quanto às letras, vemos que o x que está elevado a 1 no divisor aparece elevado a 3 no dividendo, e que o y que aparece ao quadrado no divisor, também aparece ao quadrado no dividendo. O resultado da divisão continuará sendo um monômio:

$$\frac{-5x^3y^2}{4xy^2} = -1,25x^{3-1}y^{2-2} = -1,25x$$

Para obtermos os expoentes do resultado, basta subtrair os expoentes do dividendo e do divisor, nas letras correspondentes.

Outros exemplos:

$-12x^3y^2 \div 4xy = -3x^2y$
$20x^2y^3z^2 \div 5x^2y^2 = 4yz^2$
$3a^2b^2c^3 \div 6a^2b^2 = 0,5c^3$
$15x^2y^2 \div -3x^2y^2 = -5$
$12a^7b^5c^2 \div 6a^3b^5 = 2a^4c^2$
$5x^7 \div 5 = x^7$
$2a^3 \div 6 = (1/3)a^3$

Exercícios

E9) Efetue as operações

a) $4x^2y^3 \div 2xy =$
b) $6x^3y^4 \div (-3x^2y^3) =$
c) $-12xyz \div 9z =$
d) $x^5 \div (-5x^4) =$
e) $12x^2y^3 \div (-5xy^2) =$
f) $4x^3y^2 \div (-3xy) =$
g) $-9ab^2c^3 \div (3abc) =$
h) $12x^2y^3 \div (-5xy) =$
i) $6xyz \div (-5x) =$
j) $20x^3yz^2 \div (-5xyz) =$
k) $24x^3y^4z \div (-60x^3yz) =$
l) $120x^2y^3z^2 \div (-6x^2y^2) =$
m) $-64x^2yz \div (-4xyz) =$
n) $x^2y^2z^2 \div 6xyz =$
o) $28x^2y^3 \div -2xy^2 =$
p) $(6xy^2z)^2 \div (-2xy^3) =$
q) $(-2x^2yz^2)^3 \div (-3x^4) =$
r) $(-4xyz^2)^3 \div (2x^2y^2z^4) =$
s) $(-x^2yz^2)^3 \div (-4x^2)^2 =$
t) $(-2xyz)^4 \div (-2xyz^2)^2 =$

Monômios não divisíveis

Como vimos, a divisão de monômios só dá como resultado um novo monômio, quando o dividendo tem as mesmas letras, com expoentes iguais ou maiores que as do divisor. Se essa condição não for satisfeita, a divisão ainda assim poderá ser feita, mas o resultado não será um monômio, pois terá expoentes negativos, o que faz com que a expressão algébrica deixe de ser inteira.

Scanned by CamScanner

Exemplo:
$x^3 \div y = x^3/y = x^3y^{-1}$

A divisão está algebricamente correta. O único detalhe a ser observado é que este resultado não é um monômio. É um termo algébrico racional fracionário, devido ao expoente negativo. Isso não impede que a divisão seja realizada e que o resultado esteja correto.

Exercícios

E10) Efetue as operações

a) $2x^3 \div 4y^2$
b) $-5xy^2 \div (-3x^2z) =$
c) $-9ab^2c^3 \div (3a^2b^3c^4) =$
d) $4x^3y^4z \div (-6x^3yz^4) =$
e) $2x^2y^2 \div (-xy^3) =$
f) $8x^3y^2 \div x^6y =$
g) $18ac^2 \div (4a^2bc) =$
h) $20x^2y^3 \div (-5xy) =$
i) $60xyz \div (-5x^2) =$
j) $40x^3yz^2 \div (-5x^2y^2z^2) =$
k) $24xy^3z \div (-6x^3yz) =$
l) $-60xy^3z^2 \div (-3x^2y^2) =$
m) $-44xyz \div (-4xy^2z^2) =$
n) $-36xyz^2 \div 6x^2y^2z^2 =$
o) $18x^2y \div -4xy^2 =$
p) $(4xyz)^2 \div (-2xy^3) =$
q) $(-3xyz^2)^3 \div (3x^4) =$
r) $(-10xy^2z)^3 \div 2x^2y^2z^4 =$
s) $(-2xyz^2)^3 \div (4x^2)^2 =$
t) $(-2x^2yz)^4 \div (-2xyz^2)^3 =$

Distributividade

Veremos agora uma das mais importantes aplicações da propriedade de distributividade. Já estudamos nos capítulos 1 e 2, a distributividade da multiplicação em relação à adição algébrica:

$x.(a+b) = x.a + x.b$
$x.(a-b) = x.a - x.b$

Esta regra pode ser estendida para expressões com múltiplos termos entre parênteses:

$x.(a + b - c + d + e - f) = x.a + x.b - x.c + x.d + x.e - x.f$

A propriedade da distributividade também se aplica quando invertemos a ordem dos fatores:

$(a+b).x = a.x + b.x$
$(a-b).x = a.x - b.x$
$(a + b - c + d + e - f).x = a.x + b.x - c.x + d.x + e.x - f.x$

Podemos então usar esta propriedade para multiplicar um monômio por um polinômio.

Exemplo:
$x^2.(3x+2) = x^2.3x + x^2.2 = 3x^3 + 2x^2$

Para multiplicar um monômio por um polinômio, basta multiplicar o monômio por cada um dos monômios que fazer parte do polinômio. Em cada uma das multiplicações devemos levar em conta os sinais.

Exemplo:
$a.(a+b) = a^2 + ab$
$2x^3.(x^2 - 3x - 5) = 2x^5 - 6x^4 - 10x^3$
$-5ab.(a^2 - 2ab + b^2) = -5a^3b + 10a^2b^2 - 5ab^3$
$(x^2 - y^2).zy = x^2zy - y^3z$
$-2x.(x^3 - 2x^2 - 3x + 5) = -2x^4 + 4x^3 + 6x^2 - 10x$
$2xy.(x^2 - y^2 - 2xy) = 2x^3y - 2xy^3 - 4x^2y^2$

Scanned by CamScanner

Em muitos casos devemos realizar a operação inversa, ou seja, dado um polinômio, encontrar um monômio e um polinômio que, se multiplicados, resultam no polinômio original. Vamos fazer isso com os exemplos que acabamos de apresentar:

Exemplo:
$a^2 + ab$

Devemos encontrar um monômio que seja múltiplo de cada um dos termos deste polinômio. É fácil ver que este monômio é **a**, então podemos escrever como:
$a^2 + ab = a.(a+b)$

O polinômio que aparece multiplicado é fácil de ser obtido, basta dividir cada termo do polinômio original pelo monômio a que foi encontrado. Esta operação se chama "fatorar o polinômio". O assunto é extenso e tem um capítulo inteiro a ele dedicado neste livro. Mas aqui já estamos apresentando uma das formas mais simples de fatoração. Dizemos que o monômio a encontrado foi "colocado em evidência". Vejamos um outro exemplo:

Exemplo:
Fatorar $2x^5 - 6x^4 - 10x^3$, colocando um monômio em evidência

Temos que encontrar um monômio que esteja contido nos fatores de $2x^5$, de $6x^4$ e de $10x^3$. Este monômio é fácil de ser encontrado: ele é o MDC (máximo divisor comum) entre os termos do polinômio dado. Este assunto será estudado no capítulo 5, mas podemos resolver o problema agora, pois é fácil encontrar este monômio, sem realizar cálculos. Entre os coeficientes 2, –6 e –10, vemos que todos podem ser divididos por 2, então coeficiente do monômio que vai ficar em evidência é 2. Entre as partes literais temos x^5, x^4 e x^3, vemos que todos podem ser divididos por x^3. Então o monômio que vai ficar em evidência é $2x^3$. Dividimos agora cada um dos termos do polinômio original por $2x^3$ e encontramos, respectivamente:

$(2x^5) \div 2x^3 = x^2$
$(-6x^4) \div 2x^3 = -3x$
$(-10x^3) \div 2x^3 = -5$

Então concluímos que:

$2x^5 - 6x^4 - 10x^3 = 2x^3.(x^2 - 3x - 5)$

Outros exemplos:

$-5a^3b + 10a^2b^2 - 5ab^3$	$= -5ab.(a^2 - 2ab + b^2)$
$x^2zy - y^3z$	$= zy.(x^2 - y^2)$
$-2x^4 + 4x^3 + 6x^2 - 10x$	$= -2x.(x^3 - 2x^2 - 3x + 5)$
$2x^3y - 2xy^3 - 4x^2y^2$	$= 2xy.(x^2 - y^2 - 2xy)$

Exercícios

E11) Efetue as operações

a) $2x.(x^2 - 3y^2) =$
b) $3ab.(x - 2y - z^2) =$
c) $-3.(x^2 - x - 5) =$
d) $2ab(3a + 2b + ab + 6) =$
e) $-5x(x^2 - y^2 + 4x - 5) =$
f) $5.(a^2 - b^2) =$
g) $-3.(a^2 - b^2) =$
h) $-1.(a^2 - b^2) =$
i) $-(a^2 - b^2) =$
j) $-(3x^3 - 2x^2 + 5x - 8) =$
k) $3xy(1 - 6x - 2x^2 - 3y^2) =$
l) $-2.(3x - 4y + 2xy - 3) =$
m) $2ab.(3a + 2b^2 - 4ab) =$
n) $4x^2yz.(2x + 3y - 4z) =$
o) $2xy(x^2 + y^2 - 2xy) =$
p) $xy.(x^3 + 2x^2 + 5) =$
q) $4a^2bc.(2ab^2 - 3abc^3) =$
r) $2xy^2.(x^2 + 2xy + 8) =$
s) $(2xy^2)^2.(x + 3y) =$
t) $x^3y.(x^2 + 2y^2 + x + y) =$

Scanned by CamScanner

E12) Fatore os polinômios, colocando um monômio em evidência

a) $2x^2 + 6xy$
b) $ax^2 - 2axy + ay^2$
c) $4xy - 2x^2y^2 + 6x^3y^3$
d) $4a^2b^3c^4 - 8b^5c^6 - 10a^3c^5$
e) $a^2x^2 - 3a^2x + 5a^2 =$
f) $4mx - 2mx^2 + 6m^2 =$
g) $25a^2b^2 - 125ab^2 + 375a^2b =$
h) $4x^7 + 20x^5 + 8x^3 =$
i) $3a^2b^3x^3 - 9a^2b^2x^2 + 12a^2b^4x^5 =$
j) $5a^2bc + 15b^2ac + 25a^2c^2b$
k) $8a^2b^2c^4 - 4a^3c^3 + 12b^4c^5 + 16a^3b^2$
l) $4mxy - 2mx + 6my + 10m^2$
m) $-5a^5b^2c^2 + 10\,a^2b^3c^4 + 15a^5b^3c^2$
n) $x^4y + 3x^3y^3 + x^5y + x^3y^2$
o) $8a^5b^3c^2 - 2a^3b^2c^5$
p) $x^4y + 4x^3y + 6xy$
q) $2x^3y + 2xy^4 - 8x^3y^2$
r) $6xy - 24x^2y - 6x^3y - 12xy^4$
s) $8a^2b - 4ab^2 + 4a^2b^2 - 12ab$
t) $3x^6 + 2x^8 + 7x^5 - 3x^4$

Adição e subtração de polinômios

Para adicionar polinômios, procedemos da mesma forma como fazemos para adicionar números. A seguir, agrupamos os termos semelhantes, caso existam.

Exemplo:
Dados $P(x) = x^3 + 3x^2 - 12x + 15$ e $Q(x) = 2x^2 - 4x + 6$, calcule $P(x) + Q(x)$.

Basta calcular:

$(x^3 + 3x^2 - 12x + 15) + (2x^2 - 4x + 6)$

Como estamos apenas adicionando, basta escrever o primeiro polinômio, e a seguir, os termos do segundo polinômio. Fazemos então a redução dos termos semelhantes:

$3x^2 + 2x^2 = 5x^2$
$-12x - 4x = -16x$
$15 + 6 = 21$

Ficamos então com: $x^3 + 5x^2 - 16x + 21$

Uma outra forma para adicionar polinômios ordená-los e completá-los, e armar um dispositivo de adição no qual os termos semelhantes de um ficam alinhados com os termos semelhantes do outro.

Exemplo:
Dados $P(x) = x^4 + 4x^2 - 10x + 15$ e $Q(x) = 3x^2 - 8x + 6$, calcule $P(x) + Q(x)$.

Completando e ordenando $P(x)$: $x^4 + 0x^3 + 4x^2 - 10x + 15$
Completando e ordenando $Q(x)$: já está ordenado e completo

Dispositivo para adição:

x^4	$+0x^3$	$+4x^2$	$-10x$	$+15$
		$+3x^2$	$-8x$	$+6$
x^4	$+0x^3$	$+7x^2$	$-18x$	$+21$

Resposta: $x^4 + 7x^2 - 18x + 21$

Lembre-se
1) Sempre use os polinômios ordenados e completos
2) Coloque os termos semelhantes de um polinômio alinhados com os do outro
3) Preste atenção nos sinais de cada termo

Scanned by CamScanner

A subtração de polinômios é muito fácil. Basta lembrar que subtrair é a mesma coisa que adicionar com o simétrico. Basta então trocar os sinais do segundo polinômio e adicionar com o primeiro.

Exemplo:
Dados $P(x) = 2x^4 + 5x^2 - 6x + 15$ e $Q(x) = 3x^3 - 8x + 6$, calcule $P(x) - Q(x)$.

$P(x) - Q(x) = 2x^4 + 5x^2 - 6x + 15 - (3x^3 - 8x + 6)$

$= 2x^4 + 5x^2 - 6x + 15 - 3x^3 + 8x - 6$

Observe aqui que repetimos o primeiro polinômio e trocamos todos os sinais do segundo polinômio. O motivo disso é que, um sinal negativo antes de um polinômio entre parênteses tem o efeito de inverter os sinais de cada um dos termos do polinômio.

Para reduzir os temos semelhantes, devemos operar um de cada vez. É bom sublinhar ou destacar cada termo, para que não seja esquecido nenhum deles:

Termos com x^4 → $\boxed{2x^4} + 5x^2 - 6x + 15 - 3x^3 + 8x - 6 = 2x^4 \ldots$
Termos com x^3 → $2x^4 + 5x^2 - 6x + 15 \boxed{-3x^3} + 8x - 6 = 2x^4 - 3x^3 \ldots$
Termos com x^2 → $2x^4 \boxed{+ 5x^2} - 6x + 15 - 3x^3 + 8x - 6 = 2x^4 - 3x^3 + 5x^2 \ldots$
Termos com x → $2x^4 + 5x^2 \boxed{- 6x} + 15 - 3x^3 \boxed{+ 8x} - 6 = 2x^4 - 3x^3 + 5x^2 + 2x \ldots$
Termo numérico → $2x^4 + 5x^2 - 6x \boxed{+15} - 3x^3 + 8x \boxed{- 6} = 2x^4 - 3x^3 + 5x^2 + 2x + 9$

O resultado é então $2x^4 - 3x^3 + 5x^2 + 2x + 9$

Exercícios

E13) Calcule a soma dos polinômios

a) $(-2x^4 + 4x^3 + 6x^2 - 10x) + (x^4 + 2x^3 - 15x)$
b) $(x^2 + 4x - 12) + (2x^3 - 4x^2 + 20x)$
c) $(x^3 + 4x^2 - 6) + (2x^4 - x^5 + 3x^3)$
d) $(-x^4 + 3x^2 - x^3 + 5) + (x^3 - 2x^2 + 3x)$
e) $(-2x^6 + 3x^5 - 4x^4 - 2x^3 - x^2 + 2x + 6) + (3x^5 - 2x^3 + 4x + 7)$
f) $(x^5 - 2x^4 + 4x^2 - 3x - 6) + (5x^5 + 3x^4 - 4x^2 + 6)$
g) $(-2x^5 - 5x^4 - 2x^2 + 4) + (-2x^5 + 6x^2 + 7x - 3)$
h) $(6x^4 + 2x^3 + 2x^2 - 5x) + (3x^4 + 2x^3 - 8x + 5)$
i) $(2x^6 - 3x^5 + 2x^4 - 4x^3 - 2x^2 + 7x - 10) + (2x^5 - 6x^4 + 4x + 3)$
j) $(2x^5 + 3x^4 - 5x^3 + 4x^2 + 2x) + (5x^4 + 6x^3 - 2x + 5)$
k) $(2x^7 - 4x^6 - 2x^4 + 5x^2 + 5) + (2x^5 - 2x^7 + 4x^3 - 2x^6 - 2x^4)$
l) $(5x^5 - 4x^7 - 2x^6 - 3x^4 - 5) + (2x^5 + 3x^3 - 2x^6 + 2x - 3x^4)$
m) $(6 - 3x + 4x^4 + 2x^5) + (2x^5 - 2x^7 - 3x^6 + 4x - 2x^4 - 3)$
n) $(2x^2 + 7x^4 + 3x^5 + 4x^6) + (2x^5 - 4x^7 + 2x^3 - 6^5 + 2x^2 - 4)$
o) $(6x^5 - 2x^7 + 3x^3 - 5x + 2x^4) + (6x^5 - 3x^7 - 2x^6 + 4x^2 - 7)$
p) $(9 - 2x^2 + 4x^4 - 5x^5 + 3x^7) + (-2x^7 + 6x^3 + 3x - 7x^4 + 4x^2)$
q) $(2x^5 - 4x^3 + 6x - 2x^4 + 9) + (3x^5 - 6x^7 - 3x^6 + 2x + 5x^2 - 2)$
r) $(-3 + 2x - 3x^3 + 5x^4 - 2x^6) + (-5x^7 + 2x^3 - 6x^6 - 3x^4 - 5)$
s) $(4x^3 - 2x^6 + 3x - 2x^2 + 7) + (-3x^6 + 2x - 4x^4 + 3x^2 - 8)$
t) $(8x - 2x^2 - 2x^4 + 3x^5 - 7x^7) + (-2x^6 + 4x - 3x^4 + 2x^2 - 6)$

E14) Subtraia os polinômios

a) $(-2x^4 + 4x^3 + 6x^2 - 10x) - (x^4 + 2x^3 - 15x)$
b) $x^2 + 14x - 6) - (3x^3 - 3x^2 + 10x + 5)$
c) $(2x^3 + 7x^2 - 6x) - (3x^4 - 2x^6 + 5x^2)$
d) $(4x^3 - 2x^6 + 3x - 2x^2 + 7) - (-3x^6 + 2x - 4x^4 + 3x^2 - 8)$
e) $(-3 + 4x - 3x^3 - 3x^6) - (-2x^7 + 2x^3 - 4x^4 - 6)$
f) $(9 - 5x^2 - 5x^5 + 2x^7) - (-3x^7 + 6x^3 - 5x^4 + 6x^2)$
g) $(2x^2 + 3x^4 + 2x^6) - (3x^5 - 5x^7 + 2x^3 - 2x^2 - 4)$
h) $(-4x^7 - 3x^6 - 2x^4 - 15) - (4x^5 + 3x^3 - 6x^6 + 2x - 3x^4)$
i) $(5x^7 - 2x^6 + 3x^2 + 4) - (3x^5 - 5x^7 + 6x^3 - 3x^6 - 4x^4)$
j) $(3x^4 + 7x^3 + 3x^2 - 2x) - (5x^4 + 4x^3 - 6x + 2)$
k) $(6x - 5x^4 + 4x^5 - 2x^7) - (-7x^6 + 5x - 2x^4 + 3x^2 - 5)$
l) $(2x^5 - 4x^3 + 6x + 9) - (2x^5 - 3x^7 - 4x^6 + 5x + 5x^2 - 6)$
m) $(6x^5 - 2x^7 + 3x^3 - 2x^4) - (4x^5 - 3x^7 - 2x^6 + 2x^2 - 7)$
n) $(6 - 3x + 4x^4 + 2x^5) - (2x^5 - 3x^7 - 3x^6 + 5x - 6x^4 - 3)$
o) $(-4x^7 - 2x^6 - 3x^4 - 5) - (3x^5 + 2x^3 - 5x^6 + 4x - 3x^4)$
p) $(2x^5 - 5x^3 + 4x^2 + 2x) - (2x^4 + 5x^3 - 4x + 6)$
q) $(2x^6 - 3x^5 - 4x^3 - 2x^2 + 7x - 10) - (3x^5 - 4x^4 + 7x + 6)$
r) $(-2x^5 - 5x^4 - 2x^2 + 4) - (-3x^5 + 5x^2 + 6x - 5)$
s) $(3x^5 - 2x^4 + 4x^2 - 3x - 6) - (4x^5 + 6x^4 - 7x^2 + 5)$
t) $(-2x^6 + 3x^5 - 2x^3 - x^2 + 2x + 6) - (2x^5 - 5x^3 + 6x + 8)$

Scanned by CamScanner

Multiplicação de polinômios

Já aprendemos a multiplicar um monômio por um polinômio. Agora vamos ver como multiplicar dois polinômios. O princípio é simples, e é baseado na propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição.

Exemplo:
Calcular o produto dos binômios x+y e a+b.

$(x+y).(a+b)$

Chamemos a expressão x+y de z, ficamos então com:

$(x+y).(a+b) = z.(a+b)$

Agora lembremos da propriedade distributiva da multiplicação. A variável z está multiplicando o binômio a+b. Aplicando distribuição, ficamos com:

$z.a + z.b$

Agora, lembrando que z=x+y, ficamos com:

$(x+y).a + (x+y).b$

Podemos aplicar distributividade novamente em cada uma dessas duas multiplicações. Como (x+y).a é o mesmo que x.a + y.a, e (x+y).b é o mesmo que x.b + y.b, ficamos com:

$x.a + y.a + x.b + y.b$

Observe que cada termo do primeiro polinômio (no caso, x e y), aparece multiplicando cada termo do segundo polinômio (no caso, a e b). Em outras palavras, multiplicamos cada termo do primeiro polinômio por cada um dos termos do segundo polinômio, e somamos os resultados.

Exemplo:
$(x+y+z).(a+b+c) = x.a + x.b + x.c + y.a + y.b + y.c + z.a + z.b + z.c$

Até agora estamos usando polinômios com termos simples, com uma letra só. Entretanto este princípio vale para polinômios com termos de qualquer tipo.

Exemplo:
$(2x+3y^2+4z).(x^2 + y^2 + 2xy)$
$= 2x^3 + 2xy^2 + 4x^2y + 3x^2y^2 + 3y^4 + 6xy^3 + 4x^2z + 4xyz + 8xyz$

Para não fazer confusão, você pode armar uma pequena tabela. Os polinômios tem 3 termos cada um, então formamos uma tabela com 3 linhas e 3 colunas. Colocamos ao lado de cada linha, os termos de um polinômio, e acima de cada coluna, os termos do outro polinômio.

	$2x$	$3y^2$	$4z$
x^2			
y^2			
$2xy$			

Scanned by CamScanner

A seguir multiplicamos todos os termos do primeiro polinômio, por cada um dos termos do segundo polinômio, colocando os resultados nas posições corretas da tabela. No final, reduza os termos semelhantes, caso existam.

	$2x$	$3y^2$	$4z$
x^2	$2x^3$	$3x^2y^2$	$4x^2z$
y^2	$2xy^2$	$3y^4$	$4y^2z$
$2xy$	$4x^2y$	$6xy^3$	$8xyz$

Mais um detalhe muito importante: cada uma dessas multiplicações deve ter o sinal correto. O esquecimento dos sinais é um dos erros mais comuns dos alunos que lidam com este assunto pela primeira vez.

Exemplo:
Multiplique os polinômios $3x^2 - 2x + 5$ e $x^3 - 2x^2 - 3x + 5$

	x^3	$-2x^2$	$-3x$	5
$3x^2$				
$-2x$				
5				

Neste exemplo, termos que fazer 12 multiplicações de monômios, e cada uma delas deve ter o sinal apropriado. Observe na tabela acima que colocamos os termos com os respectivos sinais. Os positivos podem ficar sem sinal, mas os negativos devem permanecer com o sinal. Fazemos então as multiplicações de todos os monômios, observando os sinais:

	x^3	$-2x^2$	$-3x$	5
$3x^2$	$3x^5$	$-6x^4$	$-9x^3$	$15x^2$
$-2x$	$-2x^4$	$4x^3$	$6x^2$	$-10x$
5	$5x^3$	$-10x^2$	$-15x$	25

Agora temos que agrupar os termos semelhantes:

Termo em x^5: $3x^5$
Termo em x^4: $-2x^4 - 6x^4 = -8x^4$
Termo em x^3: $5x^3 + 4x^3 - 9x^3 = 0x^3 = 0$
Termo em x^2: $-10x^2 + 6x^2 + 15x^2 = 11x^2$
Termo em x: $-15x - 10x = -25x$
Termo independente (aquele que não tem letra): 25

O produto pedido é então: $3x^5 - 8x^4 + 11x^2 - 25x + 25$

Desenhar uma tabela ajuda muito quem está começando a estudar o assunto, mas com a prática, o aluno conseguirá realizar esses cálculos sem armar a tabela. O importante é prestar atenção nos sinais, não esquecer de reduzir os termos semelhantes, e fazer os cálculos de forma bem organizada para não errar devido à bagunça ou letra feia.

Exemplo:
Calcule $(x^2-5).(x^3 - 7x^2 - 4x + 6)$

Começamos multiplicando o x^2 pelos termos do segundo polinômio

Scanned by CamScanner

$(x^2-5).(x^3-7x^2-4x+6) = x^5-7x^4-4x^3+6x^2 \ldots$

A seguir, o –5 deve multiplicar os termos do segundo polinômio

$(x^2-5).(x^3-7x^2-4x+6) = x^5-7x^4-4x^3+6x^2-5x^3+35x^2+20x-30$

Observe que levamos em conta os sinais em cada uma das multiplicações de monômios. Finalmente podemos reduzir os termos semelhantes. O resultado final será:

$x^5-7x^4-4x^3+6x^2-5x^3+35x^2+20x-30$
$= x^5-7x^4-9x^3+41x^2+20x-30$

Outro método para armar a multiplicação

A multiplicação de polinômios requer a multiplicação de cada termo do primeiro polinômio, por cada um dos termos do segundo polinômio. Qualquer forma de "armar" a multiplicação é válida, desde que o aluno não esqueça algum termo do produto, e que preste atenção nos sinais. Vamos ver agora uma outra forma para armar a multiplicação, parecida com a multiplicação de números naturais.

1) Complete e ordene os polinômios
2) Escreva o polinômio que possui mais termos, como sendo o multiplicando
3) Escreva sobre ele o polinômio que possui menos termos, como multiplicador, alinhando os expoentes iguais.

A recomendação de escrever primeiro o polinômio com mais termos resultará em uma expressão de cálculo mais simples.

Exemplo:
Calcule $(-4+3x-2x^3+x^5-x^6).(2x^2+3x+5)$

Completando e ordenando o primeiro polinômio, e colocando sob ele o segundo polinômio (já está ordenado e completo), com potências alinhadas (número sob número, x sob x, x^2 sob x^2, etc.), ficamos com o dispositivo abaixo.

$$\begin{array}{r} -x^6+x^5+0x^4+0x^3+0x^2+3x-4 \\ \hline 2x^2+3x+5 \end{array}$$

A seguir multiplicamos cada termo do segundo polinômio por cada termo do primeiro polinômio. Na primeira multiplicação, termos um resultado do grau 8. Na próxima teremos grau 7, grau 6, e assim por diante.

$$\begin{array}{r} -x^6+x^5+0x^4+0x^3+0x^2+3x-4 \\ 2x^2+3x+5 \\ \hline -2x^8+2x^7+0x^6+0x^5+0x^4+6x^3-8x^2 \end{array}$$

A seguir multiplicamos o próximo termo do segundo polinômio (3x) pelos termos do primeiro polinômio. Escrevemos este novo polinômio sob o anterior, mantendo as potências alinhadas.

Scanned by CamScanner

$$
\begin{array}{rrrrrrrrrrrr}
-x^6 & + & x^5 & + & 0x^4 & + & 0x^3 & + & 0x^2 & + & 3x & - & 4 \\
 & & & & & & & & 2x^2 & + & 3x & + & 5 \\
\hline
-2x^8 & +2x^7 & + & 0x^6 & + & 0x^5 & + & 0x^4 & + & 6x^3 & - & 8x^2 & \\
 & -3x^7 & + & 3x^6 & + & 0x^5 & + & 0x^4 & + & 0x^3 & + & 9x^2 & - 12x
\end{array}
$$

Finalmente, multiplicamos 5, que é o próximo e último termo do multiplicador, pelos termos do primeiro polinômio. A seguir podemos somar os termos semelhantes.

$$
\begin{array}{rrrrrrrrrrrrr}
-x^6 & + & x^5 & + & 0x^4 & + & 0x^3 & + & 0x^2 & + & 3x & - & 4 \\
 & & & & & & & & 2x^2 & + & 3x & + & 5 \\
\hline
-2x^8 & +2x^7 & + & 0x^6 & + & 0x^5 & + & 0x^4 & + & 6x^3 & - & 8x^2 & \\
 & -3x^7 & + & 3x^6 & + & 0x^5 & + & 0x^4 & + & 0x^3 & + & 9x^2 & - 12x \\
 & & & -5x^6 & + & 5x^5 & + & 0x^4 & + & 0x^3 & + & 0x^2 & + 15x - 20 \\
\hline
-2x^8 & -x^7 & - & 2x^6 & + & x^5 & + & 0x^4 & + & 6x^3 & + & x^2 & - 3x - 20
\end{array}
$$

A resposta é : $-2x^8 - x^7 - 2x^6 + x^5 + 6x^3 + x^2 - 3x - 20$

Exercícios

E15) Multiplique os polinômios

a) $(x - 1).(x^2 + 3x + 7)$
b) $(x + 2).(x^2 - 2x + 3)$
c) $(x^2 - 2x + 3).(x^2 - 3x + 4)$
d) $(3x^5 - 2x^7 - 2x^6 - 2x^4).(2x+8)$
e) $(2x^5 + 4x - 2x^4 - 3).(x-3)$
f) $(2x^5 - 3x^7 - 3x^6 - 7).(4-2x)$
g) $(-5 - 4x^3 + 5x^4 - 2x^6).(6x-2)$
h) $(6x - 2x^4 + 5x^5 - 7x^7).(x+3)$
i) $(-3x^5 - 5x^4 - 4x^2).(x-4)$
j)) $(-2x^4 - 2x^3 + 5).(2x-1)$
k) $(3x^3 - 6x^2 + 2x).(2x+1)$
l) $(-2x^4 + 4x^2 - 2x^3 + 3).(3x-3)$
m) $(-3x^5 + 2x^2 + 5x - 3).(3x^2+2)$
n) $(-4x^5 - 2x^4 - 3x^2 + 2).(x-1)$
o) $(2x^4 + 3x^3 - 5x + 5).(x^2-1)$
p) $(2x^4 + 4x^3 - 3x + 2).(x^2-3x)$
q) $(3x^5 - 2x^7 - 3x^6 - 2x^4 - 3).(x+3)$
r) $(x^2 + 2x^4 + 2x^5 + x^6).(x^3-7)$
s) $(-4 + 3x - 2x^3 + x^4 - x^6).(x^2+2x+2)$
t) $(x^3 - 2x^6 + 2x - x^2 + 1).(2x+3)$

Divisão de polinômios

Dentre as operações básicas com polinômios, a divisão é a mais trabalhosa. Vamos então dividir o assunto em duas etapas, a primeira usando um monômio como divisor (polinômio dividido por monômio), e a segunda, finalmente com o caso completo, dividindo um polinômio por outro polinômio.

Divisão de polinômio por monômio

Já vimos que ao dividirmos um monômio por outro monômio, duas coisas podem acontecer:

a) Divisão exata: Quando as letras do divisor estão presentes no dividendo, com expoentes maiores ou iguais. O resultado da divisão é um novo monômio.
Exemplo: $4x^3y^2 \div 6x^2y^2 = (2/3)x$

b) Divisão não exata: Quando a condição acima não é satisfeita, o resultado possui um ou mais expoentes negativos. Este resultado não é considerado um monômio, e sim, um termo algébrico racional fracionário.

Exemplo: $4x^3y^2 \div 6x^2y^3 = (2/3)x.y^{-1}$

Quando dividimos um polinômio por um monômio, os termos que resultariam em divisões não exatas ficam indicados como o resto da divisão.

Scanned by CamScanner

Exemplo:
Dividir $2x^3 + 4x^2 - 6x + 12$ por $2x$

Esta é uma divisão de polinômio ($2x^3+4x^2-6x+12$) por um monômio ($2x$). Para fazer esse tipo de divisão, dividimos cada termo do polinômio pelo monômio dado:

$2x^3 \div 2x = x^2$
$4x^2 \div 2x = 2x$
$-6x \div 2x = -3$
$12 \div 2x$ = Divisão não exata

Os resultados das divisões acima formam o quociente da divisão entre o polinômio e o monômio. O termo 12 que não pode ser dividido (o resultado deixaria de ser um polinômio) fica indicado como resto da divisão. Portanto o resultado pedido é:

Quociente: $x^2 + 2x - 3$
Resto: 12

Exemplo:
$(4x^5 - 2x^4 + 6x^3 + 4x^2 + 2x + 15) \div (2x^2) =$

No dividendo, apenas os termos de grau 2 ou superior poderão ser divididos, e os termos de grau 1 ou inferior ($2x+15$) ficarão indicados como resto.

Quociente: $2x^3 - x^2 + 3x + 2$
Resto: $2x+15$

Exemplo:
$(6a^2b^3 - 12a^3b^2 + 10ab + 4a^2 + 6b^2 + 4a + 2b + 8) \div (2ab)$

A única diferença aqui é que o polinômio e o monômio têm duas variáveis, a e b. O princípio da divisão é o mesmo: o quociente será formado pela divisão dos termos que permitem divisão exata pelo divisor (no caso, $2ab$), e os termos que não permitem a divisão exata formarão o resto da divisão. No exemplo acima, apenas os três primeiros termos permitem divisão exata, os 5 últimos não permitem, e formarão o resto da divisão.

Quociente: $3ab^2 - 6a^2b + 5$
Resto: $4a^2 + 6b^2 + 4a + 2b + 8$

Exercícios

E16) Divida os polinômios pelos respectivos monômios, indique o quociente e o resto

a) $(18x + 10) \div 2x$
b) $(x^2 + 3x + 6) \div 3x^2$
c) $(4x^2 + 6x + 7) \div (-6x^2)$
d) $(-6x^4 + 24x^3 + 6x^2 - 9x) \div 3x^3$
e) $(32x^3 - 4x^2 + 20x + 52) \div 4x^2$
f) $(20x^3 + 25x^2 - 15x) \div (-5x^3)$
g) $(-3x^6 + 12x - 24x^4 + 3x^2 - 18) \div 3x^2$
h) $(8 - 20x^2 - 52x^5 + 28x^7) \div (-4x^2)$
i)) $(2x^2 + 6x^4 + 2x^6) \div 2x^2$
j) $(3x^5 - 15x^7 + 6x^3 - 3x^6 - 24x^4) \div 3x^4$
k) $(2x^4 + 4x^3 - 5x) \div x$
l) $(2x^4 - 6x^6 + 4x^2) \div (-2x^2)$
m) $(12x^3 - 3x^6 + 24x - 3x^2 + 15) \div 3x$
n) $(-2x^7 + 4x^3 - 2x^4 - 6) \div (-2x^2)$
o) $(12 - 15x^2 - 3x^5 + 12x^7) \div 3x$
p) $(10x^5 - 20x^7 + 20x^3 - 10x^2 - 15) \div 5x$
q) $(2x^5 + 3x^3 - x^6 + 2x - 3x^4) \div (-4x^2)$
r) $(3x^5 - x^7 + 6x^3 - 3x^6 - 4x^4) \div 4x$
s) $(3x^4 + x^3 + 3x^2 - 3x) \div (-3x^2)$
t) $(x^5 - 2x^7 - 3x^6 + 5x - x^4 - 3) \div 6x$

Scanned by CamScanner

Divisão de dois polinômios

A divisão de polinômios apresenta uma analogia com a divisão de números inteiros. Considere por exemplo a divisão:

$13 \div 4 = 3$, resto 1

Neste exemplo, o 13 é o dividendo (D), o 4 é o divisor (d), o 3 é o quociente (Q) e 1 é o resto (R). Entre o dividendo, o divisor, o quociente e o resto na divisão de números inteiros, vale a relação:

$D = d.Q + R$

Considere agora que queremos dividir:

$[x.(x+3) + 2(x+3) + 5\ ] \div (x+3)$

Observe que o divisor é x+3, e escrevemos o dividendo de forma a aparecerem múltiplos de x+3. Na prática os polinômios a serem divididos não aparecem dessa forma simpática, e sim, com os termos semelhantes reduzidos. Seria apresentado como $(x^2 + 5x + 11)$, que é o resultado que encontraríamos se desenvolvêssemos a expressão $[x.(x+3) + 2(x+3) + 5\ ]$. Mas apresentado dessa forma, o dividendo tem partes que permitem a divisão exata por (x+3):

$x.(x+3) \div (x+3) = x$
$2(x+3) \div (x+3) = 2$
$5 \div (x+3)$ = não dá divisão exata

Então o resultado dessa operação é:
Quociente: x+2
Resto: 5

Como o dividendo, uma vez desenvolvido, é $(x^2 + 5x + 11)$, podemos dizer que:

$(x^2 + 5x + 11) \div (x+3) = x+2$, resto 5

O problema é que na prática os dividendos aparecem na forma mais compacta, já com os termos semelhantes reduzidos, e não na forma simpática que apresentamos, separada em múltiplos do divisor. Felizmente existe um processo para dividir os polinômios diretamente, apesar de ser um pouco trabalhoso. Vamos apresentar o método através deste exemplo:

Exemplo:
Calcule o quociente e o resto da divisão $(x^2 + 5x + 11) \div (x+3)$

1) A primeira coisa a fazer é completar e ordenar os polinômios, com os termos semelhantes já reduzidos. Os polinômios do nosso exemplo já estão nessa forma.

Dividendo: $x^2 + 5x + 11$
Divisor: $x + 3$

2) Armar um dispositivo de divisão, similar ao que usamos para a divisão de números naturais.

$x^2 + 5x + 11 \mid x + 3$

3) Divida o primeiro monômio do dividendo pelo primeiro monômio do divisor. No caso, temos $x^2 \div x = x$. Colocamos este resultado

$x^2 + 5x + 11 \mid x + 3$
$\qquad\qquad\quad\ \ \mid x$

Scanned by CamScanner

no lugar do quociente.

4) Multiplicamos este valor pelo divisor (no caso, x+3) e subtraímos o resultado do dividendo. No nosso exemplo temos x.(x+3) = $x^2 + 3x$. Colocaremos então, sob o divisor, o polinômio $-x^2 - 3x$. Subtraindo dos termos correspondentes no dividendo (x^2+5x), encontraremos como resultado 2x.

$$\begin{array}{r|l} x^2 + 5x + 11 & x + 3 \\ \underline{-x^2 - 3x} & \\ 2x & \end{array}$$

5) "Abaixamos" os termos restantes do polinômio, no nosso caso, apenas o 11.

$$\begin{array}{r|l} x^2 + 5x + 11 & x + 3 \\ \underline{-x^2 - 3x} & \\ 2x + 11 & \end{array}$$

6) Repetimos o processo, dividindo o primeiro termo deste novo dividendo (2x+11) pelo primeiro termo do divisor (x). Neste exemplo o resultado será 2, que deve ser adicionado ao quociente.

$$\begin{array}{r|l} x^2 + 5x + 11 & x + 3 \\ \underline{-x^2 - 3x} & x + 2 \\ 2x + 11 & \end{array}$$

7) Este novo valor (no caso, 2) deve ser multiplicado pelo divisor (x+3) e subtraído do dividendo. No caso, ficamos com 2x+6, que com sinal trocado ficará –2x – 6. Depois de subtrair, o resultado é 5 (resto).

$$\begin{array}{r|l} x^2 + 5x + 11 & x + 3 \\ \underline{-x^2 - 3x} & x + 2 \\ 2x + 11 & \\ \underline{- 2x - 6} & \\ 5 & \end{array}$$

Portanto o quociente é x+2 e o resto é 5.

Exemplo:
$(2x^5 - 3x^3 + 10) \div (4x + 3 + x^2 - 6x)$

A primeira coisa a fazer é ordenar e completar e ordenar os polinômios, além de reduzir os termos semelhantes. Ficamos com:

$(2x^5 + 0x^4 - 3x^3 + 0x^2 + 0x + 10) \div (x^2 - 2x + 3)$

Armamos então o dispositivo da divisão:

$$\begin{array}{l|l} 2x^5 + 0x^4 - 3x^3 + 0x^2 + 0x + 10 & x^2 - 2x + 3 \\ & \end{array}$$

Dividimos os termos de maior grau: $2x^5 \div x^2 = 2x^3$

$$\begin{array}{l|l} 2x^5 + 0x^4 - 3x^3 + 0x^2 + 0x + 10 & x^2 - 2x + 3 \\ & 2x^3 \end{array}$$

Este resultado deve ser multiplicado pelo divisor e subtraído do dividendo:
$2x^3.(x^2 - 2x + 3) = 2x^5 - 4x^4 + 6x^3$
Este resultado vai para baixo do dividendo, com os sinais trocados.

$$\begin{array}{l|l} 2x^5 + 0x^4 - 3x^3 + 0x^2 + 0x + 10 & x^2 - 2x + 3 \\ -2x^5 + 4x^4 - 6x^3 & 2x^3 \end{array}$$

Scanned by CamScanner

Subtraímos e a seguir abaixamos o restante do dividendo

$$\begin{array}{l|l} 2x^5 + 0x^4 - 3x^3 + 0x^2 + 0x + 10 & x^2 - 2x + 3 \\ \underline{-2x^5 + 4x^4 - 6x^3} & \overline{2x^3} \\ 4x^4 - 9x^3 + 0x^2 + 0x + 10 & \end{array}$$

Agora dividimos o termo de maior grau ($4x^4$) pelo termo de maior grau do divisor (x^2), o resultado é $4x^2$, que é adicionado ao quociente.

$$\begin{array}{l|l} 2x^5 + 0x^4 - 3x^3 + 0x^2 + 0x + 10 & x^2 - 2x + 3 \\ \underline{-2x^5 + 4x^4 - 6x^3} & \overline{2x^3 + 4x^2} \\ 4x^4 - 9x^3 + 0x^2 + 0x + 10 & \end{array}$$

Multiplicamos este valor ($4x^2$) pelo divisor, o que resulta em $4x^4 - 8x^3 + 12x^2$, e colocamos este resultado sob o divisor, com os sinais trocados.

$$\begin{array}{l|l} 2x^5 + 0x^4 - 3x^3 + 0x^2 + 0x + 10 & x^2 - 2x + 3 \\ \underline{-2x^5 + 4x^4 - 6x^3} & \overline{2x^3 + 4x^2} \\ 4x^4 - 9x^3 + 0x^2 + 0x + 10 & \\ \underline{4x^4 - 8x^3 + 12x^2} & \\ -17x^3 + 12x^2 + 0x + 10 & \end{array}$$

A próxima divisão é $-17x^3$ por x^2, que resulta em $-17x$, valor que é adicionado ao quociente. Multiplicamos $-17x$ pelo divisor e colocamos o resultado com sinais trocados sob o dividendo.

$$\begin{array}{l|l} 2x^5 + 0x^4 - 3x^3 + 0x^2 + 0x + 10 & x^2 - 2x + 3 \\ \underline{-2x^5 + 4x^4 - 6x^3} & \overline{2x^3 + 4x^2 - 17x} \\ 4x^4 - 9x^3 + 0x^2 + 0x + 10 & \\ \underline{4x^4 - 8x^3 + 12x^2} & \\ -17x^3 + 12x^2 + 0x + 10 & \\ \underline{17x^3 - 34x^2 + 51x} & \\ -22x^2 + 51x + 10 & \end{array}$$

Finalmente fazemos a divisão de $-22x^2$ por x^2, o que resulta em -22. Adicionamos este valor ao quociente, multiplicamos pelo divisor e colocamos sob o dividendo com os sinais trocados.

$$\begin{array}{l|l} 2x^5 + 0x^4 - 3x^3 + 0x^2 + 0x + 10 & x^2 - 2x + 3 \\ \underline{-2x^5 + 4x^4 - 6x^3} & \overline{2x^3 + 4x^2 - 17x - 22} \\ 4x^4 - 9x^3 + 0x^2 + 0x + 10 & \\ \underline{4x^4 - 8x^3 + 12x^2} & \\ -17x^3 + 12x^2 + 0x + 10 & \\ \underline{17x^3 - 34x^2 + 51x} & \\ -22x^2 + 51x + 10 & \\ \underline{+22x^2 - 44x + 66} & \\ 7x + 76 & \end{array}$$

Encontramos então como resultado da divisão:

Quociente: $2x^3 + 4x^2 - 17x - 22$
Resto: $7x + 76$

OBS: Quando dividimos um polinômio em x de grau m, por um polinômio em x de grau n, termos:

a) O grau do quociente será m – n
b) O grau do resto será no máximo n – 1

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

O resto da divisão de $P(x) = x^3 - x^2 + 1$ por $x - 2$ é $P(2)$:

$R = 2^3 - 2^2 + 1 = 8 - 4 + 1 = 5$

Chegamos à solução por um processo muito mais fácil. Infelizmente o Teorema do resto calcula apenas o resto, e somente na divisão de polinômios de uma variável, por $(x - a)$, sendo a um valor real qualquer. O teorema não serve para calcular o quociente, e nem para calcular restos de divisões por outros tipos de polinômios que não sejam da forma $x - a$. Ou seja, o divisor pode ser $x + 10$, por exemplo ($a = -10$), mas não pode ser de segundo grau ou superior.

Com exceção desses casos particulares em que podemos aplicar o Teorema do resto, em todos os demais temos que armar a divisão e resolvê-la pelo processo trabalhoso que ensinamos aqui.

Exercícios

E17) Divida os polinômios, encontrando o quociente e o resto (não esqueça de ordenar e completar o dividendo)

a) $(x^2 + 3x + 2) \div (x + 3)$
b) $(1 + x - x^2) \div (x + 2)$
c) $(x^2 + 4x + 5) \div (x - 1)$
d) $(2x^2 + 5x + 8) \div (x + 4)$
e) $(10 - 2x + x^2) \div (x + 5)$
f) $(x^3 + x^2 + x - 3) \div (x + 2)$
g) $(x^3 + 2x^2 + 4x + 5) \div (x - 2)$
h) $(2x^3 - 1) \div (x + 5)$
i) $(3x^3 + 4x^2 + 5x + 4) \div (x^2 + 2x + 3)$
j) $(x^2 + 3x - 5) \div (x + 3)$
k) $(2x^3 + 5x + 2) \div (x - 2)$
l) $(x^4 - 1) \div (x - 1)$
m) $x^5 \div (x^2 + 3x - 4)$
n) $(x^5 - x^4 + x^3 - x^2 + x - 1) \div (x + 1)$
o) $(3x^3 + 4x + 5) \div (x + 4)$
p) $(2x^5 - 3x^4 - 4x^2 + - 7) \div (x + 2)$
q) $(-2x^4 + 4x^3 + 6x^2 - 10x) \div (x + 1)$
r) $(4x^3 - 2x^6 + 3x - 2x^2 + 7) \div (x - 2)$
s) $(-2x^7 + 2x^3 - 4x^4 - 6) \div (x + 2)$
t) $(-7x^6 + 5x - 2x^4 + 3x^2 - 5) \div (x - 2)$

Potências de um polinômio

Esta é sem dúvida a operação mais trabalhosa que podemos fazer com um polinômio. Elevar um polinômio a uma potência inteira **n** é multiplicar o polinômio por si próprio, **n** vezes.

$$[P(x)]^n = \underbrace{P(x).P(x).P(x)....P(x)}_{\text{(n vezes)}}$$

Se elevarmos, por exemplo, um polinômio do 5º grau ao cubo, termos como resultado um polinômio do 15º grau. Temos que fazer ao todo 102 multiplicações de monômios e algumas dezenas de adições. É claro que um tipo de questão como esta não mede a capacidade do aluno, mas ainda assim é preciso saber como realizar a operação, pois questões com polinômios pequenos e potências menores podem surgir, por exemplo, elevando ao quadrado ou ao cubo.

Exemplo:
Calcular $(x+5)^2$

$(x+5)^2 = (x+5).(x+5) = x^2 + 5x + 5x + 25 = x^2 + 10x + 25$

Exemplo:
Calcular $(x+5)^3$

Já calculamos quanto vale $(x+5)^2$. Se multiplicarmos o resultado por $(x+5)$, teremos $(x+5)^3$:

Scanned by CamScanner

$(x+5)^3 = (x+5).(x+5)^2 = (x+5).(x^2+10x+25) = x^3+10x^2+25x+5x^2+50x+125$
$= x^3+15x^2+75x+125$

Para elevar à quarta potência, a forma mais rápida é elevá-la ao quadrado, depois elevar o resultado ao quadrado ($(x+5)^4 = [(x+5)^2]^2$). Também é correto elevar a expressão ao cubo, e depois multiplicar o resultado pela expressão novamente ($(x+5)^4 = (x+5)^3.(x+5)$).

Exemplo:
Calcule $(a+2b+3c)^2$

$(a+2b+3c)^2 = (a+2b+3c).(a+2b+3c) = a^2+2ab+3ac+4ab+4b^2+6bc+3ac+6bc+9c^2$

$= a^2+6ab+6ac+4b^2+12bc+9c^2$

Durante os cálculos, preste atenção aos sinais, e no final, sempre reduza os termos semelhantes. Preste atenção na ordem das letras: bc e cb são semelhantes, assim como também são semelhantes ac e ca, e também ab e ba. Para evitar confusão, convenciona-se dispor as letras de cada monômio em ordem alfabética.

Exemplo:
Calcule $(x^2-3x-2)^2$

$(x^2-3x-2)^2 = (x^2-3x-2).(x^2-3x-2) = x^4-3x^3-2x^2-3x^3+9x^2+6x-2x^2+6x+4$

$= x^4-6x^3+5x^2+12x+4$

Exercícios

E18) Calcule as seguintes potências de polinômios

a) $(x-3)^2$
b) $(x-3)^3$
c) $(x-3)^4$
d) $(x+y)^2$
e) $(x-y)^2$
f) $(a+2b)^2 =$
g) $(3x-2y)^2 =$
h) $(2m+3)^2 =$
i) $(3m-k)^2 =$
j) $(x^2-9)^2 =$
k) $(x^2+x-1)^2 =$
l) $(2x+3y^2)^2 =$
m) $(1-3x^2)^2 =$
n) $(x^2+y^2)^2 =$
o) $\left(x+\sqrt{2}\right)^2 =$
p) $(2x^2+3x-5)^2 =$
q) $(a+b+c)^2 =$
r) $(2a+3b+4c)^2 =$
s) $(x+1)^3 =$
t) $(x-1)^3 =$

Expressões envolvendo polinômios

Antes de estudarmos expressões algébricas, o mais complexo exercício de álgebra era a expressão com números racionais, dízimas, potências e raízes, adição, subtração, multiplicação e divisão, envolvendo números com sinais, além de chaves, colchetes e parênteses. Ocorre que cada um dos valores que aparecem nessas expressões, que até então eram números, podem ser polinômios, ou até mesmo expressões algébricas. Podem ainda aparecer as frações algébricas, aquelas que possuem expressões algébricas em denominadores. Isso resulta em expressões que podem ser extremamente complexas e que necessitam de toda a habilidade algébrica do aluno para resolvê-las.

Exemplo:

$$\frac{(x+1)^2}{3} - \frac{1-(x+1).(x-2)}{2}$$

Scanned by CamScanner

Para resolver expressões algébricas complexas é preciso usar todas as regras já aprendidas para números: redução ao mesmo denominador, regras de sinais, propriedades das potências, precedência das operações, etc.

Nesse caso temos duas frações, e ambas possuem expressões algébricas nos seus numeradores.

Numerador da primeira fração:

$(x+1)^2 = (x+1).(x+1) = x^2 + x + x + 1 = x^2 + 2x + 1$

Numerador da segunda fração:

$1 - (x+1).(x-2) = 1 - (x^2 - 2x + x - 2) = 1 - (x^2 - x - 2) = 1 - x^2 + x + 2 = -x^2 + x + 3$

Ficamos então com:

$$\frac{x^2+2x+1}{3} - \frac{-x^2+x+3}{2}$$

Agora devemos reduzir as duas frações ao mesmo denominador para fazer sua subtração. É preciso tomar muito cuidado quando encontramos um sinal negativo antes de uma fração, como neste exemplo. O sinal negativo será aplicado a todos os termos do denominador, e não apenas ao primeiro. Muitos alunos cometem esse erro comum.

O MMC entre os denominadores (3 e 2) é 6. Portanto vemos multiplicar ambos os termos da primeira fração por 2, e ambos os termos da segunda fração por 3.

$$\frac{2(x^2+2x+1)-3(-x^2+x+3)}{6}$$

Observe na segunda fração que ficou –3 multiplicando o seu numerador. Isso é devido ao sinal negativo que havia antes da fração, fazendo com que o sinal negativo (na verdade –3) se aplique a todos os termos do numerador desta fração.

$$\frac{2x^2+4x+2+3x^2-3x-9}{6} = \frac{5x^2+x-7}{6}$$

Exemplo:

$$(2a+3b+4ab).\left\{2b-\left[(a+2)^2-(a-3)^2\right]^2\right\}$$

Temos aqui uma expressão algébrica com duas variáveis. Como todos os termos são polinomiais e só estamos realizando adições, subtrações e multiplicações, o resultado também será um polinômio. Devemos resolver primeiro as expressões que estão nos parênteses mais internos:

$(a+2)^2 = (a+2).(a+2) = a^2 + 2a + 2a + 4 = a^2 + 4a + 4$

$(a-3)^2 = (a-3).(a-3) = a^2 - 3a - 3a + 9 = a^2 - 6a + 9$

Subtraindo as duas expressões, ficamos com:

$a^2 + 4a + 4 - (a^2 - 6a + 9) = a^2 + 4a + 4 - a^2 + 6a - 9 = 10a - 5$ (resultado dos colchetes)

Scanned by CamScanner

Este resultado agora deverá ser elevado ao quadrado:

$(10a - 5)^2 = (10a-5).(10a-5) = 100a^2 - 50a - 50a + 25 = 100a^2 - 100a + 25$

O resultado entre chaves será 2b subtraído dessa expressão:

$2b - (100a^2 - 100a + 25) = 2b - 100a^2 + 100a - 25$

Finalmente este resultado deverá ser multiplicado por (2a +3b + 4ab)

$(2a + 3b + 4ab).(2b - 100a^2 + 100a - 25)$

Serão 12 multiplicações de monômios, e no final devemos reduzir os termos semelhantes. Não esqueça de prestar atenção nos sinais:

$4ab - 200a^3 + 200a^2 - 50a + 6b^2 - 300a^2b + 300ab - 75b + 8ab^2 - 400a^3b + 400a^2b - 100ab$

$= 204ab - 200a^3 + 200a^2 - 50a + 6b^2 + 100a^2b - 75b + 8ab^2 - 400a^3b$

Exemplo:

$$\left(\frac{x-2}{2}\right)^2 - \frac{3(x^3-1).\left[(x+1)^3-(x+1).(x^2-1)\right]}{3} + \frac{\left\{6+3x.\left[4+2x(1-x^2)\right]\right\}}{6}$$

Na expressão acima temos que desenvolver primeiro as potências dos números e das expressões. Vimos que potências de polinômios nada mais são que sequências de multiplicações. Apesar do cálculo ser um pouco trabalhoso, a ideia é simples.

Numerador da primeira fração:
$(x - 2)^2 = (x - 2).(x - 2) = x^2 - 2x - 2x + 4 = x^2 - 4x + 4$

Numerador da segunda fração:
$(x + 1)^3 = (x+1).(x+1).(x+1) = (x+1).(x2 + x + x + 1) = (x+1).(x^2 + 2x + 1) =$
$= (x^3 + 2x^2 + x + x^2 + 2x + 1) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$

$(x + 1).(x^2 - 1) = x^3 - x + x^2 - 1 = x^3 + x^2 - x - 1$

$3(x^3 - 1).[(x+1)^3 - (x+1).(x^2 - 1)] = (3x^3 - 3).[x^3 + 3x^2 + 3x + 1 - (x^3 + x^2 - x - 1)]$
$= (3x^3 - 3).[x^3 + 3x^2 + 3x + 1 - x^3 - x^2 + x + 1]$ (eliminando parênteses)
$= (3x^3 - 3).[2x^2 + 4x + 2]$ (reduzindo termos semelhantes)
$= 6x^5 + 12x^4 + 6x^2 - 6x^2 - 12x - 6$ (efetuando o produto)
$= 6x^5 + 12x^4 - 12x - 6$ (reduzindo os termos semelhantes)

Numerador da terceira fração:
Temos que operar primeiro os parênteses, depois os colchetes, e por último as chaves.

$\{ 6 + 3x.[4+2x.(1 - x^2)] \} = \{ 6 + 3x.[4+ 2x - 2x^3] \} = \{ 6 + 12x + 6x^2 - 6x^4 \}$
$= -6x^4 + 6x^2 + 12x + 6$

Substituindo as três expressões encontradas nos numeradores das três frações, ficamos com:

Scanned by CamScanner

$$\frac{x^2-4x+4}{4}-\frac{6x^5+12x^4-12x-6}{3}+\frac{-6x^4+6x^2+12x+6}{6}$$

Uma vez que todas as expressões algébricas dos numeradores foram desenvolvidas, a próxima etapa é somar as três frações, reduzindo-as antes ao mesmo denominador. O MMC entre 4, 3 e 6 é 12, então é preciso multiplicar os temos da primeira fração por 3, os da segunda por 4, e os da terceira por 2.

IMPORTANTE:
O sinal negativo antes da segunda fração se aplica a todos os seus termos, e não só ao $6x^5$.

$$\frac{3(x^2-4x+4)-4(6x^5+12x^4-12x-6)+2(-6x^4+6x^2+12x+6)}{12}$$

Agora basta desenvolver a expressão do denominador e reduzir os termos semelhantes.

$$\frac{3x^2-12x+12-24x^5-48x^4+48x+24-12x^4+12x^2+24x+12}{12}$$

$$=\frac{-24x^5-60x^4+15x^2+60x+48}{12}$$

Exercícios

E19) Desenvolva as expressões e apresente o resultado final em forma de polinômio
OBS.: Mostre que $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

a) $(x^2 + 2x + 1)^2 - 2(x^2+3)^2$
b) $2(x+1).(x - 2) + 3(x - 3).(x+4)$
c) $2(x-2)^2 + 3(x-2) + 5$
d) $(x - y)^2 - 3(x - y) + 5$
e) $(x - 3)^2 + 4(x - 3) + 5$
f) $2(a + 1) - 3(a - 1) + 4a$
g) $(x + 1)^3 - 2(x + 1)^2 + 3$
h) $(x + 1).(x + 2) + (x + 1)^2 - (x + 2)^2$
i) $6 + 4(x + 4) - (x + 4)^2$
j) $(a + b)^2 - (a - b)^2$
k) $(x + 1)^2 + (x + 2)^2 + (x + 3)^2$
l) $(x + 1)^3 + 2(x + 2)^2 + (x + 3)$
m) $(x - 2) - 3(2 - x)^2 + 6$
n) $(x + 1)^2 - 3(x + 1)^2 + 2(x - 1)^2$
o) $(a + b)^2 + 2(a + b)^2 + 3(a + b)^2 + 4(a + b)^2$
p) $(x + 1)^2 + 2(x - 1)^2 + 3(x + 1)^2 + 4(x - 1)^2$
q) $(x + 3)^2 - (x - 3)^2$
r) $[-(x + 1)]^2$
s) $1 + (x + 1) + (x + 1)^2$
t) $(x + 1) + (x + 2) + (x + 3) + (x + 4)$

E20) Efetue

a) $(3x^2 - 5x + 4) + (-2x^2 + 3x - 5)$
b) $(8a^2b + 2ab^2 - 3b^3) + (-4a^2b - 7ab^2 + 8b^3)$
c) $(5ab^2 - 3a^2b) + (4ab^2 + 7a^2b)$
d) $(5x^2 - 3xy + 4y) - (-2x^2 - 7xy + 5y)$
e) $8a^4x.2ax^2y$
f) $\frac{3}{7}a^3 - 2a^2b - 4\frac{1}{5}ab^2 + \frac{4}{21}a^2 + 7a^2b - 4\frac{7}{15}ab^2$
g) $(4a^3 - 5a^2b) - (5a^3 + 2a^2b) - (a^3 - 8a^2b)$
h) $2a - \{3b + (2b - c) - 4c + [2a - (3b - c)]\}$
i) $3x^{m-3n} . 2x^{m+2n}$
j) $(5a^2b^mc^p)^3$

Exercícios de revisão

E21) Calcule:

a) $2x.(-5x)$
b) $(-4x).(-7x)$
c) $(-a^2b).(-ab^3)$
d) $(-4xy^3).(-7x^2yz)$
e) $(-3x^5y^4z).(-4xy^3z^2)$
f) $4ab.6a^3b^3$
g) $7xy.9xy$
h) $3a^3b.a^3b^2c^4$
i) $2a^3b^7c^3.5a^4b^3c^2$
j) $5abc.(-6ab^2c^3)$
k) $3x^2y . (-xy^2) . (-7x^3y^4)$
l) $2b^2c^3x^3 . 3a^2b^3c^2 . (-5a^2b^2x^2)$
m) $2x^3y^2z . (-3x^2y^2z^3) . (-2x^3yz)$
n) $6am^2x^2 . (-2a^3mx^2) . (-4amx^2)$
o) $-4x^2y^3z^4 . 2x^2y^2z . (-3x^3y^4z^2)$

Scanned by CamScanner

E22) Dados $x = -1$, $y = 2$ e $z = -3$, calcule o valor numérico das expressões

a) $2xy^2 - 3yz^2 + z$
b) $4x^2 - 2y^2 - z^2$
c) $4x + 3y - 2z^3$
d) $-2x + 4y - 2z^2$
e) $-x^3 + 3y^2 + 10z$
f) $-2x^3 + 4y^2 + 6z$
g) $-3x + 4y - 5z^2$
h) $9x + 3y - z^3$
i) $6x^2 - 9y^2 - 2z^2$
j) $2x^3 - 3y^2 + 4z^2$
k) $3xy^2 - 4yz^2 + x^2y^2z^2$
l) $3xyz - 5x^7y^2 - 3x^2y^2$
m) $xzy^3 + 2xyz^2 + x^5y^2z$
n) $3x^2yz + 4xyz + x^2y^2zy$
o) $5x^2 + 7x^2y^2 - 4zx^2$

E23) Efetue as divisões

a) $x^5 \div x$
b) $32x^5 \div 4x^2$
c) $42x^2 \div 6x$
d) $-36x^4 \div 6x^2$
e) $64\,x^6 \div 16x^2$
f) $-85x^3 \div (-5x^2)$
g) $-32x^2y^2 \div 8xy^2$
h) $-x^3y^3 \div (-4xy^2)$
i) $-16x^4y^2 \div (-4xy)$
j) $-25x^4y^2 \div (-5xy^2y)$
k) $-51x^2y^3 \div (-17x^2y)$
l) $-28a^5b^4 \div 7a^2b^2$
m) $-36x^3y^5 \div (-3x^2y^3)$
n) $-3x^3y^4 \div (-5xy^3)$
o) $-24x^2y^4 \div 8xy^3$

E24) Efetue as divisões

a) $-a^2b^3c^4d^5 \div abc$
b) $-2x^2y^2z^3 \div (-3xyz^2)$
c) $-5a^6b^7c^3 \div (-a^4b^2c^2)$
d) $x^2y^3z^4w^6 \div (-xy^2z^2w^2)$
e) $52a^2m^4n^6 \div 13am^2n^2$
f) $39xy2z4 \div 13\,xyz$
g) $68\,xc^2d^3 \div (-17xcd^3)$
h) $-8m^5n^3p \div (-4m^5np)$
i) $-6pqr^3 \div (-2\,p^2qr)$
j) $26a^2g^2t^5 \div (-2\,agt^4)$
k) $-a^4b^2c^3 \div (-a^5b^3c^4)$
l) $-3x^2yz^2 \div (-2x^3y^4z^5)$
m) $-6mnp \div (-3m^2n^2p^2)$
n) $-17a^2b^3c4 \div 51ab^5c^4$
o) $-19mq^2t^3 \div 57m^2gt^4$

E25) Efetue

a) $a^2 - ab + b2 + a^2 + ab + b2$
b) $3a^2 + 5a - 7 + 6a^2 - 7a + 13$
c) $x + 2y - 3z + 3x + y + 2x - 3y + z$
d) $3x + 2y - z - x + 3y + 2z + 2x - y + 3z$
e) $-3a + 2b + c + a - 3b + 2c + 2a + 3b - c$
f) $-a + 3b + 4c + 3a - b + 2c + 2a + 2b - 2c$
g) $4a^2 + 3a + 5 - 2a^2 + 3a - 8 + a^2 - a + 1$
h) $5ab + 6bc - 7ac + 3ab - 9bc + 4ac + 3bc + 6ac$
i) $x^3 + x^2 + x + 2x^3 + 3x^2 - 2x + 3x^3 - 2x + 3x^3 - 4x^2$
j) $3y^2 - x^2 - 3xy + 5x^2 + 6xy - 7y^2 + x^2 + 2y^2$

E26) Efetue

a) $2a^2 - 2ab + 3b^2 + 4b^2 + 5ab - 2a^2 - 3ab - 9b^2$
b) $a^3 - a^2 + a - 1 + a^2 - 2a + 2 + 3a^2 + 7a + 1$
c) $2m^3 - m^2 - m + 4m^3 + 8m + 8m^2 - 7 - 3m^2 + 9$
d) $x^3 - 3x + 6y + x^2 + 2x - 5y + x^3 - 3x^2 + 5x$
e) $6x^3 - 5x + 1 + x^3 + 3x + 4 + 7x^2 + 2x - 3$
f) $a^3 + 3a^2b + 3ab^2 - 3a^2b - 6ab^2 + 3a^2b + 4ab^2$
g) $a^3 - 2a^2b - 2ab^2 + a^2b - 3ab^2 - b^3 + 3ab^2 + 2a^3$
h) $7x^3 - 2x^2y + 9xy^2 + 5x^2y - 4xy^2 - 2x^3$
i) $y^3 - x^3 - 3x^2y - 5xy^2 + 2x^2y - 5y^3 - 2x^3 - xy^2$
j) $2c^3 - 5c^2d + d^3 + 6cd^2 + c^3 + 6c^2d - 5cd^2 - 2d^3$

E27) Efetue as subtrações

a) $(2a^3 - 3a^2 + 2a - 1) - (a^3 + 2a^2 + 3a - 5)$
b) $(-5ax^4 - 2a^2x^3 + 4a^3x^2) - (4a^3x^2 - 2a^2x^3 - 4ax^4)$
c) $(2a - 3b + 4c) - (a - 2b + 3c)$
d) $(3a - 5b + c) - (a - 3b - 5c)$
e) $(2x - 4y + 6z) - (4x - y - 2z)$
f) $(6x - 7y + 2z) - (5x - 11y - 3z)$
g) $(ab + ac + bc + bd) - (ab - ac - bc + bd)$
h) $(5ab - ac + bc + bd) - (3ab + 2ac - 3bc + bd)$
i) $(3x^3 + 2x^2 - 3x - 5) - (2x^3 - x^2 - 5x + 3)$
j) $(x^3 - x + 1 - a) - (7x^2 - 5x + 1 - a)$

E28) Efetue as subtrações

a) $(2b^3 + 8c^3 - 15abc) - (9b^3 + 3abc - 7c^2)$
b) $(x^4 + x - 5x^3 + 5) - (7 - 2x^3 - 3x^2 - 3x^3 + x^4)$
c) $(a^3 + b^3 + c^3 - 3abc) - (3abc + a^3 - 2b^3 - 3c^3)$
d) $(2x^4 - 5x^2 + 7x - 3) - (x^4 + 2 - 2x^3 - x^2)$
e) $(1 - x^5 - x + x^4 - x^3) - (x^4 + 1 + x + x^2)$
f) $(a^3 - b^3 + 3a^2b - 3ab^2) - (a^3 + b^3 - a^2b - ab2)$
g) $(a^2b - ab^2 - 3a^3b^3 - b^4) - (b^4 - 5a^3b3 - 2ab^2 + a^2b)$
h) $(-x^3 - 7x^2y - 2y^3 + 3xy^2) - (3x^2 + 5y^2 - xy^2 + 4x^2y)$
i) $(a^3 - b^3) - (a - b)^3$
j) $(a - b)^2 - (b - c)^2 - (c - a)^2$

E29) Calcule e simplifique as expressões

a) $5a - [7 - (2b + 5) - 2a]$
b) $x - [2x + (3a - 2x) - 5a]$
c) $x - [15y - (3z + 12x)]$
f) $7x - \{5y - [\,3z - (5x - y + 2z) + x\,] + y\,\}$
g) $(a - b + c) - (b - a - c) + (a + b - 2c)$
h) $3x - [-\,2y - (2y - 3x) + z] + [x - (y - 2z - x)]$

Scanned by CamScanner

d) $2a - \{b + [3c - (2b - c)]\}$
e) $5a - \{b + [3c - (3b - c)]\}$
i) $x - [2x + (x - 2y + 2y] - 3x - \{4x - [(x + 2y) - y]\}$
j) $x - [y + z - x - (x + y) - z] + (3x - (2z + z))$

E30) Calcule simplifique

a) $a(b + c)$
b) $(ab + ac - bc).abc$
c) $(x + 7).4x$
d) $(2x - 3y).3x$
e) $(2x + y).6y$
f) $(2 - 2a).3a$
g) $(- x + 3b).(-b)$
h) $(2a^2 - 3ab).(-3a)$
i) $(2x^2 + 3xz).5z$
j) $(a^2 - 5ab).4ab$
k) $(x^2 - 3xy).(-y^2)$
l) $(2x^2 - 3x^2).2x^2$
m) $(x^2 - 3y^2).5y$
n) $(x^2 - 3y^2).(-x^2)$
o) $(b^3 - a^2b^2).(-a^3)$

E31) Calcule e simplifique

a) $(a^3 + 2a^2b + 2ab^2).a^2$
b) $(a^3 + 2a^2b + 2ab^2).b^2$
c) $(4x^2 - 6xy - 9y^2).2x$
d) $(-x^2 + 2xy - y^2).(-y^2)$
e) $(3a^2b^2 - 4ab^3 + a^3b).5a^2b^2$
f) $(-a^3 - a^2b^2 - b^3).a^2$
g) $(-ax^2 + 3axy^2 - ay^4).(-3ay^2)$
h) $(x^{12} - x^{10}y^2 - x^3y^{10}).x^3y^2$
i) $(-2x^3 + 3x^2y^2 - 2xy^3).(-2x^2y^3)$
j) $(a^3x^2y^5 - a^2xy^4 - ay^3).a^7x^3y^5$
k) $(-2a^2b^2 - 3a^3).(-4a^2)$
l) $(-4a^2b^3 - 5a^2).(-2a^3)$
m) $(2x^3 - 3x^2 + 3x - 5).2x^2$
n) $(3x^4 - 4x^2 + 5x - 2).3x^3$
o) $(2a^2 - 5ab - 3b^2).5ab$

E32) Calcule e simplifique

a) $(2m - p)(4m - 3p)$
b) $(x - b)(x - c)$
c) $(5x - 3y)(5x - 3y)$
d) $(a - 7b)(a - 5b)$
e) $(a - 2b)(a + 3b)$
f) $(a^2 + ab + b^2)(a - b)$
g) $(a^2 - ab + b^2)(a + b)$
h) $(a + b + c)(a - c)$
i) $(a^2 - ab + b^2)(a^2 + b^2)$
j) $(x^3 - 3x^2 + 7)(x^2 - 3)$
k) $(a^2 - 3ab - b^2)(-a^2 + ab + 2b^2)$
l) $(3a^2b^2 + 2ab^3 - 5a^3b)(5a^2b^2 - ab^3)$
m) $(x^2 + 5x - 10)(2x^2 + 3x - 4)$
n) $(3x^2 - 2x^2 + x)(3x^2 - 2x + 1)$
o) $(x^3 + 2x^2y + 2xy^2)(x^2 - 2xy + y^2)$

E33) Calcule e simplifique

a) $(a^2 - 2ab + b^2)(a^2 + 2ab + b^2)$
b) $(ab + ac + cd)(ab - ac + cd)$
c) $(3x^2y^2 - 2x^3y)(x^2y^2 + 3y^4)$
d) $(x^2 + 2xy - y^2)(x^2 - 2xy + y^2)$
e) $(3x^2 + xy - y^2)(x^2 - 2xy - 3y^2)$
f) $(a^2 - 2ab - b^2)(b^2 - 2ab - a^2)$
g) $(a^2 + b^2 + c^2 - ac)(a^2 - b^2 - c^2)$
h) $(a^2 + 4abx - 4a^2b^2x^2)(a^2 - 4abx + 4a^2b^2x^2)$
i) $(3a^2 - 2abx + b^2x^2)(2a^2 + 3abx - 2b^2x)$
j) $(2x^3y + 4x^2y^2 - 8xy^3)(2xy^3 - 3x^2y^2 + 5x^3y)$

E34) Calcule e simplifique

a) $(2a^3 - a^2) \div a$
b) $(42a^5 - 6a^2) \div 6a$
c) $(21x^4 + 3x^2) \div 3x^2$
d) $(35m^2 - 7p^2) \div 7$
e) $(27x^5 - 45x^4) \div 9x^2$
f) $(24x^6 - 8x^3) \div (-8x^3)$
g) $(34x^3 - 51x^2) \div (17x)$
h) $(5x^5 - 10x^3) \div (-5x^3)$
i) $(-3a^2 - 6ac) \div (-3a)$
j) $(-5x^3 + x^2y) \div (-x^2)$
k) $(2a^5x^3 - 2a^4x^2) \div (2a^4x^2)$
l) $(-x^2y - x^2y^2) \div (-xy)$
m) $(9a - 12b + 3c) \div (-3)$
n) $(a^3b^2 - a^2b^5 - a^4b^2) \div (a^2b)$
o) $(3x^2 - 6x^2y - 9xy^2) \div 3x$

E35) Calcule e simplifique

a) $(x^2y^2 - x^3y - xy^3) \div xy$
b) $(a^3 - a^2b - ab^2) \div a$
c) $(a^2b - ab + ab^2) \div (-ab)$
d) $(xy - x^2y^2 + x^3y^3) \div (-xy)$
e) $(-x^6 - 2x^5 - x^4) \div (-x^4)$
f) $(a^2x - abx - acx) \div ax$
g) $(3x^5y^2 - 3x^4y^3 - 3x^2y^4) \div 3x^2y^2$
h) $(a^2b^2 - 2ab - 3ab^3) \div ab$
i) $(3a^3c^3 + 3a^2c - 3ac^2) \div 3ac$
j) $(3a^4b^2c - 9a^3bc^2 - 6a^2c^2) \div 3a^2c$

E36) Efetue as divisões, dê o quociente e o resto

a) $(x^2 + 15x + 56) \div (x + 7)$
b) $(x^2 - 15x + 56) \div (x - 7)$
c) $(x^2 + x - 56) \div (x - 7)$
d) $(x^2 - x - 56) \div (x + 7)$
e) $(2a^2 + 11a + 5) \div (2a + 1)$
f) $(6a^2 - 7a - 3) \div (2a - 3)$
g) $(4a^2 + 23a + 15) \div (4a + 3)$
h) $(x^4 + x^2 + 1) \div (x^2 + x + 1)$
i) $(x^8 + x^4 + 1) \div (x^4 - x^2 + 1)$
j) $(3a^2 - 4a - 4) \div (2 - a)$
k) $(a^3 + b^3 + c^3 - 3abc) \div (a + b + c)$
l) $(9x^3 - 3x^4 - 4x^2 + 1 + x) \div (1 + 2x - 3x^3)$
m) $(x^3 - 8x - 3) \div (x - 3)$
n) $(a^2 - 2ab + b^2) \div (a - b)$
o) $(x^2 - y^2 + 2yz - z^2) \div (x - y + z)$

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

E45) Sendo x e y positivos, simplifique $\frac{\sqrt{90x^4y}}{\sqrt{2x^5y^5}}$

(A) $\frac{3\sqrt{5}}{y^2}$ (B) $\frac{3\sqrt{5x}}{2xy^2}$ (C) $\frac{15}{xy^2}$ (D) $\frac{3\sqrt{x^5y^6}}{x^3y^5}$ (E) $\frac{3\sqrt{5x}}{xy^2}$

E46) Simplifique $\sqrt{\frac{-48r^{-3}s^{24}z}{-3r^{-9}s^{10}}}$

E47) Simplifique a expressão $\left(\frac{x^5}{y^2}\right)^2\left(\frac{y}{x^{-1}}\right)^5$ e dê a resposta sem usar expoente negativo.

(A) $\frac{x^{15}}{y}$ (B) $\frac{x^5}{y}$ (C) x^5y^2 (D) $x^{15}y$ (E) $\frac{1}{y}$

E48) Sabendo que $x + 2y = 0$, e que $x \neq 0$, calcule $\left(\frac{x}{y}\right)^{2014} + \left(\frac{y}{x}\right)^{-2014}$

(A) $\left(\frac{1}{2}\right)^{2028}$ (B) 2^{2015} (C) 2^{2028} (D) $\left(\frac{1}{2}\right)^{2015}$ (E) 1

E49) Encontre o quociente da divisão de $x^3 + 2x^2 - 3x + 4$ por $x^2 + x - 2$.

(A) $x + 1$ (B) $-2x + 8$ (C) $x - 1$ (D) $-5x + 1$ (E) Nenhuma das respostas

E50) Calcule $x - \{y - [z - (x - t)]\}$ sendo

$x = 2a^3 - 3a^2b + 4ab^2 + 5b^3$; $y = 7a^3 - 8a^2b - 9ab^2 + 3b^3$
$z = 3a^3 + 2a^2b - 4ab^2 - 5b^3$ e $t = -2a^3 + 3a^2b + 6ab^2 - 4b^3$

E51) Calcule $(1 + x).(1 + x^2).(1 + x^4).(1 + x^8)$

E52) CN 52 - Efetuar a multiplicação $(x^2-5x+9).(x+3)$

E53) CN 53 - Efetuar o produto $(x^2 + 2 - x).(x^2 - 1)$ dando a resposta ordenada segundo as potências decrescentes de x.

E54) Calcular o valor numérico da expressão

$\frac{a^2 - b}{2} + \frac{b^3 - a^4}{3} + 3a^2b$ para a= –1 e b =2.

E55) CN 58 - Calcule o resto da divisão de $x^3 - 3x^2 + 4$ por $(x - 2)$

E56) CN 59 - Classificar a expressão $\frac{x+3}{x^3 - 5x^2 + 2x + 4}$

Scanned by CamScanner

E57) CN 61 - Dividir $x^6 - x^4 - 2x^3 + x^2 + 2x - 1$ por $x^2 - 1$.

E58) CN 64 - Dê o quociente e o resto da divisão
$(3x^4 - 4x^2 + 3x - 7) \div (x^2 - 2x + 3)$

E59) Seja P(x) = $2x^4 - 5x^2 + 3x - 2$ e Q(x) = $x^2 - 3x + 1$. Se P(x) / Q(x) determina um quociente Q'(x) e um resto R(x), o valor de Q'(0) + R(1) é:

(A) 0 (B) 28 (C) 25 (D) 17 (E) 18

E60) Se P(x) = $2x^3 + 4x^2 - 7x - 5$, determine P(-3)

(A) –26 (B) 106 (C) –2 (D) –56

E61) Dê o grau do polinômio $2x^4y^6 - 6xy^8 + 3x^4y^7 - 2x^7y^5$

(A) 41 (B) 42 (C) 8 (D) 12

E62) Calcule o valor numérico de $5x^3 - 3y^2 - 8z$ para x = – 2 , y = 5 e z = – 6

(A) –108 (B) –12 (C) –67 (D) –163

E63) Simplifique, assumindo que x e y são números reais positivos e que m e n são racionais.

$$\left(\frac{x^{-3/m}y^{6/n}}{x^{-6/m}y^{9/n}}\right)^{-1/3}$$

(A) $x^{1/m}y^{1/n}$ (B) $\dfrac{y^{1/n}}{x^{1/m}}$ (C) $-\dfrac{1}{y^{1/n}x^{1/m}}$ (D) $\dfrac{1}{y^{1/n}x^{1/m}}$ (E) $\dfrac{1}{xy}$

E64) Encontre o quociente Q(x) e o resto R(x) da divisão de $x^3 - 4x^2 + x + 6$ por $x + 1$.

(A) Q(x) = $x^2 + 5x + 6$; R(x) = –1
(B) Q(x) = $x^2 - 3x + 2$; R(x) = 0
(C) Q(x) = $x^2 - 5x + 6$; R(x) = 0
(D) Q(x) = $x^2 + 4x + 5$; R(x) = –11
(E) Q(x) = $x^3 + 5x - 6$; R(x) = 2

E65) Simplifique a expressão $\left(\dfrac{x^{-\frac{3}{7}}}{y}\right)^3\left(\dfrac{y}{x^{-1}}\right)^4$

(A) $\dfrac{x^{-\frac{1}{7}}}{y}$ (B) $\dfrac{y^{-\frac{1}{7}}}{x}$ (C) $\dfrac{x^{-\frac{22}{7}}}{y}$ (D) $x^{\frac{19}{7}}y$ (E) $x^{\frac{1}{7}}y$

E66) Dê o resto da divisão de $x^3 + 2x - 1$ por $x - 1$

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4

Scanned by CamScanner

E67) Encontre o quociente e o resto da divisão de $2x^4 - 9x^2 - 5x + 3$ por $x + 1$.

(A) Quociente = $2x^2 - 11x + 6$ Resto = –3
(B) Quociente = $2x^2 - 7x - 12$ Resto = –9
(C) Quociente = $2x^3 - 11x^2 + 6x - 3$ Resto = 0
(D) Quociente = $2x^3 - 2x^2 - 7x + 2$ Resto = 1
(E) Quociente = $2x^3 + 2x^2 - 7x - 12$ Resto = –9

E68) Encontre o resto da divisão de $2x^{2010} - 3x^{67} + 7x - 5$ por $x + 1$.

(A) –7 (B) 5 (C) 3 (D) –2 (E) 0

E69) Qual é o resto da divisão de $x^{89} - 2x^{50} + 1$ por $x + 1$?

(A) 2 (B) 4 (C) –2 (D) 3 (E) 5

E70) Multiplique $(2x + 3)(x^2 - 2)$

(A) $2x^3 + 3x^2 - 4x - 6$ (B) $2x^3 - 6$
(C) $x^2 + 2x + 1$ (D) $2x^3 + x^2 - 4x - 6$
(E) Nenhuma das acima

E71) Simplifique a expressão $\left(\frac{a^{-2}}{2bc^{-3}}\right)^{-2}$

(A) $-\frac{2ba^4}{c^6}$ (B) $\frac{4a^4b^2}{c^6}$ (C) $-\frac{c^3}{a^2b}$ (D) $\frac{c^6}{4a^4b^2}$ (E) Nenhuma das acima

E72) Use o teorema do resto para determinar o resto da divisão do polinômio $3x^{99} - 2x^{25} + 5x + 1$ por $x - 1$.

(A) –5 (B) –3 (C) 1 (D) 5 (E) 7

E73) Dê o quociente da divisão $\frac{3x^3 + x^2 - 5x + 1}{x - 1}$

(A) $3x^2 + 4x - 1$ (B) $3x^3 + 4x^2 - x$ (C) $3x^2 - 2x - 3$
(D) $3x^2 - 2x + 3$ (E) Nenhuma dessas

E74) Calcule o resto da divisão de $2x^5 - 4x^3 + x^2 - 3x + 2$ por $x + 1$.

(A) –2 (B) 8 (C) 12 (D) –8 (E) Nenhuma dessas

E75) Dê o resto da divisão de $x^{25} + 10x^{12} - 7x^5 + 3$ por $x + 1$.

(A) 7 (B) 3 (C) 1 (D) –1 (E) 19

E76) Calcule: $(x^3 - 9x^2 + 15x + 3) / (x - 7)$

(A) $x^2 - 2x + 2 + 12/(x - 7)$ (B) $x^2 - 2x + 3 + 9/(x - 7)$
(C) $x^2 - 2x + 1 + 10/(x - 7)$ (D) $x^2 - 2x - 1 + 9/(x - 7)$

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

(E) não pode ser determinado com as informações dadas

E89) Qual das seguintes funções não é uma função polinomial?

(A) $f(x)=\frac{2x^3}{5}-2x^7$ (B) $f(x)=\sqrt{\frac{2}{5}}x^3-2x^7$

(C) $f(x)=\sqrt{\frac{2x^3}{5}}-2x^7$ (D) $f(x)=2x^3$ (E) $f(x)=2x^3-2x^7$

E90) Se $-2x+1$ é um fator de $-6x^3+11x^2-2x+k$, encontre o valor de 2k.

(A) –9 (B) 9 (C) –6 (D) –3 (E) –2

E91) Encontre o quociente Q(x) e o resto R(x) quando o polinômio $2x^3-3x^2+4x+3$ é dividido por $x+1/2$.

(A) $Q(x) = 2x^2-4x+6$, $R(x)=6$
(B) $Q(x) = 2x^2-2x+5$, $R(x)=-1/2$
(C) $Q(x) = 2x^2+4x+2$, $R(x)=2$
(D) $Q(x) = 2x^2-3x+4$, $R(x)=6$
(E) $Q(x) = 2x^2-4x+6$, $R(x)=0$

E92) Dado que $h(x) = -2^{x+1}+1$, calcule $h(0)+h(-2)$

(A) 1 (B) –1/2 (C) 1/2 (D) 2 (E) 1/4

E93) Calcule o valor numérico da seguinte expressão para m = 2:

$$\frac{m^2(4-2m)-(4m-m^2)2m}{m^4}$$

(A) 0 (B) 1 (C) –1 (D) –2 (E) 2

E94) Se a = 1, b = 2 e c = 3, o possível valor da expressão $\left(a^{b^c}-c^{b^a}\right)^{1/3}$ é:

(A) –4 (B) –3 (C) –2 (D) 1 (E) 0

E95) Qual expressão deve ser adicionada a x^2-6x+5 para que resulte no quadrado de (x – 3)?

(A) 3x (B) 4x (C) 3 (D) 4 (E) 3x + 4x

E96) Dividindo-se x^2+1 por $x-1$, encontramos:

(A) $\frac{x^2}{x-1}-1$ (B) $x-1+\frac{2}{x-1}$ (C) $\frac{x^2+1}{x}-1$ (D) $x+1+\frac{2}{x-1}$ (E) $x+1-\frac{2}{x-1}$

E97) CEFET 98

Calcule o valor de $E=\frac{a\cdot b^{-2}\cdot\left(a^{-1}b^2\right)^4\cdot\left(ab^{-1}\right)^2}{a^{-2}\cdot b\cdot\left(a^{-2}b^{-1}\right)^{-2}\cdot\left(a^{-1}b\right)^{-4}}$, sendo a = 3 e b = 2.

E98) Encontre o quociente e o resto de $\frac{x^4-3x^2+9}{x-1}$

Scanned by CamScanner

E99) Simplifique a expressão $\dfrac{\left(2^n.3^n\right)^{\sqrt{4n^2}}}{\left[2\left(4+\left(23^n\right)\left(23^{-n}\right)-4\right)\right]^{3n^2}}$

E100) Qual das seguintes expressões não representa a área da figura ao lado?



(A) $(3x^2 + 2x) + (21x + 14)$
(B) $(3x + 2)(x + 7)$
(C) $(3x^2 + 7) + (2x + 14)$
(D) $3x(x + 7) + 2(x + 7)$
(E) $x(3x) + x(2) + 7(3x) + 7(2)$

E101) Qual é o maior coeficiente da expressão $\left(x^2+\dfrac{2x^{21}}{x^{19}}\right)^5-\left(3x^3\right)\left(4x^4\right)+\left(11x\right)^2$ depois de simplificada?

(A) 10 (B) 12 (C) 32 (D) 121 (E) 243

E102) Qual das expressões abaixo é equivalente a $(a^{-1} + b^{-1})^{-1}$?

(A) $\dfrac{a+b}{ab}$ (B) $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}$ (C) $\dfrac{ab}{a+b}$ (D) $a+b$ (E) ab

E103) Multiplique: $\left(2x^{a-1}-3y^{b+5}\right)\left(2x^{2a-3}-3y^{4-b}\right)$

E104) Ao dividirmos $2x^4 - 3x^3 + 5x^2 - 9$ por $x^2 - 2x + 1$, o resto será

(A) $9x - 14$ (B) $2x^2 + x + 5$ (C) $x^2 - 2x + 1$ (D) $x - 10$ (E) -5

E105) Simplifique a expressão $\dfrac{x^3y^{-2}}{\left(x^{-2}y^3\right)^{-2}}$

(A) $\dfrac{1}{xy^4}$ (B) $\dfrac{y^4}{x}$ (C) $\dfrac{x}{y^4}$ (D) $\dfrac{x^7}{y^3}$ (E) $\dfrac{x^7}{y^4}$

E106) Dê o quociente da divisão de $x^3 + 2x^2 - 3x + 4$ por $x^2 + x - 2$.

(A) $x + 1$ (B) $-2x + 8$ (C) $x - 1$ (D) $-5x + 3$ (E) NRA

E107) Simplificar $\sqrt{4x^8}$

(A) $16x$ (B) $2x^4$ (C) $4x^4$ (D) $16x^2$ (E) $8x^2$

E108) Dê o quociente e o resto da divisão de $(2x^4 - 9x^2 - 5x + 3)$ por $(x + 1)$.

(A) Quociente: $2x^2 - 11x + 6$; Resto: -3
(B) Quociente: $2x^2 - 7x - 12$; Resto: -9
(C) Quociente: $2x^3 - 11x^2 + 6x - 3$; Resto: 0

Scanned by CamScanner

(D) Quociente: $2x^3 - 2x^2 - 7x + 2$; Resto: 1
(E) Quociente: 2x3 + 2x2 – 7x – 12; Resto: –9

E109) Qual das seguintes expressões é um fator de $\mathbf{x^3 + x^2 - 17x + 15}$?

(A) x – 5 (B) x – 3 (C) x + 1 (D) x + 2 (E) x + 3

E110) Calcule o quociente $\dfrac{3x^3 + x^2 - 5x + 1}{x - 1}$

(A) $3x^2 + 4x - 1$ (B) $3x^3 + 4x^2 - x$ (C) $3x^2 - 2x - 3$ (D) $3x^2 - 2x + 3$ (E) NRA

E111) Simplifique $\dfrac{a^{-1} + b^{-1}}{(a+b)^{-1}}$

E112) Sendo a = 6 e b = 2, calcule $\sqrt{a} \times \sqrt[3]{(a-b)^2} \times \dfrac{1}{\sqrt[4]{a^2}} \times \sqrt{a-b}$

E113) Se a, b, c e d são números reais, então quando as expressões **(a + b).(c + d)** e **ac + bd** são iguais?

(A) nunca (B) sempre (C) quando a = 0 (D) quando ac+bd = 0 (E) quando ad+bc = 0.

E114) Encontre o resto da divisão de $x^3 - 3x^2 - x - 1$ por $x^2 - 2$

E115) Se $3^{x+y} = 81$ e $3^{x-y} = 3$, calcule x e y.

E116) Se $f(x) = x^2 - 3x + 4x^0 - 5x^{-2} + x^{-3}$, calcule f(1/2)

E117) Qual é o resto da divisão de $2x^3 + 11x^2 - 31x + 20$ por 2x – 3?

(A) 0 (B) 5 (C) 10 (D) –3 (E) 11

E118) Encontre o resto da divisão de $x^5 - 3$ por x + 1

(A) –4 (B) –3 (C) 0 (D) 2 (E) NRA

E119) Quanto vale x, sabendo que $2^x = -1$?

(A) 0 (B) –1/2 (C) 1/2 (D) –1 (E) NRA

E120) Simplifique $\dfrac{16x^4y^{-2}z^{10}}{2x^{-1}y^4z^5}$

E121) Encontre o resto da divisão de $\mathbf{2x^4 - 3x^2 + x + x^3 - 10}$ por x – 2.

E122) Determine o resto da divisão de $x^3 + x + 1$ por $x^2 + x + 1$.

E123) Determine o resto da divisão de $\mathbf{x^3 + x^2 + x + 1}$ por x – 2.

E124) Qual das expressões abaixo é um fator de $x^7 - 53x^3 + 27x^2 + 25$?

(A) (x – 1) (B) (x – 5) (C) (x + 5) (D) (x + 1) (E) (x + 2)

E125) Encontre o quociente da divisão de $\mathbf{39 + 8x^3 - 4x}$ por 2x + 3

Scanned by CamScanner

E126) Determine o resto da divisão de $x^3 + 2x^2 - 5x + 30$ por $x + 3$.

E127) Encontre **k** para que $x - 2$ seja um fator de $P(x) = x^3 - 4x2 + kx + 2$.

E128) Calcule $\left(x^{x}\right)^{\left(x^{x}\right)}$ para x = 2.

(A) 16 (B) 64 (C) 256 (D) 1024 (E) 65.536

E129) CN 76 - O resto da divisão de $x^3 - x^2 + 1$ por $x - 2$ é:

(A) 4 (B) 5 (C) 3 (D) –2 (E) –5

E130) CN 78 - O menor número inteiro que se deve somar ao polinômio $x^3 + x - 1$ para que o resto de sua divisão por $x + 3$ seja um número par positivo é:

(A) 33 (B) 31 (C) 39 (D) –1 (E) 29

E131) EPCAr 2002 - O resto da divisão do polinômio $P(x) = x^4 - 2x^3 + 2x^2 - x + 1$ por (x + 1) é um número:

(A) ímpar menor que 5
(B) par menor que 6
(C) primo maior que 5
(D) primo menor que 7

CONTINUA NO VOLUME 2: 80 QUESTÕES DE CONCURSOS

Soluções dos exercícios

E1)

a) $2x + 3a - 4ax + 11$
b) $24x - 15y$
c) $4x + 6y + 5z + 6xyz$
d) $7x^2 + 5y^2 + 2xy - 8x - 10y$
e) $4x^2 - 5xy + x - 2y$
f) $-5y^3 + 5xy^2 - x^2 + 5xy - 3x$
g) $8m^2n + 8p^2q + 2mp + 4nq$
h) $5x^2 + 2y^2 + 10x - 9y - 12$
i) $5xyz - 4xz + 9zy + 3xy$
j) $-3x^2 - 13xy - 3y$
k) $a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
l) $2x^2 + 9xy - 3y^2 + 8x - 7y + 22$
m) $5x^2 + 2xy + -3x^3 + 6x + 6y$
n) $8a^2b + 3a^2 - 4b^2 + 3b^2a + 4ba$
o) $-2x^2y^3 - x^2y^2 + 4xy - 3x^3y^2$
p) $4ab + 2a^2 - 2b^2 + 2a^2b + 2ab^2$
q) $8x^2 - 3x^3 - 8x + 8$
r) $-5x^2y + 5xy + -3xy^2 + 10$
s) $7ab + -a^2b + 8ab^2 - 4a^2 - 3b^2$
t) $10x^2 + 5y^2 + 6x - 6y - 10$

E2)

a) 20 c) 2 e) 14/15 g) –16 i) 6 k) 6/5 m) –19 o) –2 q) 0 s) –71
b) –1 d) 23 f) 35 h) 7 j) 4 l) 12 n) 16 p) 0 r) 0 t) 30

E3)

A classificação depende apenas da parte literal, não é afetada pela parte numérica

a) RI c) I e) RI g) RF i) I k) RI m) RI o) RF q) RF s) RI
b) RI d) RF f) RF h) RF j) RF l) RF n) I p) RF r) RF t) RI

E4)

a) 3º c) 6º e) 3º g) 5º i) 5º k) 2º m) 2º H o) 2º C q) 2º s) 2º C
b) 5º d) 3º H f) 5º h) 9º j) 4º l) 4º n) 4º p) 3º r) 3º t) 2º H

Scanned by CamScanner

E5)

a) $x^5 + 0x^4 + 0x^3 + 0x^2 + 0x + 18$
b) $x^4 + 0x^3 + 0x^2 + 2x + 0$
c) $2x^6 + 0x^5 + 3x^4 + 0x^3 - 4x^2 + 0x + 0$
d) $4x^6 + 0x5 + 3x4 + 0x3 + 0x2 + 2x + 3$
e) $0a^2 + 0b^2 + 3ab + 2a + 4b + 5$
f) $5x^3 + 0x^2 + 3x + 2$
g) $x^5 + 3x^4 + 0x^3 + 0x^2 - 2x + 5$
h) $x^7 + 0x^6 + 0x^5 + 0x^4 + 0x^3 + 0x^2 + 0x + 7$
i) $4a^2 + 4b^2 + 0ab + 0a + 0b + 4$
j) $y^4 + 0y^3 + 2y^2 + 0y + 1$
k) $3x^2 + 2y^2 + 0xy + 4x + 3y + 6$
l) $x^2 + 2y^2 + 6xy + 0x + 0y + 0$
m) $2x^4 + 0x^3 + 3x^2 - 4x + 0$
n) $x^4 + 0x^3 + 0x^2 + x + 0$
o) $6x^5 + 2x^4 + 0x^3 + 4x^2 + 0x + 7$
p) $3x^5 - 3x^4 - 2x^3 + 0x^2 + 0x + 9$
q) $4x^3 + 0x^2 + 6x - 8$
r) $0a^2 + b^2 + 3ab + 0a + 0b + 6$
s) $-x^5 + 0x^4 + x^3 + 0x^2 + 0x + 0$
t) $-2x^4 + 0x^3 + 2x^2 + 0x + 2$

E6)

a) $9x$ c) $-2x^2$ e) $-2x^2$ g) $9xy$ i) $2x+2y$ k) $-8xy$ m) $-2abc$ o) $7a-5b$ q) $7b+13$ s) $-3abc$
b) $11y$ d) $5x^3$ f) ab h) $5x+13$ j) $5a+5b+2$ l) $-3z^2$ n) $9x^2y$ p) $9xyz$ r) $-10x^2$ t) $-2x$

E7)

a) $15x^3y^5z^2$ c) $-2x^8$ e) $6a^3b^2c^2$ g) $18x^2y$ i) $-6a^4b^3c$ k) $12x^2y^3$ m) $12a^6b^5$ o) $8x^3$ q) $42x^5y^4$ s) $60x^2y^2z^3$
b) $6a^4b^6x$ d) $-8x^2y$ f) $-2a^4bc$ h) $-15a^3b^4$ j) $24x^5yz$ l) $\sqrt{2}\,x^5y$ n) $16x^2y^2$ p) $30xyz$ r) $24a^8b^6$ t) $-30x^2y^2z^2$

E8)

a) $32x^{10}$ c) $49x^{10}$ e) $-125x^3$ g) $64a^6c^6$ i) $-x^{21}$ k) $64y^6$ m) $16x^{12}$ o) $5x^8$ q) $81x^4y^8$ s) $-1/(8x^6)$
b) $-64x^9$ d) $81x^8$ f) $4a^2b^6$ h) $9x^4$ j) $16x^8y^{12}$ l) $-27a^3x^6$ n) $-64x^6$ p) $-32x^5$ r) $1/(4x^{12})$ t) $125x^6$

E9)

a) $2xy^2$ c) $-(3/4)xy$ e) $-12xy/5$ g) $-3bc^2$ i) $-6yz/5$ k) $-(2/5)y^3$ m) $16x$ o) $-14xy$ q) $8x^2y^3z^6/3$ s) $-x^2y^3z^6/16$
b) $-2xy$ d) $-1/(5x)$ f) $-4x^2y/3$ h) $-12xy^2/5$ j) $-4x^2z$ l) $-20yz^2$ n) $xyz/6$ p) $-18xyz^2$ r) $-32xyz^2$ t) $4x^2y^2$

E10)

a) $x^3/2y^2$ c) $-3/(abc)$ e) $-2x/y$ g) $9c/(2ab)$ i) $-12yz/x$ k) $-4y^2/x^2$ m) $11/(yz)$ o) $-9x/(2y)$ q) $-9y^3z^6/x$ s) $-y^3z^6/(2x)$
b) $5y^2/(3xz)$ d) $-2y^3/(3z^3)$ f) $8y/x^3$ h) $-4xy^2$ j) $-8x/y$ l) $20yz^2/x$ n) $-6/(xy)$ p) $-8xz^2/y$ r) $-500xy^4/z$ t) $-2x^5y/z^2$

E11)

a) $2x^3 - 6xy^2$
b) $3abx - 6aby - 3abz^2$
c) $-3x^2 + 3x + 15$
d) $6a^2b+4ab^2+2a^2b^2+12ab$
e) $-5x^3 + 5xy^2 - 20x^2 + 25x$
f) $5a^2 - 5b^2$
g) $-3a^2 + b^2$
h) $-a^2 + b^2$
i) $-a^2 + b^2$
j) $-3x^3 + 2x^2 - 5x + 8$
k) $3xy-18x^2y-6x^3y-9xy^3$
l) $-6x + 8y - 4xy - 6$
m) $6a^2b + 4ab^3 - 8a^2b^2$
n) $8x^3yz+12x^2y^2z-16x^2yz^2$
o) $2x^3y + 2xy^3 - 4x^2y^2$
p) $x^4y + 2x^3y + 5xy$
q) $8a3b3c - 12a^3b^2c^4$
r) $2x^3y^2 + 4x^2y^3 + 16xy^2$
s) $4x^3y^4 + 12x^2y^5$
t) $x^5y + 2x^3y^3 + x^4y + x^3y^2$

E12)

a) $2x(x + 3y)$
b) $a(x^2 - 2xy + y^2)$
c) $2xy(2 - xy + 3x^2y^2)$
d) $2c^4(2a^2b^3 - 4b^3c^2 - 5a^3c)$
e) $a^2(x^2 - 3x + 5)$
f) $2m(2x - x^2 + 3m)$
g) $25ab(ab - 5b + 15a)$
h) $4x^3(x^4 + 5x^2 + 2)$
i) $3a^2b^2x^2(bx - 3 + 4b^2x^3)$
j) $5abc(a + 3b + 5ac)$
k) $4(2a^2b^2c^4 - a^3c^3 + 3b^4c^3 + 4a^3b^2)$
l) $2m(2xy - x + 3y + 5m)$
m) $5a^2b^2c^2(-a + 2bc^2 + 3a^3b)$
n) $xy(x^3 + 3x^2y^2 + x^4 + x^2y)$
o) $2a^3b^2c^2(4b - c^3)$
p) $xy(x^3 + 4x^2 + 6)$
q) $2xy(x^2 + y^3 - 4x^2y)$
r) $6xy(1 - 4x - x^2 - 2y^3)$
s) $4ab(2a - b + ab - 3)$
t) $x^4(3x^2 + 2x^4 + 7x - 3)$

E13)

a) $-x^4 + 6x^3 + 6x^2 - 25x$
b) $2x^3 - 3x^2 + 24x - 12$
c) $-x^5 + 2x^4 + 4x^3 + 4x^2 - 6$
d) $-x^4 + x^2 + 3x + 5$
e) $-2x^6 + 6x^5 - 4x^4 - 4x^3 - x^2 + 6x + 13$
k) $(2x^7 - 4x^6 - 2x^4 + 5x^2 + 5) + (2x^5 - 2x^7 + 4x^3 - 2x^6 - 2x^4)$
l) $(5x^5 - 4x^7 - 2x^6 - 3x^4 - 5) + (2x^5 + 3x^3 - 2x^6 + 2x - 3x^4)$
m) $(6 - 3x + 4x^4 + 2x^5) + (2x^5 - 2x^7 - 3x^6 + 4x - 2x^4 - 3)$
n) $(2x^2 + 7x^4 + 3x^5 + 4x^6) + (2x^5 - 4x^7 + 2x^3 - 6^6 + 2x^2 - 4)$
o) $-5x^7 - 2x^6 + 12x^5 + 2x^4 + 3x^3 + 4x^2 - 5x - 7$

Scanned by CamScanner

f) $6x^5 + x^4 - 3x$
g) $-4x^5 - 5x^4 + 4x^2 + 7x + 1$
h) $9x^4 + 4x^3 + 2x^2 - 13x + 5$
i) $2x^6 - x^5 - 4x^4 - 4x^3 - 2x^2 + 11x - 7$
j) $2x^5 + 8x^4 + x^3 + 4x^2 + 5$
p) $x^7 - 5x^5 - 3x^4 + 6x^3 + 2x^2 + 3x + 9$
q) $-6x^7 - 3x^6 + 5x^5 - 2x^4 - 4x^3 + 5x^2 + 8x + 7$
r) $-5x^7 - 8x^6 + 2x^4 - x^3 + 2x - 8$
s) $-5x^6 - 4x^4 + 4x^3 + x^2 + 5x - 1$
t) $-7x^7 - 2x^6 + 3x^5 - 5x^4 + 12x - 6$

E14)
a) $-3x^4 + 2x^3 + 6x^2 + 5x$
b) $-3x^3 + 4x^2 + 4x - 11$
c) $2x^6 - 3x^4 + 2x^3 + 2x^2 - 6x$
d) $x^6 + 4x^4 + 4x^3 - 5x^2 + x + 15$
e) $2x^7 - 3x^6 + 4x^4 - 5x^3 + 4x + 3$
f) $5x^7 - 5x^5 + 5x^4 - 6x^3 - 11x^2 + 9$
g) $5x^7 + 2x^6 - 3x^5 + 3x^4 - 2x^3 + 4x^2 + 4$
h) $-4x^7 + 3x^6 - 4x^5 + x^4 - 3x^3 - 2x - 15$
i) $10x^7 + x^6 - 3x^5 + 4x^4 - 6x^3 + 3x^2 + 4$
j) $-2x^4 + 3x^3 + 3x^2 + 4x - 2$
k) $-2x^7 + 7x^6 + 4x^5 - 3x^4 - 3x^2 + x + 5$
l) $3x^7 + 4x^6 - 4x^3 - 5x^2 + x + 15$
m) $x^7 + 2x^6 + 2x^5 - 2x^4 + 3x^3 - 2x^2 + 7$
n) $3x^7 + 3x^6 + 10x^4 - 8x + 9$
o) $-4x^7 + 3x^6 - 3x^5 - 2x^3 - 4x - 5$
p) $2x^5 - 2x^4 - 10x^3 + 4x^2 + 6x - 6$
q) $2x^6 - 6x^5 + 4x^4 - 4x^3 - 2x^2 - 16$
r) $x^5 - 5x^4 - 7x^2 - 6x + 9$
s) $x^5 - 8x^4 + 11x^2 - 3x - 11$
t) $-2x^6 + x^5 + 3x^3 - x^2 - 4x - 2$

E15)
a) $x^3 + 4x^2 + 10x + 7$
b) $x^3 - x + 8$
c) $x^4 - 5x^3 + 13x^2 - 17x + 12$
d) $-4x^8 - 20x^7 - 10x^6 - 20x^5 - 16x^4$
e) $2x^6 - 8x^5 + 6x^4 + 4x^2 - 15x + 3$
f) $6x^8 - 6x^7 - 16x^6 + 8x^5 - 14x - 28$
g) $-12x^7 + 4x^6 + 30x^5 - 34x^4 + 8x^3 - 30x + 10$
h) $-7x^8 - 21x^7 + 5x^6 + 13x^5 - 6x^4 + 6x^2 + 18x$
i) $-3x^6 + 7x^5 + 20x^4 - 4x^3 + 16x^2$
j)) $-4x^5 - 2x^4 + 2x^3 + 10x - 5$
k) $6x^4 - 10x^3 - 6x^2 + 36x$
l) $-6x^5 + 18x^3 - 12x^2 + 9x - 9$
m) $-9x^7 - 6x^5 + 6x^4 + 15x^3 - 5x^2 + 10x - 6$
n) $-4x^6 + 2x^5 + 2x^4 - 3x^3 + 3x^2 + 2x - 2$
o) $2x^6 + 3x^5 - 2x^4 - 8x^3 + 5x^2 + 5x - 5$
p) $2x^6 + 10x^5 + 12x^4 - 3x^3 - 7x^2 + 6x$
q) $-2x^8 - 9x^7 - 6x^6 + 7x^5 - 6x^4 - 3x - 9$
r) $x^9 + 2x^8 + 2x^7 - 7x^6 - 13x^5 - 4x^4 - 7x^2$
s) $-x^8 - 2x^7 - x^6 - 2x^4 + x^3 + 2x^2 - 2x - 8$
t) $-4x^7 - 6x^6 + 2x^4 + x^3 + x^2 + 8x + 3$

E16)
a) $Q = 9x, R = 10$
b) $Q = 1/3, R = 3x + 6$
c) $Q = -2/3, R = 6x + 7$
d) $Q = -2x + 8, R = 6x^2 - 9x$
e) $Q = 8x - 1, R = 20x + 52$
f) $Q = -4, R = 25x^2 - 15x$
g) $Q = -x^4 - 8x^2 + 3, R = 12x - 18$
h) $Q = -7x^5 + 13x^3 + 5, R = 0$
i) $Q = x^4 + 3x^2 + 1, R = 0$
j) $Q = -5x^3 - x^2 + x - 8, R = 6x^3$
k) $Q = 2x^3 + 4x^2 - 5, R = 0$
l) $Q = -3x^4 - x^2 - 2, R = 0$
m) $Q = -x^5 - 4x^2 - x + 8, R = 15$
n) $Q = x^5 + x^2 - 2x, R = 6$
o) $Q = 4x^6 - x^4 - 5x, R = 12$
p) $Q = -4x^6 + 2x^4 + 4x^2 - 2x, R = -15$
q) $Q = x^4/4 - x^3/2 + 3x^2/4 - 3x/4, R = 2x$
r) $Q = -x^6/4 - 3x^5/4 + 3x^4/4 - x^3 + 3x^2/2, R = 0$
s) $Q = -x^2 - x/3 - 1, R = -3x$
t) $Q = -x^6/3 - x^5/2 + x^4/6 - x^3/6 + 5/6, R = -3$

E17)
a) $Q = x, R = 2$
b) $Q = -x + 3, R = -5$
c) $Q = x + 5, R = 10$
d) $Q = 2x - 3, R = 20$
e) $Q = x - 7, R = 45$
f) $Q = x^2 - x + 3, R = -9$
g) $Q = x^2 + 4x + 12, R = 29$
h) $Q = 2x^2 - 10x + 50, R = -251$
i) $Q = 3x - 2, R = 10$
j) $Q = x, R = -5$
k) $Q = 2x^2 + 4x + 13, R = 28$
l) $Q = x^3 + x^2 + x + 1, R = 0$
m) $Q = x^3 - 3x^2 + 13x - 51, R = 205x - 204$
n) $Q = x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 4x + 5, R = -6$
o) $Q = 3x^2 - 12x + 52, R = -208$
p) $Q = 2x^4 - 5x^3 + 5x^2 + x - 11, R = 11$
q) $Q = -2x^3 + 6x^2 - 10, R = 10$
r) $Q = -2x^5 - 4x^4 - 8x^3 + 20x^2 + 38x + 79, R = 165$
s) $Q = -2x^6 + 4x^5 - 8x^4 + 12x^3 - 22x^2 + 44x - 88, R = 170$
t) $Q = -7x^5 - 14x^4 - 30x^3 - 60x^2 - 117x - 229, R = -463$

E18)
a) $x^2 - 6x + 9$
b) $x^3 - 9x^2 + 27x - 27$
c) $x^4 - 12x^3 + 54x^2 - 108x + 81$
f) $a^4 + 4ab + 4b^2$
g) $9x^2 - 12xy + 4y^2$
h) $4m^2 + 12m + 9$
k) $x^4 + 2x^3 - x^2 - 2x + 1$
l) $4x^2 + 12xy^2 + 9y^4$
m) $1 - 6x^2 + 9x^4$
p) $4x^4 + 9x^2 + 25 + 12x^3 - 20x^2 - 30x$
q) $a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$
r) $4a^2 + 9b^2 + 16c^2 + 12ab + 16ac + 24bc$

Scanned by CamScanner

d) $x^2 + 2xy + y^2$
e) $x^2 - 2xy + y^2$
i) $9m^2 - 6mk + k^2$
j) $x^4 - 19x^2 + 81$
n) $x^4 + 2x^2y^2 + y^4$
o) $x^2 + 2x\sqrt{2} + 2$
s) $x^3 + 3x^2 + 3x + 1$
t) $x^3 - 3x^2 + 3x - 1$

E19)
a) $-x^4 + 4x^3 - 6x^2 + 4x - 17$
b) $5x^2 + x - 40$
c) $2x^2 - 5x + 7$
d) $x^2 - 2xy + y^2 - 3x + 3y + 5$
e) $x^2 - 2x + 2$
f) $3a + 5$
g) $x^3 + x^2 - x + 2$
h) $x^2 + x - 1$
i) $-x^2 - 4x + 6$
j) $4ab$
k) $3x^2 + 12x + 14$
l) $x^3 + 5x^2 + 12x + 12$
m) $-3x^2 + 13x - 8$
n) $-8x$
o) $10(a + b)^2 = 10a^2 + 20ab + 10b^2$
p) $4(x + 1)^2 + 6(x - 1)^2 = 10x^2 - 4x + 10$
q) $12x$
r) $x^2 + 2x + 1$
s) $x^2 + 3x + 3$
t) $4x + 10$

E20)
a) $-x^2 - 2x - 1$
b) $4a^2b - 5ab^2 + 5b^3$
c) $9ab^2 + 4a^2b$
d) $7x^2 + 4xy - y$
e) $16a^5x^3y$
f) $3a^3/7 + 5 + 26ab^2/3 + 4a^2/21$
g) $-2a^3 + a^2b$
h) $-2b + 4c$
i) $6x^{2m-n}$
j) j) $125a^6b^{3m}c^{3p}$

E21)
a) $-10x^2$
b) $28x^2$
c) a^3b^4
d) $28x^3y^4z$
e)$12x^6y^7z^3$
f) $24a^4b^4$
g) $63x^2y^2$
h) $3a^6b^3c^4$
i) $10a^7b^{10}c^5$
j) $-30a^2b^3c^4$
k) $21x^6y^7$
l)$-30a^4b^7c^5x^5$
m) $12x^8y^5z^5$
n) $48a^5m^4x^6$
o) $24x^7y^9z^7$

E22)
a) –65
b) –13
c) 56
d) –8
e) –19
f) 0
g) –34
h) 24
i) –48
j) 22
k) –48
l) –70
m) 0
n) –18
o) 45

E23)
a) x^4
b) $8x^3$
c) $7x$
d) $-6x^2$
e) $4x^4$
f) $17x$
g) $-4x$
h) $x^2y/4$
i) $4x^3y$
j) $5x^3/y$
k) $3y^2$
l) $-4a^3b^2$
m) $12xy^2$
n) $3x^2y/5$
o) $3xy$

E24)
a) $-ab^2c^3d^5$
b) $2xyz/3$
c) $5a^2b^5c$
d) $-xyz^2w^4$
e) $4am^2n^4$
f) $3yz^3$
g) $-4c$
h) $2n^2$
i) $3pr^2$
j) $-13agt$
k) $1/abc$
l) $3/(2xy^3z^3)$
m) $2/(mnp)$
n) $-a/(3b^2)$
o)$-q^2/(3mgt)$

E25)
a) $2a^2 + 2b^2$
b) $9a^2 - 2a + 6$
c) $6x - 2z$
d) $4x + 4y + 4z$
e) $2b + 2c$
f) $4a + 4c$
g) $3a^2 + 5a - 2$
h) $8ab + 3ac$
i) $9x^3 - 3x$
j) $5x^2 - 2y^2 + 3xy$

E26)
a) $-2b^2$
b) $a^3 + 3a^2 + 6a + 2$
c) $6m^3+4m^2+7m+2$
d) $2x^3-2x^2+4x+y$
e) $7x^3 + 7x^2 + 2$
f) $a^3 + 3a^2b - ab^2$
g) $3a^3-a^2b-2ab^2+b^3$
h)$5x^3+3x^2y+5xy^2+13$
i) $-3x^3 - 4y^3 - x^2y - 4xy^2$
j) $3c^3 - d^3 + c^2d + cd^2$

E27)
a) $a^3 - 5a^2 - a + 4$
b) $-ax^4$
c) $a - b + c$
d) $2a - 2b + 6c$
e) $2x - 3y + 8z$
f) $x + 4y + 5z$
g) $2ac + 2bc$
h) $2ab+ac+4bc-2bd$
i) $x^3 + 3x^2 + 2x - 8$
j) $x^3 - 7x^2 + 4x$

E28)
a) $-7b^3 + 8c^3 - 18abc + 7c^2$
b) $3x^2 + x - 2$
c) $a^3 + 3b^3 + 4c^3 - 6abc$
d) $x^4 + 2x^3 - 4x^2 + 7x - 5$
e) $-x^5 - x^3 - x^2 - 2x$
f) $-2b^3 + 4a^2b - 2ab^2$
g) $ab^2 + 2a^3b^3 - 2b^4$
h) $-x^3 - 11x^2y - 2y^3 + 4xy^2 - 3x^2 - 5y^2$
i) $3a^2b - 3ab^2$
j) $-2c^2 - 2ab + 2bc + 2ac$

Scanned by CamScanner

E29)

a) $5a + 2b - 2$
b) $x + 2a$
c) $13x - 15y + 3z$
d) $2a + b - 4c$
e) $5a + 2b - 4c$
f) $3x - 5y + z$
g) $3a - b$
h) $2x + 3y + 2z$
i) $-8x + y$
j) $6x - 3z$

E30)

a) $ab + ac$
b) $a^2b^2c + a^2bc^2 - ab^2c^2$
c) $4x^2 + 28x$
d) $6x^2 - 9xy$
e) $12xy + 6y^2$
f) $6a - 6a^2$
g) $bx - 3b^2$
h) $-6a^3 + 9a^2b$
i) $10x^2z + 15xz^2$
j) $4a^3b - 20a^2b^2$
k) $-x^2y^2 + 3xy^3$
l) $-2x^4$
m) $5x^2y - 15y^3$
n) $-x^4 + 3x^2y^2$
o) $-a^3b^3 + a^5b^2$

E31)

a) $a^5 + 2a^4b + 2a^3b^2$
b) $a^3b^2 + 2a^2b^3 + 2ab^4$
c) $8x^3 - 12x^2y - 18xy^2$
d) $x^2y^2 - 2xy^3 + y^4$
e) $15a^4b^4 - 20a^3b^5 + 5a^5b^3$
f) $-a^5 - a^4b^2 - a^2b^3$
g) $3a^2y^4 - 9a^2xy^4 + 3a^2y^6$
h) $x^{15}y^2 - x^{13}y^4 - x^6y^{12}$
i) $4x^5y^3 - 6x^4y^5 + 4x^3y^6$
j) $a^{10}x^5y^{10} - a^9x^4y^9 - a^8x^3y^3$
k) $8a^4b^2 + 12a^5$
l) $8a^5b^3 + 10a^5$
m) $4x^5 - 6x^4 + 6x^3 - 10x^2$
n) $9x^7 - 12x^5 + 15x^4 - 6x^3$
o) $10a^3b - 25a^2b^2 - 15ab^3$

E32)

a) $8m^2 - 10mp + 3p^2$
b) $x^2 - bx - cx + bc$
c) $25x^2 - 30xy + 9y^2$
d) $a^2 - 12ab + 35b^2$
e) $a^2 + ab - 6b^2$
f) $a^3 - b^3$
g) $a^3 + b^3$
h) $a^2 + ab - bc - c^2$
i) $a^4 + b^4 + 2a^2b^2 - a^3b - ab^3$
j) $x^5 - 3x^4 - 3x^3 + 16x^2 - 21$
k) $-a^4 + 4a^3b - 7ab^3 - 2b^4$
l) $20a^4b^5 + 7a^3b^6 - 25a^5b^4 - 2a^2b^7$
m) $2x^4 + 13x^3 + 9x^2 - 50x + 40$
n) $3x^4 + 5x^3 + 3x^2 + x$
o) $x^5 + 2x^4y - x^3y^2 - 4x^2y^3 + 2xy^4$

E33)

a) $a^4 - 2a^2b^2 + b^4$
b) $a^2b^2 + c^2d^2 + 2abcd - a^2c^2$
c) $3x^4y^4 + 9x^2y^6 - 2x^5y^3 - 6x^3y^5$
d) $x^4 - 2x^2y^2 + y^4$
e) $3x^4 - 5x^3y - 12x^2y^2 - xy^3 + 3y^4$
f) $-a^4 + b^4 + 4a^2b^2 - 4ab^3$
g) $a^4 - b^4 - c^4 - 2b^2c^2 + ac^3 - a^3c + ab^2c$
h) $a^4 - 16a^2b^2x^2 + 32a^3b^3x^3 - 16a^4b^4x^4$
i) $6a^4 + 5a^3bx - 6a^2b^2x - 4a^2b^2x^2 + 3ab^3x^3 + 4ab^3x - 2b^4x^3$
j) $14x^4y^3 + 32x^3y^5 - 48x^4y^4 + 10x^6y^2 - 16x^2y^6$

E34)

a) $2a^2 - a$
b) $7a^4 - a$
c) $7x^2 + 1$
d) $5m^2 - p^2$
e) $3x^3 - 5x^2$
f) $-3x^3 + 1$
g) $2x^2 - 3x$
h) $-x^2 + 2$
i) $a + 2c$
j) $5x - y$
k) $ax - 1$
l) $x + xy$
m) $-3a + 4b - c$
n) $ab - b^4 - a^2b$
o) $x - 2xy - 3y^2$

E35)

a) $xy - x^2 - y^2$
b) $a^2 - ab - b^2$
c) $-a + 1 - b$
d) $-1 + xy + x^2y^2$
e) $x^2 + 2x + 1$
f) $a - b - c$
g) $x^3 - x^2y - y^2$
h) $ab - 2 - 3b^2$
i) $a^2c^2 + a - c$
j) $a^2b^2 - 3abc - 2c$

E36)

a) $Q = x + 8, R = 0$
b) $Q = x - 8, R = 0$
c) $Q = x + 8, R = 0$
d) $Q = x - 8, R = 0$
e) $Q = a + 5, R = 0$
f) $Q = 3a + 1, R = 0$
g) $Q = a + 5, R = 0$
h) $Q = x^2 - x + 1, R = 0$
i) $Q = x^4 + x^2 + 1, R = 0$
j) $Q = -3a - 2, R = 0$
k) $Q = a^2 - ab - ac - bc + b^2 + c^2, R = 0$
l) $Q = x - 3, R = -6x^2 + 6x + 2$
m) $Q = x^2 + 3x + 1, R = 0$
n) $Q = a - b, R = 0$
o) $Q = x + y - z, R = 0$

E37)

a) $x + 5a + 9$
b) $5a + 4b + 7d - 12$
c) $-f + 8m - 6x - 3d - 8$
d) $-7a - 17b + 8c - 19d + 3e + 2f$
e) $27a - 14b$
f) $-15a + 8b - c$
g) $7a - 5b$
h) $3a^2 + a^2b + 2ab^2 - 7b^3$
i) $8a^4 - 5a^3b + 36a^2b^2 - 9ab^3 + b^4$

Scanned by CamScanner

E38) 4 E39) a^4b E40) (A) E41) (A) E42) (D)

E43) (D)

E44) a) $9x^2 - 36x + 35$ b) $8x^2 + 26x + 15$ c) $4x^2 + 12x + 9$

E45) (E) E46) $4r^3s^7\sqrt{z}$ E47) (D) E48) (B)

E49) (A) E50) $-2a^3 + 7a^2b - ab^2 - 4b^3$

E51) $x^{15} + x^{14} + x^{13} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^9 + x^8 + x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$

E52) $x^3 - 2x^2 - 6x + 27$ E53) $x^4 - x^3 + x^2 + x - 2$ E54) 47/6

E55) 0 E56) Expressão algébrica racional fracionária

E57) $Q = x^4 - 2x + 1$, $R = 0$ E58) $Q = 3x^2 + 6x - 1$, $R = -17x - 4$

E59) (B) E60) (C) E61) (12) E62) (C) E63) (B)

E64) (C) E65) (D) E66) (C) E67) (D) E68) (A)

E69) (C) E70) (A) E71) (B) E72) (E) E73) (A)

E74) (B) E75 (E) E76) (C) E77) (C) E78) (B)

E79) (B) E80) (B) E81) (C) E82) (C) E83) (A)

E84) (C) E85) (A) E86) (C) E87) (C)

E88) (B)
Solução:
Todos os termos de P(x) terão o sinal invertido, quando trocamos –5 por 5 (e vice-versa). Se P(–5) vale 17, os três termos em x, x^5 e x^9 têm soma 14 para $x = -5$. Se fizermos $x = 5$, esta soma passará a ser –14. Somando 3, teremos que $P(5) = -14 + 3 = -11$.

E89) (C)

E90) (A)
OBS: Dizer que $Q(x) = -2x + 1$ é um fator de $P(x) = -6x^3 + 11x^2 - 2x + k$ é o mesmo que dizer que o resto da divisão de $-6x^3 + 11x^2 - 2x + k$ por $-2x + 1$ vale 0. Para encontrar de forma rápida o resto da divisão por $-2x + 1 = -2(x - 1/2)$, usamos o teorema do resto, calculando P(–1/2) e igualamos a zero.

E91) (E) E92) (B) E93) (C) E94) (C) E95) (D)

E96) (D)

E97) Solução:

Calcule o valor de $E = \dfrac{a \cdot b^{-2} \cdot \left(a^{-1}b^2\right)^4 \cdot \left(ab^{-1}\right)^2}{a^{-2} \cdot b \cdot \left(a^{-2}b^{-1}\right)^{-2} \cdot \left(a^{-1}b\right)^{-4}}$, sendo a = 3 e b = 2.

Scanned by CamScanner

Solução: Devemos simplificar a expressão para depois calcular o valor numérico. Como todo os fatores a e b estão operados apenas por multiplicações, divisões e potências, podemos operar com os expoentes:
Expoente de **a** no numerador: $1 - 4 + 2 = -1$
Expoente de **a** no denominador: $-2 + 4 + 4 = 6$
Expoente de **b** no numerador: $-2 + 8 - 2 = 4$
Expoente de **b** no denominador: $1 + 2 - 4 = -1$
Ficamos então com: $\frac{a^{-1}b^4}{a^6b^{-1}} = \frac{b^5}{a^7}$
Fazendo a=3 e b=2 ficamos com $2^5/3^7$ = **32/2187**

E98) Q = $x^3 + x^2 - 2x - 2$, R = 7 E99) $\left(\frac{9}{2}\right)^{n^2}$, se n>0 E100) (C)

E101) (A) E102) (C) E103) $4x^{3a-4} - 6x^{a-1}y^{4-b} - 6x^{2a-3}y^{b+5} + 9y^9$

E104) (A) E105) (B) E106) (A) E107) (B) E108) (D)

E109) (B) E110) (A) E111) $\frac{(a+b)^2}{ab}$

E112) 4. Simplifique antes de atribuir os valores de a e b.

E113) (E) E114) (x – 7) E115) x = 5/2 e y = 3/2 E116) –37/4

E117) (B) E118) (A) E119) (E) E120) $\frac{8x^5z^5}{y^6}$ E121) 20

E122) x + 2 E123) 15 E124) (A) E125) $4x^2 - 6x + 7$ E126) 36

E127) P(2) tem que ser 0, ou seja, tem que deixar resto 0 na divisão por x – 2.
P(2) = 0 ➔ k = –3

E128) (B) E129) (B) E130) (A) E131) (C) = 7

Scanned by CamScanner

Capítulo 4

Produtos notáveis

Para ganhar tempo

A maioria dos alunos conhece bem a tabuada. Se aparecer uma expressão como 7x12, saberão calcular rapidamente a resposta: 84. Por outro lado, se aparecer o número 84 no numerador de uma fração, é extremamente útil saber que pode ser dividido por 7, ou por 14, ou por 12:

$84 = 7 \times 12$
$84 = 14 \times 6$
$84 = 12 \times 7$

Ao ver em uma expressão, o número 84 no numerador e o número 35 no denominador, o aluno lembrará imediatamente que ambos podem ser divididos por 7, e simplificará a expressão com facilidade:

$$\frac{84}{11} \times \frac{19}{35} = \frac{12}{11} \times \frac{19}{5}$$

O aluno que não vê imediatamente que 84 e 35 são divisíveis por 7, vai perder mais tempo testando a divisibilidade.

Ocorre exatamente a mesma coisa com as expressões algébricas. Certas expressões aparecem com muita frequência, e se soubermos o resultado memorizado, ganharemos bastante tempo.

Certas expressões algébricas simples, que aparecem com muita frequência, são chamadas *produtos notáveis*, e devem ser memorizadas. Vejamos quais são essas expressões e seus exemplos:

$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

Nesta fórmula e nas fórmulas seguintes, as variáveis a e b representam expressões algébricas quaisquer. Por exemplo, se tivermos a=x e b=5, a expressão fica:

$(x+5)^2 = x^2 + 10x + 25$ (observe que $2.x.5 = 10x$ e $5^2 = 25$).

Isso é uma fórmula que precisa ser memorizada. A melhor forma de memorizar fórmulas é entender como são obtidas. Calculemos o valor de $(a+b)^2$ sem usar fórmulas memorizadas, até chegar à expressão final. Elevar um valor ao quadrado é a mesma coisa que multiplicar o valor por ele mesmo. Ficamos então com:

Scanned by CamScanner

$(a+b)^2 = (a+b).(a+b)$

Temos aqui dois binômios (a+b). É um caso particular da multiplicação de polinômios, já bastante exercitada no capítulo 3. Ficamos com:

$(a+b).(a+b) = a^2 + a.b + b.a + b^2$

Como a.b é a mesma coisa que b.a, a expressão resulta em:

$(a+b).(a+b) = a^2 + a.b + b.a + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$

Provamos assim que:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

Se ao invés de a e b tivermos outras letras, números ou expressões, a fórmula continua válida:

"O quadrado da soma é igual ao quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo".

Exemplos:
$(x+1)^2 = x^2 + 2x + 1$
$(x+2)^2 = x^2 + 4x + 4$
$(x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$
$(x+4)^2 = x^2 + 8x + 16$
$(2x+y)^2 = 4x^2 + 4xy + y^2$
$(2x+3y)^2 = 4x^2 + 12xy + 9y^2$
$(x+1/2)^2 = x^2 + x + 1/4$

Também é comum aplicar a fórmula no modo inverso, ou seja, dada uma expressão algébrica que é um quadrado perfeito, transformá-la no quadrado de um binômio. Para fazer isso, devemos:

1) Identificar entre os termos da expressão, dois quadrados perfeitos e encontrar a sua raiz quadrada positiva.

2) Verificar se o termo restante é igual a duas vezes o produto das raízes quadradas. Se for, a expressão original é igual ao quadrado da soma dessas raízes quadradas.

Exemplo:
Transformar a expressão $x^2 + 12x + 36$ no quadrado de um binômio.

A primeira coisa a fazer é localizar os dois quadrados perfeitos:

x^2 é o quadrado de x
36 é o quadrado de 6.

2.6.x = 12x, que é exatamente o outro termo da expressão. Então concluímos que:

$x^2 + 12x + 36 = (x+6)^2$

Scanned by CamScanner

Exemplo:
Verificar se a expressão $x^4 + 6x^2y^3 + 9y^6$ é o quadrado de um binômio

x^4 é o quadrado de x^2
$9y^6$ é o quadrado de $3y^3$

$2.x^2.3y^3 = 6x^2y^3$, que é exatamente o outro termo da expressão. Logo:

$x^4 + 6x^2y^3 + 9y^6 = (x^2 + 3y^2)^2$

Como vemos, é importante não apenas saber elevar um binômio ao quadrado, mas também, fazer a operação inversa: dada uma expressão, identificar qual é o binômio que, se elevado ao quadrado, resulta na expressão dada.

Exemplo:
A expressão $x^2 + 6x + 20$ é igual ao quadrado de um binômio, somado com um número. Determine qual é este binômio e qual é este número.

x^2 é o quadrado de x

Não conseguimos identificar o outro valor que está somado com x e elevado ao quadrado. Mas sabemos que o termo em x, que é 6x, é igual a 2 vezes o primeiro pelo segundo, ou seja:

$6x = 2.x.(\text{segundo})$

Sendo assim, o segundo valor só pode ser igual a 3, e o quadrado do segundo é 9. Podemos então escrever a expressão original (fazendo 20 = 9 + 11) como:

$x^2 + 6x + 9 + 11$

Concluímos então que a expressão original é igual a $(x+3)^2 + 11$.

Exemplo:
Escrever a expressão $x^2 + 10x + 40$ como a soma de um quadrado com um número.

Já vemos na expressão um quadrado perfeito, que é x^2, o quadrado de x. O termo do primeiro grau, 10x, é igual a 2 vezes o primeiro (x) vezes o segundo termo do binômio. Então:

$10x = 2.x.(\text{segundo})$ ➔ o segundo termo é 5.

Agora temos que fazer aparecer na expressão o quadrado de 5, que é 25. Para isso basta desmembrar 40 em 25 + 15:

$x^2 + 10x + 40 = x^2 + 10x + 25 + 15 = (x+5)^2 + 15$

Exemplo:
Escrever a expressão $x^2 + 8x + 3$ como a soma de um quadrado de um binômio, mais um valor fixo.

Encontramos na expressão um quadrado perfeito que é x^2, o quadrado de x. O termo 8x é igual a duas vezes o primeiro (x) pelo segundo. Então:

$8x = 2.x.(\text{segundo})$ ➔ o segundo número do binômio é 4

Scanned by CamScanner

Temos então que fazer aparecer na expressão o quadrado de 4, que é 16. Para isso escrevemos o outro termo, 3, como 16 – 13.

$$x^2 + 8x + 3 = x^2 + 8x + 16 - 13 = (x+4)^2 - 13$$

Para fazer surgir o termo "quadrado do segundo", ao invés de fazer 3 = 16 – 13, poderíamos também somar e subtrair 16. Somando e subtraindo valores iguais, o valor da expressão não se altera.

$$x^2 + 8x + 3 = x^2 + 8x + 3 + 16 - 16 = x^2 + 8x + 16 + 3 - 16 = (x+4)^2 - 13$$

Este método para "completar quadrados" somando e subtraindo um valor conveniente para fazer aparecer o valor desejado em uma expressão, sempre funciona.

Exemplo:
Exprimir $x^2 + 3x + 1$ como a soma de um quadrado perfeito mais uma constante

Já temos x^2, então o primeiro termo é x. Falta determinar a expressão "duas vezes o primeiro vezes o segundo". Como x é o primeiro termo do binômio que está elevado ao quadrado, o termo 2.primeiro.segundo é 2.x.segundo = 3x. Sendo assim, o segundo termo é 3/2. O quadrado do segundo é $(3/2)^2 = 9/4$. Algebricamente, o passo mais simples agora é somar e diminuir 9/4, ficando com"

$$x^2 + 3x + 9/4 + 1 - 9/4 = (x + 3/2)^2 + 1 - 9/4 = (x + 3/2)^2 - 5/4$$

Exemplo:
Exprimir $10^{2m} + 2.10^m$ como a soma de um quadrado perfeito com uma constante.
O termo 10^{2m} é um quadrado, pois podemos escrevê-lo como $(10^m)^2$. Sendo assim, 10^{2m} é o quadrado de 10^m, e o termo 2.10^m contém este termo elevado a 1. Podemos então formar o termo do meio 2.10^m.segundo = 2.10^m, portanto o segundo termo é 1. Para chegar ao quadrado de $(10^m + 1)^2 = 10^{2m} + 2.10^m$, vamos somar 1 e subtrair 1:

$$10^{2m} + 2.10^m = 10^{2m} + 2.10^m + 1 - 1 = (10^m + 1)^2 - 1$$

Exemplo:
Exprimir $x^4 + 6x^2 + 30$ como a soma de um quadrado perfeito e um valor constante.
Note que a expressão "quadrado perfeito" pode ser usada para números e também para expressões algébricas. No caso, uma expressão algébrica é chamada de "quadrado perfeito", quando é o quadrado perfeito de outra expressão algébrica. Esta expressão é usada apenas informalmente, pois a rigor, qualquer expressão algébrica positiva pode ser escrita como o quadrado de outra expressão algébrica, por exemplo, x + 2 é o quadrado de $\sqrt{x+2}$, desde que x + 2 não seja negativo. Sob este prisma, poderíamos responder que a expressão deste problema, $x^4 + 6x^2 + 30$ já é um "quadrado perfeito", o quadrado de $\sqrt{x^4+6x^2+30}$. Permitindo o uso de irracionais, qualquer valor não negativo é o quadrado de sua raiz quadrada.

O enunciado ficaria mais preciso se escrevêssemos como "o quadrado de uma expressão algébrica racional". Usualmente usamos o termo "quadrado perfeito" para expressões algébricas, quando as expressões algébricas envolvidas são todas racionais, ou seja, não existem raízes nessas expressões. Ainda assim, apesar de não usarmos a designação "perfeito", isto não muda o fato de que $x^4 + 6x^2 + 30$ continua sendo o quadrado de $\sqrt{x^4+6x^2+30}$.

Scanned by CamScanner

Vamos então procurar formar uma expressão da forma $a^2 + 2ab + b^2$ no nosso trinômio $x^4 + 6x^2 + 30$.

O termo candidato a ser o "quadrado do primeiro" é x^4, então o "primeiro" seria x^2. Isto não se deve ao fato do x^4 aparecer primeiro na expressão, mas ao fato de termos encontrado um valor (x^2) e seu quadrado (x^4).

Primeiro = x^2, quadrado do primeiro = x^4

Sendo assim, o termo do meio da expressão (2.a.b) seria:
$6x^2$ = 2.primeiro.segundo = 2.x^2.segundo

Portanto o segundo termo só pode ser 3. Para formar $(x^2 + 3)^2$, falta apenas aparecer o quadrado do segundo termo, que seria $3^2 = 9$. Vamos então somar e subtrair 9 na nossa expressão:

$$x^4 + 6x^2 + 30 = x^4 + 6x^2 + 9 + 30 - 9 = (x^2 + 3)^2 + 21$$

Exemplo: Exprimir $x + \sqrt{x}$ (x>0) como a soma de um quadrado, mais uma constante usando o menor número possível de radicais.

Uma solução para o problema seria $\left(\sqrt{x+\sqrt{x}}\right)^2 + 0$, porém esta não é a forma mais simples, podemos resolver o problema com um único radical. Como o termo x é o quadrado da sua raiz, vamos fazer:

Primeiro = $\sqrt{x}$
Quadrado do primeiro = x
Nesse caso, o termo 2.primeiro.segundo ficaria:
$\sqrt{x}$ = 2. $\sqrt{x}$ .segundo
segundo = 1/2

A expressão elevada ao quadrado seria $\sqrt{x} + \frac{1}{2}$. Seu quadrado é:

$$\left(\sqrt{x} + \frac{1}{2}\right)^2 = x + \sqrt{x} + \frac{1}{4}$$

Falta portanto adicionar e subtrair 1/4 para completar o quadrado:

$$x + \sqrt{x} = x + \sqrt{x} + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = \left(\sqrt{x} + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}$$

Obviamente, expressões como $x^2 + 6x + 9$ são muito fáceis, e a coisa fica feia quando aparecem frações e radicais.

Interpretação geométrica

A fórmula do quadrado da soma pode ser interpretada geometricamente, como o cálculo da área de um quadrado de lados iguais a (a+b). Por outro lado, a área desse mesmo quadrado pode ser calculada como a soma das áreas dos quatro quadriláteros da figura abaixo: 2 quadrados e dois retângulos. As duas situações são mostradas nas figuras abaixo.

Scanned by CamScanner





Ocorre que os dois quadrados têm áreas iguais a a^2 e b^2, e os dois retângulos são iguais, têm áreas iguais a a.b cada um. Sendo assim, a área do quadrado total é dada por $a^2 + 2ab + b^2$. Isso mostra que:

$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

OBS.: Várias fórmulas algébricas e geométricas podem ser demonstradas através de interpretações geométricas como neste exemplo.

Não confunda

É natural que muitos alunos, ao trabalharem pela primeira vez com letras, cometam alguns enganos baseados em idéias erradas. Por exemplo, muitos alunos pensam que $(a+b)^2$ é a mesma coisa que $a^2 + b^2$. Está completamente errado. Por exemplo, 10^2 é igual a 100. O número 10, por sua vez, pode ser escrito como uma soma de números positivos, de várias formas:

$10 = 1 + 9$
$10 = 2 + 8$
$10 = 3 + 7$
$10 = 4 + 6$
$10 = 5 + 5$

Considere agora somar os quadrados dessas parcelas:

$1^2 + 9^2 = 1 + 81 = 82$
$2^2 + 8^2 = 4 + 64 = 68$
$3^2 + 7^2 = 9 + 49 = 58$
$4^2 + 6^2 = 16 + 36 = 52$
$5^2 + 5^2 = 25 + 25 = 50$

São números que, somados resultam em 10, mas a soma dos seus quadrados não é a mesma coisa que o quadrado de 10 (ou seja, 100). Isto ocorre porque a operação de elevar ao quadrado não é distributiva em relação à adição. Nem sempre operações que fazemos em relação à multiplicação e adição podem ser feitas com outras operações, como é o caso da potência. Isso explica porque $(a+b)^2$ não é a mesma coisa que $a^2 + b^2$. No aprendizado da álgebra não devemos usar de forma indiscriminada as propriedades aprendidas para os números naturais, inteiros e racionais e as quatro operações básicas. É preciso aprender, uma a uma, quais propriedades podem ser usadas. E a potência, definitivamente, não tem as mesmas propriedades que a adição, e a multiplicação, em relação à distributividade.

Scanned by CamScanner

O único caso em que $(a+b)^2 = a^2 + b^2$, é quando a ou b valem zero.

A diferença entre $(a+b)^2$ e $a^2 + b^2$ também pode ser interpretada geometricamente.



A figura mostra um quadrado de lado igual a (a+b), sua área é portanto $(a+b)^2$. Estão também destacados na figura os quadrados de lados a e b, cujas áreas são a^2 e b^2. Vemos então que $a^2 + b^2$ (a soma das áreas dos dois quadrados destacados) é bem diferente de $(a+b)^2$ (a área do quadrado total).

Exercícios

E1) Calcule os seguintes quadrados usando a fórmula do quadrado da soma

a) $(x+1)^2$
b) $(x+3)^2$
c) $(2x+3)^2$
d) $(7+2x)^2$
e) $(x+6)^2$
f) $(x+5)^2$
g) $(x+10)^2$
h) $(2x+5)^2$
i) $(4x+y)^2$
j) $(x+3y)^2$
k) $(a+2b)^2$
l) $(3a+b)^2$
m) $(4x+3y)^2$
n) $(x^2+9)^2$
o) $(2a^2b+3ab^2)^2$
p) $(3ab+b^2)^2$
q) $(5ab+3a^2b^2)^2$
r) $(x^2+y^2)^2$
s) $(2x^2 + 3y^2)^2$
t) $(2x^3 + 5y^2)^2$

E2) Transforme cada expressão abaixo no quadrado de um binômio

a) $x^2 +4x +4$
b) $x^2 +6x +9$
c) $x^2 +10x +25$
d) $x^2 +2x +1$
e) $x^2 +12x +36$
f) $a^2 + 6ab + 9b^2$
g) $9x^2 + 24xy + 16y^2$
h) $4x^2 + 4x + 1$
i) $9y^2 + 6y + 1$
j) $4k^2 + 12k + 9$
k) $x^2 + 10x + 25$
l) $x^2 + 20x + 100$
m) $16a^2 + 8a + 1$
n) $4x^2 + 12xy + 9y^2$
o) $100m^2 + 60m + 9$
p) $b^2 + 6b + 9$
q) $x^4 + 6x^2 + 9$
r) $x^4 + 2x^3 + x^2$
s) $x^{2y} + 4x^y + 4$
t) $10000 + 200x + x^2$

E3) Escrever cada expressão abaixo como a soma do quadrado de um binômio, mais um valor constante.

a) $x^2 + 10x + 16$
b) $x^2 + 6x + 1$
c) $x^2 + 10x + 10$
d) $z^2 + 4z$
e) $x^2 + 6x + 8$
f) $m^2 + 8m$
g) $x^2 + x + 1$
h) $x^2 + 3x$
i) $4m^2 + 7m$
j) $k^6 + k^3$
k) $x^2 + 5x + 1$
l) $x^{10} + 10x^5$
m) $t^2 + t$
n) $x^2 + 12x + 100$
o) $x^4 + 2x^2 + 10$
p) $x + x^{1/2} + 1$, $x>0$
q) $x^y + 2x^{y/2}$, $x>0$ e $y>0$
r) $10^{2n} + 6.10^n + 10$
s) $5^{2m} - 4.5^m + 1$
t) $z^2 + z^4 + 1$

$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

Este é um outro produto notável que aparece com muita frequência:

"O quadrado de uma diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo."

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

A fórmula pode ser demonstrada facilmente, como já fizemos para o quadrado de a+b, exceto que agora teremos a–b:

$(a-b)^2 = (a-b).(a-b) = a^2 - ab - ba + b^2 = a^2 - 2ab + b^2$

Scanned by CamScanner

Uma outra forma mais fácil para deduzir esta fórmula é partir da fórmula do quadrado da soma e trocar b por (–b). Podemos fazer isso porque na verdade a e b podem ser qualquer expressão. Escrevendo a–b coma a + (–b) ficamos com uma soma e podemos aplicar a fórmula já conhecida:

$$[a + (-b)]^2 = a^2 + 2.a.(-b) + (-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

Exemplos:

$(x-1)^2 = x^2 - 2x + 1$
$(x-2)^2 = x^2 - 4x + 4$
$(x-3)^2 = x^2 - 6x + 9$
$(x-4)^2 = x^2 - 8x + 16$
$(2x-y)^2 = 4x^2 - 4xy + y^2$
$(2x-3y)^2 = 4x^2 - 12xy + 9y^2$
$(x-1/2)^2 = x^2 - x + 1/4$

Exercícios

E4) Calcule os seguintes quadrados usando a fórmula do quadrado da soma

a) $(x - 2)^2$
b) $(x - 4)^2$
c) $(2x - 5)^2$
d) $(7 - 3x)^2$
e) $(x - 7)^2$
f) $(x - 9)^2$
g) $(x - 12)^2$
h) $(3x - 7)^2$
i) $(2x - y)^2$
j) $(x - 6y)^2$
k) $(a - 5b)^2$
l) $(7a - b)^2$
m) $(5x - 2y)^2$
n) $(x^2 - 8)^2$
o) $(3a^2b - 4ab^2)^2$
p) $(5ab - b^2)^2$
q) $(3ab - 5a^2b^2)^2$
r) $(x^2 - y^2)^2$
s) $(3x^2 - 7y^2)^2$
t) $(5x^3 - 3y^2)^2$

Outro tipo de problema muito comum é reconhecer um quadrado perfeito em uma expressão algébrica. Muitas vezes isso não é um problema independente, mas uma etapa a ser usada na resolução de problemas maiores, por exemplo, na resolução de equações. Vemos que o quadrado de um binômio (seja adição ou subtração) é uma expressão com três termos (trinômio), na qual dois deles são quadrados perfeitos e com o mesmo sinal, ou seja, devem aparecer o quadrado de um primeiro termo e o quadrado de um segundo termo. Se o outro termo for igual a duas vezes o primeiro pelo segundo, então é a expressão é o quadrado de uma soma, se existir um sinal trocado, então é o quadrado de uma diferença.

Exemplo:

Verificar se a expressão $x^2 - 6x + 9$ é um quadrado perfeito.

Se for um quadrado perfeito, a expressão deverá ser o quadrado de um binômio. Temos que identificar inicialmente, dois termos que sejam quadrados perfeitos:

x^2 é o quadrado de x
9 é o quadrado de 3

$2.x.6 = 6x$, que é exatamente o outro termo, porém com sinal trocado. Então a expressão é o quadrado da diferença:

$$x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2$$

Observe que $(3 - x)^2$ é a mesma coisa que $(x - 3)^2$. Por quê? Sabemos que quando elevamos um número ao quadrado, não importa se o seu sinal é positivo ou negativo, por exemplo, 5^2 é a mesma coisa que $(-5)^2$. Sendo assim, $(3 - x)$ é a mesma coisa que $(x - 3)$ com o sinal trocado (é preciso trocar todos os sinais). Logo, se elevarmos a o quadrado, o resultado será o mesmo. Isso também pode ser visto através da fórmula:

Scanned by CamScanner

$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

$(b-a)^2 = b^2 - 2ba + a^2$

Vemos então que as duas expressões acima são iguais. O exercício que acabamos de exemplificar tem então duas respostas:

$x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2 = (3 - x)^2$

Apenas por questão de convenção, tradicionalmente escolhemos $(x - 3)^2$ para que o binômio fique ordenado e com o primeiro termo positivo. Mas nada impede que seja dada a resposta $(3 - x)^2$.

Exemplo:
Verificar se a expressão $4a^2x^2 - 12ax^3 + 9x^4$ é um quadrado perfeito.

Vemos que a expressão tem dois quadrados perfeitos:

$4a^2x^2$ é o quadrado de $2ax$.
$9x^4$ é o quadrado de $3x^2$.

Multiplicando duas vezes o primeiro pelo segundo, ficamos com:

$2.2ax.3x^2 = 12ax^3$, que é exatamente o outro termo, porém com sinal negativo. Então a expressão é o quadrado da diferença

$4a^2x^2 - 12ax^3 + 9x^4 = (2ax - 3ax^2)^2$

Exemplo:
Verificar se a expressão $10x - 25 - x^2$ pode ser expressa a partir de um quadrado perfeito.
Este exemplo é um pouco diferente. Temos dois quadrados perfeitos: x^2 e 25, porém ambos aparecem com sinais negativos. Vamos então colocar -1 em evidência para que a expressão entre parênteses fique com dois quadrados perfeitos com sinais positivos.

$10x - 25 - x^2 = -(x^2 - 10x + 25)$

É claro que ao colocarmos -1 em evidência, todos os sinais da expressão que ficará entre parênteses serão trocados, e o termo $10x$ aparecerá como $-10x$. Analisando agora a expressão entre parênteses:

x^2 é o quadrado de x
25 é o quadrado de 5
$2.x.5 = 10x$, que é exatamente o outro termo, porém com sinal trocado. Então

$x^2 - 10x + 25 = (x - 5)^2$

Não podemos esquecer que esta expressão está dentro de um par de parênteses que tem um sinal negativo na frente:

$10x - 25 - x^2 = -(x^2 - 10x + 25) = -(x - 5)^2$

Scanned by CamScanner

Exemplo:
Escrever a expressão $x^2 - 20x + 50$ como a soma de um quadrado de um binômio mais um valor constante.

Já fizemos exercícios como este quando estudamos o quadrado da soma. O roteiro é:

1) Identificar um termo que seja quadrado perfeito
2) Identificar um termo que possa ser "duas vezes o primeiro pelo segundo"
3) Fazer aparecer um valor numérico que seja o quadrado do segundo

No nosso exemplo a expressão é $x^2 - 20x + 50$. Identificamos o termo x^2 que é um quadrado.

1) x^2 é o quadrado de x.
2) 2.x."segundo" = $-20x$, então o "segundo" é 10 e a expressão terá o quadrado de uma diferença, que é $(x - 10)^2 = x^2 - 10x + 100$.
3) Como a expressão original é $x^2 - 10x + 50$, transformamos em $x^2 - 10x + 100 - 50$.

Então:
$x^2 - 20x + 50 = x^2 - 10x + 100 - 50 = (x - 10)^2 - 50$

E5) Transforme cada expressão abaixo no quadrado de um binômio

a) $x^2 - 14x + 49$	f) $x^2 - 2x + 1$	k) $9x^2 - 24xy + 16y^2$	p) $x^4 + 2x^2 + 1$
b) $x^2 - 6x + 9$	g) $x^2 - 26x + 169$	l) $4t^2 + 28t + 49$	q) $k^6 - 6k^3 + 9$
c) $x^2 - 20x + 100$	h) $x^2 - 12x + 36$	m) $9c^2 + 30c + 25$	r) $10^{2n} - 2.10^n + 1$
d) $x^2 - 4x + 4$	i) $x^2 - 24x + 144$	n) $4m^2 - 4m + 1$	s) $1 + w + w^2/4$
e) $x^2 - 10x + 25$	j) $a^2 - 6ab + 9b^2$	o) $x^2 + x + 1/4$	t) $x^4 + x^2 + 1/4$

Interpretação geométrica

Expressões algébricas simples do segundo grau podem ser interpretadas geometricamente através de áreas de quadrados ou retângulos, nos quais os fatores do primeiro grau aparecem como lados. Já mostramos neste capítulo a interpretação geométrica da fórmula que dá $(a+b)^2$. Veremos agora uma interpretação para a fórmula de $(a - b)^2$. Para isso vamos construir um quadrado de lado (a – b) cuja área possa ser formada a partir de combinações de a^2, b^2 e ab, que são as áreas dos quadrados de lados a e b, e de retângulos de dimensões a e b.



Na figura ao lado temos um quadrado grande, de lado a, e um quadrado menor, de lado b. O quadrado médio tem lado igual a (a–b). Note que existem dois retângulos de lados b e (a – b), mas se cada um desses retângulos for juntado com o quadrado menor, ficarão dois retângulos de lados a e b.

Scanned by CamScanner



O quadrado médio, com lados iguais a (a – b), pode ser obtido da seguinte forma:

1) Partir do quadrado maior, de lado a, área a^2.
2) Subtrair um retângulo de lados a e b, com área a.b.
3) Adicionar o pequeno quadrado de lado b, área b^2.
4) Subtrair o outro retângulo de lados a e b, com área a.b.

A figura abaixo mostra essas etapas.



$a^2 - ab + b^2 - ab = (a - b)^2$

$a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$

Não confunda

Alguns alunos confundem $(a - b)^2$ com $a^2 - b^2$. Já explicamos quando apresentamos o quadrado da soma, que a potência (no caso, o quadrado) não pode ser distribuida entre as parcelas de uma adição, e nem de uma subtração. Veja por exemplo algumas formas de escrever o número 5 através de subtrações:

$5 = 6 - 1$
$5 = 7 - 2$
$5 = 8 - 3$
$5 = 9 - 4$
$5 = 10 - 5$

Se elevarmos as parcelas ao quadrado e calcularmos as diferenças, ficaremos com:

$6^2 - 1^2 = 36 - 1 = 35$
$7^2 - 2^2 = 49 - 4 = 45$
$8^2 - 3^2 = 64 - 9 = 55$
$9^2 - 4^2 = 81 - 16 = 65$
$10^2 - 5^2 = 100 - 25 = 75$

Esses exemplos ilustram o fato de que $(a - b)^2$ não é a mesma coisa que $a^2 - b^2$.

Scanned by CamScanner

$(a+b+c)^2$

Essa expressão pode aparecer na verdade de 8 formas diferentes:

$(a+b+c)^2$, $(a+b-c)^2$, $(a-b+c)^2$, $(a-b-c)^2$, $(-a+b+c)^2$, $(-a+b-c)^2$, $(-a-b+c)^2$ e $(-a-b-c)^2$.

Não é necessário memorizar todas elas, basta lembrar da primeira. Para as outras, simplesmente convertemos as subtrações em adições com os simétricos. Por exemplo:

$a + b - c = a + b + (-c)$

Então calculemos:

$(a+b+c)^2 = (a+b+c).(a+b+c) = a^2 + ab + ac + ba + b^2 + bc + ca + cb + c^2$

Note que existem termos semelhantes na expressão, que reduzidos, leva a:

$(a+b+c)^2 = a^2 + 2ab + 2ac + b^2 + 2bc + c^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + ac + bc)$

$$\boxed{(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + ac + bc)}$$

Portanto, o quadrado da soma de três termos algébricos é igual à soma dos quadrados dos termos, mas o dobro da soma dos três produtos entre os números, tomados dois a dois.

Exemplo:
$(x + 2y + 3z)^2 = x^2 + 4y^2 + 9z^2 + 2(2xy + 3xz + 6yz)$

A mesma fórmula pode ser adaptada para quando tivermos subtrações. Por exemplo, para aplicá-la a $(a - b - c)^2$, basta trocar b por -b e c por -c. Os termos ao quadrado não se alteram, apenas os termos dos produtos combinados. Ficamos então com:
$(a - b - c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2[a.(-b) + a.(-c) + (-b).(-c)] = a^2 + b^2 + c^2 + 2[-ab - ac + bc]$

Exercícios

E6) Calcule os seguintes quadrados usando a fórmula do quadrado da soma de 3 termos

a) $(x - y + 3)^2$
b) $(x + y - 2)^2$
c) $(4x + 3y - 5)^2$
d) $(2 + 4y - 3x)^2$
e) $(3x + 2y - 9)^2$
f) $(x + y - 5)^2$
g) $(x + z - 10)^2$
h) $(3x + 2y - 4)^2$
i) $(2x - 3y + 2)^2$
j) $(5x - 6y + 2z)^2$
k) $(2a - 5b + c)^2$
l) $(3a - 4b + 2c)^2$
m) $(4x - 5y - 3z)^2$
n) $(x^2 + y^2 - 8)^2$
o) $(2a^2b - 3ab^2 + 5ab)^2$
p) $(4ab - 2bc - c^2)^2$
q) $(2ab - 3ab^2 + 3a^2b^2)^2$
r) $(x^2 - y^2 + 4)^2$
s) $(5x^2 - 3y^2 + z^2)^2$
t) $(2x^3 - 4y^2 + 2z^2)^2$

$(a+b).(a-b) = a^2 - b^2$

Este é outro produto notável muito importante, que aparece com bastante frequência. É chamado de "diferença de quadrados", que é obtido quando multiplicamos uma soma de dois valores pela sua diferença.

A dedução da fórmula também é bem fácil:

$(a + b).(a - b) = a^2 - ab + ba - b^2$

Os termos -ab e +ba são simétricos e vão ser cancelados (sua soma dá zero), ficando somente a^2 e $-b^2$.

Scanned by CamScanner

$(a+b).(a-b) = a^2 - b^2$

Exemplos:
$(x+3).(x-3) = x^2 - 9$
$(x+5).(x-5) = x^2 - 25$
$(x+1).(x-1) = x^2 - 1$
$(x+a).(x-a) = x^2 - a^2$
$(3x+5y).(3x-5y) = 9x^2 - 25y^2$
$(1+x).(1-x) = 1 - x^2$
$(x^2 + 4)(x^2 - 4) = x^4 - 16$
$(x^4 + 10)(x^4 - 10) = x^8 - 100$
$(x^8 + a^8)(x^8 - a^8) = x^{16} - a^{16}$
$(x^3 + 1)(x^3 - 1) = x^6 - 1$

Assim como ocorre com os outros produtos notáveis, pode acontecer o problema inverso: identificar uma diferença de quadrados e representá-la como o produto de uma soma por uma diferença.

Exemplo:
Representar $x^2 - 100$ como um produto de binômios.

x^2 é o quadrado de x
100 é o quadrado de 10

Então $x^2 - 100 = (x+10).(x-10)$

Exemplo:



A figura ao lado mostra o lugar em que é encaixado, dentro de um computador, um tipo de processador chamado Pentium 4, muito comum entre 2000 e 2005, é portanto um chip bem antigo. O processador, não mostrado na figura, é o responsável pela execução dos programas.

O componente ao lado é chamado de *Soquete 478*, e possui vários furos com contatos metálicos onde é encaixado o processador. O processador, por sua vez, possui pinos metálicos que se encaixam exatamente nesses furos.

Usando a fórmula da diferença de quadrados, calcule, sem contar um a um, o número de contatos metálicos desse soquete.

Se contarmos os pinos um a um, vamos demorar muito tempo. Entretanto, contando apenas na largura e no comprimento, vemos que existe um quadrado maior, e dentro dele, um quadrado menor.

O quadrado menor tem 26 furos na largura e no comprimento.

Scanned by CamScanner

O quadrado menor tem 14 furos na largura e no comprimento.
No canto inferior esquerdo vemos que existem dois furos a menos.

Então o número total de furos é igual a:

$26^2 - 14^2 - 2$

Note que $26^2 - 14^2$ é uma diferença de quadrados, que pode ser escrita como a soma multiplicada pela diferença. Ficamos então com:

$(26 + 14).(26 - 14) - 2$

$= 40.12 - 2 = 480 - 2 = 478$

Então são ao todo, 478 contatos. Por isso este componente é chamado de Soquete 478. É claro que poderíamos fazer a conta cima elevando 26 ao quadrado e subtraindo 14 ao quadrado, mas transformando em produto de soma por diferença ficou bem mais fácil.

Exemplo: CMBH 2007
Seja N o número que se deve somar a 86115^2 para se obter 86116^2. A soma dos algarismos que compõem N é igual a:

(A) 20 (B) 18 (C) 16 (D) 14 (E) 13

Solução:
Este tipo de questão é bastante comum. À primeira vista á resposta é simples, basta calcular a diferença entre os dois valores dados:
$86115^2 + N = 86116^2$

$N = 86116^2 - 86115^2$

O problema é que o cálculo desses valores é bastante trabalhoso. Encontrar os quadrados desses números requer multiplicações trabalhosas, e é grande a chance de erro nas contas. Por outro lado, o cálculo fica simples quando lembramos que:

$x^2 - y^2 = (x + y).(x - y)$

Ou seja, não é necessário elevar os números ao quadrado, pois de acordo com este produto notável (diferença de quadrados), basta multiplicar a soma pela diferença entre esses valores:

$86116 - 86115 = 1$

$86116 + 86115 = 172231$

Sendo assim,

$N = 86116^2 - 86115^2 = (86116 + 86115).(86116 - 86115) = 172231.1 = 172231$

A soma dos algarismos de N é 16.

Resposta (C)

Scanned by CamScanner

É muito comum em provas, apresentar cálculos trabalhosos, com números com muitos algarismos ou muitas casas decimais, que ficam fáceis quando transformados em forma fatorada como em $x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$.

Exercícios

E7) Calcule os seguintes produtos

a) (x+8).(x–8)
b) (m + 1)(m – 1)
c) (x + 10)(x – 10)
d) (3x + 2y)(3x – 2y)
e) (4k + 1)(4k – 1)
f) (2a – 2b)(2a + 2b)
g) (x – 2a)(x + 2a)
h) $(x^2 - y^2)(x^2 + y^2)$
i) $(x^4 - y^4)(x^4 + y^4)$
j) $(x^8 + a^8)(x^8 - a^8)$
k) (xy + 2)(xy – 2)
l) $(x^5 + 1)(x^5 - 1)$
m) $(2ab+5ac^2)(2ab-5ac^2)$
n) (x + 2/3)(x – 2/3)
o) (x + 1/x)(x – 1/x)
p) (a + b + c)(a + b – c)
q) $\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)\left(\sqrt{x}-\sqrt{y}\right)$
r) $\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)$
s) $(1 - x^{10})(1+x^{10})$
t) 10001 x 9999

E8) Representar as seguintes expressões como o produto de uma soma por uma diferença.

a) $x^2 - 1$
b) $x^2 - a^2$
c) $4x^4 - 9x^2$
d) $9w^2 - 1$
e) $z^8 - z^4$
f) $1 - k^2$
g) $10000 - x^2$
h) $4m^2 - 16n^2$
i) $25a^2b^2 - 49x^4y^6$
j) $a^{64} - 1$
k) $x^6 - y^6$
l) $x^2 + 6x + 8$
m) $x^2 + 6x$
n) $x^4 - 4x^2$
o) $x^6 - 1/x^6$
p) $22^{88} - 88^{22}$
q) $a^{2m} - b^{2m}$
r) 999999
s) $a^2 + 2ab + b^2 - c^2$
t) $x^{16} - a^{16}$

Produto de Stevin: $(x+a).(x+b) = x^2 + Sx + P$

Este produto notável é conhecido como *Produto de Stevin*. As letras S e P representam a soma e o produto de a e b, respectivamente, ou seja, S = a+b e P = a.b. É uma fórmula muito útil que muitas vezes nos permite ganhar tempo no cálculo de expressões algébricas. Também permite a resolução de equações de segundo grau de cabeça, como veremos no capítulo 13.

Sua demonstração é muito simples:

$(x+a).(x+b) = x^2 + x.b + a.x + a.b$

Podemos colocar x em evidência nas expressões x.b e a.x, ficando com x.(a+b).

$$(x+a).(x+b) = x^2 + x.(a+b) + a.b$$

Podemos chamar a+b de S (soma) e a.b de P (produto), e ficamos com:

$$(x+a).(x+b) = x^2 + S.x + P$$

Exemplo:
$(x+2).(x+5) = x^2 + 7x + 10$

Veja que 7 é a soma de 2 e 5, e 10 é o produto de 2 e 5.

Exemplos:
$(x+1).(x+3) = x^2 + 4x + 3$
$(x+4).(x+7) = x^2 + 11x + 28$
$(x+2).(x+3) = x^2 + 5x + 6$
$(x+4).(x+5) = x^2 + 9x + 20$
$(x+2).(x+6) = x^2 + 8x + 12$

Scanned by CamScanner

A fórmula do Produto de Stevin também pode ser usada em expressões dos tipos $(x+a).(x-b)$, $(x-a).(x+b)$ e $(x-a).(x-b)$. Para isso, basta usar como S, a soma algébrica dos números que estão acompanhando x nos binômios, e ao calcular P, levar em conta os sinais que acompanham a e b.

Exemplo:
Calcular $(x+3).(x-1)$

Os números que acompanham x são 3 e –1. A soma algébrica desses números é 2, e o produto é –3. O produto fica então:

$x^2 + 2x - 3$

Exemplo:
Calcular $(x-4).(x-5)$

Os números que acompanham x são –4 e –5. Sua soma algébrica é –9 e seu produto é +20. O produto fica então:

$x^2 - 9x + 20$

Exemplos:
$(x-4).(x+3) = x^2 - x - 12$
$(x+4).(x-7) = x^2 - 3x - 28$
$(x-2).(x+3) = x^2 + x - 6$
$(x-4).(x-5) = x^2 - 9x + 20$
$(x+2).(x-6) = x^2 - 4x - 12$

Exercícios

E9) Calcule os seguintes produtos:

a) $(x+2).(x+7)$
b) $(x + 4)(x + 10)$
c) $(x + 5)(x + 8)$
d) $(x + 2)(x - 2)$
e) $(x + 1)(x + 9)$
f) $(x + 6)(x + 9)$
g) $(x + 5)(x + 7)$
h) $(x + 2)(x + 8)$
i) $(x + 4)(x + 9)$
j) $(x + 3)(x + 6)$
k) $(x + 3)(x + 8)$
l) $(x + 4)(x + 8)$
m) $(x + 8)(x + 7)$
n) $(x + 3)(x + 9)$
o) $(x + 6)(x + 7)$
p) $(x + 2a)(x + 3a)$
q) $(ax + b)(ax + 4b)$
r) $(x + 20)(x + 40)$
s) $(x + k)(x + m)$
t) $(x + 2z)(x + 3z)$

E10) Calcule os seguintes produtos:

a) $(x-2).(x-9)$
b) $(x - 8)(x - 5)$
c) $(x - 3)(x - 6)$
d) $(x - 5)(x - 9)$
e) $(x - 6)(x - 8)$
f) $(x - 5)(x - 7)$
g) $(x - 7)(x - 9)$
h) $(x - 8)(x - 2)$
i) $(x - 3)(x - 4)$
j) $(x - 10)(x - 12)$
k) $(x + 2)(x - 5)$
l) $(x - 3)(x + 4)$
m) $(x - 5)(x + 7)$
n) $(x - 4)(x + 7)$
o) $(x - 2)(x + 14)$
p) $(x + 3)(x - 7)$
q) $(x + 4)(x - 9)$
r) $(x + 5)(x - 9)$
s) $(x + 4)(x - 15)$
t) $(x + 8)(x - 12)$

Muitas vezes precisamos realizar a operação inversa, ou seja, dado um trinômio do segundo grau, identificar qual foram os binômios de primeiro grau que foram multiplicados.

Considere como exemplo o produto $(x+2).(x+3)$, que resulta em $x^2 + 5x + 6$. Se for dado este trinômio para ser transformado em um produto de binômios, devemos descobrir quais são os dois números que somados resultam em 5, e multiplicados resultam em 6. Na maioria das vezes é fácil descobrir. Nesse exemplo, os números são 2 e 3 (soma=5 e produto=6). Então:

$x^2 + 5x + 6 = (x+2).(x+3)$

Scanned by CamScanner

Exemplos:

$x^2 + 6x + 8$ → 2 e 4 → $(x+2).(x+4)$
$x^2 + 10x + 16$ → 2 e 8 → $(x+2).(x+8)$
$x^2 + 5x + 4$ → 1 e 4 → $(x+1).(x+4)$
$x^2 + 9x + 14$ → 2 e 7 → $(x+2).(x+7)$
$x^2 + 8x + 15$ → 3 e 5 → $(x+3).(x+5)$

Exercícios

E11) Transforme os seguintes trinômios em um produto de dois binômios do primeiro grau:

a) $x^2 + 7x + 6$
b) $x^2 + 8x + 15$
c) $x^2 + 10x + 21$
d) $x^2 + 7x + 12$
e) $x^2 + 6x + 5$
f) $x^2 + 9x + 18$
g) $x^2 + 9x + 14$
h) $x^2 + 10x + 24$
i) $x^2 + 12x + 35$
j) $x^2 + 8x + 12$
k) $x^2 + 13x + 36$
l) $x^2 + 6x + 8$
m) $x^2 + 12x + 27$
n) $x^2 + 15x + 56$
o) $x^2 + 16x + 60$
p) $x^2 + 13x + 40$
q) $x^2 + 12x + 11$
r) $x^2 + 20x + 75$
s) $x^2 + 17x + 70$
t) $x^2 + 12x + 20$

É fácil fazer isso quando todos os sinais positivos. Quando aparecem sinais negativos, temos um pouco mais de trabalho. Vejamos inicialmente o que acontece quando o termo em x é negativo e o termo numérico é positivo.

Exemplo:
Transformar $x^2 - 6x + 8$ em um produto de binômios do primeiro grau.

Como o termo numérico é positivo, significa que os números a e b da fórmula têm sinais iguais. Por outro lado, como o coeficiente de x é negativo, os dois números que acompanham x são negativos. Então este trinômio, sendo fatorado, ficará como $(x - a).(x - b)$. Então a e b são números cujo produto é 8 e cuja soma é 6. Esses números são 2 e 4. Então o trinômio convertido em produto ficará:

$$x^2 - 6x + 8 = (x - 2).(x - 4)$$

Pode ainda aparecer o caso em que o termo numérico é negativo. Nesse caso, os números que acompanham x são, um positivo e um negativo.

Exemplo:
Transformar $x^2 - 5x - 14$ em um produto de dois binômios de primeiro grau.

Os números que acompanham x nos binômios são, um positivo e um negativo, pois seu produto dá –14, que é negativo. Então a fórmula será do tipo $(x + a).(x - b)$. Nesse caso, o número 5 não é a soma, mas sim a diferença entre os números a e b da fórmula. Então temos que identificar dois números cuja diferença seja 5 e cujo produto seja 14. É fácil ver que os números são 7 e 2, mas temos que identificar ainda qual deles ficará com o sinal negativo e qual com o positivo. Descobrimos isso através do sinal do termo em x. Como esse termo é negativo (–5), significa que o de maior módulo será o negativo. Sendo assim, o 7 ficará com o sinal negativo e o 2 ficará com o sinal positivo. Ficamos então com:

$$x^2 - 5x - 14 = (x - 7).(x + 2)$$

Por outro lado, quando o termo em x tem coeficiente positivo, significa que o número de maior módulo ficará com o sinal positivo.

Exemplo:
Transformar $x^2 + 7x - 30$ em um produto de dois binômios de primeiro grau.

Scanned by CamScanner

Como o termo numérico é negativo, o produto será da forma $(x + a).(x - b)$, e o termo em x é a diferença entre a e b. Temos então que descobrir quais são os dois números que multiplicados resultam em 30 e subtraídos resultem em 7. É fácil ver que os números são 10 e 3.

Agora temos que descobrir os sinais. Como o termo em x é positivo, significa que o de maior módulo é o que tem o sinal positivo. Portanto o 10 ficará com o sinal positivo, e o 3 ficará com o sinal negativo.

$x^2 + 7x - 30 = (x + 10).(x - 3)$

As formas possíveis são:

$x^2 + Sx + P \rightarrow (x + a).(x + b)$
$x^2 - Sx + P \rightarrow (x - a).(x - b)$
$x^2 \pm Dx - P \rightarrow (x + a).(x - b) \rightarrow$ o maior entre a e b ficará com o sinal do termo em x.

Exercícios

E12) Transforme os seguintes trinômios em um produto de dois binômios do primeiro grau:

a) $x^2 - x - 2$
b) $x^2 + 4x - 32$
c) $x^2 + 2x - 35$
d) $x^2 - 4x - 12$
e) $x^2 + 3x - 40$
f) $x^2 - x - 30$
g) $x^2 + x - 72$
h) $x^2 - 3x - 54$
i) $x^2 + 9x - 52$
j) $x^2 - 6x - 16$
k) $x^2 - 25$
l) $x^2 + 5x - 14$
m) $x^2 + 10x - 24$
n) $x^2 - 15x - 54$
o) $x^2 - 6x - 72$
p) $x^2 + 6x - 91$
q) $x^2 - 2x - 48$
r) $x^2 + 10x - 39$
s) $x^2 + 12x - 85$
t) $x^2 - 10x - 200$

Tome cuidado, a fórmula do Produto de Stevin requer que nos dois binômios, a variável x apareça com sinal positivo. Se x aparecer com sinal negativo, será preciso colocar -1 em evidência para fazer com que x apareça com sinal positivo, para então aplicar a fórmula.

Exemplo:
$(4-x).(x-3) = -(x-4).(x-3) = -(x^2 - 7x + 12) = -x^2 + 7x - 12$

Por outro lado, se os dois termos tiverem um sinal negativo antes de x, podemos trocar os sinais de ambos, pois quando multiplicamos um valor por -1 duas vezes ele não se altera, já que $(-1).(-1) = 1$:

$(2 - x).(5 - x) = (x - 2).(x - 5) = x^2 - 7x + 10$

A fórmula do Produto de Stevin também exige que o termo em x^2 tenha coeficiente 1, no caso de transformar o trinômio em produto. Se não for, temos que colocar o seu coeficiente em evidência para poder aplicar a fórmula.

Exemplo:
Transformar $2x^2 + 6x + 4$ em um produto de binômios do primeiro grau.

Como o termo em x^2 tem coeficiente 2, temos que colocar 2 em evidência:

$2x^2 + 6x + 4 = 2.(x^2 + 3x + 2)$

Ficamos então com o dobro de um trinômio do 2º grau com coeficiente 1, que pode ser facilmente convertido:

$2.(x^2 + 3x + 2) = 2.(x+1).(x+2)$

Scanned by CamScanner

O resultado $2.(x+1).(x+2)$ já está na forma fatorada. Opcionalmente podemos "devolver" o coeficiente 2 para um dos binômios. Por exemplo:

$(2x+2).(x+2)$ ou então $(x+1).(2x+4)$

OBS.: No capítulo 5 veremos uma forma de fatorar diretamente este trinômio ter que fazer esta manobra com o coeficiente de x^2.

Exercícios

E13) Transforme os seguintes trinômios em um produto de dois binômios do primeiro grau e um fator numérico:

a) $3x^2 - 9x + 6$
b) $3x^2 + 27x + 54$
c) $4x^2 - 20x + 24$
d) $2x^2 + 20x + 48$
e) $5x^2 - 5x - 10$
f) $4x^2 - 8x - 32$
g) $2x^2 - 10x - 72$
h) $6x^2 + 36x + 48$
i) $4x^2 - 4x - 120$
j) $2x^2 + 16x + 30$
k) $3x^2 - 18x - 48$
l) $4x^2 + 48x + 80$
m) $2x^2 - 4x - 96$
n) $5x^2 + 30x + 25$
o) $3x^2 + 15x - 42$
p) $7x^2 + 56x + 84$
q) $3x^2 + 12x - 96$
r) $4x^2 + 56x + 28$
s) $3x^2 + 36x + 33$
t) $3x^2 + 30x - 72$

Interpretação geométrica

O Produto de Stevin pode ser interpretado geometricamente como o cálculo da área de um retângulo cujos lados são $(x+a)$ e $(x+b)$, como na figura abaixo. Para calcular a área, multiplicamos esses dois valores.



A área do retângulo é então $(x+a).(x+b)$, que também pode ser calculada como a soma das áreas das quatro figuras que formam este retângulo maior: um quadrado de lado x (área x^2) e mais três retângulos, com áreas a.b, x.a e x.b.

$a.b = P$ (produto)
$x.a + x.b = x.(a+b) = x.S$ (soma)

Logo $(x+a).(x+b) = x^2 + Sx + P$

Derivados do Produto de Stevin

Alguns produtos notáveis podem ser formulados com base no Produto de Stevin. São produtos não muito comuns em provas e problemas, mas quando aparecem, podem ser de difícil solução para quem nunca os viu. Calcular o produto é sempre fácil, mas a operação inversa (fatoração) é bem mais difícil. Vejamos então três produtos notáveis, não muito conhecidos, mas que podem ser bem úteis.

$(x+a).(x+b).(x+c)$

Este produto tem uma fórmula que lembra a do Produto de Stevin:

Scanned by CamScanner

$(x+a).(x+b).(x+c) = x^3 + S_1.x^2 + S_2x + S_3$

Os coeficientes do trinômio resultante são:
S_1 = soma dos números a, b e c = a+b+c
S_2 = Soma dos produtos dos números a, b e c, tomados 2 a 2 = ab + ac + bc
S_3 = Soma dos produtos dos números a, b e c, tomados 3 a 3 = produto a.b.c

OBS.: No capítulo 21 estudaremos as relações de Girard, que formam uma generalização da fórmula acima.

A fórmula é de fácil dedução:

$(x+a).(x+b).(x+c) = (x^2 + ax + bx + ab).(x+c)$ (calculando primeiro (x+a).(x+b))
$= x^3 + ax^2 + bx^2 + abx + cx^2 + acx + bcx + abc$ (multiplicando por (x+c))
$= x^3 + ax^2 + bx^2 + cx^2 + abx + acx + bcx + abc$ (ordenando o polinômio em x)
$= x^3 + (a+b+c)x^2 + (ab + ac + bc)x + abc$ (reduzindo termos semelhantes)
$= x^3 + S_1.x^2 + S_2x + S_3$

$$(x+a).(x+b).(x+c) = x^3 + (a+b+c).x^2 + (a.b + a.c + b.c)x + a.b.c$$

A formula acima é para (x + a)(x + b)(x + c). Se x tiver coeficientes, todos iguais, como em (2x + a)(2x + b)(2x + c), por exemplo, fazemos a substituição y = 2x e recaímos em (y + a)(y + b)(y +c), aplicamos então a fórmula com y e no final substituímos y por 2x, lembrando que no caso teremos também $y^3 = 8x^3$ e $y^2 = 4x^2$. Outra opção é não usar fórmula alguma (caso você a esqueça) e multiplicar diretamente as expressões.

(a+1).(b+1)

Este produto é um caso particular do Produto de Stevin, obtido quando fazemos x=1:

$(x+a).(x+b) = x^2 + (a+b).x + a.b$
$(1+a).(1+b) = 1 + a + b + a.b$

$$(a+1).(b+1) = ab + a + b + 1$$

Exemplo:
Transformar m.n + m + n + 1 em um produto de dois binômios do primeiro grau.

Vemos que a expressão m.n + m + n + 1 é um caso particular do resultado de $(x+m).(x+n)$ quando x=1. Então:

$m.n + m + n + 1 = (m+1).(n+1)$

(a+1).(b+1).(c+1)

Este produto é também um caso particular de outro produto apresentado antes: (x+a).(x+b).(x+c), quando fazemos x=1. A fórmula geral para este produto é:

$(x+a).(x+b).(x+c) = x^3 + (a+b+c).x^2 + (a.b + a.c + b.c)x + a.b.c$

Quando fazemos x=1, ficamos com:

Scanned by CamScanner

$(a+1).(b+1).(c+1) = 1 + a + b + c + ab + ac + bc + abc$

É um produto fácil de calcular, apesar de um pouco trabalhoso, entretanto, se for apresentada a questão inversa, ou seja, transformar a expressão em um produto de três binômios, dificilmente alguém resolverá rapidamente a questão se não conhecer este produto notável pouco conhecido.

Exercícios

E14) Calcule os seguintes produtos:

a) $(x+1).(x+2).(x+3)$
b) $(a + 2)(a + 3)(a – 2)$
c) $(x + 5)(x – 3)(x + 2)$
d) $(x + 1)(x – 1)(x + 2)$
e) $(x + 2)(x + 3)(x + 6)$
f) $(x + 2a)(x – 4a)(x + 5a)$
g) $(2x + 1)(2x – 3)(2x + 4)$
h) $(2x + 3)(2x – 5)(x + 1)$
i) $(x^2 + 1)(x^2 – 5)(x^2 + 3)$
j) $(2x + 1)(3x + 1)(5x + 1)$
k) $(2a + 1)(3b + 1)(5c + 1)$
l) $(3x + 1)(4x + 1)(x + 1)$
m) $(2x+1)(–y+1)(–3z+1)$
n) $(x + 1)(x^2 + 1)(x^3 + 1)$
o) $(2k + 1)(3k – 1)(k – 1)$

E15) Transforme as seguintes expressões em um produto de binômios:

a) $xy + x + y + 1$
b) $xyz+xz+yz+xy+x+y+z+1$
c) $x^3 + 7x^2 + 14x + 8$
d) $x^3 – 9x^2 + 14x + 24$
e) $6xy + 2x + 3y + 1$
f) $32a^2 + 12a + 1$
g) $x^2y + x^2 + y + 1$
h) $x^3 + x^2 + x + 1$
i) $6x^2y + 2x^2 + 3y + 1$
j) $x^2y^2 – x^2 – y^2 + 1$

Cubos da soma e da diferença

As expressões das formas $(a+b)^3$ e $(a–b)^3$ aparecem com relativa frequência em provas e problemas.

$(a+b)^3$

Quando a expressão aparece em um problema e não lembramos a fórmula, basta executar a multiplicação.

$(a+b)^3 = (a+b).(a+b)^2 = (a+b).(a^2 + 2ab + b^2)$

É claro que a fórmula do quadrado da soma ninguém esquece. Ficamos então com:

$(a+b).(a^2 + 2ab + b^2) = a^3 + 2a^2b + ab^2 + ba^2 + 2b^2a + b^3$

Reduzindo os termos semelhantes e observando que $a^2b = ba^2$ e $ab^2 = b^2a$, ficamos com:

$= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

A expressão não é de memorização muito difícil. Observe que tem o cubo do primeiro e o cubo do segundo. Os dois outros termos aparecem com coeficiente 3 a expoentes 2 e 1 para a e b, e também para b e a. A expressão também pode ser escrita como $a^3 + 3ab(a+b) + b^3$.

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

Exemplo:
Calcule $(x+5)^3$

$(x+5)^3 = x^3 + 3.x^2.5 + 3.x.5^2 + 5^3$

Scanned by CamScanner

$= x^3 + 30x^2 + 75x + 125$

$(a-b)^3$

A expressão que dá o cubo da soma pode ser usada para chegarmos à fórmula de $(a - b)^3$. Basta observar que:

$a - b = a + (-b)$

Sendo assim, para encontrar a fórmula de $(a - b)^3$, basta partir da fórmula de $(a + b)^3$ e trocar b por –b:

$(a - b)^3 = a^3 + 3a^2(-b) + 3a(-b)^2 + (-b)^3$

Propagando os sinais negativos para os coeficientes do polinômio (lembrando que $(-b)^2 = b^2$ e $(-b)^3 = -b^3$), ficamos com:

$$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

Ou seja, a fórmula é similar à do cubo da soma, exceto que os termos com potências ímpares de b ficaram com sinais negativos.

Note que as fórmulas do cubo da soma e cubo da diferença também podem ser escritas como:

$$(a+b)^3 = a^3 + 3ab(a+b) + b^3$$

$$(a-b)^3 = a^3 - 3ab(a-b) - b^3$$

Se for usar nas formas acima, cuidado com os sinais de b na fórmula da diferença.

Exemplo:
Calcule $(x - 3)^3$

$(x - 3)^3 = x^3 - 3.x^2.3 + 3.x.3^2 - 3^3$
$= x^3 - 9x^2 + 27x - 27$

Também pode ser calculado como

$x^3 - 3(3x)(x - 3) - 3^3 = x^3 - 9x^2 + 27x - 27$

Se você tem o hábito de errar em sinais, recomendamos que você use a primeira forma, que já dá os sinais corretos.

Exercícios

E16) Calcule os cubos abaixo:

a) $(x + y)^3$
b) $(m - n)^3$
c) $(x + 1)^3$
d) $(x - 2)^3$
e) $(x + 5)^3$
f) $(x + 4)^3$
g) $(2x + 1)^3$
h) $(-x + 2)^3$
i) $(x + 3)^3$
j) $(k - 4)^3$
k) $(x^2 + 1)^3$
l) $(z^2 - w^2)^3$
m) $(x^2 + x)^3$
n) $(3x + 2y)^2$
o) $(10 - 3t)^3$
p) $(m^2 - 2)^3$
q) $(1 - z^2)^3$
r) $(5x - 2)^3$
s) $(x^n + 10)^3$
t) $(x + 1/x)^3$

Scanned by CamScanner

Soma e diferença de cubos

Não confunda *cubo da soma* com *soma de cubos*. Seria a mesma coisa alguém confundir quadrado da soma com soma de quadrados:

$a^2 + b^2$ é a soma dos quadrados dos números a e b

$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ é o quadrado da soma dos números a e b

As expressões são diferentes porque somar e elevar ao quadrado não são operações que possam ter a ordem invertida, pois o resultado é diferente.

Da mesma forma, a diferença de quadrados e o quadrado da diferença também são operações diferentes.

$a^2 - b^2$ é a diferença dos quadrados dos números a e b

$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ é o quadrado da diferença dos números a e b

O mesmo ocorre em relação aos cubos: somar dois números e elevar o resultado ao cubo não é a mesma coisa que elevar ao cubo dois números e depois somar os resultados. Dados dois números a e b, temos:

Soma dos cubos: $a^3 + b^3$
Cubo da soma: $a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

Da mesma forma, podemos ter uma diferença de cubos e o cubo de uma diferença, são coisas completamente diferentes:

Diferença de cubos: $a^3 - b^3$
Cubo da diferença: $a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$

Do ponto de vista de produtos notáveis, não há nada a fazer com a soma e diferença de cubos. Elevam-se os números ao cubo e calculamos sua soma ou sua diferença. Já a sua operação inversa, a fatoração, tem uma fórmula que será estudada no capítulo 5. Essas fórmulas são:

1) $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$
2) $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$

Essas fórmulas podem ser deduzidas facilmente:

$(a + b)(a^2 - ab + b^2) = a^3 - a^2b + ab^2 + a^2b - ab^2 + b^3$
$(a + b)(a^2 - ab + b^2) = a^3 + b^3$ (os termos em ab^2 cancelam, assim como os termos em a^2b)

A segunda fórmula pode ser obtida a partir da primeira, trocando b por –b.

$(a + (-b))(a^2 - a(-b) + (-b)^2) = a^3 + (-b)^3$
$(a - b)(a^2 - ab + b^2) = a^3 - b^3$

Scanned by CamScanner

Resumindo:

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

Muitas vezes os professores de bancas examinadoras de concursos gostam de usar essas fórmulas, pois muitos professores nas escolas decidem não ensiná-las por serem "difíceis", o que é mais comum, os professores ensinam mas os alunos aplicam pouco e as esquecem.

Mais uma vez lembramos, não confunda as fórmulas acima (soma e diferença de cubos) com as fórmulas de cubo da soma e cubo da diferença.

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

Observe ainda que as quatro fórmulas acima têm objetivos diferentes. As fórmulas da soma e diferença de cubos destinam-se a fatorar, ou seja, transformar a expressão originais em fatores. As fórmulas do cubo da soma e da diferença destinam-se em expandir as expressões, elevando-as ao cubo. Como x=y é o mesmo que y=x, todas as fórmulas podem ser usadas em um sentido ou no sentido inverso.

Aliás, todas as fórmulas de produtos notáveis podem ser usadas em um sentido ou no inverso. Por exemplo, podemos calcular $(a + b)^2$ como $a^2 + 2ab + b^2$, ou então podemos transformar uma expressão $a^2 + 2ab + b^2$ em fatores $(a + b)^2$, para fazer por exemplo uma simplificação em uma fração algébrica.

Exemplo:

Simplificar a fração algébrica $\frac{x^2+4x+4}{x^2-4}$

Solução:

$$\frac{x^2+4x+4}{x^2-4} = \frac{(x+2)^2}{(x+2)(x-2)} = \frac{x+2}{x-2}$$

Essas operações, que correspondem a usar produtos notáveis de forma "invertida", serão vistas novamente nos capítulos 5 (Fatoração) e 7 (Frações algébricas), porém alguns exercícios a respeito serão apresentados no presente capítulo.

$(x + 1/x)^n$

São relativamente comuns questões que envolvem este cálculo. A particularidade neste cálculo é que os números que estão somados (x e 1/x) têm produto igual a 1. No desenvolvimento da expressão, aparecerão parcelas que envolvem o produto desses valores, que no caso será igual a 1, o que resultará em simplificações.

Exemplo: Calcule $(x + 1/x)^2$

Usando a fórmula do quadrado da soma $(a^2 + b^2 + 2ab)$, ficamos com:

Scanned by CamScanner

$x^2 + 1/x^2 + 2.x.1/x = x^2 + 1/x^2 + 2$

Sendo assim podem surgir questões como a que se segue.

Exemplo: (PROFMAT 2014)

Se x é um número real tal que $x+\frac{1}{x}=3$, então $x^2+\frac{1}{x^2}$ é igual a:

(A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 9 (E) 12

A expressão cujo valor é pedido, $x^2 + 1/x^2$, pode ser obtida elevando-se ao quadrado a expressão original, $x + 1/x$:

$$\left(x+\frac{1}{x}\right)^2 = 3^2 = 9$$

$$x^2+\frac{1}{x^2}+2.x.\frac{1}{x}=9$$

$$x^2+\frac{1}{x^2}+2=9$$

$$x^2+\frac{1}{x^2}=9-2=7$$

Resposta (B)

Exemplo: Sabendo que $x+\frac{1}{x}=4$, calcule $x^3+\frac{1}{x^3}$

A fórmula de $(a+b)^3$ pode ser expressa em função de a^3, b^3, (a+b) e a.b:

$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

$a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab^2 - 3a^2b$

$a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3\,ab.(a + b)$ (I)

Sendo assim, quando sabemos o produto e a soma de dois números podemos usar a fórmula acima para calcular a soma de seus cubos. Na verdade, muitas expressões simétricas com duas variáveis **a** e **b** (expressões que não se alteram quando trocamos **a** por **b**, e vice-versa) podem através de alguma manipulação algébrica, ser calculadas em função de **a + b** e **a.b**.

Vamos fazer a mesma coisa, usando a = x e b = 1/x:

$$x+\frac{1}{x}=4$$

Elevando ao cubo:

$$\left(x+\frac{1}{x}\right)^3 = 4^3 = 64$$

Scanned by CamScanner

$$x^3+3x^2.\frac{1}{x}+3.x.\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x^3}=64$$

$$x^3+3x+3.\frac{1}{x}+\frac{1}{x^3}=64$$

$$x^3+\frac{1}{x^3}=64-3\left(x+\frac{1}{x}\right)$$

Como foi dado que x + 1/x = 4, ficamos com:

$$x^3+\frac{1}{x^3}=64-3.4=64-12=52$$

Exemplo: CMJF 2004
Um número x mais seu inverso é igual a 5. Então o valor de y + 1/y, onde y é a terceira potência de x, é igual a:

(A) 125 (B) 110 (C) 100 (D) 80 (E) 15

Solução:
Dado $x+\frac{1}{x}=5$, temos que calcular $x^3+\frac{1}{x^3}$

A segunda expressão pode ser obtida, a partir da elevação de 1+1/x ao cubo:

$$\left(x+\frac{1}{x}\right)^3=5^3=125$$

$$x^3+3.x^2.\frac{1}{x}+3.x.\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x^3}=125$$

$$x^3+3.x+3.\frac{1}{x}+\frac{1}{x^3}=125$$

$$x^3+\frac{1}{x^3}=125-3.\left(x+\frac{1}{x}\right)=125-3.5=110$$

Resposta: (B)

Exercícios de revisão

E17) Calcule
a) $(2a + 3b)^2$
b) $(a - 3b)^2$
c) $(2x - y)^2$
d) $(y - 2x)^2$
e) $(a + 5b)^2$
f) $(2a - 5c)^2$
g) $(x + y)(x - y)$
h) $(4a - b)(4a + b)$
i) $(2b - 3c)(2b + 3c)$
j) $(y - 2z)(y - 2z)$
k) $(a + 3z)(a - 3z)$
l) $(2a - b)(2a + 3b)$
m) $(2a - 3b)(2a - 3b)$
n) $(5x + 3a)(5x - 3a)$
o) $(4m - 5n)(4m + 5n)$

Scanned by CamScanner

E18) Calcule

a) $(x+7)(x+4)$
b) $(x-3)(x+7)$
c) $(x-2)(x-4)$
d) $(x-6)(x-10)$
e) $(x+7)(x-4)$
f) $(x+a)(x-2a)$
g) $(x+3a)(x-a)$
h) $(a+3c)(a+3c)$
i) $(a+2x)(a-4x)$
j) $(a-3b)(a-4b)$
k) $(a^2-c)(a^2+2c)$
l) $(x-17)(x-3)$
m) $(x+6y)(x-5y)$
n) $(3+2x)(3-x)$
o) $(5+2x)(1-2x)$

E19) Calcule

a) $(a-2b)(a+3b)$
b) $(a^2b^2-x^2)(a^2b^2-5x^2)$
c) $(a^3b-ab^2)(a^3b+5ab^3)$
d) $(x^2y-xy^2)(x^2y-3xy^2)$
e) $(x^2y+xy^2)(x^2y+xy^2)$
f) $(x+a)(x+b)$
g) $(x+a)(x-b)$
h) $(x-a)(x+b)$
i) $(x-a)(x-b)$
j) $(x+2a)(x+2b)$
k) $(x-2a)(x+2b)$
l) $(x+2a)(x-2b)$
m) $(x-2a)(x-2b)$
n) $(x-a)(x+3a)$
o) $(x-2a)(x+3a)$

E20) Simplifique

a) $\dfrac{a^2-b^2}{a+b}$
b) $\dfrac{x^2-4}{x-2}$
c) $\dfrac{x^2-4}{x+2}$
d) $\dfrac{a^2-9}{a-3}$
e) $\dfrac{c^2-25}{c-5}$
f) $\dfrac{c^2-25}{c+5}$
g) $\dfrac{49x^2-y^2}{7x+y}$
h) $\dfrac{49x^2-y^2}{7x-y}$
i) $\dfrac{9b^2-1}{3b-1}$
j) $\dfrac{9b^2-1}{3b+1}$
k) $\dfrac{16x^4-25a^2}{4x^2-5a}$
l) $\dfrac{16x^4-25a^2}{4x^2+a}$
m) $\dfrac{9x^2-25y^2}{3x-5y}$
n) $\dfrac{a^2-(b-c)^2}{a-(b-c)}$
o) $\dfrac{a^2-(b-c)^2}{a+(b-c)}$

E21) Simplifique

a) $\dfrac{a^2-(2b-c)^2}{a-(2b-c)}$
b) $\dfrac{(5a-7b)^2-1}{(5a-7b)-1}$
c) $\dfrac{(5a-7b)^2-1}{(5a-7b)+1}$
d) $\dfrac{z^2-(x-y)^2}{z-(x-y)}$
e) $\dfrac{z^2-(x-y)^2}{z+(x-y)}$
f) $\dfrac{a^2-(2b-c)^2}{a-(2b-c)}$
g) $\dfrac{(x+3y)^2-z^2}{(x+3y)-z}$
h) $\dfrac{(x+3y)^2-z^2}{(x+3y)+z}$
i) $\dfrac{(a+2b)^2-4c^2}{(a+2b)-2c}$
j) $\dfrac{(a+2b)^2-4c^2}{(a+2b)+2c}$
k) $\dfrac{1-(3x-2y)^2}{1+(3x-2y)}$
l) $\dfrac{9x^4-16y^6}{3x^2+4y^3}$
m) $\dfrac{1-m^4}{1-m^2}$
n) $\dfrac{a^4-b^2}{a^2+b}$
o) $\dfrac{25x^2-81y^2}{5x+9y}$

E22) Simplifique

a) $\dfrac{1+x^3}{1+x}$
b) $\dfrac{1+8a^3}{1+2a}$
c) $\dfrac{1+27c^3}{1+3c}$
f) $\dfrac{27x^3+8y^3}{3x+2y}$
g) $\dfrac{8x^3+125y^3}{2x+5y}$
h) $\dfrac{x^3y^3+z^3}{xy+z}$
k) $\dfrac{a^3+8b^3}{a+2b}$
l) $\dfrac{a^6+64}{a^2+4}$
m) $\dfrac{a^9+27}{a^3+3}$

Scanned by CamScanner

d) $\frac{8a^3+b^3}{2a+b}$

e) $\frac{64b^3+27c^3}{4b+3c}$

i) $\frac{a^3b^3+8}{ab+2}$

j) $\frac{125a^3+b^3}{5a+b}$

n) $\frac{8a^6+b^3}{2a^2+b}$

o) $\frac{a^{12}+x^6y^6}{a^4+x^2y^2}$

E23) Simplifique

a) $\frac{x^{15}+a^9b^9}{x^5+a^3b^3}$

b) $\frac{27x^3y^3+z^{12}}{3xy+z^4}$

c) $\frac{x^3y^3z^3+1}{xyz+1}$

d) $\frac{8a^3b^3c^3+27}{2abc+3}$

e) $\frac{1+64x^3y^3z^3}{1+4xyz}$

f) $\frac{1+27a^6b^3c^3}{1+3a^2bc}$

g) $\frac{x^4-y^4}{x-y}$

h) $\frac{x^4-y^4}{x+y}$

i) $\frac{x^5-y^5}{x-y}$

j) $\frac{x^5+y^5}{x+y}$

k) $\frac{x^6-y^6}{x-y}$

l) $\frac{x^6-y^6}{x+y}$

m) $\frac{x^8-y^8}{x+y}$

n) $\frac{x^{16}-1}{x^2-1}$

o) $\frac{x^{16}-a^{16}}{x^2-a^2}$

E24) Calcule $\frac{2x}{x+3}+\frac{2}{3x+4}$

E25) Substituir k no trinômio abaixo de tal forma que o trinômio se torne um quadrado perfeito.

$ks^2 - 24s + 9$

(A) 4 (B) 3 (C) 16 (D) 9 (E) 12

E26) Expandir o produto

$(x^n + y^n)(x^{2n} - x^n y^n + y^{2n})$

E27) Se $A + B = 2$ e $A^2 + B^2 = 5$, calcule $A^3 + B^3$

(A) 11 (B) 8 (C) 10 (D) 5 (E) 14

E28) Qual valor de c torna o trinômio $x^2 + 11x + c$ um quadrado perfeito?

(A) 11/2 (B) 11/4 (C) 121/2 (D) 121/4

E29) Sejam x e y dois números reais satisfazendo a $x + y = 5$ e $xy = 7$. Encontre o valor de $x^3 + y^3$

(A) 10 (B) 11 (C) 20 (D) 31 (E) 125

E30) **CN 53**

Calcular o valor numérico da expressão $\frac{a^2-b^2}{2}+\frac{b^3-a^4}{3}+3a^2b$ para $a = -1$ e $b = 2$.

E31) Se $x^2 - 5x - 6 = 0$, calcule $x^4 - 10x^3 + 26x^2 - 5x - 6$

(A) 36 (B) 42 (C) 30 (D) 6 (E) 0

Scanned by CamScanner

E32) Simplificando a expressão $\frac{a^2-(b-c)^2}{(a+b)^2-c^2}$, temos:

(A) 0 (B) 1 (C) $\frac{a-b+c}{a-b-c}$ (D) $\frac{a-b+c}{a+b+c}$ (E) $-\frac{c}{a}$

E33) Exprimir A = 999.999.999.999.999, com 15 algarismos "9", usando apenas dois valores, sendo um deles uma potência de 10. Idem para B = 999.999.999....999, com n algarismos 9. Encontre fórmulas similares para C = 333.333...333, com n algarismos "3" e D = 111.111.111...111 com n algarismos "1" e 777.777.777....777 com n algarismos "7"

E34) CEFET 2001 - Considerando-se a e b números reais não nulos, analise as sentenças abaixo:

I) $(a^2 + b^3)^2 = a^4 + b^6$
II) $(a - 2b)/a = 1 - 2b$
III) $\sqrt{(2a-3b)^2} = 2a - 3b$
IV) $\sqrt{a^2+b^2} = \sqrt{a^2} + \sqrt{b^2}$
V) $\frac{3a}{7b} \cdot \frac{2b}{5a} = \frac{15a^2}{14b^2}$

O número de sentenças verdadeiras é:

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4

E35) CEFET 2010

Se $x + y = 1$ e $x^2 + y^2 = 2$, então $x^3 + y^3$ é igual a:

(A) 3,5 (B) 3 (C) 2,5 (D) 2

E36) Se $A + B = 2$ e $A^2 + B^2 = 5$, determine $A^3 + B^3$.

(A) 11 (B) 8 (C) 10 (D) 5 (E) 14

E37) Seja N = 999.999.999.999.999.999. Quantos "9" possui a expansão decimal de N^2?

E38) Sendo a e b números reais, qual das afirmativas está sempre correta?

(A) $(a + b)^3 = a^3 + b^3$
(B) $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 + ab + b^2)$
(C) $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$
(D) $a^2 - b^2 = (a - b)(a - b)$
(E) $a - b = \left(\sqrt{a} - \sqrt{b}\right) \cdot \left(\sqrt{a} - \sqrt{b}\right)$

E39) Quanto deve ser adicionado a $2x^2 + 2x$ para que seja formado um quadrado perfeito?

E40) Efetue e simplifique $(x + y)^3 - (x - y)^3$

E41) Simplifique $\sqrt{(x-y)^2+(x+y)^2}$

E42) Sabendo que $x - y = 2$ e $x^2 + y^2 = 8$, calcule $x^3 - y^3$.

E43) Se $\left(k+\frac{1}{k}\right)^2 = 3$, calcule $k^3 + \frac{1}{k^3}$

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 6

E44) Qual condição dever ocorrer para que $\sqrt{x^2+y^2} = \sqrt{x^2} + \sqrt{y^2}$?

Scanned by CamScanner

(A) $x = y$ (B) $xy = 0$ (C) $x \geq 0$ e $y \geq 0$ (D) $\pm\sqrt{x} = \sqrt{y}$ (E) NRA

E45) Expandir o produto $(x^n + y^n)(x^{2n} - x^n y^n + y^{2n})$

E46) Suponha que $a + b = 3$ e $a^2 + b^2 = 7$. Calcule $a^4 + b^4$.

(A) 45 (B) 47 (C) 49 (D) 51 (E) 81

E47) Calcule $1^2 - 2^2 + 3^2 - 4^2 + \ldots - 1998^2 + 1999^2$

(A) 1.000.000 (B) 1.789.000 (C) 1.899.000 (D) 1.989.000 (E) 1.999.000

E48) Encontre o quociente da divisão de $(64x^3 - 8y^3)$ por $(4x - 2y)$.

E49) Qual é o valor numérico da expressão $x^2 - 2x - 3$ para $x = 1 - 2\sqrt{3}$?

E50) Se **a** = 111111...111, com **n** dígitos 1, e **b** = 100...0005, com **(n – 1)** dígitos 0, mostre que a expressão **ab + 1** é um quadrado perfeito, e identifique de qual número esta expressão é quadrado.

CONTINUA NO VOLUME 2: 55 QUESTÕES DE CONCURSOS

Respostas dos exercícios

E1)
a) $x^2 + 2x + 1$
b) $x^2 + 6x + 9$
c) $4x^2 + 12x + 9$
d) $4x^2 + 28x + 47$
e) $x^2 + 12x + 36$
f) $x^2 + 10x + 25$
g) $x^2 + 20x + 100$
h) $4x^2 + 20x + 25$
i) $16x^2 + 8xy + y^2$
j) $x^2 + 6xy + 9y^2$
k) $a^2 + 4ab + 4b^2$
l) $9a^2 + 6ab + b^2$
m) $16x^2 + 24xy + 9y^2$
n) $x^4 + 18x^2 + 81$
o) $4a^4b^2 + 12a^3b^3 + 9a^2b^4$
p) $9a^2b^2 + 6ab^3 + b^4$
q) $25a^2b^2 + 30a^3b^3 + 9a^6b^4$
r) $x^4 + 2x^2y^2 + y^4$
s) $4x^4 + 12x^2y^2 + 9y^4$
t) $4x^6 + 20x^3y^2 + 25y^4$

E2)
a) $(x + 2)^2$
b) $(x + 3)^2$
c) $(x + 5)^2$
d) $(x + 1)^2$
e) $(x + 6)^2$
f) $(a + 3b)^2$
g) $(3x + 4y)^2$
h) $(2x + 1)^2$
i) $(3y + 1)^2$
j) $(2k + 3)^2$
k) $(x + 5)^2$
l) $(x + 10)^2$
m) $(4a + 1)^2$
n) $(2x + 3y)^2$
o) $(10m + 3)^2$
p) $(b + 3)^2$
q) $(x^2 + 3)^2$
r) $(x^2 + x)^2$
s) $(x^y + 2)^2$
t) $(100 + x)^2$

E3)
a) $(x + 5)^2 - 9$
b) $(x + 3)^2 - 8$
c) $(x + 5)^2 - 15$
d) $(z + 2)^2 - 4$
e) $(x + 3)^2 - 1$
f) $(m + 4)^2 - 16$
g) $(x + 1/2)^2 + 3/4$
h) $(x + 3/2)^2 - 9/4$
i) $(2m + 7/4)^2 - 49/16$
j) $(k^3 + 1/2)^2 - 1/4$
k) $(x + 5/2)^2 - 21/4$
l) $(x^5 + 5)^2 - 25$
m) $(t + 1/2)^2 - 1/4$
n) $(x + 6)^2 + 64$
o) $(x^2 + 1)^2 + 9$
p) $(x^{1/2} + 1/2)^2 + 3/4$
q) $(x^{y/2} + 1)^2 - 1$
r) $(10^n + 3)^2 + 1$
s) $(5^m - 2)^2 - 3$
t) $(z^2 + 1/2)^2 + 3/4$

E4)
a) $x^2 - 4x + 4$
b) $x^2 - 8x + 16$
c) $4x^2 - 20x + 25$
d) $49 - 42x + 9x^2$
e) $x^2 - 14x + 49$
f) $x^2 - 18x + 81$
g) $x^2 - 24x + 144$
h) $9x^2 - 42x + 49$
i) $4x^2 - 4xy + y^2$
j) $x^2 - 12xy + 36y^2$
k) $a^2 - 10ab + 25b^2$
l) $49a^2 - 14ab + b^2$
m) $25x^2 - 20xy + 4y^2$
n) $x^4 - 16x^2 + 64$
o) $9a^4b^2 - 24a^3b^3 + 16a^2b^4$
p) $25a^2b^2 - 10ab^3 + b^4$
q) $9a^2b^2 - 30a^3b^3 + 25a^6b^4$
r) $x^4 - 2x^2y^2 + y^4$
s) $9x^4 + 42x^2y^2 + 49y^4$
t) $25x^6 - 30x^3y^2 + 9y^4$

E5)
a) $(x - 7)^2$
b) $(x - 3)^2$
c) $(x - 10)^2$
f) $(x - 1)^2$
g) $(x - 13)^2$
h) $(x - 6)^2$
k) $(3x - 4y)^2$
l) $(2t + 7)^2$
m) $(3c + 5)^2$
p) $(x^2 + 1)^4$
q) $(k^3 - 3)^2$
r) $(10^n - 1)^2$

Scanned by CamScanner

d) $(x-2)^2$
e) $(x-5)^2$
i) $(x-12)^2$
j) $(a-3b)^2$
n) $(2m-1)^2$
o) $(x+1/2)^2$
s) $(1+w^2/2)^2$
t) $(x^2+1/2)^2$

E6)
a) $x^2+y^2+9-2xy+6x-6y$
b) $x^2+y^2+4+2xy-2x-2y$
c) $16x^2+9y^2+25+24xy-40x-30y$
d) $4+16y^2+9x^2+16y-12x-24xy$
e) $9x^2+4y^2+81+12xy-54x-36y$
f) $x^2+y^2+25+2xy-10x-10y$
g) $x^2+z^2+100+2xz-20x-20z$
h) $9x^2+4y^2+16+12xy-24x-16y$
i) $4x^2+9y^2+4-12xy+8x-12y$
j) $25x^2+36y^2+4z^2-60xy+20xz-24yz$
k) $4a^2+25b^2+c2-20ab+4ac-10bc$
l) $9a^2+16b^2+4c^2-24ab+12ac-16bc$
m) $16x^2+25y^2+9z^2-40xy-24xz+30yz$
n) $x^4+y^4+64+2x^2y^2-16x^2-16y^2$
o) $4a^4b^2+9a^2b^4+25a^2b^2-12a^3b^3+20a^3b^2-30a^2b^2$
p) $16a^2b^2+4b^2c^2+9c^4-6ab^2c-8abc^2+4bc^3$
q) $4a^2b^2+9a^2b^4+9a^4b^4-12a^2b^3+12a^3b^3-18\,a^3b^4$
r) $x^4+y^4+16-2x^2y^2+8x^2-8y^2$
s) $25x^4+9y^4+z^4-30x^2y^2+10x^2z^2-6y^2z^2$
t) $4x^6+16y^4+4z^4-16x^3y^2+8x^3z^2-16y^2z^2$

E7)
a) x^2-64
b) m^2-1
c) x^2-100
d) $9x^2-4y^2$
e) $16k^2-1$
f) $4a^2-4b^2$
g) x^2-4a^2
h) x^4-y^4
i) x^8-y^8
j) $x^{16}-a^{16}$
k) x^2y^2-4
l) $x^{10}-1$
m) $4a^2b^2-25a^2c^4$
n) $x^2-4/9$
o) x^2-1/x^2
p) $a^2+2ab+b^2-c^2$
q) $x-y$
r) $3-2=1$
s) $1-x^{20}$
t) 10^8-1

E8)
a) $(x+1)(x-1)$
b) $(x+a)(x-a)$
c) $(2x^2+3x)(2x^2-3x)$
d) $(9w+1)(9w-1)$
e) $(z^4+z^2)(z^4-z^2)$
f) $(1+k)(1-k)$
g) $(100+x)(100-x)$
h) $(2m+4n)(2m-4n)$
i) $(5ab+7x^2y^3)(5ab-7x^2y^3)$
j) $(a^{32}+1)(a^{32}-1)$
k) $(x^3+y^3)(x^3-y^3)$
l) $(x+3+1)(x+3-1) = (x+4)(x+2)$
m) $(x+6).x$
n) $(x^2+2x)(x^2-2x)$
o) $(x^3+1/x^3)(x^3-1/x^3)$
p) $(22^{44}+88^{11})(22^{44}-88^{11})$
q) $(a^m+b^m)(a^m-b^m)$
r) 1001×999
s) $(a+b+c)(a+b-c)$
t) $(x^8+a^8)(x^8-a^8)$

E9)
a) $x^2+9x+14$
b) $x^2+14x+40$
c) $x^2+13x+40$
d) x^2-4
e) $x^2+10x+9$
f) $x^2+15x+54$
g) $x^2+12x+35$
h) $x^2+10x+16$
i) $x^2+13x+36$
j) $x^2+9x+18$
k) $x^2+11x+24$
l) $x^2+12x+32$
m) $x^2+15x+56$
n) $x^2+12x+27$
o) $x^2+13x+42$
p) $x^2+5ax+6a^2$
q) $a^2x^2+5bax+4b2$
r) $x^2+60x+800$
s) $x^2+(k+m)x+km$
t) $x^2+5zx+6z^2$

E10)
a) $x^2-11x+18$
b) $x^2-13x+40$
c) $x^2-9x+18$
d) $x^2-14x+40$
e) $x^2-14x+48$
f) $x^2-12x+35$
g) $x^2-16x+63$
h) $x^2-10x+16$
i) $x^2-7x+12$
j) $x^2-22x+120$
k) $x^2-3x-10$
l) x^2+x-12
m) $x^2+2x-35$
n) $x^2+3x-28$
o) $x^2+12x-28$
p) $x^2-4x-21$
q) $x^2-5x-36$
r) $x^2-4x-45$
s) $x^2-11x-60$
t) $x^2-4x-96$

E11)
a) $(x+1)(x+6)$
b) $(x+3)(x+5)$
c) $(x+3)(x+7)$
d) $(x+3)(x+4)$
e) $(x+1)(x+5)$
f) $(x+6)(x+3)$
g) $(x+2)(x+7)$
h) $(x+6)(x+4)$
i) $(x+5)(x+7)$
j) $(x+2)(x+6)$
k) $(x+4)(x+9)$
l) $(x+2)(x+4)$
m) $(x+3)(x+9)$
n) $(x+7)(x+8)$
o) $(x+6)(x+10)$
p) $(x+5)(x+8)$
q) $(x+1)(x+11)$
r) $(x+5)(x+15)$
s) $(x+10)(x+7)$
t) $(x+2)(x+10)$

E12)
a) $(x-2)(x+1)$
b) $(x+8)(x-4)$
c) $(x+7)(x-5)$
f) $(x-6)(x+5)$
g) $(x-9)(x+8)$
h) $(x-9)(x+6)$
k) $(x+5)(x-5)$
l) $(x+7)(x-2)$
m) $(x+12)(x-2)$
p) $(x+13)(x-7)$
q) $(x-8)(x+6)$
r) $(x+13)(x-3)$

Scanned by CamScanner

d) $(x-6)(x+2)$
e) $(x+8)(x-5)$
i) $(x+13)(x-4)$
j) $(x-8)(x+2)$
n) $(x-18)(x+3)$
o) $(x-12)(x+6)$
s) $(x+17)(x-5)$
t) $(x-20)(x+10)$

E13)

a) $3(x-1)(x-2)$
b) $3(x+3)(x+6)$
c) $4(x-2)(x-3)$
d) $2(x+4)(x+6)$
e) $5(x-2)(x+1)$
f) $4(x+2)(x-4)$
g) $2(x-9)(x+4)$
h) $6(x+2)(x+4)$
i) $4(x-6)(x+5)$
j) $2(x+6)(x+5)$
k) $3(x-8)(x+2)$
l) $4(x+2)(x+10)$
m) $2(x-8)(x+6)$
n) $5(x+1)(x+5)$
o) $3(x+7)(x-2)$
p) $7(x+2)(x+6)$
q) $3(x+2)(x-4)$
r) $4(x+1)(x+7)$
s) $3(x+1)(x+11)$
t) $3(x+12)(x-2)$

E14)

a) $x^3+6x^2+11x+6$
b) $a^3+3a^2-4a-12$
c) $x^3+4x^2-11x-30$
d) x^3+2x^2-x-2
e) $x^3+11x^2+36x+36$
f) $x^3+3ax^2-18a^2x-40a^3$
g) $8x^3+8x^2-22x-12$
h) $8x^3-4x^2-34x-15$
i) $x^6-2x^4-17x^2-15$
j) $1+10x+31x^2+30x^3$
k) $1+2a+3b+5c+6ab+10ac+15bc+30abc$
l) $1+8x+19x^2+12x^3$
m) $1+2x-y-3z-2xy-6xz+3yz+6xyz$
n) $1+x+x^2+2x^3+x^4+x^5+x^6$
o) $1-2k-5k^2+6k^3$

E15)

a) $(x+1)(y+1)$
b) $(x+1)(y+1)(z+1)$
c) $(x+1)(x+2)(x+4)$
d) $(x-6)(x-4)(x+1)$
e) $(2x+1)(3y+1)$
f) $(1+4a)(1+8a)$
g) $(x^2+1)(y+1)$
h) $(x^2+1)(x+1)$
i) $(2x^2+1)(3y+1)$
j) $(1-x^2)(1-y^2)$

OBS.: Item c) três números cuja soma é 7, produto é 8, somas dos produtos dois a dois é 14: 1, 2 e 4. O mesmo método deve ser usado em (d). Os demais itens são produtos de 2 binômios.

E16)

a) $x^3+3x^2y+3xy^2+y^3$
b) $3m^3-3m^2n+3mn^2-n^3$
c) x^3+3x^2+3x+1
d) $x^3-6x^2+12x-8$
e) $x^3+15x^2+45x+125$
f) $x^3+12x^2+48x+64$
g) $8x^3+12x^2+6x+1$
h) $-x^3+6x^2-12x+8$
i) $x^3+9x^2+27x+27$
j) $k^3-12k^2+48k-64$
k) $x^6+3x^4+3x^2+1$
l) $z^6-3z^4w^2+3z^2w^4-w^6$
m) $x^6+3x^5+3x^4+x^3$
n) $27x^3+54x^2y+36xy^2+8y^3$
o) $1000-900t+270t^2-27t^3$
p) $m^6-6m^4+12m^2-8$
q) $1-3z^2+3z^4-z^6$
r) $125x^3-150x^2+60x-8$
s) $x^{3n}+30x^{2n}+300x^n+1000$
t) $x^3+3x+3/x+1/x^3$

E17)

a) $4a^2+12ab+9b^2$
b) $a^2-6ab+9b^2$
c) $4x^2-4xy+y^2$
d) $y^2-4xy+4x^2$
e) $a^2+10ab+25b^2$
f) $4a^2-20ac+25c^2$
g) x^2-y^2
h) $16a^2-b^2$
i) $4b^2-9c^2$
j) y^2-4z^2
k) a^2-9z^2
l) $4a^2+4ab-3b^2$
m) $4a^2-12ab+9b^2$
n) $25x^2-9a^2$
o) $16m^2-25n^2$

E18)

a) $x^2+11x+28$
b) $x^2+7x-21$
c) x^2-6x+8
d) $x^2-16x+60$
e) $x^2+3x-28$
f) $x^2-ax-2a^2$
g) $x^2+2ax-3a^2$
h) $a^2+6ac+9c^2$
i) $a^2-2ax-8x^2$
j) $a^2-7ab+12b^2$
k) $a^4+a^2c-2c^2$
l) $x^2-20x+51$
m) $x^2+xy-30y^2$
n) $9+3x-2x^2$
o) $-4x^2-8x+5$

E19)

a) $a^2+ab-6b^2$
b) $a^4b^4+5x^4-6a^2b^2x^2$
c) $(a^3b-ab^2)(a^3b+5ab^3)$
d) $x^4y^2-4x^3y^3+3x^2y^4$
e) $x^4y^2+2x^3y^3+x^2y^4$
f) $x^2+ax+bx+ab$
g) $x^2+ax-bx-ab$
h) $x^2-ax+bx-ab$
i) $x^2-ax-bx+ab$
j) $x^2+2ax+2bx+4ab$
k) $x^2-2ax+2bx-4ab$
l) $x^2+2ax-2bx-4ab$
m) $x^2-2ax-2bx+4ab$
n) $x^2+2ax-3a^2$
o) $x^2+ax-6a^2$

E20)

a) $a-b$
b) $x+2$
c) $x-2$
d) $a+3$
e) $c+5$
f) $c-5$
g) $7x-y$
h) $7x+y$
i) $3b+1$
j) $3b-1$
k) $4x^2+5a$
l) $4x^2-5a$
m) $3x+5y$
n) $a+b-c$
o) $a-b+c$

Scanned by CamScanner

E21)

a) $a+2b-c$
b) $5a-7b-1$
c) $5a-7b+1$
d) $z+x-y$
e) $z-x+y$
f) $a+2b-c$
g) $x+3y+z$
h) $x+3y-z$
i) $a+2b+2c$
j) $a+2b-2c$
k) $1-(3x-y)$
l) $3x^2-4y^3$
m) $1+m^2$
n) a^2-b
o) $5x-9y$

E22)

a) $1-x+x^2$
b) $1-2a+4a^2$
c) $1-3c+9c^2$
d) $4a^2-2ab+b^2$
e) $4b^2-12bc+9c^2$
f) $9x^2-6xy+4y^2$
g) $4x^2-20xy+25y^2$
h) $x^2y^2-xyz+z^2$
i) $a^2b^2-2ab+4$
j) $25a^2-5ab+b^2$
k) $a^2-2ab+4b^2$
l) a^4-4a^2+16
m) a^6-3a^2+9
n) $4a^4-2a^2b+b^2$
o) $a^8-a^4x^2y^2+x^4y^4$

E23)

a) $x^{10}-x^5a^3b^3+a^6b^6$
b) $9x^2y^2-3xyz^4+z^8$
c) $x^2y^2z^2-xyz+1$
d) $4a^2b^2c^2+6abc+9$
e) $1+4xyz+16x^2y^2z^2$
f) $1-3a^2bc+9a^4b^2c^2$
g) $(x^2+y^2)(x+y)$
h) $(x^2+y^2)(x-y)$
i) $x^4+x^3y+x^2y^2+xy^3+y^4$
Sugestão: divisão de polinômios
j) $x^4+x^3y+x^2y^2+xy^3+y^4$
k) $(x^3+y^3)(x^2+xy+y^2)$
l) $(x^3-y^3)(x^2-xy+y^2)$
m) $(x^4+y^4)(x^2+y^2)(x-y)$
n) $(x^8+1)(x^4+1)(x^2+1)$
o) $(x^8+a^8)(x^4+a^4)(x^2+a^2)$

E24) $\dfrac{6x^2+10x+6}{(x+3)(3x+4)}$ Sugestão: Reduzir ao mesmo denominador, usando o MMC e somar as frações.

E25) (C) E26) $x^{3n} + y^{3n}$ E27) (A) E28) (D) E29) (C)

E30) 41/6

E31) (A)
Dividindo o polinômio do 4º grau pelo de 2º grau, encontramos quociente $x^2 - 5x + 7$ e resto 36, então podemos usar dividendo = divisor.quociente + resto, ou seja:
$x^4 - 10x^3 + 26x^2 - 5x - 6 = (x^2 - 5x + 7)(x^2 - 5x - 6) + 36$. Como foi dado que $x^2 - 5x - 6 = 0$, a expressão pedida reduz-se a 36. Outra solução é resolver a equação do 2º grau x2 – 5x + 6 = 0, que resulta em x=2 ou x=3, e substituir um desses valores na expressão pedida, o que resultará em 36.

E32) (D)

E33) $A = 10^{15} - 1$, $B = 10^n - 1$, $C = (10^n - 1)/3$, $D = (10^n - 1)/9$, $E = 7.(10^n - 1)/9$

E34) (A) lembre-se que $\sqrt{x^2} = |x|$ E35) (C) E36) (A)

E37) 17
$N = (10^{18} - 1)$, $N^2 = 10^{36} - 2.10^{18} + 1 =$

```
1.000.000.000.000.000.00.000.000.000.000.000.000
-                         2.000.000.000.000.000.000
+                                                 1
=999.999.999.999.999.998.000.000.000.000.000.001
```

E38) (C). Note que a (E) esta correta, porém a fórmula não pode ser aplicada para a ou b negativos, portanto não podemos dizer que está "sempre correta".

Scanned by CamScanner

E39) Existem infinitas soluções, basta partir do quadrado perfeito desejado a subtrair a expressão original. O resultado será o valor que deve ser adicionado à expressão para obter o quadrado. Chamando a expressão de **E** e o quadrado perfeito desejado de **Q**, basta adicionar Q – E. A solução que resulta no valor mais simples para "completar um quadrado", é considerar o "quadrado do primeiro" como $2x^2$, o que pode ser obtido fazendo o primeiro termo ser $x\sqrt{2}$, então o termo 2.primeiro.segundo seria dado por:
2. $x\sqrt{2}$.segundo = 2x, então o segundo termo é $1/\sqrt{2}$, o quadrado do segundo é então $\left(1/\sqrt{2}\right)^2 = 1/2$. Resposta: 1/2.

E40) $6x^2y + 2y^3$ E41) $\sqrt{2x^2+2y^2}$ E42) 20 E43) (A) E44) (B)

E45) $x^{3n} + y^{3n}$ E46) (B)

E47) (E)
A soma tem 1999 termos, cada dupla de termos consecutivos é uma diferença de quadrados. Para facilitar o agrupamento dos termos, adicionemos -0^2, o que não altera a expressão.
$S = -0^2 + 1^2 - 2^2 + 3^2 - 4^2 + ... - 1998^2 + 1999^2$
Temos então 1000 diferenças de quadrados, em que o primeiro quadrado é par e leva sinal negativo, e o segundo é ímpar e leva sinal positivo. Por exemplo, $-10^2 + 11^2$, que pode ser fatorado como (11 + 10)(11 – 10) = 11 + 10. Portanto cada diferença de quadrados resultará na soma dos dois números consecutivos. Então
S = 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + ... + 999 + 1000 + 1001 + ... + 1998 + 1999
Usamos então a clássica fórmula da soma de números consecutivos, ou com diferença constante, a sequência chamada de *progressão aritmética*, que é matéria de ensino médio mas é cobrada em olimpíadas, e tem possibilidade de ser pedida em concursos difíceis como CN, EPCAr e CM. Para realizar esta soma, usamos o método utilizado pelo matemático Gauss quando era criança, conta a história que seu professor passou um castigo para somar uma grande sequência de números consecutivos, então Gauss agrupou o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, conseguindo assim somas iguais, o que tornou o cálculo fácil.
(0 + 1999) + (1 + 1998) + (2 + 1997) + ... + (999 + 1000) = 1999 x 1000, pois são 1000 somas.
O valor total é então 1.999.000.

E48) $16x^2 + 8xy + 4y^2$ (Fatorar o numerador e simplificar)

E49) 8. Uma solução é substituir o valor dado de x na expressão, lidando com o quadrado da expressão com radical. Outra solução mais rápida é fatorar a expressão como (x – 3)(x + 1), e substituir o valor de x, então teremos uma diferença de quadrados, que faz o radical sumir.

E50) Como a tem **n** dígitos 1 e b tem **n – 1** dígitos 0, podemos escrever:
9a = 11111...1111 (n dígitos) = 10n – 1

$$a = \frac{10^n - 1}{9};\ e\ b = 10^n + 5;\ a.b + 1 = \frac{10^n - 1}{9}.\left(10^n + 5\right) + 1 = \frac{10^{2n} + 4.10^n + 4}{9} = \left(\frac{10^n + 2}{3}\right)^2$$

De fato, se fizermos por exemplo, n=1, teremos a=1, b=15, ab + 1 = 16, que é o quadrado de (10+2)/3, ou seja, o quadrado de 4.
Este exercício exemplifica como questões de aritmética avançada em geral exigem conhecimentos de álgebra para sua resolução. No caso, usamos fatoração e produtos notáveis.

Scanned by CamScanner

Capítulo 5

Fatoração

Fatorar é transformar um valor em um produto de fatores. Isto facilita a simplificação de expressões, as operações com frações e a resolução de equações.

No caso da álgebra, transformar uma expressão algébrica em fatores requer conhecimento de produtos notáveis. Por exemplo, se você sabe que $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$, então pode fatorar a expressão $a^2 - b^2$, que dá como resultado, $(a + b)(a - b)$.

Na aritmética, lidamos com números, principalmente inteiros. Considere por exemplo que precisamos fatorar o número 35, ou seja, descobrir quais números que, multiplicados, dão como resultado, 35. É fácil deduzir que os números que multiplicados dão como resultado 35, são 5 e 7.

$35 = 5 \times 7$

"5 x 7" é uma forma fatorada do número 35. Obviamente neste caso numérico, também existe uma outra solução, que é "1 x 35".

Em muitos casos, podem ocorrer mais de dois fatores, como:

$70 = 2 \times 5 \times 7$

$80 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 5$

Uma forma para fatorar números inteiros é dividir o número sucessivamente pelos números primos (2, 3, 5, 7, 11...), enquanto for possível.

Exemplo: Fatorar 120
$120 \div 2 = 60$
$60 \div 2 = 30$
$30 \div 2 = 15$ (agora não pode mais ser dividido por 2, passamos para o 3)
$15 \div 3 = 5$ (agora não pode mais ser dividido por 3, passamos para o 5)
$5 \div 5 = 1$

Então $120 = 2x2x2x3x5 = 2^3.3.5$

Para evitar erros, devemos armar as divisões no dispositivo abaixo.

Scanned by CamScanner

120	2
60	2
30	2
15	3
5	5
1	$= 2^3.3.5$

Dentro da álgebra, a fatoração deve ser realizada em *expressões algébricas*. Em alguns casos, a fatoração é bem simples. Outros casos são mais complicados. Em geral usamos os conceitos de *produtos notáveis* aprendidos no capítulo anterior.

Exemplo: Fatorar a expressão x^2+5x+6

A expressão a ser fatorada é um trinômio do segundo grau. Caso esta fatoração seja possível, deve ser na forma do produto de duas expressões do primeiro grau. Tal expressão lembra o *produto de stevin*, já apresentado no capítulo 4:

$(x+a).(x+b) = x^2 + Sx + P$, onde S (soma) vale a+b, e P (produto) vale a.b. No exemplo, o coeficiente do termo em x (5) é a soma dos valores a e b procurados, e o termo independente (6) é o produto desses valores. Sendo assim, devemos identificar dois números tais que sua soma seja 5 e seu produto seja 6. É fácil identificar esses números, que são 2 e 3. A fatoração fica portanto como:

$x^2+5x+6 = (x+2).(x+3)$

Como sempre ocorre na matemática, alguns casos de fatoração são simples, outros são mais trabalhosos.

Usar expressões racionais

Está implícito que em qualquer fatoração, devemos utilizar apenas fatores racionais. Por exemplo, o número 6 pode ser fatorado de forma única como 2 x 3. Se fosse permitido usar fatores irracionais, existiriam infinitas formas de fatoração, como:

$6 = \sqrt{6} \times \sqrt{6}$
$6 = \sqrt[3]{6} \times \sqrt[3]{6} \times \sqrt[3]{6}$
$6 = \sqrt[4]{6} \times \sqrt[4]{6} \times \sqrt[4]{6} \times \sqrt[4]{6}$
$6 = \sqrt{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{3} \times \sqrt{3}$
...

Obviamente não há interesse em usar essas formas, pois são fora do padrão e fogem ao objetivo da fatoração. Fatoramos para usar uma posterior simplificação, ou para reduzir ao mesmo denominador, e para que funcione é preciso que todos os números sejam fatorados pelo mesmo critério e de forma única. Apesar de todos os casos acima também serem tipo de fatoração, convenciona-se a forma única, que é usar fatores primos.

A mesma coisa ocorre na álgebra. O termo x, por exemplo, pode ser expresso como:

$x = \sqrt{x}.\sqrt{x}$
$x = \sqrt[3]{x}.\sqrt[3]{x}.\sqrt[3]{x}$

Scanned by CamScanner

$$x = \sqrt{\frac{x}{2}} \times \sqrt{2x}$$

$$x^2 + x = \sqrt{x^2 + x}.\sqrt{x^2 + x}$$

...

Não há interesse em usar essas formas alternativas de fatoração. Convenciona-se que ao manipular expressões algébricas racionais (forma polinomial), devemos usar apenas expressões algébricas.

Considere por exemplo uma forma alternativa para fatorar a expressão $x^2 - x$. Se tentarmos usar o fórmula da diferença de quadrados, a expressão poderia ser fatorada da forma:

$$x^2 - x = x^2 - \left(\sqrt{x}\right)^2 = \left(x + \sqrt{x}\right)\left(x - \sqrt{x}\right)$$

A igualdade acima está correta, desde que x seja positivo, caso contrário não poderíamos usar a raiz quadrada de x, nos números reais. O que se espera de uma fatoração algébrica é obter fatores racionais, como:

$x^2 - x = x(x - 1)$

Ao trabalhar com álgebra, convenciona-se que as fatorações de expressões racionais devem utilizar como fatores, apenas expressões racionais, ou seja, **nada de radicais !**

Eventualmente pode ser necessário usar fatores irracionais, como no exemplo abaixo:

Exemplo: Simplifique a expressão algébrica $\frac{x^2 - x}{x - \sqrt{x}}$, dado que $x>0$ e $x \neq 1$.

Solução: Como não se trata de uma expressão racional, somos obrigados a operar com fatores não racionais. O numerador pode ser escrito como uma diferença de quadrados, usando termos irracionais, e simplificar com o denominador:

$$\frac{x^2 - x}{x - \sqrt{x}} = \frac{\left(x + \sqrt{x}\right)\left(x - \sqrt{x}\right)}{x - \sqrt{x}} = x + \sqrt{x}$$

Quando se fala em "fatoração" em álgebra, considera-se apenas fatores racionais, é o aluno deve estar atento por em certas situações, como no exemplo acima, pode ser necessário operar com fatores irracionais.

Neste capítulo, no restante deste livro, em tipicamente em toda a álgebra, convencionamos usar apenas fatores racionais, a menos que o problema nos obrigue a usar irracionais, como no exemplo acima.

Fatoração por evidência

Passemos agora a apresentar os principais casos de fatoração. É preciso conhecer todos eles, pois em algumas expressões é preciso usar mais de um caso.

Exemplo: Fatorar $2x + 6y$

Scanned by CamScanner

A fatoração por evidência consiste em encontrar um fator que esteja presente em todos os termos de uma soma de termos algébricos. Neste exemplo observamos que tanto o termo $2x$ quanto o termo $6y$ possuem o fator 2. Podemos escrever a expressão como:

$2.x + 2.3y$

Sendo assim, escrevemos a expressão colocando o "fator 2 em evidência". Ficamos com:

$2x + 6y = 2.x + 2.3y = 2.(x + 3y)$

Colocar um fator em evidência nada mais é que usar, de forma inversa, a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Portanto, a forma fatorada da expressão deste exemplo é $2.(x + 3y)$.

Exemplo: Fatorar $4x^2 + 6xy + 8x$

Devemos transformar esta soma de três parcelas, em um produto de um fator por uma outra soma. Este fator deve estar presente nos três termos desta adição. Na verdade esta fator é o MDC (Máximo Divisor Comum) entre $4x^2$, $6xy$ e $8x$. É fácil ver que os três coeficientes, 4, 6 e 8, podem ser divididos simultaneamente por 2. Já as partes literais das expressões, podem ser divididas simultaneamente por x. Sendo assim podemos escrever:

$4x^2 + 6xy + 8x = 2.x^2 + 2.3xy + 2.4x = 2.x.x + 2.x.3y + 2.x.4$

O fator $2x$ está presente nos três termos, então pode ser colocado em evidência:

$4x^2 + 6xy + 8x = 2x.(x + 3y + 4)$

Com a prática, podemos realizar esta fatoração usando apenas cálculos mentais, ou seja, "de cabeça". No início, fica mais fácil fazer as contas, usando o método do MDC. Vamos recordar como calcular o MDC entre números e aplicá-lo à fatoração por evidência.

Exemplo: Calcule o MDC entre os números 8, 12 e 20

```
8 - 12 - 20 | 2
4 -  6 - 10 | 2
2 -  3 -  5 | MDC = 2.2 = 4
            |
```

Relembrando o método do cálculo do MDC, escrevemos os números na parte esquerda do dispositivo. Procuramos números que possam dividir simultaneamente todos os números. Tipicamente usamos os números primos na ordem crescente (2, 3, 5, 7...). No exemplo, os três números podem ser divididos por 2. Colocamos este fator 2 à direita do dispositivo. Na parte esquerda, repetimos os números, porém divididos por este fator. Ficamos então com 4, 6 e 10. Na etapa seguinte vemos que esses três números podem ser divididos por 2. Ficamos então com 2, 3 e 5. Finalmente verificamos que não é possível encontrar um fator comum entre esses três valores, e a fatoração termina.

Usaremos o mesmo processo para fatorar a expressão do nosso exemplo, $4x^2 + 6xy + 8x$.

```
4x² + 6xy + 8x | 2
2x² + 3xy + 4x | x
 2x +  3y +  4 | MDC = 2x
```

Scanned by CamScanner

Inicialmente dividimos os três termos pelos números primos possíveis, da mesma forma como no cálculo do MMC entre números. O fator comum possível é 2. Na segunda linha, escrevemos a expressão original dividida por 2. Nesta segunda linha, observamos que não existe mais fator numérico comum que possa dividir 2, 3 e 4. Passamos então a usar os fatores literais. Observamos que x é um fator que divide simultaneamente os três termos. Colocamos então x como o próximo fator, na parte direita da segunda linha. Agora colocamos na terceira linha, na parte esquerda, a expressão anterior dividida por este fator x. Ficamos então com 2x + 3y + 4. Observamos então que não é mais possível encontrar um fator que divida simultaneamente 2x, 3y e 4. Esta expressão resultante é a que ficará entre parênteses na fatoração final. O fator que multiplicará esta expressão é o MDC dos termos da expressão original, ou seja, o produto dos fatores encontrados na coluna da direita. A fatoração ficará então:

$4x^2 + 6xy + 8x = 2x.(2x + 3y + 4)$

Como já foi dito, fatorar uma expressão é escrevê-la como uma multiplicação. A fatoração por evidência usa para isto, a propriedade distributiva da multiplicação.

Exercícios

E1) Fatore as expressões abaixo

a) $6x + 3y$
b) $10x + 30y$
c) $15a + 25b$
d) $18m + 72n$
e) $14a + 35z$
f) $10x + 15y + 25z$
g) $12a + 20b + 28c$
h) $7i + 28j + 42k$
i) $6m + 42n + 24p + 54q$
j) $44x + 28y + 24w + 72z$
k) $2x^3 + 3x^2$
l) $12xy^3 + 36x^4y$
m) $12b^2 + 30abc + 36c^3$
n) $x^7 + 12x^6 + 11x^5$
o) $9n^2 – 12mnp + 33m^2n$

Interpretação geométrica da fatoração por evidência

Considere a fatoração de 6x+3y, que sabemos que vale 3.(2x+y). Fazendo x=☺ e y=☎, podemos representar a expressão 6x+3y como:

6x + 3y = ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☎ ☎ ☎

que pode ser reagrupado como

☺ ☺ ☎
☺ ☺ ☎
☺ ☺ ☎

Isso é o mesmo que 3 vezes (☺ ☺ ☎), ou seja, 3.(2x+y).

Quando dizemos que 6x + 3y = 3.(2x+y) estamos dizendo que:

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☎ ☎ ☎ = ☺ ☺ ☎
☺ ☺ ☎
☺ ☺ ☎

Esta interpretação representa o caso em que é colocado em evidência, um número inteiro, no caso, 3.

O caso geral de fatoração por evidência pode ser interpretado com áreas de retângulos. Na figura abaixo, temos dois retângulos, ambos com altura **a**, mas com larguras **m** e **n**. As áreas dos dois primeiros retângulos são respectivamente, **a.m** e **a.n**. Na segunda parte, os dois

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

$a(b+3) + 2(b+3)$

Que sorte! Os dois termos acima possuem como fator comum, (b+3). Então podemos colocar (b+3) em evidência, ficando com:

$(b+3).(a + 2)$

Portanto, a forma fatorada da expressão, usando a técnica do agrupamento, é:

$(b+3).(a+2)$

Exemplo: Fatorar a expressão $ax + bx + 2ay + 2by + 3az + 3bz$

Inicialmente observamos que não existe um termo comum presente nos seis temos da expressão, então a fatoração por evidência não pode ser usada. Tentando usar agrupamento, observamos que os dois primeiros termos possuem um fator x, os dois seguintes possuem um fator comum 2y, e os dois últimos possuem um fator comum 3z. Usando então evidência com esses termos, ficamos com:

$x(a+b) + 2y(a+b) + 3z(a+b)$

Mais uma vez que sorte! Encontramos o fator comum (a+b) nos três termos. Colocando então o fator (a+b) em evidência, ficamos com:

$(a+b).(x + 2y + 3z)$

Note que nem sempre é possível colocar expressões em forma fatorada. Por exemplo, se na expressão original o primeiro termo fosse 2x, ao invés de ax, ficaríamos com:

$x(2+b) + 2y(a+b) + 3z(a+b)$

Não teríamos nesse caso, o fator comum (a+b), e a fatoração não seria possível. Nem sempre é possível encontrar uma fatoração para qualquer expressão. Obviamente as expressões apresentadas nos exercícios propostos de fatoração são obtidas a partir de multiplicações de expressões menores, tornando possível reverter o processo, escrevendo a expressão em forma fatorada.

Exercícios

E4) Fatorar as expressões por agrupamento

a) $am + bm + an + bn$
b) $ab + 3a + 2b + 6$
c) $xy - 7x + 5y - 35$
d) $12xy + 15x + 8y + 10$
e) $10ab - 15a - 16b + 24$
f) $15b + 20 - 6ab - 8a$
g) $3a - ab + 12 - 4b$
h) $m(x - 1) + n(x - 1) + 2p(x - 1)$
i) $ax + ay + bx + by + cx + cy$
j) $ax + bx + cx + 2a + 2b + 2c$

E5) Fatorar as expressões por agrupamento

a) $ax + bx + ay + by$
b) $6ax + 2ay + 3bx + by$
c) $8ax - 10ay - 12bx + 15by$
d) $mn - 2m + 3n - 6$
e) $2x^3 + 3x^2y + 2xy^2 + 3y^3$
f) $12ab - 15ay + 8bx - 10xy$
g) $15x - 10y + 6ax - 4ay$
h) $1 - ny - mx + mnxy$
i) $ax + 2bx + 3cx - ay - 2by - 3cy$
j) $x^2y^2 - x^2 + xy^2 - x + y^2 - 1$

Scanned by CamScanner

Interpretação geométrica da fatoração por evidência

A expressão ax + ay + bx + by pode ser fatorada como (a+b).(x+y). Isto pode ser interpretado como a área de um retângulo de lados (a+b) e (x+y):



A soma das áreas dos quatro retângulos (ax, bx, ay e by) é igual à área do retângulo grande, que vale (a+b).(x+y). Então:

$ax + bx + ay + by = (a+b).(x+y)$

Exercícios

E6) Fatorar as expressões por agrupamento

a) $8a^3x^2 + 4bx^2 - 12a^3 - 6b$
b) $15am + 9bm - 20ax - 12bx$
c) $9a^2x + 21a^2y - 15mx - 35my$
d) $20akxy - 12x^2by - 35akbz + 21b^2xz$
e) $10x^3k - 5abx^3 - 14k + 7ab$
f) $25a^4b - 40a^3b - 5a + 8$
g) $20a^2x^2 + 12a^2y + 5x^3y + 3xy^2$
h) $12x^2y^2z + 3kx^2yz + 8bmxy + 2kxbm$
i) $3x^4y^4 + 4bx^2y^3 - 12ax^2y - 16\,ab$
j) $x^7y^3 - 5b^2x^4y^2 - 3x^3yk^2b^3 + 15k^2b^5$

Fatoração por quadrados e cubos

Fatorar uma expressão é transformá-la no produto de fatores mais simples. Muitas vezes isto é feito aplicando conhecimentos sobre os produtos notáveis, como as fórmulas do quadrado e cubo. Por exemplo:

$(x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$

A fatoração de uma expressão que é um quadrado consiste em identificar quais são os termos do binômio que está elevado ao quadrado. Em uma expressão de três termos, identificamos inicialmente dois deles que sejam quadrados. A seguir verificamos quais são os valores que estão elevados ao quadrado. Finalmente, checamos se o terceiro termo (aquele que não é quadrado) é igual ao dobro do produto desses dois termos.

Exemplo: Fatorar $a^2 + 6a + 9$

Observamos que a^2 e 9 são quadrados perfeitos. São os quadrados de ***a*** e ***3***, respectivamente. Finalmente, verificamos que o terceiro termo da expressão (no caso, 6a) é exatamente igual a 2.a.3. Sendo assim, a expressão é o quadrado de a+3

OBS.: Referimo-nos a "terceiro termo", não como sendo o terceiro na posição, mas sim, o terceiro, considerando que os dois quadrados como primeiro e segundo.

$a^2 + 6a + 9 = (a+3)^2$

Exemplo: Fatorar $x^2 - 8x + 16$

Scanned by CamScanner

Temos aqui dois quadrados, que são x^2 e 16. São os quadrados de x e 4. O termo do meio, 8x, é exatamente o produto 2.x.4, portanto a expressão é um quadrado. O único detalhe é que como este terceiro termo tem um sinal negativo, a expressão é um quadrado de diferença, e não quadrado de soma. Sendo assim:

$x^2 - 8x + 16 = (x - 4)^2$

Exercícios

E7) Fatore as seguintes expressões

a) $a^2 + 2ab + b^2$
b) $m^2 + 20m + 100$
c) $k^2 - 18k + 81$
d) $x^2 - 2x + 1$
e) $a^2 + 12a + 36$
f) $x^2 + 16x + 64$
g) $y^2 + 8y + 16$
h) $m^2 - 14m + 49$
i) $z^2 - 6z + 9$
j) $p^2 - 10p + 25$
k) $b^2 - 22b + 121$
l) $x^2 + 2xy + y2$
m) $a^2 - 16a + 64$
n) $c^2 - 40c + 400$
o) $x^2 + 32x + 256$

Nem sempre os fatores têm forma simples como nos exercícios acima. As expressões podem apresentar um aspecto um pouco mais complicado.

Exemplo: Fatorar $x^8 + 18x^4y + 81y^2$

A primeira dificuldade é que na vida real (provas e concursos, por exemplo), nem sempre é indicado qual é o caso de fatoração a ser usado – isto deve ser descoberto pelo aluno. Rapidamente verificamos que não existe um fator comum entre os três termos da expressão a ser fatorada, então não pode ser evidência, nem agrupamento. Com três termos, é provável que seja um quadrado, ou mesmo um trinômio. Para verificar se é um quadrado, é preciso checar se dois termos são quadrados. Podemos identificar claramente dois quadrados na expressão:

$x^8 = (x^4)^2$
$81y^2 = (9y)^2$

Claro, é preciso levar em conta as propriedades das potências para identificar esses dois quadrados. Portanto, é possível que a expressão seja o quadrado de $x^4 + 9y$, ou $x^4 - 9y$, mas para isto é preciso verificar o terceiro termo, no caso, $18x^4y$. Como o terceiro termo tem sinal positivo, então descartamos a possibilidade de ser o quadrado de $x^4 - 9y$. Verificamos então se o termo do meio é igual a duas vezes o produto de x^4 e de 9y:

$2.\ x^4 . 9y = 18x^4y$

Este é exatamente o termo do meio! Se não fosse, a expressão não poderia ser fatorada como um quadrado (na verdade seria fatorada como um trinômio, como será visto posteriormente neste capítulo.

Sendo assim, a expressão é realmente o quadrado de $(x^4 + 9y)$:

$x^8 + 18x^4y + 81y^2 = (x^4 + 9y)^2$

Scanned by CamScanner

Exercícios

E8) Fatore as seguintes expressões

a) $4m^2 + 12m + 9$
b) $15a^2 + 40ab + 25b^2$
c) $25x^2 + 10x + 1$
d) $1 - 8k + 16k^2$
e) $9x^2 - 30xy + 25y^2$
f) $49a^2 - 56ab + 16b^2$
g) $100x^2 + 600xy + 900y^2$
h) $25x^2y^2 - 10xy + 1$
i) $16p^2 - 24pq^2 + 9q^4$
j) $4x^4y^2 - 20x^2y + 25$
k) $x^8 - 2x^4 + 1$
l) $k^{20} - 4k^{10} + 4$
m) $1 - 2z^5 + z^{10}$
n) $16x^4 - 40x^2y^3 + 25y^6$
o) $25a^2x^2 - 90abxy + 81b^2y^2$

Obviamente, nem sempre os termos aparecem na ordem "quadrado do primeiro + duas vezes o primeiro pelo segundo + quadrado do segundo". Devemos inicialmente identificar os dois quadrados presentes, e o termo restante deve ser testado se realmente é "duas vezes o primeiro pelo segundo".

E9) Fatore as seguintes expressões

a) $2xy + x^2 + y^2$
b) $a^2 + b^2 - 2ab$
c) $100 + x^2 + 20x$
d) $25 + k^2 + 10k$
e) $-14x + x^2 + 49$
f) $25 + 9x^2 - 30x$
g) $6ab + b^2 + 9a^2$
h) $16k^2 + 1 - 8k$
i) $x(25x - 10) + 1$
j) $16m^2 + 49p^2 - 56mp$
k) $9 + k^{16} - 6k^8$
l) $16y^4 + 9x^2 + 24xy^2$
m) $1 - 64p^4 - 16p^2$
n) $9a^2 + 25k^4 + 30ak^2$
o) $49x^2y^2 + 9 + 42xy$

Da mesma forma como podem aparecer quadrados de somas, podem aparecer cubos de somas. Para realizar esta fatoração devemos lembrar a fórmula do cubo da soma/diferença:

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

É mais difícil identificar que uma expressão é um cubo, para poder fatorá-la desta forma. É preciso identificar os cubos de dois números ***a*** e ***b***, e testar se dois termos restantes podem ser representados como os triplos de a^2b e ab^2. Se um cubo (ex: b^3)tiver um sinal negativo, é preciso também verificar se o termo $3a^2b$ também tem sinal negativo.

Exemplo: Fatore $x^3 + 3x^2 + 3x + 1$

Uma expressão a ser fatorada, que tem quatro termos, sendo dois cubos perfeitos (x^3 e 1), nos leva à suspeita de que seja o cubo de uma soma. No caso soma, pois todos os termos têm sinais positivos. Então a expressão é candidata a ser $(x + 1)^3$.

Basta então verificar se os dois termos restantes são os obtidos quando elevamos ao cubo esta expressão:

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$
$$(x + 1)^3 = x^3 + 3x^2.1 + 3.1^2.x + 1^3$$

De fato, os termos $3x^2$ e $3x$ encontrados na expressão original são exatamente os termos "do meio" encontrados quando elevamos $(x + 1)$ ao cubo. Portanto

$$x^3 + 3x^2 + 3x + 1 = (x + 1)^3$$

Cubos de soma ou diferença aparecem com menos frequência nos problemas e provas, pois são de uso mais trabalhoso. Ainda assim podem aparecer, e é preciso saber resolver este tipo de problema.

Scanned by CamScanner

Exercícios

E10) Fatore as seguintes expressões

a) $x^3 + 3x^2y + 3y^2 + y^3$
b) $m^3 - 3m^2 + 3m - 1$
c) $x^3 - 12x^2 + 48x - 64$
d) $a^3 + 9a^2 + 27a + 27$
e) $1 - 6m + 12m^2 - 8m^3$
f) $x^3 + y^3 + 3xy.(x + y)$
g) $8a^3 + 27b^3 + 36a^2b + 54ab^2$
h) $k^3 - 6k^2m + 12km^2 - 8m^3$
i) $1 - 9m + 27m^2 - 27m^3$
j) $x^3 + 0{,}3x^2 + 0{,}03x + 0{,}001$

Fatoração por diferença de quadrados

Este é um caso de fatoração bastante comum, resultante do produto notável que dá o valor de uma soma multiplicada pela diferença de dois valores:

$$(x + y).(x - y) = x^2 - y^2$$

Esta fórmula não pode ser esquecida, pois seu uso é bastante comum em questões de provas e concursos. Resulta da aplicação da propriedade distributiva no produto $(x + y).(x - y)$:

$$(x + y).(x - y) = x^2 - xy + yx - y^2$$

Os termos $-xy$ e yx são simétricos, e cancelam-se, resultando em:

$$(x + y).(x - y) = x^2 - \cancel{xy} + \cancel{yx} - y^2 = x^2 - y^2$$

Sendo assim, a forma fatorada de uma diferença de quadrados de dois valores é o produto da soma pela diferença desses dois valores:

Exemplo: Fatorar $m^2 - 100$

$$m^2 - 100 = m^2 - 10^2 = (m + 10)(m - 10)$$

Exemplo: Fatorar $x^2 - 1$

$$x^2 - 1 = x^2 - 1^2 = (x + 1)(x - 1)$$

Exercícios

E11) Fatore as seguintes expressões

a) $a^2 - b^2$
b) $k^2 - 1$
c) $1 - m^2$
d) $x^2 - 9$
e) $a^2 - 36$
f) $25 - x^2$
g) $x^2 - 121$
h) $4x^2 - 9y^2$
i) $25m^2 - 1$
j) $100 - 9k^2$
k) $9t^2 - 256$
l) $x^2 - 100$
m) $4a^2 - 1$
n) $5x^2 - 5y^2$
o) $2a^2 - 8b^2$

Termos algébricos quadrados não são apenas aqueles que têm a forma "x^2". Também são quadrados os temos formados por:

letras elevadas a qualquer expoente par: x^4, a^8, m^6, etc.
Produto de letras elevadas a expoentes pares: a^2m^4, a^4b^6, $m^8x^{10}k^2$, etc.
Idem, quando multiplicados por coeficiente que seja quadrado perfeito: $9x^2$, $16k^4$, $25m^2p^6$, etc.

Mesmo quando o coeficiente não é quadrado perfeito, podemos dizer que é o quadrado de uma raiz. Por exemplo, $3x^2$ é o quadrado de $\sqrt{3}.x$.

Scanned by CamScanner

Exercícios

E12) Fatore as seguintes expressões

a) $a^4 - b^2$
b) $k^2 - m^4$
c) $q^6 - m^2$
d) $4x^2 - 9$
e) $25a^2 - 36$
f) $25 - 4x^2$
g) $9x^4 - 121$
h) $64x^2 - 81y^4$
i) $25m^2 - 121q^2$
j) $100 - 81k^4$
k) $t^4 - 256$
l) $a^2x^2 - 100$
m) $4a^2b^2 - 1$
n) $a^2x^2 - 9b^4y^2$
o) $4a^2x^4 - 81b^2y^6$

Algumas vezes, uma fatoração por diferença de quadrados pode recair em outra diferença de quadrados.

Exemplo: Fatore $x^8 - y^8$

Os termos x^8 e y^8 são respectivamente os quadrados de x^4 e y^4. Fatorando, ficamos com:

$$x^8 - y^8 = (x^4 + y^4).(x^4 - y^4)$$

O termo $x^4 - y^4$ também é uma diferença de quadrados, e pode ser escrito como $(x^2 + y^2).(x^2 - y^2)$. Ficamos então com:

$$x^8 - y^8 = (x^4 + y^4).(x^4 - y^4) = (x^4 + y^4).(x^2 + y^2).(x^2 - y^2)$$

O termo $(x^2 - y^2)$ é também uma diferença de quadrados, e pode ser escrito como $(x + y).(x - y)$. Finalmente ficamos com:

$$x^8 - y^8 = (x^4 + y^4).(x^4 - y^4) = (x^4 + y^4).(x^2 + y^2).(x^2 - y^2) = (x^4 + y^4).(x^2 + y^2).(x + y).(x - y)$$

Exemplo: Fatorar $x^{16} - 1$

Aplicando o mesmo princípio, ficamos com:

$$x^{16} - 1 = (x^8 + 1).(x^4 + 1).(x^2 + 1).(x + 1).(x - 1)$$

Exemplo: Fatorar $x^{16} - a^{16}$

$$x^{16} - a^{16} = (x^8 + a^8).(x^4 + a^4).(x^2 + a^2).(x + a).(x - a)$$

Exercícios

E13) Fatorar as expressões

a) $a^{2m} - b^{2m}$
b) $16a^4b^4 - 1$
c) $1 - x^4$
d) $(x+y)^2 - (x-y)^2$
e) $a^8 - b^8$
f) $(x+y)^2 - a^2$
g) $(x^k)^2 - (y^2)^k$
h) $3x^2 - 27y^2$
i) $256z^8 - 81w^4$
j) $(5x+4y)^2 - (3x-4y)^2$
k) $10m^2 - 40n^2$
l) $xy - 16m^4xy$
m) $b^2 - 4.a^2c^2$
n) $a^2 - 2ab + b^2 - x^2$
o) $a^2 + 2ab + b^2 - 1$

Soma e diferença de cubos

$(a + b)^3$ não é a mesma coisa que $a^3 + b^3$, e $(a - b)^3$ não é a mesma coisa que $a^3 - b^3$. Entretanto, as expressões $a^3 + b^3$ e $a^3 - b^3$ podem ser fatoradas pelas seguintes fórmulas:

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

Scanned by CamScanner

É fácil demonstrar esta igualdade, basta desenvolver a expressão do segundo membro:

$(a + b)(a^2 - ab + b^2) = a^3 - \cancel{a^2b} + \cancel{ab^2} + \cancel{ba^2} - \cancel{ab^2} + b^3 = a^3 + b^3$

Da mesma forma, podemos também fatorar a diferença de cubos:

$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$

Exemplo: Fatorar $x^3 - 27$
Usando a fórmula:

$x^3 - 27 = x^3 - 3^3 = (x - 3)(x^2 + 3x + 3^2) = (x - 3).(x^2 + 3x + 9)$

Exemplo: Fatorar $a^3 + 1$

$a^3 + 1 = a^3 + 1^3 = (a + 1).(a^2 - a + 1)$

Exercícios

E14) Fatore as seguintes expressões

a) $x^3 + y^3$
b) $8m^3 - 1$
c) $1 - x^3$
d) $a^3 + 1000$
e) $x^3 + 8$
f) $512 + 27a^3$
g) $k^3 - 64$
h) $8x^3 + 27y^3$
i) $x^6 - y3$
j) $64x^3 - 125y^3$
k) $1 + m^6$
l) $x3 + 3x2y + 3xy2 + y3 - 1$
m) $a^3 + b^3 + 3ab(a+b) - 1$
n) $64x^3 + 27$
o) $1000x^3 + 1000000$

Trinômio do segundo grau na forma $x^2 + bx + c$

Um trinômio do segundo grau pode ser fatorado como um produto de dois binômios do primeiro grau, desde que o trinômio tenha raízes reais. Esses conceitos não podem ser demonstrados agora, pois isto depende do conhecimento de equações do segundo grau. Nos exercícios de fatoração deste capítulo, usaremos sempre trinômios cuja fatoração seja possível.

O trinômio do segundo grau é resultado de um produto notável apresentado no capítulo anterior: o *produto de Stevin.*

Exemplo: Calcule o seguinte produto:
$(x + 2).(x + 3)$

Esta simples expressão pode ser calculada usando apenas a distributividade da multiplicação em relação à adição:

$(x + 2).(x + 3) = x^2 + 3x + 2x + 6$
$= x^2 + 5x + 6$

O coeficiente 5 nada mais é que a soma dois termos independentes (2 e 3) na expressão original, o termo 6 do resultado nada mais é que o produto desses valores. Isto pode ser visto facilmente quando consideramos em uma forma geral:

$(x + a).(x + b) = x^2 + ax + bx + ab = x^2 + (a+b)x + ab = x^2 + Sx + P$

Onde S é a soma dos valores independentes dos binômios que estão sendo multiplicados, e P é o seu produto.

Scanned by CamScanner

A fatoração do trinômio do segundo grau requer a descoberta de dois valores que somados resultam em S e multiplicados resultam em P.

Exemplo: Fatorar $x^2 + 13x + 40$

Temos que identificar dois números que, somados resultam em 13 e multiplicados resultam em 40. Existe uma fórmula para identificar esses números (fórmula para resolução da equação do segundo grau), mas com a prática o cálculo pode ser feito mentalmente, esses números são 8 e 5. Portanto

$$x^2 + 13x + 40 = (x + 5).(x + 8)$$

Resolver o trinômio "mentalmente" é um pouco de adivinhação, com tentativas e erros. O segredo é fatorar o produto em dois números que tenham a soma desejada. O número 40 pode ser fatorado como 4 x 10, mas a soma de 4 e 10 é 14, e não 13. Então tentamos outra forma de fatorar o 40, poderia ser 40 x 1, 20 x 2, 8 x 5... Como 8 + 5 = 13, esta é a resposta, os dois números que multiplicados resultam em 40 e somados resultam em 13, são 8 e 5.

Exercícios

E15) Fatore os seguintes trinômios do segundo grau

a) $x^2 + 6x + 8$
b) $x^2 + 4x + 3$
c) $x^2 + 6x + 5$
d) $x^2 + 7x + 10$
e) $x^2 + 10x + 16$
f) $x^2 + 10x + 21$
g) $x^2 + 9x + 14$
h) $x^2 + 11x + 18$
i) $x^2 + 12x + 35$
j) $x^2 + 12x + 27$
k) $x^2 + 12x + 20$
l) $y^2 + 7y + 12$
m) $m^2 + 8m + 15$
n) $k^2 + 14k + 24$
o) $z^2 + 9z + 20$

Ao fatorar um trinômio do segundo grau, temos que levar em conta os sinais. Quando os sinais são todos positivos, como no exercícios acima, ou seja, tanto o produto como a soma são positivos, então os números procurados também são positivos.

Por outro lado, a expressão pode assumir sinais negativos, tanto na soma como no produto. Considere por exemplo a expressão

$$(x - 5).(x - 3)$$

Ao ser desenvolvido este produto de stevin, resultará o seguinte trinômio:

$$x^2 - 8x + 15$$

Observe que a soma tem um sinal negativo (– 8), mas o produto (15) é positivo. Isto significa que os dois números procurados são negativos, pois seu produto é positivo e a soma é negativa.

Exemplo: Fatorar $x^2 - 7x + 12$

De acordo com os sinais, os dois números procurados são negativos, já que seu produto é positivo e a soma é negativa. Esses números procurados têm produto +12 e soma – 7. Os dois números são portanto –3 e –4.

$$x^2 - 7x + 12 = (x - 3).(x - 4)$$

Scanned by CamScanner

Um cuidado extra deve ser tomado quando o produto é negativo. Vejamos o que ocorre através de dois exemplos:

a) $(x + 2).(x - 5) = x^2 - 3x - 10$

b) $(x - 3).(x + 8) = x^2 + 5x - 24$

Nesses dois exemplos, o produto é negativo (–10 e –24), já que os dois números procurados são, um positivo e um negativo. O termo em x nesse caso, é a diferença entre os valores procurados, e não a soma (na verdade é a soma algébrica, que no caso, é uma diferença).

A diferença entre os dois casos é o sinal do termo em x. Na letra (a) o termo em x é negativo (–3x), e na letra (b) o termo em x é positivo (+5). Este sinal é do termo em x é o mesmo do maior dos números procurados.

No caso (a), os números procurados são, em módulo, 2 e 5, sendo que um ficará positivo e o outro negativo. O maior dos números levará o sinal do termo em x. Como o termo em x nesse caso é negativo (–3x), o 5, que é o de maior módulo, ficará com sinal negativo. Os números procurados são portanto, +2 e –5.

No caso (b), o termo em x é positivo (+5x). Sendo assim, entre os números encontrados (3 e 8) o maior (8) ficará com o sinal do termo em x, ou seja, positivo. Os números procurados são portanto, –3 e +8.

Resumindo:
a) Todos os termos do trinômio são positivos: os números procurados são positivos
Ex: $x^2 + 22x + 40 = (x + 2).(x + 20)$

b) O termo em x é negativo e o termo independente é positivo: Os dois números são negativos.
Ex: $x^2 - 8x + 15 = (x - 3).(x - 5)$

c) O termo independente é negativo, os números procurados têm sinais contrários. O maior dos números em valor absoluto tem o mesmo sinal do termo em x.
Ex: $x^2 + 2x - 8 = (x - 2).(x + 4)$
Ex: $x^2 - 5x - 14 = (x - 7).(x + 2)$

Trinômios que não podem ser fatorados

Dependendo dos coeficientes do trinômio, a fatoração pode ser impossível. Isto está relacionado com o "delta" do trinômio, e será estudado nos capítulos 13 e 21. Por hora vamos apresentar uma "receita" para identificar um trinômio que não pode ser fatorado. Vamos ilustrar com um exemplo:

Exemplo: Fatorar o trinômio $x^2 + 6x + 5$ usando a técnica de completar quadrados.

O trinômio começa com $x^2 + 6x$... então tentaremos formar na expressão, o quadrado de $(x + 3)$. Para isso vamos somar e subtrair 9, para formar o temo "quadrado do segundo":

$x^2 + 6x + 5 = x^2 + 6x + 9 - 9 + 5 = (x + 3)^2 - 4$

Conseguimos assim formar uma diferença de quadrados, que fatorada resulta no produto da soma pela diferença dos termos que estão elevados ao quadrado:

Scanned by CamScanner

$(x + 3)^2 - 4 = (x + 3 + 2)(x + 3 - 2) = (x + 5)(x + 1)$

Exemplo: Idem, com o trinômio $x^2 + 6x + 20$

Usando o mesmo método, ficamos com:

$x^2 + 6x + 20 = x^2 + 6x + 9 - 9 + 20 = (x + 3)^2 + 11$

A expressão encontrada não é uma diferença de quadrados, mas sim, uma soma de quadrados, que não é fatorável, ou seja, não pode ser expressa como um produto de fatores racionais.

A receita que apresentamos no momento, até que isto seja provado quando estudarmos as equações do 2º grau, é:

Um trinômio do 2º grau, na forma $ax^2 + bx + c$, não pode ser fatorado quando a metade do quadrado do termo em x for menor que o produto dos outros dois termos: $(b/2)^2 < a.c$

No exemplo dado, $x^2 + 6x + 20$, vemos que $3^2 = 9$ é menor que 1 x 20 = 20. (isto é o mesmo que dizer que no trinômio do 2º grau, o fator delta ($b^2 - 4ac$) é menor que zero – aguarde o capítulo 13). Mesmo sem demonstrar, vemos que esta condição resulta na formação de uma soma de quadrados, ao invés de uma diferença, o que torna a fatoração impossível.

Exercícios

E16) Fatorar as seguintes expressões

a) $x^2 + 6x + 8$
b) $x^2 - 8x + 15$
c) $x^2 - 10x + 21$
d) $x^2 + 12x + 11$
e) $x^2 - 13x + 22$
f) $x^2 + 15x + 56$
g) $x^2 - 11x + 28$
h) $x^2 + 15x + 50$
i) $x^2 - 14x + 24$
j) $x^2 - 16x + 39$
k) $x^2 - 19x + 48$
l) $x^2 - 17x + 52$
m) $x^2 + 21x + 54$
n) $x^2 - 25x + 100$
o) $x^2 - 19x + 90$

E17) Fatorar as seguintes expressões

a) $x^2 - 5x - 24$
b) $x^2 + 10x - 24$
c) $x^2 - x - 90$
d) $x^2 + 4x - 45$
e) $x^2 - 9x - 52$
f) $x^2 - 4x - 32$
g) $x^2 - 2x - 35$
h) $x^2 + 11x - 60$
i) $x^2 - 4x - 60$
j) $x^2 + 5x - 50$
k) $x^2 - 57x - 58$
l) $x^2 + 14x - 72$
m) $x^2 + 5x - 84$
n) $x^2 + 2x - 99$
o) $x^2 - 10x - 75$

Trinômio do segundo grau na forma $ax^2 + bx + c$

Uma pequena adaptação no método de fatoração apresentado para trinômios na forma $x^2 + bx + c$ permite que fatoremos também os trinômios da forma $ax^2 + bx + c$. O método também é baseado em encontrar dois números com soma e produto dados.

Vamos primeiro mostrar a aplicação do método, e depois justifica-lo.

Exemplo: Fatorar o trinômio $10x^2 + 9x + 2$

O método é o seguinte: desmembrar o coeficiente do termo em ***x*** (no caso, 9) em duas partes, tais que a soma seja 9 (o coeficiente do termo em x) e o produto seja 20 (o produto dos dois outros termos, no caso, 10x2).

Soma = 9; Produto = 20

Scanned by CamScanner

Os números procurados são 4 e 5. Devemos então trocar o termo 9x por 5x + 4x

$10x^2 + 9x + 2 = 10x^2 + 5x + 4x + 2$

Agora entre os dois primeiros termos, podemos colocar 5x em evidência, e entre o terceiro e o quarto termo, podemos colocar 2 em evidência, ficando com:

$5x.(2x + 1) + 2.(2x + 1)$

Desta forma aparece o fator comum 2x + 1, trata-se de uma fatoração por agrupamento, que resulta em:

$(5x + 1).(2x + 1)$

Justificativa do método da fatoração de $ax^2 + bx + c$

O método demonstrado é baseado em encontrar dois números cuja soma seja ***b*** e cujo produto seja ***ac***. Isto tem uma justificativa matemática bem simples. Considere que desejamos encontrar os quatro números m, n, p e q, de tal forma que:

$ax^2 + bx + c = (mx + n).(px + q)$

onde a, b e c são termos conhecidos, tal qual como foi feito no exemplo anterior. Se a expressão no segundo membro for expandida, ficaremos com:

$ax^2 + bx + c = mp.x^2 + (mq + np).x + nq$

A princípio não vamos determinar os quatro números m, n, p e q, que são os coeficientes necessários para encontrar a forma fatorada. Podemos encontrar antes os números mq e np, que formam o desmembramento do termo em x na expressão original. Note que a soma de mp e nq resulta em b, e o seu produto, mnpq é exatamente igual ao produto dos dois demais termos na expressão original mp.nq = a.c. Obtendo os valores de mq e np por este processo, podemos reagrupar a expressão na forma:

$mp.x^2 + npx + mqx + nq = px.(mx + n) + q.(mx + n) = (mx + n).(px + q).$

Note que o termo em x^2 foi agrupado com npx. Façamos desta fez agrupando-o com o termo mqx:

$mp.x^2 + mqx + npx + nq = mx.(px + q) + n.(px + q) = (mx + n).(px + q).$

Ou seja, em desmembrar o termo ***bx*** da expressão original, de tal forma que atenda as condições de soma e produto, a escolha de qual deles se agrupará com ax^2 e qual se agrupará com ***c***, produzirá o mesmo resultado.

Exemplo: Fatorar $6x^2 + 19x + 10$

Inicialmente devemos encontrar dois números tais que sua soma e produto sejam:

Soma = 19
Produto = 6 x 10 = 60

Os números procurados são 4 e 15. A expressão será então desmembrada em:

Scanned by CamScanner

$6x^2 + 4x + 15x + 10$

Entre os dois primeiros termos, o fator comum é 2x, e entre os dois seguintes o fator comum é 5:

$6x^2 + 4x + 15x + 10 = 2x.(3x + 2) + 5.(3x + 2)$

Aparece o fator comum (3x + 2), que por agrupamento resulta em:

$6x^2 + 4x + 15x + 10 = 2x.(3x + 2) + 5.(3x + 2) = (2x + 5).(3x + 2)$

Resumindo, o método a ser aplicado para fatorar trinômios do segundo grau nos quais o coeficiente de x^2 é diferente de 1, é:

1) Chamemos os coeficientes de a, b, e c, indicando o trinômio na forma $ax^2 + bx + c$

2) Calculamos a soma e o produto na forma:

Soma = b
Produto = a.c

3) Determinamos os dois números ***p*** e ***q*** cuja soma e produto sejam esses valores.

4) Desmembramos o termo **bx** em dois termos **px** e **qx**.

5) Um desses termos será agrupado com ax^2, o outro será agrupado com **c**, a seguir finalizamos a fatoração usando agrupamento.

Exercícios

E18) Fatore os seguintes trinômios do segundo grau

a) $2x^2 + 6x + 4$
b) $2x^2 + 7x + 3$
c) $3x^2 + 8x + 5$
d) $5x^2 + 7x + 2$
e) $8x^2 + 10x + 2$
f) $7x^2 + 10x + 3$
g) $2x^2 + 9x + 7$
h) $6x^2 + 11x + 3$
i) $5x^2 + 12x + 7$
j) $6x^2 + 25x + 24$
k) $4x^2 + 12x + 5$
l) $3y^2 + 7y + 4$
m) $5m^2 + 8m + 3$
n) $3k^2 + 14k + 8$
o) $5z^2 + 9z + 4$

Quando o trinômio possui sinais negativos, usamos as mesmas regras de sinais aplicadas para os trinômios que possuem a=1.

Exemplo: Fatorar $2x^2 - 7x + 5$

Como o termo c (no caso, 5) é positivo e o termo b (no caso, –7), os dois números procurados são negativos. Em valor absoluto, os números possuem:

Produto = 2 x 5 = 10
Soma = 7

Esses números serão 2 e 5, e ambos levarão o sinal negativo:

$2x^2 - 7x + 5 = 2x^2 - 2x - 5x + 5 = 2x.(x - 1) - 5.(x - 1) = (2x - 5).(x - 1)$

Scanned by CamScanner

Exemplo: Fatorar $2x^2 + 7x - 15$

Neste caso o produto é negativo, então os números encontrados serão um positivo e um negativo.

Diferença = 7
Produto = 2 x 15 = 30

Os números procurados são 3 e 10. O maior deles ficará com o sinal de *b*, então serão –3 e +10.

$2x^2 + 7x - 15 = 2x^2 - 3x + 10x - 15 = x.(2x - 3) + 5.(2x - 3) = (x + 5).(2x - 3)$

Exemplo: Fatorar $-3x^2 - 2x + 8$

As regras de sinais para os números procurados exigem que o coeficiente de x^2 seja positivo. Sendo assim, vamos colocar -1 em evidência:

$-3x^2 - 2x + 8 = -(3x^2 + 2x - 8)$

Produto = –24
Diferença = 2

Os números procurados são 4 e –6.

$-3x^2 - 2x + 8 = -(3x^2 + 2x - 8) = -(3x^2 + 4x - 6x - 8) = -(x(3x + 4) - 2.(3x + 4))$
$= -(x - 2).(3x + 4) = (2 - x).(3x + 4)$

Exercícios

E19) Fatorar as seguintes expressões

a) $10x^2 + 11x - 6$
b) $3x^2 - 8x + 5$
c) $2x^2 + 9x - 26$
d) $7x^2 + 5x - 12$
e) $11x^2 - 13x + 2$
f) $7x^2 + 15x + 8$
g) $4x^2 - 11x + 7$
h) $13x^2 - 9x - 4$
i) $3x^2 - 10x - 25$
j) $13x^2 - 16x + 3$
k) $6x^2 - 19x + 8$
l) $4x^2 - 17x + 13$
m) $11x^2 + 2x - 9$
n) $4x^2 - 25x + 25$
o) $7x^2 - 2x - 5$

Fatorações combinadas

Uma expressão pode recair em mais de um caso de fatoração. Quando isto ocorre, encontramos os fatores resultantes do primeiro caso de fatoração e verificamos se esses fatores podem ainda ser fatorados por outro método.

Exemplo: Fatorar $10ax^2 - 10ay^2$
Vemos claramente que o fator *10a* pode ser colocado em evidência na expressão. Ficamos então com:

$10ax^2 - 10ay^2 = 10a(x^2 - y^2)$

O fator $x^2 - y^2$, por sua vez, é uma diferença de quadrados. Substituímos então $(x^2 - y^2)$ pela sua forma fatorada, ficando então com:

$10ax^2 - 10ay^2 = 10a(x^2 - y^2) = 10a.(x + y).(x - y)$

Scanned by CamScanner

Exercícios

E20) Fatore as seguintes expressões

a) $x^2y - 7x^2 + 5xy - 35x$
b) $10a^2b - 15a^2 - 16ab + 24a$
c) $3ax^2 - abx^2 + 12x^2 - 4bx^2$
d) $15bxy^2 + 20xy^2 - 6abxy^2 - 8axy^2$
e) $abmx^2 + 3amx^2 + 2bmx^2 + 6mx^2$
f) $4xya^2 + 8xyab + 4xyb^2$
g) $3abk^2 - 54abk + 243ab$
h) $5mxz^2 - 30mxz + 45mx$
i) $2am^3 - 6am^2 + 6am - 2a$
j) $2a^3x + 18a^2x + 54ax + 54x$
k) $4ax^8 - 4a$
l) $7a^3x^2 - 700a$
m) $2axq^6 - 2axm^2$
n) $4a^2x^7 - 81x^3b^2y^6$
o) $10ax^3 - 10a$

E21) Fatore as seguintes expressões

a) $5ax^2 + 30ax + 40a$
b) $2a^3x^2 + 24a^3x + 22a^3$
c) $4mx^3 - 44mx^2 + 112mx$
d) $5amx^2 - 80amx + 195am$
e) $4ax^3 - 68ax^2 + 208ax$
f) $x^4y + 10x^3y - 24x^2y$
g) $x^2 - 2x - 35 + x^3 - 2x^2 - 35x$
h) $(a + 1)x^2 + 14(a + 1)x - 72(a + 1)$
i) $10x^2 - 100x - 750$
j) $4m^2x^2 + 16m^2x - 180m^2$

Fatoração por "mágica"

Em alguns casos, fatorar pode requerer um pouco de adivinhação. Por exemplo considere a expressão:

$$4a^2 - 4ax + x^2 - 4y^2$$

Como a expressão tem quatro termos, somos tentados a usar agrupamento, observando que é possível colocar 4a em evidência nos dois primeiros termos. Indo por esse caminho falharemos em colocar em evidência um valor entre o terceiro e o quarto termo. Como existem três coeficientes "4", somos também tentados a combinar os termos em outra ordem. Nada disso dá certo neste caso.

Observando atentamente, notamos que os três primeiros termos formam um quadrado. É o quadrado de $(2a - x)$. A expressão pode ser escrita então como:

$$(2a - x)^2 - 4y^2$$

Ficamos assim com uma diferença de quadrados: o quadrado de $2a - x$ e o quadrado de $2y$. Fatorando, ficamos com o produto da soma pela diferença:

$$(2a - x + 2y).(2a - x - 2y)$$

Imagine agora uma expressão semelhante, porém com x no lugar de y:

$$4a^2 - 4ax + x^2 - 4x^2 = 4a^2 - 4ax - 3x^2$$

Desta forma não ficou tão fácil observar que a expressão é uma diferença de quadrados, pois o segundo quadrado, $4x^2$, ficou misturado com parte do primeiro quadrado.

Aqui pode ser usado um pouco de mágica. Mágica em matemática é fazer uma operação inesperada que resolve o problema, mas que não existe técnica alguma que indique que esta é a operação a ser feita.

Quem já resolveu fatorações parecidas com esta, sabe que pode recair em uma diferença de quadrados, porém o quadrado conveniente não está aparecendo na expressão.

Scanned by CamScanner

A expressão $4a^2 - 4ax - 3x^2$ lembra um quadrado perfeito, exceto pelo terceiro termo. O primeiro termo, $4a^2$, é o quadrado de 2a. O segundo termo 4ax, é o mesmo que 2.2a.x. Para formar um quadrado perfeito, este termo teria que ser "duas vezes o primeiro pelo segundo". Como o termo 2a seria o "primeiro termo" da expressão que está elevada ao quadrado, o segundo termo desta expressão seria ***x***, mas para isto a expressão teria que ter x^2, que seria o "quadrado do segundo". Nesse caso devemos fazer uma "mágica", que é completar com o termo que formaria o quadrado. Para isto vamos somar e subtrair x^2. É preciso somar para completar o quadrado, e subtrair para não alterar o valor da expressão. Ficamos então com:

$$4a^2 - 4ax + x^2 - 3x^2 - x^2 = = (2a - x)^2 - 4x^2$$

Como $4x^2$ é um quadrado $(2x)^2$, ficamos com uma diferença de quadrados:

$$(2a - x)^2 - (2x)^2$$

Esta expressão por sua vez pode ser fatorada como o produto da soma pela diferença dos termos:

$$(2a - x + 2x).(2a - x - 2x) = (2a + x).(2a - 3x)$$

Informalmente chamamos isto de "mágica" porque o aluno precisa adivinhar a alteração a ser feita em uma expressão para ficar de uma forma conveniente que resolva o problema. Em alguns casos pode-se perder muito tempo com esse tipo de questão, por isso pode ser crueldade usar tais questões em provas.

Exemplo: Fatore $x^2 - 20x + 96$

A expressão é um trinômio do segundo grau, portanto é preciso identificar quais são os dois números que somados resultam em 20, e multiplicados resultam em 96. Vamos mostrar como isto pode ser resolvido com o método de somar e subtrair um valor de tal forma que seja formada uma diferença de quadrados.

A expressão "$x^2 - 20x$" lembra um quadrado perfeito. Como o termo em x é "duas vezes o primeiro pelo segundo", então a expressão se assemelha ao quadrado de (x – 10). Para isto, a expressão teria que ter o termo 100. Vamos então somar e subtrair 100, ficando com:

$$x^2 - 20x + 100 - 100 + 96 = (x - 10)^2 - 4$$

Ficamos agora com uma diferença de quadrados:

$$(x - 10)^2 - 4 = (x - 10)^2 - 2^2$$

que fatorada fica:

$$(x - 10 + 2).(x - 10 - 2) = (x - 8).(x - 12)$$

Este método pode ser usado quando não conseguimos identificar os números a partir da sua soma e seu produto.

Exemplo: Fatorar $x^2 - 4xy + 4y^2 + 3x - 6y + 2$

Claramente observamos que os três primeiros termos formam um quadrado. É o quadrado de (x – 2y). Entretanto, não encontramos nos termos restantes, o suficiente para formar um outro

Scanned by CamScanner

quadrado, o que resultaria em uma diferença de quadrados. Felizmente podemos escrever os três últimos termos como $3(x - 2y) + 2$. A expressão toda pode ser escrita como:

$$(x - 2y)^2 + 3(x - 2y) + 2$$

Se fizermos $z = (x - 2y)$, observamos claramente que a expressão é um trinômio do segundo grau:

$$z^2 + 3z + 2$$

que por sua vez fica fatorada como $(z + 1).(z + 2)$. Substituindo z por $x - 2y$ ficamos com

$$(x - 2y + 1).(x - 2y + 2)$$

Exemplo:
Mostre que $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx)$
e que, se $x + y + z = 0$, $x^3 + y^3 + z^3 = 3xyz$

Desenvolvendo o segundo membro, temos:

$$\begin{aligned}&(x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx) = \\ &x^3 + xy^2 + xz^2 - x^2y - xyz - x^2z \\ &+ x^2y + y^3 + yz^2 - xy^2 - y^2z - xyz \\ &+ x^2z + y^2z + z^3 - xyz - yz^2 - xz^2\end{aligned}$$

Vários termos serão cancelados: xy^2 com $-xy^2$, xz^2 com $-xz^2$, x^2y com $-x^2y$, yz^2 com $-yz^2$, x^2z com $-x^2z$ e y^2z com $-y^2z$. Depois dos cancelamentos, sobrarão apenas:

$$x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$$

Fica assim demonstrado que

$$x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx)$$

Se tivermos $x + y + z = 0$, a expressão do segundo membro será igual a 0. Nesse caso,

$$x^3 + y^3 + z^3 = 3xyz$$

É um caso de fatoração pouquíssimo conhecido, e sem conhecer este resultado, dificilmente alguém conseguirá deduzi-lo em tempo hábil, por exemplo, resolvendo uma questão em uma prova. Seria uma "fatoração mágica". Este tipo de fatoração já foi pedido em provas, por exemplo, na Olimpíada Brasileira de Matemática.

E22) Fatore as seguintes expressões

a) $4x^4 - x^2 + 2x - 1$
b) $2x^3 - 3x^2 - 27$
c) $x^3 - 3x + 2$
d) $x^4 - 25x^2 + 100$
e) $16k^4 - 20k^2 + 4$
f) $4x^2y^2 - (x^2 + y^2 - z^2)^2$ $(x>0, y>0, z>0)$
g) $x^4 - 5x^2 + 4$
h) $a^4 + b^4 + a^2b^2$
i) $a^4 + b^4$
j) $a^2 + b^2$

Scanned by CamScanner

Polinômios

A fatoração de polinômios pode ser extremamente complexa e será abordada no capítulo 21. Em alguns casos, a quantidade de cálculos necessários impede que esse tipo de questão seja exigida em provas. Quando aparecem em provas, em geral são escolhidos polinômios particulares que permitem fatoração por métodos simples. Por exemplo:

$x^3 + 5x^2 + x + 5$

Os coeficientes deste polinômio foram estrategicamente escolhidos para permiti uma fácil fatoração através de agrupamento:

$x^3 + 5x^2 + x + 5 = x^2(x + 5) + (x + 5) = (x^2 + 1)(x + 5)$

Via de regra, um polinômio que não tenha seus coeficientes "amistosamente escolhidos" pelo formulador da questão a ponto de permitir uma fatoração fácil como esta. Vejamos mais dois exemplos que aparentemente são difíceis mas possuem fatorações simples:

Exemplo: Fatore $x^4 + 6x^2 - 16$
Um polinômio de quarto grau com potências pares pode ter sua fatoração facilitada quando fazemos $y=x^2$. Ficamos então com:

$y^2 + 6y - 16$, que é facilmente fatorado como $(y + 8).(y - 2)$. Fazendo $y=x^2$, ficamos com:

$(x^2 + 8).(x^2 - 2)$

Existe um outro caminho que nos leva ao mesmo resultado. Partindo do polinômio original

$x^4 + 6x^2 - 16$

tentamos exprimir os termos como uma diferença de quadrados. Neste exemplo é muito tentador usar 16 como um dos quadrados, mas desta forma, os termos $x^4 + 6x^2$ não formarão um quadrado. Então vamos inicialmente "completar um quadrado" com esses dois termos. Parece ser o quadrado de $(x^2 + 3)$. Para que forme um quadrado, falta o termo 9. Vamos então somar e subtrair 9 à expressão:

$x^4 + 6x^2 + 9 - 9 - 16 = (x^2 + 3)^2 - 25$

Conseguimos então formar uma diferença de quadrados, que fatorada fica:

$(x^2 + 3)^2 - 25 = (x^2 + 3 + 5)(x^2 + 3 - 5) = (x^2 + 8)(x^2 - 2)$

Exemplo: Fatorar $x^4 + 2x^2 + 9$
Vamos adicionar e subtrair 1 para completar o quadrado $x^4 + 2x^2 + 1$, que é $(x^2 + 1)^2$:

$x^4 + 2x^2 + 1 - 1 + 9 = (x^2 + 1)^2 + 8$

Por este caminho não formamos uma diferença de quadrados. Tentemos portanto um outro caminho, que é completar um quadrado que tenha os termos x^4 e 9. Seria o quadrado de $(x^4 + 3)$. Para completar este quadrado temos que somar e subtrair o termo $6x^2$:

$x^4 + 2x^2 + 9 = x^4 + \mathbf{6x^2} + 9 + 2x^2 - \mathbf{6x^2}$

Scanned by CamScanner

$= (x^2 + 3)^2 - 4x^2 = (x^2 + 3)^2 - (2x)^2 = (x^2 + 3 + 2x)(x^2 + 3 - 2x)$

É de praxe representar os polinômios de forma ordenada:

Resposta: $(x^2 + 2x + 3)(x^2 + 3 - 2x)$

Exemplo: Fatorar $x^6 - 7x^3 - 8$
Um caminho para esta fatoração é fazer $y = x^3$ e fatorar o trinômio de segundo grau em y:

$y^2 - 7y - 8 = (y + 1)(y - 8) = (x^3 + 1)(x^3 - 8)$

Usando agora as fórmulas de fatoração da soma e da diferença de cubos, ficamos com:

$(x + 1)(x^2 - x + 1)(x - 2)(x^2 + 2x + 2)$

Outro caminho é transformar a expressão original em uma diferença de quadrados. Temos que completar o quadrado de $(x3 - 7/2)$:

$x^6 - 7x^3 - 8 = x^6 - (7/2)x^3 + 49/4 - 8 - 49/4 = (x^3 - 7/2)^2 - 81/4 = (x^3 - 7/2)^2 - (9/2)^2$

$= (x^3 - 7/2 + 9/2).(x^3 - 7/2 - 9/2) = (x^3 + 1).(x^3 - 8)$

Fatorando a soma e a diferença de cubos, ficamos com o mesmo resultado:

Resposta: $(x + 1)(x^2 - x + 1)(x - 2)(x^2 + 2x + 2)$

Dependendo do caso, um caminho poderá ser mais ou menos trabalhoso que o outro.

Exemplo: Fatorar $x^4 - 3x^3 - 7x^2 + 27x - 18$
Fatorar é encontrar fatores. Quando um polinômio tem uma raiz a, temos P(a) = 0 (teorema do resto). Podemos então fazer a divisão por $(x - a)$ e colocar $(x - a)$ em evidência. Existe um teorema que será mostrado no capítulo 21, o teorema das raízes racionais, que diz que se um polinômio tem uma raiz racional da forma p/q, p = é um divisor do termo numérico, e q é um divisor do coeficiente de mais alto grau, no nosso caso, as raízes racionais, caso existam, são divisores de 18, positivos ou negativos. Se tivermos que testar números para checar se são raízes, devemos testar ±1, ±2, ±3, ±6, ±9, ±18. Esses são os candidatos, e os números mais fáceis de serem testados são 1 e –1.

$P(1) = 0$; $P(-1) = -48$.

Como já achamos a raiz 1, vamos dividir o polinômio por $(x - 1)$:

$(x^4 - 3x^3 - 7x^2 + 27x - 18)/(x - 1) = x^3 - 2x^2 - 9x + 18$; Resto = 0
(Caso esteja com saudades de divisões polinomiais, recomendamos o capítulo 3)

Podemos então colocar $(x - 1)$ em evidência:
$(x - 1)(x^3 - 2x^2 - 9x + 18)$

A expressão do terceiro grau pode ser fatorada por agrupamento, já que notamos que a relação entre o primeiro e o segundo coeficientes é –1:2, a mesma relação entre o terceiro e o quarto.

$(x - 1)[x^2(x - 2) - 9(x - 2)] = (x - 1)(x^2 - 9)(x - 2)$

Scanned by CamScanner

Finalmente fatoramos a diferença de quadrados e temos o polinômio de 4º grau totalmente fatorado em quatro binômios do primeiro grau:

Resposta: $(x-1)(x-2)(x+3)(x-3)$

E23) Fatore as seguintes expressões

a) $4x^4 + 13x^2 + 9$
b) $x^4 - x^2 - 30$
c) $x^4 - 6x^2 - 27$
d) $x^4 - 10x^2 + 9$
e) $x^4 - 4x^2 - 45$
f) $4x^4 - 11x^2 - 20$
g) $9x^4 - 25x^2 + 16$
h) $x^8 + x^4 - 2$
i) $x^4 - 10x^2 + 16$
j) $x^4 + 6x^2 - 40$

Fatoração em provas e concursos

A fatoração algébrica é um assunto que deve ser dominado por todos aqueles que pretendem ter bons conhecimentos de álgebra, e sobretudo, para realização de concursos. Nos vários concursos que requerem álgebra, como Colégio Naval, Colégio Militar, EPCAr, EsPCEx, Olimpíadas de matemática, são normalmente propostas questões diretas sobre fatoração. Além dessas questões, existem inúmeras outras que não pedem diretamente a forma fatorada de uma expressão, mas é necessário fazê-lo como uma etapa intermediária da resolução. A fatoração é uma ferramenta importante, indispensável em questões que envolvem:

- Polinômios
- Equações
- Inequações
- Expressões algébricas complexas
- Radicais

O aluno que não domina a fatoração provavelmente não conseguirá resolver questões que envolvem os tópicos acima.

Exemplo: EPCAr 2010 – Expressões algébricas complexas

Praticamente todos os concursos apresentam questões para simplificação de expressões algébricas complexas, que usam algum tipo de fatoração como etapa da sua resolução. Obviamente outros conhecimentos são necessários, e serão abordados em outros capítulos deste livro.

Considere os números reais a, b e x, tais que:

$a + b = x$
$a - b = x^{-1}$
$a \neq b \neq 0$

O valor da expressão $Y = \dfrac{\dfrac{(a^2+2ab+b^2)(a^3-b^3)}{(a^2-b^2)(a^2+ab+b^2)}}{\left(\dfrac{a^2-ab}{2a}\right)}$ é:

(A) 2 (B) $2x^2$ (C) x^2 (D) $x^2/2$

A questão requer os conhecimentos dos seguintes produtos notáveis e casos de fatoração:

Scanned by CamScanner

Quadrado da soma: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
Diferença de cubos: $a^3 - b^3 = (a - b).(a^2 + ab + b^2)$
Diferença de quadrados: $a^2 - b^2 = (a + b).(a - b)$
Evidência: $a^2 - ab = a.(a - b)$

Usando essas fórmulas, a expressão pode ser escrita como:

$$\frac{\frac{(a+b)^2(a^3-b^3)}{(a+b)(a-b)(a^2+ab+b^2)}}{\left(\frac{a(a-b)}{2a}\right)}$$

A expressão é uma fração algébrica, resultante da divisão de duas frações. Cada uma dessas duas frações possui fatores comuns no numerados e no denominador, que devem ser cancelados na simplificação. A fração do numerador tem em ambos os termos, um fator $(a + b)$ que pode ser simplificado. O produto $(a - b).(a^2 + ab + b^2)$ é igual a $(a^3 - b^3)$, que pode ser cancelado com o outro fator $a^3 - b^3$ existente no numerador.

A fração do denominador tem o fator ***a*** que pode ser cancelado.

$$\frac{\frac{(a+b)^2(a^3-b^3)}{(a+b)(a-b)(a^2+ab+b^2)}}{\left(\frac{a(a-b)}{2a}\right)} = \frac{\frac{(a+b)(a^3-b^3)}{(a-b)(a^2+ab+b^2)}}{\left(\frac{(a-b)}{2}\right)} = \frac{\frac{(a+b)(a^3-b^3)}{(a^3-b^3)}}{\left(\frac{(a-b)}{2}\right)} = \frac{\frac{(a+b)}{1}}{\left(\frac{(a-b)}{2}\right)} = \frac{a+b}{1} \times \frac{2}{a-b}$$

Como firam dados $a + b = x$ e $a - b = x^{-1}$, ficamos com:

$$\frac{x}{1} \times \frac{2}{x^{-1}} = 2x^2$$

Resposta: (B)

Exemplo: CMRJ 2015 – Expressões algébricas e equações

Se $x + y = 2$ e $\frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} = \frac{1}{4}$, então $(xy)^{-1}$ é igual a:

(A) 11/14 (B) 11/13 (C) 11/12 (D) 1 (E) 11/10

A maioria das questões de álgebra requer o conhecimento de manipulação de expressões algébricas. Esta questão requer ainda a resolução de uma equação e conhecimentos de fatoração da soma de cubos, que aparece no numerador da segunda expressão. A soma de quadrados existente no denominador não pode ser fatorada, mas pode ser expressa em função de $x + y$ e xy:

$$\frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} = \frac{(x+y)(x^2 - xy + y^2)}{x^2 + y^2 + 2xy - 2xy} = \frac{(x+y)(x^2 + 2xy + y^2 - 3xy)}{(x+y)^2 - 2xy}$$

Além da fatoração, os termos foram expressos usando apenas $(x+y)$, $(x+y)^2$ e xy. A seguir, façamos $x + y = 2$ como foi dado pelo problema, e chamemos $x.y$ de P:

Scanned by CamScanner

$\frac{(x+y)(x^2+2xy+y^2-3xy)}{(x+y)^2-2xy} = \frac{2.(2^2-3P)}{2^2-2P} = \frac{8-6P}{4-2P} = \frac{4-3P}{2-P}$, que vale 1/4 (enunciado).

Resolvendo a equação:

$$\frac{4-3P}{2-P} = \frac{1}{4}$$

16 – 12P = 2 – P
14 = 11P
P = 14/11

Como P = xy e o problema pede $(xy)^{-1}$, devemos calcular P^{-1}, que vale 11/14.

Resposta: (A) 11/14.

A questão exige vários conhecimentos de álgebra, e sem conhecer a fatoração de $x^3 + y^3$ o aluno não conseguirá chegar à solução.

$x^n - y^n$ e $x^n + y^n$

Já vimos várias expressões desse tipo, como $x^2 - y^2$, $x^3 + y^3$, etc. Dependendo do fato de n ser par ou ímpar, ou de ser uma adição ou subtração, os resultados serão diferentes. Vejamos:

$x^2 - y^2 = (x - y)(x + y)$
Esta é a fórmula da diferença de quadrados.

$x^2 + y^2$
Não pode ser fatorado com fatores racionais.

$x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2)$
Fórmula da diferença de cubos

$x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2)$
Fórmula da soma de cubos

Vejamos o que ocorre para maiores valores de n.

$x^n - y^n$

A expressão $x^n - y^n$ sempre pode ser fatorada, para qualquer número n natural. A fórmula geral é:

$$x^n - y^n = (x - y)(x^{n-1} + x^{n-2}y + x^{n-3}y^2 + ... + y^{n-1})$$

Exemplos:
$x^2 - y^2 = (x - y)(x + y)$
$x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2)$
$x^4 - y^4 = (x - y)(x^3 + x^2y + xy^2 + y^3)$
$x^5 - y^5 = (x - y)(x^4 + x^3y + x^2y^2 + xy^3 + y^4)$
$x^6 - y^6 = (x - y)(x^5 + x^4y + x^3y^2 + x^2y^3 + xy^4 + y^5)$
$x^7 - y^7 = (x - y)(x^6 + x^5y + x^4y^2 + x^3y^3 + x^2y^4 + xy^5 + y^6)$

Scanned by CamScanner

Note que para n=2 e n=3, a fórmula geral recai em fórmulas já conhecidas: diferença de quadrados e diferença de cubos.

Note ainda que a fatoração de $x^4 - y^4$ também pode ser feita por diferença de quadrados, e recai no mesmo resultado:

$$x^4 - y^4 = (x^2 - y^2)(x^2 + y^2) = (x - y)(x + y)(x^2 + y^2) = (x - y)(x^3 + x^2y + xy^2 + y^3)$$

Já demonstramos no capítulo 3, a fórmula da diferença de cubos. A demonstração consiste em desenvolver a multiplicação, e os termos irão cancelar uns com os outros, sobrando apenas o primeiro e o último. Para a fórmula de $x^n - y^n$, o método de demonstração é o mesmo.

$x^n + y^n$

Já a fatoração da soma $x^n + y^n$, nem sempre pode ser feita. Por exemplo, $x^2 + y^2$ pode ser fatorada, com restrições, torna-se o produto de expressões irracionais. Já a soma de cubos $x^3 + y^3$ pode ser fatorada como $(x + y)(x^2 - xy + y^2)$. A fórmula geral para n ímpar é a seguinte:

$x^n + y^n = (x + y)(x^{n-1} - x^{n-2}y + x^{n-3}y^2 - .... + y^{n-1})$, somente para n ímpar.

Exemplos:
$x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2)$
$x^5 + y^5 = (x + y)(x^4 - x^3y + x^2y^2 - xy^3 + y^4)$
$x^7 + y^7 = (x + y)(x^6 - x^5y + x^4y^2 - x^3y^3 + x^2y4 - xy^5 + y^6)$

As demonstrações consistem em efetuar as multiplicações, e todos os termos semelhantes aparecerão com sinais alternados e se cancelarão, sobrando apenas os termos em x^n e y^n.

A fórmula $x^n + y^n$, com n par, fica complicada, e fica reduzido o seu interesse em questões de prova. Não existe uma fórmula geral.

$x^2 + y^2$: não pode ser fatorado em expressões racionais
$x^4 + y^4 = (x^2 + y^2 + xy\sqrt{2})(x^2 + y^2 - xy\sqrt{2})$
$x^6 + y^6 = (x^2 + y^2)(x^4 - x^2y^2 + y^4)$

A fórmula de $x^4 + y^4$ é obtida somando e subtraindo $2x^2y^2$, formando uma diferença de quadrados. Já $x^6 + y^6$ pode ser feita como uma soma de cubos de x^2 e de y^2.

Note que na fatoração de $x^4 + y^4$, os fatores encontrados são racionais, pois é permitido que o coeficiente seja irracional, apenas as variáveis não podem estar dentro de radical.

Exercícios de revisão

E24) Fatore as seguintes expressões

a) $x^6 - 9x^3 + 8$
b) $x^2 - y^2 + 2xy - z^2$
c) $x^9 - x^6 - x^3 + 1$
d) $x^3 + x^2 - x - 1$
e) $256a^8 - b^8$
f) $12a^5b^8 - 6a^6b^7 - 6a^7b^7 + 3a^8b^6$
g) $x^4 + 14x^2 + 45$
h) $x^2 - 4xy + 4y^2 + 3x - 6y + 2$
i) $4a^2 + 12ab + 9b^2 + 10a + 15b + 6$
j) $4x^2 - 12xy + 9y^2 - 12x + 18y + 9$

Scanned by CamScanner

E25) Fatore as seguintes expressões

a) $(5x-2y)^4-16$
b) $x^3-4x^2+9x-36$
c) x^4-12x^2+36
d) x^4-5x^2-36
e) x^5-5x^3-36x
f) x^5+9x^4-x-9
g) $(3x+5y)^2-5.(3x+5y)-6$
h) $(2x+7y)^2+10.(2x+7y)+24$
i) $x^2-6xy+9y^2-5x+15y+6$
j) $25-x^2-4xy-4y^2$

E26) Fatore as seguintes expressões

a) $x^7+8x^4-x^3-8$
b) x^6-9x^3+8
c) x^6+16x^3+64
d) $x^6-8x^3-x^3y^3+8y^3$
e) $x^3-3x^2-25x+75$
f) $x^3-4x^2-16x+64$
g) x^3+3x^2+3x-7
h) $16y^2-25x^2+10x-1$
i) $a^5+a^2b^3-a^3b^2-b^5$
j) $6x^3y^2+15x^2y^5-30x^7y^4z$

E27) Fatore as seguintes expressões

a) $3x^3+33x^2+90x$
b) $abc^2+6abc+5ab$
c) $9z^4+16$
d) $9y^2-42y+49$
e) $2x^3+6x^2+10x$
f) $2x^3+14x^2-20x$
g) $4b^3+32$
h) $84z^3+57z^2-60z$
i) $12k^2+59k+72$
j) $25m^4+64$, $m>0$

E28) Fatore

a) $4x^2+12x+9-z^2$
b) $40z^2-37z-63$
c) $a^{2m}-25$
d) $12m^{2a}+9m^a-30$
e) $x^{3a}+y^{6a}$
f) $6x^4-3x^3-24x^2+12x$
g) a^6-64b^6
h) $x^4+2x^3+27x+54$
i) $5x^3-30x^2-15x+90$
j) $54x^6+270x^4+450x^2+250$

E29) Fatore

a) $x^4-3x^3-7x^2+27x-18$
(sugestão $27x=21x+6x$)
b) $x^5-3x^3-2x^2+6$
c) x^4+x^2-20
d) $x^5+y^5-xy^4-x^4y$
e) x^3-3x^2-x+3
f) $4x^4+x^2-3$
g) $9n^2p^2-24mnp-33m^2$
h) $12ab^2+60abc^2+36b^4c^3$
i) $36a^6y^6-18a^5y^5+45a^7y^5-54a^6y^4$
j) $12a^4x^2-15a^5x+9a^6x^3-30a^3x^4$

E30) Fatore

a) x^4-2x^2-15
b) $12xy+15x+8y+10$
c) $10x^3k-5abx^3-14k+7ab$
d) $m^2-14m+49$
e) $25x^2y^2-10xy+1$
f) $9a^2+25k^4+30ak^2$
g) $x^3-12x^2+48x-64$
h) $1-9m+27m^2-27m^3$
i) $25m^2-1$
j) $a^2x^2-9b^4y^2$

E31) Fatore

a) $(x+y)^2-(x-y)^2$
b) $xy-16m^4xy$
c) $x6-26x3-27$
d) $8x^3+27y^3$
e) $x^3+3x^2y+3xy^2+y^3-1$
f) $x^2+12x+35$
g) $m^2+8m+15$
h) $x^2-14x+24$
i) $x^2+5x-84$
j) $2x^2+9x+7$

E32) Fatore

a) $5m^2+8m+3$
b) $8x^2+10x+2$
f) $4m^2x^2+16m^2x-180m^2$
g) z^3-3z+2

Scanned by CamScanner

c) $13x^2 - 9x - 4$
d) $3ax^2 - abx^2 + 12x^2 - 4bx^2$
e) $x^6 + 2x^4 - 16x^2 - 32$
h) $a^4 + b^4$
i) $9x^4 + 8x^2 + 16$
j) $x^4 - 4x^2 - 45$

E33)Fatore

a) $(x + 1)^2 + (x+1) - 2$
b) $y^2 + 15y + 56$
c) $k^2 + 9k - 90$
d) $x^2 + 10x + 9$
e) $x^2 - x - 42$
f) $x^3 - 2x^2 + 16(2 - x)$
g) $5x^3 - 55x^2y + 150xy^2$
h) $x^3 - 2x^2 - 3x + 6$
i) $x^3 - 27$
j) $x^3 - 2x^2 + 16(2 - x)$
k) $a^3 - 11a^2b + 30ab^2$.
l) $(x + 1)^2 + (x + 1) - 2$
m) $2x^2 + 3x - 14$
n) $x^2 - 6xy + 9y^2$
o) $x^3 - x^2 - 4x + 4$

E34)Fatore

a) $16a^4 - b^4$
b) $4x^2 - 4xy - 36 + y^2$
c) $2y^3 - 6y^2 - y + 3$
d) $x^3 - 8x^2 - 9x + 72$
e) $\frac{4}{9} + \frac{1}{3}x - \frac{3x^2}{16}$
f) $x^4 - 16y^8$
g) $4x^2 - 16x + 2xy + 15 - 3y$
h) $3(x - y)^2 - 7(x - y) + 4$
i) $2x^3 + 2x^2 - 312x$
j) $\frac{1}{4}x^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2}x^{\frac{1}{4}}y^{\frac{1}{4}} + \frac{1}{4}y^{\frac{1}{2}}$
k) $9x^2 - y^2 - 4y - 4$
l) $x^{16} - y^{16}$
m) $(3a - b)^2 - (2a + b)^2$
n) $x^2y^2 - x^3y^3 + 2xy$
o) $\frac{x^2 - 4x - 45}{4xy + 20y} \div \frac{x^2 - 81}{3x + 27}$

E35)Fatore

OBS.: Há décadas atrás, as questões de matemática nos concursos eram triviais, devido à realidade do ensino na época.

a) CN 61
$x^3yz + y^3xz - z^3xy + 2x^2y^2z$

b) **EsPCEx 59** – Fatorar
$(3a+2b+c)^2 - (a+2b+3c)^2$

c) **CN51** Fatorar
$x^2 - 2xy + y^2 - a^2$
d) $x^3 - 2x + 1$
e) $2x^3 - x - 4x^2 + 2$

f) **CN52**
Fatorar $8z(x - y) - 3(x - y)$

g) **EsPCEx 53**
Fatorar $a^2 + 6a - 7$

h) $x^6 - 64$

i) $x^4 + 64$.
j) $8x^3 + 20x^2 - 18x - 45$.

k) **CN 58**
Fatorar $x^3 + x^2 - x - 1$

i) **CN54**
Fatorar $16x^4 - 1$

m) $81x^4 - 16$

n) $128x^6 - 2y^6$
o) $2x^3 + 5x^2 - 18x - 45$

E36) Fatore numeradores e denominadores e simplifique

a) $\frac{x^2 + 8x + 15}{x^2 - 25}$
b) $\frac{x^2 - 1}{x^2 - 9} \div \frac{x^2 + 4x + 3}{x^2 - 4x + 3}$
c) $\frac{a^2 + 2ab + b^2 + ac + bc}{a + b + c}$
d) $\frac{2x^2 - xy + 6x - 3y}{2x - y}$
e) $\frac{x^2 + 8x + 15}{x^2 - 9}$
f) $\frac{3x^2 + 9x + 6}{x^3 + 2x^2 - x - 2}$
g) $\frac{x^2 + 13x + 36}{x^2 - 16}$
h) $\frac{x^2 - x - 2}{x + 1}$
i) $\frac{x^3 + 1}{x^3 + 3x^2 + 3x + 1}$
j) $\frac{x^6 - y^6}{x^2 - y^2}$
k) $\frac{x^3 - x^2 - x + 1}{x^2 - 2x + 1}$
l) $\left(\frac{35(2b+1)^9}{7(2b+1)^{-1}}\right)^2$

E37) Fatore

a) $3(4x + 5)^2 .4(5x + 1)^2 + (4x + 5)^3.(5x + 1).5$
b) $-24u^{3m}v^n + 4u^{2m}v^{2n} + 48v^{3n}u^m$
c) $x^3 - 2x^2 - 2x + 1$
d) $4x^3 - 75 + 12x^2 - 25x$
e) $a^3 - 8a^2 + a^2b - 5ab - 24b$
f) $6x^2(1 - x^2) - 5x(1 - x^2) + x^2 - 1$
g) $x^5y^6 - x^4y^3 + x^3y^4$
h) $9x^2 + 15x - 16y^2 + 20y$
i) $12x^3y + 26x^2y^2 + 10xy^3$
j) $1 - x - y - z + xy + xz + yz - xyz$

Scanned by CamScanner

E38) Efetue e simplifique

a) $(x^2y^2 + x^2 + y^2)^2 - (x^2 + y^2)^2 - x^2y^2(x^2 + y^2)$

b) $\dfrac{2x^2 - 5x - 3}{9 - x^2} \div \dfrac{4x + 2}{2x^2 + 2x - 12} \cdot \dfrac{2}{x - 2}$

c) $\dfrac{x^2 - 9}{2x^2 - 6x} \div \dfrac{2x^2 + 5x - 3}{4x^2 - 1}$

d) $x^2 - 0{,}2x - 0{,}08$

e) $x^2 - 1 - 2y - y^2$

f) $(y^2 + y - 9)^2 - 9$

g) $\dfrac{2xy - y}{8x^2 - 12xy} \div \dfrac{3xy - 6y}{12x^2 - 24x}$

h) $x^6 - 1$

i) $2x^4 - 32y^8$

j) $x^8 - y^{16}$.

E39) Efetue as seguintes divisões exatas, usando fatoração e simplificação

a) $(x^2 - 4y^2 - 4yz - z^2) + (x + 2y + z)$

b) $(x^3 - 6a^3 + 11a^2x - 6ax^2) + (x^2 + 6a^2 - 5ax)$

c) $(2a^3 - 8a + a^4 + 12 - 7a^2) + (2 + a^2 - 3a)$

d) $(q^4 + 6q^3 + 4 + 12q + 13q^2) + (3q + 2 + q^2)$

e) $(27a^3 - 8b^3) + (3a - 2b)$

E40) Determine o quociente e o resto da divisão

$(a^4 + 9a^2 + 15 - 11a - 7a^3) + (a - 5)$

E41) Se $x^2 - x - 5 = 0$, quanto vale $x^3 - 6x - 5$?

E42) Qual das expressões abaixo é um fator de $x^2 - 7x + 10$?

(A) $x + 2$ (B) $x + 10$ (C) $x - 2$ (D) $x + 5$ (E) $x + 7$

E43) Qual das expressões abaixo é um fator de $x^3 - 27$?

(A) $x^2 - 3x + 9$ (B) $x^2 + 3x + 9$ (C) $x^2 + 3x - 9$ (D) $x + 3$ (E) $x + 9$

E44) Dê um fator do polinômio $-24x^{3m}y^n + 4x^{2m}y^{2n} + 48y^{3n}x^m$. As variáveis usadas como expoentes representam números inteiros.

(A) $(2x^m - 3y^n)$
(B) O polinômio não pode ser fatorado
(C) $x^{3m}y^{3n}$
(D) $4x^{3m}y^{3n}$
(E) $(-2x^m - 3y^n)$

E45) Realize a operação indicada e simplifique completamente. As variáveis em expoentes são números inteiros.

$$\frac{x^{2k} - 9}{3x^{k+3} + 9x^3} \div \frac{x^{k+2} - 3x^2}{6x^{k+5}}$$

(A) $2x^k$ (B) $\dfrac{2x^k\left(x^k + 3\right)}{x^k + 9}$ (C) $\dfrac{\left(x^k - 3\right)^2}{18x^{k+6}}$ (D) $\dfrac{1}{2}x^{k-6}$ (E) $2k$

E46) Qual das expressões abaixo é um fator de $x^4 - 10000$?

(A) $x^4 + 100$ (B) $x^2 + 10$ (C) $x^4 - 100$ (D) $x - 10$ (E) não pode ser fatorado

E47) Qual das expressões abaixo é um fator de $x^4 - 16$?

(A) $x - 4$ (B) $x + 4$ (C) $(x + 2)^2$ (D) $x^2 + 4$ (E) $x - 16$

Scanned by CamScanner

E48) Simplifique $-s\sqrt[3]{128r}+\sqrt[3]{54rs^3}$

(A) $-s^3\sqrt[3]{2r}$ (B) $-s\sqrt[3]{182r^2s^3}$ (C) $-s^2\sqrt[3]{74r}$ (D) $-s\sqrt[3]{2r}$ (E) $-10s\sqrt[3]{3}$

E49) Fatore a expressão $6x^2(1-x^2)-5x(1-x^2)+x^2-1$

(A) $x[(1-x^2)(6x-5)+x]-1$ (B) $(1-x^2)(6x+1)(x-1)$ (C) $(6x-1)(x+1)^2(x-1)$
(D) $-(6x+1)(1+x)(1-x)^2$ (E) $(6x^2-5x-1)(1-x^2)$

E50) Qual das alternativas é um fator de $x^2+16x-4+64-y^2+4y$?

(A) $x+y+6$ (B) $x-y$ (C) y^2 (D) $y+4$ (E) x^2

E51) Fatore completamente o polinômio $4x^3-4$.

(A) $4(x-4)(x^2+x+1)$ (B) $4(x-1)(x^2+x+1)$ (C) $4(x^3-1)$
(D) $4(x+1)(x^2-x+1)$ (E) O polinômio é primo

E52) Simplifique a expressão

$$\frac{x^2-4x-6}{x^2-x-6}\times\frac{x^2+2x-15}{x^2-25}$$

(A) $\frac{x+1}{x-3}$ (B) $\frac{x-3}{x-5}$ (C) $\frac{x+1}{x+2}$ (D) $\frac{x+1}{x+5}$ (E) $\frac{x-3}{x+2}$

E53) Fatore o polinômio $x^3-3x^2-16x+48$

(A) $(x+2)(x-2)(x-3)$ (B) $(x+4)(x-4)(x-3)$ (C) $(x+2)(x-2)(x+3)$
(D) $(x+4)(x-4)(x+3)$ (E) $(x^2+16)(x+3)$

E54) Qual das expressões abaixo é um fator do polinômio $x^3+x^2-17x+15$?

(A) $(x-5)$ (B) $(x-3)$ (C) $(x+1)$ (D) $(x+2)$ (E) $(x+3)$

E55) Qual das expressões abaixo é um fator do polinômio $6x^2+11x-10$?

(A) $2x-5$ (B) $3x-5$ (C) $6x-1$ (D) $3x-2$ (E) $6x-5$

E56) Simplifique $\frac{8x-72}{9x^3-72x^2}\div\frac{x-9}{9x^3-72x^2}$

(A) $\frac{x-4}{30x}$ (B) 8 (C) $x+4$ (D) $\frac{2}{x-8}$

E57) Simplifique $\frac{5x+3}{3x^2+15x}+\frac{3x}{3}$

(A) $\frac{3x^3+15x^2+5x+3}{3x(x+5)}$ (B) $\frac{x+2}{x+1}$

(C) $\frac{3x+1}{x^2+5x+1}$ (D) $\frac{x^3+5x^2+2x+1}{x(x+5)}$

Scanned by CamScanner

E58) Fatore completamente $x^3 - x^2 - 4x + 4$.

(A) $(x^2 + 4)(x + 1)$ (B) $(x + 2)^2(x + 1)$ (C) $(x^2 - 4)(x + 1)$
(D) $(x^2 - 4)(x - 1)$ (E) $(x - 2)(x + 2)(x - 1)$

E59) Simplifique: $\sqrt{\dfrac{3^{x+7} + 3 \times 3^{x+9}}{3 \times 3^{x+7} - 3^{x+6}}}$

(A) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ (B) $\dfrac{\sqrt{42}}{2}$ (C) $\sqrt{21}$ (D) $\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$ (E) $\sqrt{15}$

E60) Se **a** e **b** são inteiros tais que $x^2 - x + 1$ é um fator de $ax^3 + bx^2 + 2x + 4$, então **b** vale:

(A) –2 (B) –1 (C) 0 (D) 1 (E) 2

E61) Simplifique $\dfrac{x^2 - x - 6}{x^2 + 6x + 9} \div \dfrac{x^2 - 4}{x + 3}$

(A) $\dfrac{x+2}{x^2+x-6}$ (B) $\dfrac{x^2-9}{x^2+x-6}$ (C) $\dfrac{x-3}{x^2+x-6}$ (D) $\dfrac{x+2}{x^2+5x+6}$ (E) $\dfrac{x-3}{x^2+5x+6}$

E62) Simplifique $(2x^2 - 7x - 4)^{-1}(2x^2 + 7x + 3)(x^2 + 3x - 28)(x^2 - 9)^{-1}$

(A) $\dfrac{x+3}{x+4}$ (B) $\dfrac{x+7}{x-3}$ (C) $\dfrac{2x+1}{x-4}$ (D) 1 (E) $\dfrac{x+4}{x+3}$ (F) NRA

E63) Escrever $(2001^3 - 1986^3 - 15^3)/(2001.1986.15)$ como um inteiro ou fração simplificada.

E64) Se $x^2 - y^2 = 20$ e $x - y = -10$, então $x + y$ vale:

(A) –6 (B) –2 (C) 4 (D) 2 (E) 8

E65) Efetue e simplifique $\dfrac{3x^2 + 7x + 2}{4 - x^2} \cdot \dfrac{3x^2 - 7x + 2}{1 - 9x^2}$

(A) 1 (B) –1 (C) $\dfrac{x^2 - 4x + 4}{9x^2 - 6x + 1}$ (D) $\dfrac{9x^2 - 1}{4 - x^2}$ (E) NRA

E66) Se $x - 7$ é um fator de $x^2 - 3x + p$, qual é o valor de **p**?

(A) –28 (B) –21 (C) –10 (D) 21 (E) 28

E67) Se $r + t = 4$ e $m + s = 7$, determine o valor de $(mr + rs + mt + st)/2$.

E68) Simplifique $\dfrac{x^2 - x - 6}{x^2 + 6x + 9} \div \dfrac{x^2 - 4}{x + 3}$

(A) $\dfrac{x+2}{x^2+x-6}$ (B) $\dfrac{x^2-9}{x^2+x-6}$ (C) $\dfrac{x-3}{x^2+x-6}$ (D) $\dfrac{x+2}{x^2+5x-6}$ (E) $\dfrac{x-3}{x^2+5x+6}$

E69) Qual das expressões abaixo não é um fator de $2x^2y^5z^4 - 6xy^4z^3$?

(A) y^4 (B) $2z^4$ (C) $x^2yz - 3$ (D) $2y^4z^3$ (E) xy

Scanned by CamScanner

E70) Fatore completamente o polinômio $6m^2(1 - m^2) - 5m(1 - m^2) + m^2 - 1$

(A) $m[(1 - m^2)(6m - 5)+m] - 1$
(B) $(1 - m^2)(6m - 1)(m - 1)$
(C) $(6m - 1)(m + 1)^2(m - 1)$
(D) $-(6m + 1)(1 + m)(1 - m)^2$
(E) $(6m^2 - 5m - 1)(1 - m^2)$

E71) Colégio Naval, 2015

Seja $k = \left(\frac{9999...997^2 - 9}{9999...994}\right)^3$, onde cada um dos números 9999....997 e 9999...994, são constituídos de 2015 algarismos 9. Deseja-se que $\sqrt[i]{k}$ seja um número racional. Qual a maior potência de 2 que o índice i pode assumir?

(A) 32 (B) 16 (C) 8 (D) 4 (E)

CONTINUA NO VOLUME 2: 80 QUESTÕES DE CONCURSOS

Respostas dos exercícios

E1) a) $3(2x + y)$
b) $10(x + 3y)$
c) $5(3a + 5b)$
d) $18(m + 4n)$
e) $7(2a + 5z)$
f) $5(2x + 3y + 5z)$
g) $4(3a + 5b + 7c)$
h) $7(i + 4j + 6k)$
i) $6(m + 7n + 4p + 9q)$
j) $4(11x + 7y + 6w + 18z)$
k) $x^2(2x + 3)$
l) $12xy(y^2 + 3x^3)$
m) $6(2b^2 + 5abc + 6c^3)$
n) $x^5(x^2 + 12x + 11)$
o) $3n(3n - 4mp + 11m^2)$

E2) a) $3(2x^3 + y^2)$
b) $10(x^5 + 3y^2)$
c) $5ab(3ab^2 + 5c)$
d) $18m(m + 4n^2)$
e) $7(2a^2 + 5z^2)$
f) $5(2x^2 + 3y^2 + 5z^2)$
g) $2abc(3ab^2 + 4bc + 6c^3)$
h) $7jk(i^2j + 4i^3k^2 + 6)$
i) $3m(2m + n + 3p + 18mq)$
j) $2(2xyz + 4yzw + 2xyw + zwx)$
k) $x^2(2xy^2 + 3)$
l) $6x^2y(2y + xz)$
m) $12b(ab + 5ac^2 + 3b^3c^3)$
n) $ax^5(x^2 + 12ax + 72a^2)$
o) $3np(33np - 4m + 11m^2p^2)$

E3) a) $a(2a + 3b + 4b^2)$
b) $5a(a + 2 - 3bc)$
c) $12(5 + 2y)$
d $z^2(z + 1)(z - 3)$
e) $2x(2x - y + 3y^2z)$
f) $5x^4z^2(3x^4z^3 - 4z + 5x)$
g) $8m^4n^4(4m + 2n - 3m^2n^3)$
h) $3a^3x(4ax - 5a^2 + 3a^3x^2 - 10x^3)$
i) $5x^4y^4(3x^2y^2 - y^3 + 2x^5 - 5x^4y)$
j) $9a^5y^4(4ay^2 - 2y + 5a^2y - 6a)$
k) $7x^2y^2(-2x^5y^3 - x^2y^6 - 3x^3y^4 + 4)$
l) $2a^3b^4(8a^3b^3 - 24a^4b^2 + 10a^2b + 15)$
m) $12x^4y^5(-4x^2y^2 + 3xy^4 - 4x^4y^3 + 6x^2)$
n) $4a(10ax^5 - 6bx^3 + 4a^7c^2x^4 - a^4)$
o) $12x^2y^2z^2(3y - 4x^2 + 2x^5y^2z^3)$

E4) a) $(a + b)(m + n)$
b) $(a + 2)(b + 3)$
c) $(x + 5)(y - 7)$
d) $(3x + 2)(4y + 5)$
e) $(5a - 8)(2b - 3)$
f) $(5 - 2a)(3b + 4)$
g)) $(a + 4)(3 - b)$
h) $(x - 1)(m + n + 2p)$
i) $(a + b + c)(x + y)$
j) $(a + b + c)(x + 2)$

E5) a) $(a + b)(x + y)$
b) $(2a + b)(3x + 2y)$
c) $(2a - 3b)(4x - 5y)$
d) $(m + 3)(n - 2)$
e) $(x^2 + y2)(2x + 3y)$
f) $(3a + 2x)(4b - 5y)$
g) $(5 + 2a)(3x - 2y)$
h) $(1 - ny)(1 - mx)$
i) $(x - y)(a + 2b + 3c)$
j) $(x^2 + x + 1)(y^2 - 1)$

E6) a) $(4x^2 - 6)(2a^3 + b)$
b) $(3m - 4x)(5a + 3b)$
c) $(3a^2 - 5m)(3x + 7y)$
d) $(4xy - 7bz)(5ak - 3bx)$
e) $(5x^3 - 7)(2k - ab)$
f) $(5a^3b - 1)(5a - 8)$
g) $(4a^2 + xy)(5x^2 + 3y)$
h) $(3x^2yz + 2bmx)(4y + k)$
i) $(x^2y^3 - 4a)(3x^2y + 4b)$
j) $(x^4y^2 - 3k^2b^3)(x^3y - 5b^2)$

E7) a) $(a + b)^2$
b) $(m + 10)^2$
d) $(x - 1)^2$
e) $(a + 6)^2$
g) $(y + 4)^2$
h) $(m - 7)^2$
j) $(p - 5)^2$
k) $(b - 11)^2$
m) $(a - 8)^2$
n) $(c - 20)^2$

Scanned by CamScanner

E8)
c) $(k-9)^2$
a) $(2m+3)^2$
b) $5(a+b)(3a+5b)$
c) $(5x+1)^2$
f) $(x+8)^2$
d) $(4k-1)^2$
e) $(3x-5y)^2$
f) $(7a-4b)^2$
i) $(z-3)^2$
g) $[10(x+3y)]^2$
h) $(5xy-1)^2$
i) $(4p-3q)^2$
l) $(x+y)^2$
j) $(2x^2y-5)^2$
k) $(x^4-1)^2$
l) $(k^{10}-2)^2$
o) $(x+8)^2$
m) $(1-z^5)^2$
n) $(4x^2-5y^3)^2$
o) $(5ax-9by)^2$

E9)
a) $(x+y)^2$
b) $(a-b)^2$
c) $(x+10)^2$
d) $(k+5)^2$
e) $(x-7)^2$
f) $(3x-5)^2$
g) $(3a+b)^2$
h) $(4k-1)^2$
i) $(5x-1)^2$
j) $(4m-7p)^2$
k) $(k^4-3)^2$
l) $(4y^2+3x)^2$
m) $-(8p^2-1)^2$
n) $(3a+5k^2)^2$
o) $(7xy+3)^2$

E10)
a) $(x+y)^3$
b) $(m-1)^3$
c) $(x-8)^3$
d) $(a+3)^3$
e) $(1-2m)^3$
f) $(x+y)^3$
g) $(2a+3b)^3$
h) $(k-2m)^3$
i) $(1-3m)^3$
j) $(x+0{,}1)^3$

E11)
a) $(a+b)(a-b)$
b) $(k+1)(k-1)$
c) $(1+m)(1-m)$
d) $(x+3)(x-3)$
e) $(a+6)(a-6)$
f) $(5+x)(5-x)$
g) $(x+11)(x-11)$
h) $(2x-3y)(2x+3y)$
i) $(5m+1)(5m-1)$
j) $(10+3k)(10-3k)$
k) $(3t+8)(3t-8)$
l) $(x+10)(x-10)$
m) $(2a+1)(2a-1)$
n) $5(x+y)(x-y)$
o) $2(a+2b)(a-2b)$

E12)
a) $(a^2+b)(a^2-b)$
b) $(x+m^2)(k-m^2)$
c) $(q^3+m)(q^3-m)$
d) $(2x+3)(2x-3)$
e) $(5a+6)(5a-6)$
f) $(5+2x)(5-2x)$
g) $(3x^2+11)(3x^2-11)$
h) $(8x+9y^2)(8x-9y^2)$
i) $(5m+11q)(5m-11q)$
j) $(10+9k^2)(10-9k^2)$
k) $(t^2+16)(t+4)(t-4)$
l) $(ax+10)(ax-10)$
m) $(2ab+12)(2ab-1)$
n) $(ax+3b^2y)(ax-3b^2y)$
o) $(2ax^2+9by^3)(2ax^2-9by^3)$

E13)
a) $(a^m+b^m)(a^m-b^m)$
b) $(4a^2b^2+1).(2ab+1)(2ab-1)$
c) $(1-x)(1+x)(1+x^2)$
d) $4xy$
e) $(a^4+b^4)(a^2+b^2).(a+b)(a-b)$
f) $(x+y+a)(x+y-a)$
g) $(x^k+y^k)(x^k-y^k)$
h) $3(x+3y)(x-3y)$
i) $(16z^4+9w^2).(4z^2+3w)(4z^2-w)$
j) $8x.(2x+8y)$
k) $10(m+2n)(m-2n)$
l) $xy(1+4m^2).(1+2m)(1-2m)$
m) $(b+2a)(b-2a)$
n) $(a-b+x)(a-b-x)$
o) $(a+b+1)(a+b-1)$

E14)
a) $(x+y)(x^2-xy+y^2)$
b) $(2m-1)(4m^2-2m+1)$
c) $(1-x)(1+x+x^2)$
d) $(a+10)(a^2-10a+100)$
e) $(x+2)(x^2-2x+4)$
f) $(8+3a)(64-24a+a^2)$
g) $(k-2)(k^2+2k+4)$
h) $(2x+3y)(4x^2-6xy+9y^2)$
i) $(x^2-y)(x^4+x^2y+y^2)$
j) $(4x-5y)(16x^2+20xy+25y^2)$
k) $(1+m^2)(1-m^2+m^4)$
l) $(x+y-1)((x+y)^2+x+y+1)$
m) $(a+b-1)((a+b)^2+a+b+1)$
n) $(4x+3)(16x^2-12x+9)$
o) $1000(x+10)(x^2-10x+100)$

E15)
a) $(x+2)(x+4)$
b) $(x+1)(x+3)$
c) $(x+1)(x+5)$
d) $(x+2)(x+5)$
e) $(x+2)(x+8)$
f) $(x+3)(x+7)$
g) $(x+2)(x+7)$
h) $(x+2)(x+9)$
i) $(x+5)(x+7)$
j) $(x+3)(x+9)$
k) $(x+2)(x+10)$
l) $(y+3)(y+4)$
m) $(m+3)(m+5)$
n) $(k+2)(k+12)$
o) $(z+4)(z+5)$

E16)
a) $(x+2)(x+4)$
b) $(x-3)(x-5)$
c) $(x-3)(x-7)$
d) $(x+1)(x+11)$
e) $(x-11)(x-2)$
f) $(x+7)(x+8)$
g) $(x-4)(x-7)$
h) $(x+5)(x+10)$
i) $(x-2)(x-12)$
j) $(x-3)(x-13)$
k) $(x-16)(x-3)$
l) $(x-13)(x-4)$
m) $(x-18)(x-3)$
n) $(x-5)(x-20)$
o) $(x-10)(x-9)$

E17)
a) $(x-8)(x+3)$
b) $(x+12)(x-2)$
c) $(x-10)(x+9)$
d) $(x+9)(x-5)$
e) $(x-13)(x+4)$
f) $(x-8)(x+4)$
g) $(x-7)(x+5)$
h) $(x+15)(x-4)$
i) $(x-10)(x+6)$
j) $(x+10)(x-5)$
k) $(x-58)(x+1)$
l) $(x+18)(x-4)$
m) $(x+12)(x-7)$
n) $(x+11)(x-9)$
o) $(x-15)(x+5)$

E18)
a) $(2x+4)(x+1)$
b) $(x+3)(2x+1)$
c) $(3x+5)(x+1)$
d) $(x+1)(5x+2)$
e) $(2x+2)(4x+1)$
f) $(x+1)(7x+3)$
g) $(2x+7)(x+1)$
h) $(2x+3)(3x+1)$
i) $(5x+7)(x+1)$
j) $(3x+8)(2x+3)$
k) $(2x+5)(2x+1)$
l) $(3y+4)(y+1)$
m) $(5m+3)(m+1)$
n) $(k+4)(3k+2)$
o) $(5z+4)(z+1)$

Scanned by CamScanner

E19) a) $(5x-2)(2x+3)$ b) $(3x-5)(x-1)$ c) $(x-2)(2x+13)$ d) $(x-1)(7x+12)$ e) $(x-1)(11x-2)$ f) $(7x+8)(x+1)$ g) $(4x-7)(x-1)$ h) $(13x+4)(x-1)$ i) $(3x+5)(x-5)$ j) $(x-1)(13x-3)$ k) $(2x-1)(3x-8)$ l) $(4x-13)(x-1)$ m) $(11x-9)(x+1)$ n) $(x-5)(4x-5)$ o) $(7x+5)(x-1)$

E20) a) $x(x+5)(y-7)$ b) $a(5a-8)(2b-3)$ c) $x^2(a+4)(3-b)$ d) $xy^2(5-2a)(3b+4)$ e) $mx^2(a+2)(b+3)$ f) $4xy(a+b)^2$ g) $3ab(k-9)^2$ h) $5mx(z-3)^2$ i) $2a(m-1)^3$ j) $2x(a+3)^3$ k) $4a(x+1)(x-1)(x^4+x^2+1)$ l) $7a(ax+10)(ax-10)$ m) $2ax(q3-m)(q3-m)$ n) $x^3(2ax^2+9by^3)(2ax^2-9by^3$ o) $10a(x-1)(x^2+x+1)$

E21) a) $5a(x+2)(x+4)$ b) $2a^3(x+1)(x+11)$ c) $4mx(x-4)(x-7)$ d) $5am(x-3)(x-13)$ e) $4ax(x-4)(x-13)$ f) $x^2y(x-4)(x-6)$ g) $(x-7)(x+5)(1+x)$ h) $(a+1)(x+18)(x-4)$ i) $10(x-15)(x+5)$ j) $4m^2(x+9)(x-5)$

E22) a) $(2x-1)(x+1)(2x^2-x+1)$ b) $(x-3)(2x^2+3x+9)$ c) $(x+2)(x-1)^2$ d) $(x+2)(x-2)(x+5)(x-5)$ e) $(2k+1)(2k-1)(2k+2)(2k-2)$ f) $(x+y+z)(x+y-z)(z-x+y)(z+x-y)$ g) $(x+1)(x-1)(x+2)(x-2)$ h) $(a^2+b^2+ab)(a^2+b^2-ab)$ i) $(a^2+b^2-\sqrt{2}\,ab)(a^2+b^2+\sqrt{2}\,ab)$ j) $(a+b+\sqrt{2ab})(a+b-\sqrt{2ab})$

(a): Fazer $(2x^2)^2-(x-1)^2$, depois fatorar os trinômios (um trinômio pode ser fatorado, o outro não)
(b): Note que $P(3)=0$, então o trinômio tem um fator $(x-3)$. Transforme então $2x^3$ em x^3+x^3, ficando com $x^3-3x^2+x^3+27$, fatore então por agrupamento.
(c): Como $P(1)=0$, tem um fator $(x-1)$. Transforme $-3x$ em $-x-2x$ e use agrupamento.
(h), (i), (j): complete até formar diferenças de quadrados.

E23) a) $(4x^2+9)(x^2+1)$ b) $(x^2+5)(x+\sqrt{6})(x-\sqrt{6})$ c) $(x-3)(x+3)(x^2+3)$ d) $(x+1)(x-1)(x+3)(x-3)$ e) $(x^2+5)(x+3)(x-3)$ f) $(4x^2+5)(x+2)(x-2)$ g) $(3x+4)(3x-4)(x+1)(x-1)$ h) $(x^2+2)(x+1)(x-1)$ i) $(x+\sqrt{2})(x-\sqrt{2})(x+\sqrt{8})(x-\sqrt{8})$ j) $(x^2+10)(x+2)(x-2)$

E24) a) $(x-1)(x-2)(x^2+x+1)(x^2+2x+4)$ b) $(x-y+z)(x-y-z)$ c) $(x+1)(x-1)^2(x^2+x+1)(x^4+x^2+1)$ d) $(x+1)^2(x-1)$ e) $(16a^4+b^4)(4a^2+b^2)(2a+b)(2a-b)$ f) $3a^5b^6(2b-a^2)(2b-a)$ g) $(x^2+5)(x^2+9)$ h) $(x-2y+1)(x-2y+2)$ i) $(2a+3b+1)(2a+3b+5)$ j) $(2x-3y-3)^2$

E25) a) $((5x-2y)^2+4)(5x-2y+2)(5x-2y-2)$ b) $(x^2+9)(x-4)$ c) $(x^2+6)(x+\sqrt{6})(x-\sqrt{6})$ d) $(x+4)(x+3)(x-3)$ e) $x(x+4)(x+3)(x-3)$ f) $(x^2+1)(x+1)(x-1)(x+9)$ g) $(3x+5y-6)(3x+5y+1)$ h) $(2x+7y+4)(2x+7y+6)$ i) $(x-3y-2)(x-3y-3)$ j) $(5-x+2y)(5+x-2y)$

E26) a) $(x^2+1)(x+1)(x-1)(x+3)(x^2-2x+4)$ b) $(x-1)(x-2)(x^2+x+1)(x^2+2x+4)$ c) $(x+2)^2(x^2-2x+4)^2$ d) $(x-y)(x^2+xy+y^2)(x-2)(x^2+2x+4)$ e) $(x+5)(x-5)(x-3)$ f) $(x+4)(x-4)^2$ g) $(x-1)(x^2+4x+7)$ h) $(4y+5x-1)(4y-5x+1)$ i) $(a-b)(a+b)^2(a^2-ab+b^2)$ j) $3x^2y^2(2x+5y^3-10x^5y^2z)$

E27) a) $3x(x+5)(x+6)$ b) $ab(c+1)(c+5)$ c) $(3z^3+4+z\sqrt{24})(3z^3+4-z\sqrt{24})$ d) $(3y-7)^2$ e) $2x(x^2+3x+5)$ f) $2x(x+7+\sqrt{59})(x+7-\sqrt{59})$ g) $4(b+2)(b^2-2b+4)$ h) $3z(7z-4)(4z+5)$ i) $(4k+9)(3k+8)$ j) $(5m^2+8+m\sqrt{80})(5m^2+8-m\sqrt{80})$

Scanned by CamScanner

E28) a) $(2x + 3 + z)(2x + 3 - z)$
b) $(5z - 9)(8z + 7)$
c) $(a^m + 5)(a^m - 5)$
d) $3(4m^3 - 5)(m^3 + 2)$
e) $(x^a + y^{2a})(x^{2a} - x^a y^{2a} + y^{4a})$
f) $3x(x + 2)(x - 2)(2x - 1)$
g) $(a+2b)(a-2b)(a^4-4a^2b^2+16b^4)$
h) $(x + 3)(x^2 - 3x + 9)(x + 2)$
i) $5\left(x+\sqrt{3}\right)\left(x-\sqrt{3}\right)(x-6)$
j) $2(3x^2 + 5)^3$

E29) a) $(x - 1)(x - 2)(x - 3)(x + 3)$
b) $(x^3 - 2)(x^2 - 3) = \left(x-\sqrt[3]{2}\right)\left(x^2+x\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{4}\right)\times \left(x+\sqrt{3}\right)\left(x-\sqrt{3}\right)$
c) $\left(x+\sqrt{5}\right)\left(x-\sqrt{5}\right)\times (x+2)(x-2)$
d) $(x^2 + y^2)(x + y)(x - y)^2$
e) $(x + 1)(x - 1)(x - 3)$
f) $\left(2+\sqrt{3}\right)\left(2-\sqrt{3}\right)\left(x^2+1\right)$
g) $3(3np - 11m)(np + m)$
h) $12b(ab + 5ac^2 + 3b^3c^3)$
i) $9a^5y^4(4ay^2 - 2y + 5a^2y - 6a)$
j) $3a^3x(4ax - 5a^2 + 3a^3x - 10x^3)$

E30) a) $\left(x+\sqrt{5}\right)\left(x-\sqrt{5}\right)(x+3)$
b) $(3x + 2)(4y + 5)$
c) $(5x^3-7)(k-ab) = \left(x\sqrt[3]{5}-\sqrt[3]{7}\right)\times\left(x^2\sqrt[3]{25}+x\sqrt[3]{35}+\sqrt[3]{49}\right)$
d) $(m - 7)^2$
e) $(5xy - 1)^2$
f) $(5k^2 + 3a)^2$
g) $(x - 4)^3$
h) $(1 - 3m)^3$
i) $(5m + 1)(5m - 1)$
j) $(ax + 3b^2y)(ax - 3b^2y)$

E31) a) $4xy$
b) $xy(1 + 4m^2)(1 + 2m)(1 - 2m)$
c) $(x-3)(x^2+3x+9)(x+1)(x^2-x+1)$
d) $(2x + 3y)(4x^2 - 6xy + 9y^2)$
e) $(x+y-1)(x^2+2xy+y^2+x+y+1)$
f) $(x + 5)(x + 7)$
g) $(m + 3)(m + 5)$
h) $(x - 2)(x - 12)$
i) $(x + 12)(x - 7)$
j) $(2x + 7)(x + 1)$

E32) a) $(5m + 3)(m + 1)$
b) $2(4x + 1)(x + 1)$
c) $(13x + 4)(x - 1)$
d) $x^2(a + 4)(3 - b)$
e) $(x^2 + 2)(x^2 + 4)(x + 2)(x - 2)$
f) $4m^2(x + 9)(x - 5)$
g) $(z + 2)(z - 1)^2$
h) $\left(a^2+b^2+ab\sqrt{2}\right)\left(a^2+b^2-ab\sqrt{2}\right)$
i) não fatorável
j) $(x + 3)(x - 3)(x + 5)$

E33) a) $x(x + 1 + 2)$
b) $(y + 7)(y + 8)$
c) $(k + 10)(k - 9)$
d) $(x + 1)(x + 9)$
e) $(x - 7)(x + 6)$
f) $(x + 4)(x - 4)(x - 2)$
g) $5x(x - 5y)(x - 6y)$
h) $\left(x+\sqrt{3}\right)\left(x-\sqrt{3}\right)(x-2)$
i) $(x - 3)(x^2 + 3x + 9)$
j) $(x + 3)(x - 3)^2$
k) $a(a - 5b)(a - 6b)$
l) $(x + 5)(x + 2)$
m) $(x - 2)(2x + 7)$
n) $(x - 3y)^2$
o) $(x + 2)(x - 2)(x - 1)$

E34) a) $(4a^2+b^2)(2a+b)(2a-b)$
b) $(2x-y+6)(2x-y-6)$
c) $\left(\sqrt{2}y+1\right)\left(\sqrt{2}y-1\right)(y-3)$
d) $(x + 3)(x - 3)(x - 8)$
e) $-\frac{1}{144}(3x-8)(9x-8)$
f) $(x^2+4y^4)(x+2y^2)(x-2y^2)$
g) $(2x - 5 + y)(2x - 3)$
h) $(3x-3y-4)(x-y-1)$
i) $2x(x + 13)(x - 12)$
j) $\frac{1}{4}\left(x^{\frac{1}{4}} - y^{\frac{1}{4}}\right)^2$
k) $(3x+y-2)(3x-y+2)$
l) $(x^8+y^8)(x^4+y^4)(x^2+y^2)(x+y)(x-y)$
m) $5a(a - 2b)$
n) $-xy(xy - 2)(xy + 1)$
o) $3/(4y)$

OBS.: (g): partir de $4x^2 - 16x + 15$

E35) a) $xyz(x+y+z)(x+y-z)$
b) $8(a-c)(a+b+c)$
c) $(x-y+a)(x-y-a)$
d) $(x - 1)(x^2 + x - 1)$
e) $(x-2)\left(\sqrt{2}x+1\right)\left(\sqrt{2}x-1\right)$
f) $(x - y)(8z - 3)$
g) $(a + 7)(a - 1)$
h) $(x-2)(x+2)(x^2+2x+4)$
i) $(x^2+8+4x)(x^2+8-4x)$
j) $(2x+3)(2x-3)(2x+5)$
k) $(x + 1)^2(x - 1)$
l) $(4x^2+1)(2x+1)(2x-1)$
m) $(9x^2+4)(3x+2)(3x-2)$
n) $2(2x+y)(4x^2-2xy+y^2)(2x-y)(4x^2+2xy+y^2)$
o) $(x + 3)(x - 3)(2x + 5)$

Scanned by CamScanner

E36) a) $\frac{x+3}{x-5}$ b) $\frac{(x-1)^2}{(x+3)^2}$ c) $a+b$ d) $x+3$ e) $\frac{x+5}{x-3}$ f) $\frac{3}{x-1}$ g) $\frac{x+9}{x-4}$ h) $x-2$ i) $\frac{x^2-x+1}{(x+1)^2}$ j) $x^4+x^2y^2+y^4$ k) $x+1$ l) $25(2b+1)^{20}$

E37) a) $(4x+5)^2(5x+1)(80x+37)$
b) $-4u^mv^n(3u^m+4v^n)(2u^m-3v^n)$
c) $(x+1)(x^2-3x+1)$
d) $(x+3)(2x+5)(2x-5)$
e) $(a-8)(a^2+ab+3b)$
f) $(1+x)(1-x)(2x-1)(3x-1)$
g) $x^3y^3(x^2y^3-x+y)$
h) $(3x+4y+5)(3x-4y)$
i) $2xy(3x+5y)(2x+y)$
j) $(1-x)(1-y)(1-z)$

E38) a) $x^2y^2(x^2+y^2+x^2y^2)$
b) $\frac{2(2x-1)(x+3)}{(x+2)(3-x)}$
c) $\frac{2x+1}{2x}$
d) $(x-0{,}4)(x+0{,}2)$
e) $(x+y+1)(x-y-1)$
f) $(y+4)(y-3)(y+3)(y-2)$
g) $\frac{2x-1}{2x-3y}$
h) $(x+1)(x^2-x+1)(x-1)(x^2+x+1)$
i) $2(x^2+4y^4)(x+2y^2)(x-2y^2)$
j) $(x^4+y^8)(x^2+y^4)(x+y^2)(x-y^2)$

E39) a) $x-2y-z$
b) $x-a$
c) $(a+2)(a+3)$
d) $(q+1)(q+2)$
e) $9a^2+6a+4b^2$

OBS.: (b) Para fatorar, note que P(a) = 0, então podemos dividir P(x) por (x – a), e colocar (x – a) em evidência. Usamos a divisão polinomial considerando **x** variável, e com **a** fazendo parte dos coeficientes.

E40) a^3-2a^2-a-16, resto -65

E41) Resposta: 0. Dividir o polinômio do terceiro grau pelo de segundo, e verificar que $(x^3-6x-5)=(x^2-x-5)(x+1)$.

E42) (C) E43) (B) E44) (A) fazer $a=x^m$ e $b=y^n$ e fatorar por evidência.

E45) (A) E46) (D) E47) (D) E48) (D) E49) (D)

E50) (A) E51) (B) E52) (C) E53) (B) E54) (B)

E55) (D) E56) (B) E57) (A) E58) (E) E59) (B)

E60) (A) E61) (C) E62) (B)

E63) 3. No numerador, fatorar diferença de cubos d 2001 e 15, colocar 1986 em evidência, depois fatorar diferença de quadrados de 2001 e 1986, colocar 15 em evidência, finalmente operar os números que sobraram entre parênteses, resultando em 3 x 2001. No final o denominador simplifica, resultando em 3. Pode ser feito em outra ordem, chegando ao mesmo resultado.

E64) (B) E65) (A) E66) (A). Fazer P(7) = 0.

E67) 14. E68) (C) E69) (B) E70) (D)

Scanned by CamScanner

E71) Colégio Naval, 2015

Seja $k=\left(\frac{9999...997^2-9}{9999...994}\right)^3$, onde cada um dos números 9999....997 e 9999...994, são constituídos de 2015 algarismos 9. Deseja-se que $\sqrt[i]{k}$ seja um número racional. Qual a maior potência de 2 que o índice i pode assumir?

(A) 32 (B) 16 (C) 8 (D) 4 (E)

Solução:

Toda expressão do tipo 9999999...999, onde o número de algarismos "9" é dado (seja ele ***n***) pode ser calculado em função de n, e é fácil deduzir qual é a relação algébrica que se aplica. Vejamos alguns exemplos:

$9 = 10^1 - 1$
$99 = 10^2 - 1$
$999 = 10^3 - 1$

Se temos n algarismos "9", então o número 99999..999 é igual a $10^n - 1$

Outros números similares podem ser deduzidos facilmente, como:

11111....111 (n algarismos "1") = $(10^n - 1)/9$
77777....777 (n algarismos "7") = $7x(10^n - 1)/9$

O mesmo princípio serve para determinar 2222..222, 3333.333, 4444...444, etc.

É bom conhecer essas relações durante o estudo, e não apenas na hora da prova.

O problema envolve dois números parecidos, que podem ser facilmente deduzidos:

999....997 = 999....999 – 2, se o primeiro número tem 2015 algarismos 9, o segundo tem 2016.
999....994 = 999....999 – 5, se o primeiro número tem 2015 algarismos 9, o segundo tem 2016.

Portanto podemos escrever a expressão dada pelo problema usando:

$9999...997 = 10^{2016} - 1 - 2 = 10^{2016} - 3$
$9999...994 = 10^{2016} - 1 - 5 = 10^{2016} - 6$

A expressão de k fica então:

Numerador: $(10^{2016} - 3)^2 - 9$
Denominador: $(10^{2016} - 6)$

Para agilizar os cálculos, chamemos 10^{2016} de x. Ficamos com:

N: $(x - 3)^2 - 9 = x^2 - 6x + 9 - 9 = x^2 - 6x$
D: $(x - 6)$
N/D = $(x^2 - 6x)/(x - 6) = x$

O valor k é esta fração elevada ao cubo:
$k = x^3 = (10^{2016})^3 = 10^{6048}$.

Scanned by CamScanner

A raiz i-ésima $\sqrt[i]{k}$ será um número racional quando o expoente 6048 for um múltiplo de i, sendo que i é uma potência de 2, segundo as instruções do problema. Portanto fatoremos 6048, o que resultará em: $2^5 \times 189$, (basta determinar os fatores 2), portanto a maior potência de 2 que é divisor de 6048 é $2^5 = 32$.

Resposta: (A)

Scanned by CamScanner

Capítulo 6

MMC e MDC

Problemas sobre MMC e MDC

Este é um capítulo bem pequeno. Na maioria dos livros de álgebra, o capítulo sobre MMC e MDC é também pequeno ou inexistente. Normalmente este assunto fica incluído no capítulo sobre fatoração. Também nas provas de concursos, praticamente não existem questões do tipo "calcule o MDC entre ....". O primeiro motivo é que para calcular o MMC e o MDC entre expressões algébricas, é preciso primeiro fatorar as expressões, e aí já está a maior parte do conhecimento necessário. A parte restante é uma rápida verificação de expoentes, muito fácil.

O segundo motivo é que o cálculo MMC, usado para reduzir frações ao mesmo denominador, bem como o MDC, usando nas simplificações, nada mais são que etapas intermediárias de questões mais trabalhosas, que são as operações com frações algébricas. Essas questões sim, exigem muitas etapas, inclusive o MDC e o MMC, são bastante comuns em todas as provas de concursos, usadas em resolução de expressões algébricas complexas, equações e inequações.

O MDC e o MMC são ferramentas importantíssimas em questões envolvendo equações fracionárias e frações algébricas em geral. Para não dar ao aluno a ideia de importância reduzida deste assunto, optamos por destacar sua importância dedicando-lhes este capítulo exclusivo, mesmo com um número reduzido de páginas, e também de exercícios. Não existem mais questões do tipo "calcule o MMC ou o MDC" em provas, já que essas são etapas corriqueiras de outras questões mais complexas. Por isso o número de exercícios é reduzido, inclusive fizemos uso de questões de provas antigas. Seria um erro não estudar o assunto pelo fato das provas atuais não apresentarem questões exclusivas. Sem resolver a questões de provas antigas, o entendimento do assunto ficaria prejudicado.

Fatores numéricos e algébricos

Na aritmética, é usual calcular o MMC (mínimo múltiplo comum) e o MDC (máximo divisor comum) entre números naturais ou inteiros, com aplicações em diversos tipos de problemas. Por exemplo, para somar ou subtrair frações com denominadores diferentes, precisamos reduzir todas elas ao mesmo denominador, que é o MMC entre os denominadores das frações originais. O mesmo ocorre com frações algébricas (capítulo 7), que são aquelas que possuem expressões algébricas nos denominadores. Por exemplo:

$$\frac{2x}{x-1}+\frac{4}{x+1}-\frac{1}{x^2-1}$$

Assim como ocorre na aritmética, temos que reduzir todas as frações ao mesmo denominador (OBS.: É errado dizer "mesmo denominador comum", o correto é dizer "mesmo

Scanned by CamScanner

denominador", ou a um "denominador comum", já que as palavras "mesmo" e "comum" têm o mesmo significado). A forma mais simples para fazer isso é usar como denominador comum o MMC entre os denominadores. Isto requer que os denominadores sejam fatorados:

1º denominador = (x – 1)
2º denominador = (x + 1)
3º denominador = $(x^2 - 1) = (x + 1)(x - 1)$

O MMC é o produto dos fatores comuns e não comuns, elevados aos maiores expoentes. No caso, este MMC é (x + 1).(x – 1).

Para que as três frações fiquem com denominador (x + 1).(x – 1), é preciso multiplicar numeradores e denominador das frações por:

1ª fração: multiplicar por (x + 1)
2ª fração: multiplicar por (x – 1)
3ª fração: multiplicar por 1

Com tais multiplicações, todos os denominadores ficarão iguais a $x^2 - 1$

Ficamos então com:

$$\frac{2x.(x+1)}{x^2-1}+\frac{4.(x-1)}{x^2-1}-\frac{1}{x^2-1}=\frac{2x^2+2x+4x-4-1}{x^2-1}=\frac{2x^2+6x-5}{x^2-1}$$

Dificilmente aparecerá em uma prova de concurso, uma questão do tipo "calcule o MDC entre...", mas aparecerão questões mais complexas que exigirão, entre as etapas da resolução, o cálculo do MMC ou do MDC.

Recordando o MDC e o MMC de números naturais

Vamos recordar rapidamente como calcular o MDC e o MMC de números naturais. Na aritmética, o método mais usado para calcular o MDC é armar um dispositivo com uma barra vertical, e são feitas divisões pelos números primos: 2, 3, 5...

Exemplo: Calcule o MDC entre os números 8, 12 e 20

```
8 - 12 - 20 | 2
4 -  6 - 10 | 2
2 -  3 -  5 | MDC = 2.2 = 4
            |
```

O método para calcular o MMC é parecido. A diferença é que no caso do MDC, fazemos a divisão apenas quando todos os números são múltiplos do referido número, como no exemplo acima. No caso do MMC, fazemos a divisão quando pelo menos um dos números pode ser dividido. Os que não permitem a divisão são simplesmente repetidos. Os fatores pelos quais dividimos, no lado direito da barra vertical, são os números primos.

Na álgebra, este método não é usado, pois os fatores algébricos não podem ser ordenados, como ocorre com os números primos. Ao invés disso, usamos um outro método, que se aplica tanto para números naturais quanto para expressões algébricas:

Scanned by CamScanner

MDC = Máximo Divisor Comum
a) Fatorar os números
b) Calcular o produto dos fatores comuns elevados os menores expoentes

MMC = Mínimo Múltiplo Comum
a) Fatorar os números
b) Calcular o produto dos fatores comuns e não comuns elevados aos maiores expoentes

Vejamos como aplicar o método para encontrar o MDC entre os números 8, 12 e 20:

a) Fatorar os números
$8 = 2^3$
$12 = 2^2.3$
$20 = 2^2.5$

b) Calcular o produto dos fatores comuns elevados os menores expoentes

O único fator comum é 2. Os expoentes são 3, 2 e 2, o menor deles é 2. Então:

$$MDC(8, 12, 20) = 2^2 = 4$$

No próximo item veremos como usar este método para calcular o MDC e o MMC entre expressões algébricas.

MDC e o MMC de expressões algébricas

Vamos aplicar o mesmo método para encontrar o MDC e o MMC entre as expressões algébricas $x^2 - 3x + 2$ e $x^2 - 7x + 10$

$x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$
$x^2 - 7x + 10 = (x - 2)(x - 5)$

MDC: Fatores comuns elevados aos menores expoentes = $(x - 2)$
MMC: Todos os fatores, elevados aos maiores expoentes = $(x - 1)(x - 2)(x - 5)$

O cálculo do MDC e o MMC de monômios é bastante simples, pois a parte literal já está fatorada, ficando apenas faltando fatorar os coeficientes numéricos:

Exemplo: Calcule o MMC e o MDC entre $4a^2b^3c^4$, $12xa^4b^2$ e $20\,a^4b^5x^2$
Fatorando os coeficientes, ficamos com:

$2^2a^2b^3c^4$
$2^2.3xa^4b^2$ e
$2^2.5a^4b^5x^2$

$MDC = 2^2.a^2.b^2 = 4a^2b^2$
$MMC = 2^2.3.5.a^4.b^5.c^4.x^2 = 60a^4b^5c^4x^2$

O sinal não é usado no MDC, nem no MMC de expressões algébricas. Se o polinômio x^2y^3 é divisível por y^3, por exemplo, o polinômio $-x^2y^3$ também é, portanto não levamos em conta o sinal.

Exercícios

Scanned by CamScanner

E1) Calcule o MDC e o MMC entre:

a) $32x^2yz^3$ e $24w^2x^4z^2$
b) $75x^2y^2z$ e $-15xyz^2$
c) $48ab^2c$ e $28a^2b^2c^3$
d) $120m^2n^4p^5$ e $30m^3n^2p$
e) $72abc^3$ e $84a^2b^2c$
f) $34m^3n^2$ e $85m^2n^3p^2$
g) $12xy^2$ e $18x^2yz$
h) $-25ab^2c^2$ e $15a^3b^3c^4$
i) $320k^2jh^2$ e $128k^3h^3$
j) $99p^2x^2y$ e $132npq$
k) $30x^4y^5$, $20x^2y^7$ e $75x^3y^4$
l) $60x^2y^2$ e $35xz^3$
m) $14a^2b^3$, $20a^3b^2c$ e $35ab^3c^2$
n) $32m^2n^3$, $8m^2n$ e $56m^3n^2$
o) $12a^3bx$, $5a^4bxy$ e $30a^3b^2x^2$

Expressões algébricas não necessariamente são polinomiais. Por exemplo, $2^{\sqrt{x}}\sqrt{x-1}$ é uma expressão algébrica não racional. Nesse caso, para efeitos de MMC e MDC, tanto $2^{\sqrt{x}}$ como $\sqrt{x-1}$ são considerados fatores. Ocorre que as expressões polinomiais são as mais comuns na prática. Um polinômio em x pode ser sempre desmembrado como um produto de binômios do primeiro grau e trinômios do segundo grau, nas formas (exemplo: $(2x + 5)$, $(x^2 - 4x + 10)$). Cada um desses termos binomiais ou trinomiais pode ter seus próprios expoentes. Uma vez fatorados completamente, podemos usar a regra já apresentada para determinar o MMC e o MDC.

Exemplo: Determine o MDC entre $(x^4 - 2x^2 + 1)$ e $(x^2 - 3x + 2)^2$
Os dois polinômios devem ser inicialmente fatorados. De acordo com o que vimos no capítulo 5:

$x^4 - 2x^2 + 1 = (x^2 - 1)^2 = [(x + 1)(x - 1)]^2 = (x + 1)^2.(x - 1)^2$
$(x^2 - 3x + 2)^2 = [(x - 1)(x - 2)]^2 = (x - 1)^2.(x - 2)^2$

O fator comum é $(x - 1)$, e o menor expoente é 2. Logo, o MDC é $(x - 1)^2$.

O MMC usa todos os fatores, com os maiores expoentes. Logo, o MMC vale:
$(x + 1)^2.(x - 1)^2.(x - 2)^2$

É de praxe deixar o MDC e o MMC indicado na forma fatorada, sem realizar o desenvolvimento, pois muitas vezes serão feitas simplificações posteriores (corta-corta).

Exercícios

E2) Calcular o MDC e o MMC entre:

a) $(x^2 - x - 12)$ e $(x^2 + 6x + 9)$
b) $(x^2 - 15x + 50)$ e $(x^2 - 6x + 5)$
c) $(x + 1)$ e $(x - 3)$
d) $(x^2 + 2x + 1)$ e $(x + 1)$
e) $5(x^2 - 4)$ e $3(x^2 + 10x + 16)$
f) $(x^2 - y^2)$ e $(x^3 + y^3)$
g) $(x^3 - y^3)$ e $(x - y)^3$
h) $(x^2 + y^2)$ e $(x^2 - y^2)$
i) $(x^2 - 6x + 8)$ e $(x^2 - 12x)$
j) $(x^2 - 4)$ e $(x^2 - 5x + 6)$
k) $(x^5 - x^3 - x^2 + 1)$ e $(x^2 - 2x + 1)$
l) $x^4 - 53x^2 + 196$ e $x^2 - 49$
m) $x^4 - 2x^3 + x^2 - 4x + 4$ e $(x - 2)^3$
n) $4x^4 - x^2 + 2x - 1$ e $4x^2 - 1$
o) $z^3 - 3z + 2$ e $z^3 - 1$

E3) Calcular o MDC e o MMC entre:

a) $(a^2x - 2a^2 + 2ax - 4a + x - 2)$ e $(xy^2 - y^3 + 2xy - 2y^2 + x - y)$
b) $(3a^2 + 24a + 45)$ e $(a^4 + 4a^3 - 5a^2)$
c) $(x^3y^3 + 1)$, $(x^3y^2 - x)$ e $(x^3y^3 + 2x^2y^2 + xy)$
d) $(x^2 + xy)$, $(x^2 - y^2)$, $(x^2 + 2xy + y^2)$ e $(ax - x - y + ay)$
e) $(2x^2 + 5x - 12)$ e $(4x^3 + 16x^2 - 9x - 36)$
f) $(x^2 - x - 20)$ e $(25 - x^2)$
g) $(x^2 + 3x - 28)$ e $(x^2 + 5x - 36)$
h) $(x^2 + 10x + 9)$ e $(x^2 + 15x + 54)$
i) $(x^2 - 16)$ e $(x^2 - x - 12)$
j) $(x^2 - 5x)$ e $(x^2 - 9x)$

MDC e simplificação de frações algébricas

Uma importante aplicação do MDC é a simplificação de frações algébricas. Da mesma forma como fazemos com números na aritmética, usamos na álgebra a fatoração do numerador e do denominador de frações algébricas, para cancelar os termos iguais no numerador e

Scanned by CamScanner

denominador. O produto dos termos cancelados é exatamente o MDC entre o numerador e do denominador.

Exemplo: Simplifique a fração $\frac{18a^2b^2xy^2z}{8a^3b^2cx^3y}$

Os coeficientes numéricos podem ser simplificados por 2, sendo reduzidos respectivamente a 9 e 4. Os termos literais c e z não permitem simplificação. Os termos em **a** podem ser simplificados por $\mathbf{a^2}$, os termos em b por $\mathbf{b^2}$ (b será totalmente cancelado), os termos em **x** permitem simplificação por **x**, e os termos em y permitem simplificação por y. Ficaremos então com:

$$\frac{9yz}{4acx^2}$$

Repetindo podemos representar todos os fatores de forma que apareçam tanto no numerador quanto no denominador, os termos comuns que serão cancelados:

$$\frac{18a^2b^2xy^2z}{8a^3b^2cx^3y} = \frac{2.9.a^2.b^2.x.y.y.z}{2.4.a^2.a.b^2.c.x.x^2.y} = \frac{\cancel{2}.9.\cancel{a^2}.\cancel{b^2}.\cancel{x}.y.y.z}{\cancel{2}.4.\cancel{a^2}.a.\cancel{b^2}.c.\cancel{x}.x^2.\cancel{y}} = \frac{9yz}{4acx^2}$$

O produto dos termos que foram cancelados, $2.a^2.b^2.x.y$, é exatamente o MDC entre numerador e denominador, ou seja, o produto dos fatores comuns elevados aos menores expoentes.

Exercícios

E4) Simplifique as frações algébricas

a) $\frac{6x^2y^3}{4ax^3y}$

b) $\frac{12abc^2}{15bxy}$

c) $\frac{24m^4p^3}{12m^3p}$

d) $\frac{42x^5y^3}{15a^2x^7}$

e) $\frac{37x^{12}}{72x^{25}y^{37}}$

f) $\frac{x^4-1}{x^2+3x+2}$

g) $\frac{x^{16}-y^{16}}{x^2-y^2}$

h) $\frac{x^2+5x+6}{x^2-x-2}$

i) $\frac{x^4-1}{x^2+1}$

j) $\frac{a^2-a-72}{a^2-10a+9}$

MMC e redução ao mesmo denominador

A principal aplicação do MMC de expressões algébricas é reduzir frações algébricas ao mesmo denominador, para que seja possível fazer adição ou subtração dessas frações. O princípio é o mesmo usado na aritmética, para frações numéricas.

Exemplo: Calcule $\frac{x-3}{x^2-5x+6}+\frac{x+5}{x^2-3x+2}$

Inicialmente devemos fatorar completamente os numeradores e denominadores das frações:

$$\frac{x-3}{(x-2)(x-3)}+\frac{x+5}{(x-1)(x-2)}$$

Scanned by CamScanner

Agora uma etapa que muitos esquecem, e acabam ficando com expressões mais complicadas a simplificação. Na primeira fração, o termo (x – 3) pode ser cancelado, no numerador e no denominador, resultando em uma expressão mais simples, de cálculo menos trabalhoso.

$$\frac{1}{(x-2)}+\frac{x+5}{(x-1)(x-2)}$$

O MMC entre os denominadores é (x – 1)(x – 2). Para reduzir ambas as frações ao mesmo denominador, devemos multiplicar ambos os temos da primeira fração por (x – 1), e a segunda fração não precisa ser modificada:

$$\frac{1\times(x-1)}{(x-2)\times(x-1)}+\frac{x+5}{(x-1)(x-2)}$$

Ficamos então com:

$$\frac{x-1}{(x-2)(x-1)}+\frac{x+5}{(x-1)(x-2)}=\frac{x-1+x+5}{(x-1)(x-2)}=\frac{2x+4}{(x-1)(x-2)}$$

Eventualmente neste momento pode ainda ser feita uma simplificação, mas não é o caso, pois o numerador é igual a 2(x + 2), que não tem fator comum com o denominador que permita cancelamento.

Exercícios

E5) Reduza ao mesmo denominador e adicione as frações algébricas

a) $\frac{a+b}{2}+\frac{3a}{7}$

b) $\frac{4}{2x}+\frac{2(y-1)}{5xy}$

c) $\frac{5}{x+1}+\frac{3}{x-1}$

d) $\frac{3x}{x+4}+\frac{4x}{x+5}$

e) $\frac{2}{x+1}+\frac{3}{x+4}$

f) $x+1+\frac{1}{x-1}$

g) $\frac{5x}{x^2-4}+\frac{2}{x-2}$

h) $\frac{6x-4}{4x+3}+\frac{7-2x}{4x-3}$

i) $\frac{2x+7}{x^2-2x-15}+\frac{3x-4}{x^2-7x+10}$

j) $\frac{2x+5}{x^2+7x+12}+\frac{3x-2}{x^2+9x+20}$

Casos especiais

Alguns casos especiais devem ser lembrados, semelhantes aos que ocorrem na aritmética. São fórmulas que facilitam o cálculo do MDC e do MMC.

1) O produto de dois números é igual ao produto do seu MMC pelo sem MDC.

Exemplo:
Sejam os números 6 e 10.
Seu MDC é 2, seu MMC é 30.
6 x 10 = 2 x 30

A fórmula geral desta propriedade é: A x B = MMC(A, B) x MDC(A, B)

Scanned by CamScanner

A mesma fórmula é válida para expressões algébricas.

A demonstração desta fórmula é fácil. O MDC é o produto dos fatores comuns, elevado aos menores expoentes. O MMC é o produto dos fatores comuns e não comuns, elevados aos maiores expoentes. Quanto multiplicamos o MDC pelo MMC, estamos multiplicando todos os fatores de A e de B, que é o mesmo que obtemos quando multiplicamos A e B.

Exemplo:
Sejam $P(x) = (x - 1)(x - 2)$
$Q(x) = (x - 1)(x - 3)$

MDC = $(x - 1)$, MMC = $(x - 1)(x - 2)(x - 3)$

Então
$P(x).Q(x) = (x - 1)(x - 2) \times (x - 1)(x - 3) = (x - 1) \times (x - 1)(x - 2)(x - 3) =$ MDC x MMC

2) Quando dois números não têm fatores primos comuns, seu MDC é 1 e seu MMC é o seu produto. O mesmo vale para expressões algébricas.

Exemplo:
Sejam $P(x) = (x - 1)(x + 1)$
$Q(x) = (x + 2)(x + 3)$

MDC = 1, MMC = $(x + 1)(x - 1)(x + 2)(x + 3)$

3) Quando os dois números considerados são tais que o maior é múltiplo do menor, então o MDC é o menor deles, e o MMC é o maior deles. O mesmo vale para expressões algébricas.

Exemplo:
Sejam os números 10 e 30.
MDC = 10, MMC = 30

Exemplo:
Sejam $P(x) = (x + 1)$
$Q(x) = (x + 1)(x + 2)$

MDC = $(x + 1)$
MMC = $(x + 1)(x + 2)$

A parte teórica deste capítulo chega aqui ao final. Como já vimos um capítulo extenso sobre fatoração, ficou fácil completar com os conhecimentos necessários de MDC e MMC. Muito mais será aplicado no capítulo 7, que trata sobre frações algébricas. Por hora vamos aos exercícios de revisão.

Exercícios de revisão

E6) Encontre o MDC entre as expressões:

a) $42ax^2$ e $60a^2x$
b) $35a^2b^2$ e $49ab^3$
f) $x^2 - 9x + 18$ e $x^2 - 10x + 24$
g) $x^3 + 3x^2y$ e $x^3 + 27y^3$

Scanned by CamScanner

c) $54a^2b^2$ e $56a^3b^3$
d) $x^2 - 1$ e $x^2 + 2x - 3$
e) $x^2 + 5x + 6$ e $x^2 + 4x + 3$
h) $x^2 + 3x$ e $x^2 - 9$
i) $2ax^3 + x^3$ e $8a^3 + 1$
j) $(x + y)^2$ e $x^2 - y^2$

E7) Encontre o MDC entre as expressões:
a) $a^3 + a^2x + a^2 - x^2$
b) $a^2 - 4b^2$ e $a^2 + 2ab$
c) $x^2 + xy - 2y^2$ e $x^2 + 5xy + 6y^2$
d) $x^2 + 7xy + 12y^2$ e $x^2 + 3xy - 4y^2$
e) $x^3 - 8y^3$ e $x^2 + 2xy + 4y^2$
f) $x^3 - 2x^2 - x + 2$ e $x^2 - 4x + 4$
g) $1 - 5a + 6a^2$ e $1 - 7a + 12a^2$
h) $x^2 - 8xy + 7y^2$ e $x^2 - 3xy - 28y^2$
i) $8a^3 + b^3$ e $4a^2 + 4ab + b^2$
j) $x^2 - (y - z)^2$ e $(x + y)^2 - z^2$

E8) Encontre o MMC entre as expressões:
a) $9xy^3$ e $6x^2y$
b) $6a^3b^3$ e $15a^2b^4$
c) a^2 e $a^2 + a$
d) $x^2 - 1$ e $x^2 - x$
e) $x^2 + 2x$ e $(x + 2)^2$
f) $a^2 + 4a + 4$ e $a^2 + 5a + 6$
g) $c^2 + c - 20$ $c^2 - c - 30$
h) $y^2 - 10y + 24$ e $y^2 + y - 20$
i) $b^2 + b - 42$ e $b^2 - 11b + 30$
j) $x^2 - 1$ e $x^2 + x$

E9) Encontre o MMC entre as expressões:
a) $x^2 + 2x - 35$ e $x^2 - 11x + 30$
b) $x^2 - 64$; $x^3 - 64$ e $x + 8$
c) $a^2 - b^2$; $(a + b)^2$ e $(a - b)^2$
d) $4ab(a + b)^2$ e $2a^2(a^2 - b^2)$
e) $y^2 + 7y + 12$; $y^2 + 6y + 8$ e $y^2 + 5y + 6$
f) $x^2 - 1$; $x^3 + x^2 + x + 1$ e $x^3 - x^2 + x - 1$
g) $1 - x^2$; $1 - x^3$ e $1 + x$
h) $x^3 - 27$; $x^2 + 2x - 15$ e $x^2 + 5x$
i) $(a + b)^2 - c^2$; $(a + b + c)^2$ e $a + b - c$
j) $x^2 - (a + b)x + ab$ e $x^2 - (a + c)x + ac$

E10) Reduza as frações algébricas ao mesmo denominador, efetue e simplifique.

a) $x - y + \dfrac{2xy}{x - y}$
b) $x + y - \dfrac{2xy}{x + y}$
c) $1 - \dfrac{x - y}{x + y}$
d) $a - x - \dfrac{a^2 + x^2}{a - x}$
e) $x + 2 - \dfrac{x^2 - 4}{x - 3}$
f) $\dfrac{x - 3}{x - 2} - 2x + 1$
g) $\dfrac{x + 3}{x + 2} + x^2 - x - 1$
h) $2a - 1 + \dfrac{3 - 4a}{a - 3}$
i) $1 - 2a^2 - \dfrac{a^2 - a - 2}{a - 1}$
j) $a^2 + 2a - 5 - \dfrac{2a - 1}{3a^2 + 1}$

E11) Efetue e simplifique

a) $\dfrac{3a - 4b}{4} - \dfrac{2a - b + c}{3} + \dfrac{a - 4c}{12}$
b) $\dfrac{1}{x + 3} + \dfrac{1}{x - 2}$
c) $\dfrac{4}{x - 8} - \dfrac{1}{x + 2}$
d) $\dfrac{1}{x + 1} + \dfrac{1}{x - 1}$
e) $\dfrac{a + x}{a - x} - \dfrac{a - x}{a + x}$
f) $\dfrac{x}{x - a} - \dfrac{x^2}{x^2 - a^2}$
g) $\dfrac{4a^2 + b^2}{4a^2 - b^2} - \dfrac{2a + b}{2a - b}$
h) $\dfrac{7}{9 - a^2} - \dfrac{1}{3 + a} - \dfrac{1}{3 - a}$
i) $\dfrac{1}{a - b} - \dfrac{1}{a + b} - \dfrac{b}{a^2 - b^2}$
j) $\dfrac{2}{x - 2} - \dfrac{2}{x + 2} + \dfrac{5x}{x^2 - 4}$

Scanned by CamScanner

E12) Efetue e simplifique

a) $\frac{3-x}{1-3x}-\frac{3+x}{1+3x}-\frac{15x-1}{1-9x^2}$

b) $\frac{1}{a}-\frac{1}{a+3}+\frac{3}{a+1}$

c) $\frac{x}{x-1}-\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}$

d) $\frac{x+1}{x+2}+\frac{x-2}{x-3}+\frac{2x-7}{x^2-x-6}$

e) $\frac{1}{x(x-1)}-\frac{2}{x^2-1}+\frac{1}{x(x+1)}$

f) $\frac{1}{2x+1}+\frac{1}{2x-1}-\frac{4x}{4x^2-1}$

g) $\frac{a^2+b^2}{a^2-b^2}+\frac{a}{a+b}-\frac{b}{a-b}$

h) $\frac{3a}{1-a^2}+\frac{2}{1-a}-\frac{2}{1+a}$

i) $\frac{1}{x+4y}-\frac{8y}{x^2-16y^2}+\frac{1}{x-4y}$

j) $\frac{3}{2x-3}-\frac{2}{2x+3}-\frac{3}{4x^2-9}$

E13) Se o MDC entre P(x) e Q(x) é 1, quanto vale o MMC entre P(x) e Q(x) ?

E14) Se o MDC entre os polinômios P(x) e Q(x) é M(x), quanto vale o MDC entre os polinômios P(x).R(x) e Q(x).R(x) ?

E15) Em se tratando de números inteiros, se o MDC entre A e B vale M, quanto é o MDC entre A e A + B?

E16) $\frac{2y}{x+y}+\frac{3x}{y-x}+\frac{3x^2-y^2}{y^2-x^2}$

E17) Efetuando $\frac{a}{2c-2b}-\frac{ab+ac}{c^2-b^2}$, obtém-se:

(A) $\frac{a}{2(b-c)}$ (B) $\frac{2a}{b-c}$ (C) $\frac{2a}{b+c}$ (D)1 (E) $\frac{-2a}{c-b}$

E18) A fração $\frac{1-\frac{a}{b}}{1+\frac{a}{b}}$ pode ser escrita como:

(A) $\frac{1-a}{1+b}$ (B) $\frac{b-a}{b+a}$ (C) $\frac{1-a}{1+a}$ (D) $\frac{1}{b}$ (E) NRA

E19) Efetue e simplifique $\frac{3}{x-y}+\frac{2x}{(x^2-y^2)}$

E20) Efetue e simplifique $\frac{x^2-36}{x^3-3x^2-54x}\div\frac{x^2-4x-12}{x^2-9x}$

Scanned by CamScanner

(A) $\frac{1}{x+2}$ (B) $\frac{1}{x-6}$ (C) x (D) $\frac{1}{x-9}$ (E) $\frac{x-9}{x+6}$

E21) Se x = 1 então calcule $1+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{x}}}$

E22) Simplifique a expressão $\frac{x^{-3}y^{-3}}{x^{-3}+y^{-3}}$

E23) Simplifique a expressão $\cfrac{\frac{1}{p}-\frac{1}{q}}{\frac{1}{p^2}-\frac{1}{q^2}}$

E24) $\frac{x+1}{2x-2}-\frac{x-1}{2x+2}-\frac{4x}{x^2-1}+\frac{x^2+1}{x^2-1}$

E25) $\frac{x-1}{x+1}+\frac{x+1}{x-1}-\frac{x^2+1}{x^2-1}$

E26) $\frac{a^2}{(a+b)^2}+\frac{ab}{(a+b)^2}+\frac{b}{a+b}$

E27) $1-x+x^2-\frac{x^3}{1+x}$

CONTINUA NO VOLUME 2: 34 QUESTÕES DE CONCURSOS

Respostas dos exercícios

E1)
a) MDC= $8x^2z^2$, MMC= $96x^4yz^3w^2$
b) $15xyz$, $75x^2y^2z^2$
c) $4ab^2c$, $336a^2b^2c^3$
d) $30m^2n2p$, $120m^3n^4p^5$
e) $12abc$, $504a^2b^2c^3$
f) $17m^2n^2$, $170m^3n^3p^2$
g) $6xy$, $36x^2y^2z$
h) $5ab^2c^2$, $150a^3b^3c^4$
i) $64k^2h^2$, $640k^3h^3j$
j) $33p$, $396p^2nqx^2y$
k) $5x^2y^4$, $300x^4y^7$
l) $5x$, $420x^2y^2z^3$
m) ab^2, $140a^3b^3c^2$
n) $8m^2n$, $224m^3n^3$
o) a^3bx, $60a^4b^2x^2y$

E2)
a) $(x+3)$, $(x-4)(x+3)^2$
b) $(x-5)$, $(x-1)(x-5)(x-10)$
c) 1, $(x-1)(x-3)$
d) $(x+1)$, $(x+1)^2$
e) $(x+2)$, $15(x-2)(x+2)(x+8)$
f) $(x+y)$, $(x^3+y^3)(x-y)$
g) $(x-y)$, $(x^3-y^3)(x-y)^2$
h) 1, (x^4-y^4)
i) 1, $x.(2-6x+8).(x-12)$
j) 1, $(x^2-4)(x^2-5x+6)$
k) $(x-1)^2$, $(x^5-x^3-x^2+1)$
l) (x^2-49), (x^4-53x^2+196)
m) $(x-2)$, $(x-2)^3.(x^3+x-2)$
n) $(2x+1)$, $(4x^4-x^2+2x-1)(2x-1)$
o) $(z-1)$, $(z^3-1)(z+1)(z-2)$

E3)
a) 1, $(x-2)(a-1)^2.(x-y)(y+1)^2$
b) 1 , $(3a^2+24a+45).(a^4+4a^3-5a^2)$
c) $xy(x^2y^2-1)(x^3y^3+1)$
d) $x(x+y)^2(x-y)(a-1)$
e) $(2x-3)(x+4)$, $(4x^2-9)(x+4)$
f) $(x-5)$, $(x+4)(25-x^2)$
g) $(x-4)$, $(x+7)(x+9)(x-4)$
h) $(x+9)$, $(x+1)(x+9)(x+6)$
i) $(x-4)$, $(x+4)(x-4)(x+3)$
j) x, $x(x-5)(x-9)$

Scanned by CamScanner

E4) a) $\frac{3y^2}{2ax}$ b) $\frac{4ac^2}{5xy}$ c) $2mp^2$ d) $\frac{14y^3}{5a^2x^2}$ e) $\frac{37}{72x^{13}y^{37}}$ f) $\frac{(x^2+1)(x-1)}{x+2}$ g) $(x^8+y^8)(x^4+y^4)$ h) $\frac{x+6}{x-2}$ i) x^2-1 j) $\frac{a+8}{a-1}$

E5) a) $\frac{13a+7b}{14}$ b) $\frac{12y-2}{5xy}$ c) $\frac{8x-4}{x^2-1}$ d) $\frac{7x^2+19x}{(x+4)(x+5)}$ e) $\frac{5x+1}{(x+1)(x+4)}$ f) $\frac{x^2}{x-1}$ g) $\frac{7x+4}{x^2-4}$ h) $\frac{16x^2-12x+33}{16x^2-9}$ i) $\frac{5x^2+8x-26}{(x-5)(x-2)(x+3)}$ j) $\frac{5x^2+22x+19}{(x+3)(x+4)(x+5)}$

E6) a) 6ax, $420a^2x^2$
b) $7ab^2$, $245a^2b^3$
c) $2a^2b^2$, $1512a^3b^3$
d) (x – 1), (x + 1)(x – 1)(x + 3)
e) (x + 3), (x + 1)(x + 2)(x + 3)
f) (x – 6), (x – 3)(x – 4)(x – 6)
g) (x + 3y), $x^2(x^3 + 27y^3)$
h) (x + 3), $x(x^2 – 9)$
i) (2a + 1), $x^3(8a^3 + 1)$
j) (x + y), $(x + y)(x^2 – y^2)$

E7) a) (a + x), $a^2(a^2 – x^2)$
b) (a + 2b), $a(a^2 – 4b^2)$
c) (x+2y), (x+2y), (x+3y), (x–y)
d) (x + 4y), (x+3y)(x+4y)(x–y)
e) $(x^2 + 2xy + 4y^2)$, $(x^3 – 8y^3)$
f) (x – 1), $(x^2 – 1)(x – 2)^2$
g) (1–3a), (1–2a)(1–3a)(1–4a)
h) (x – 7y), (x – y)(x – 7y)(x – 4y)
i) (2a + b), $(8a^3 + b^3)(2a + b)$
j) (x + y – z), (x + y – z)(x – y + z)(x + y + z)

E8) a) 3xy, $18x^2y^3$
b) $3a^2b^3$, $30a^3b^4$
c) a, $a^3 + a^2$
d) (x – 1), $x(x^2 – 1)$
e) (x + 2), $x(x + 2)^2$
f) (a + 2), $(a + 3)(a + 2)^2$
g) (c + 5), (c – 4)(c + 5)(c – 6)
h) (y – 4), (y – 4)(y + 5)(y – 6)
i) (b – 6), (b – 6)(b + 7)(b – 5)
j) (x + 1), $x(x^2 – 1)$

E9) a) (x – 5), (x + 7)(x – 5)(x – 6)
b) 1, $(x^2 – 64)(x^3 – 64)$
c) 1, $(a + b)^2(a – b)^2$
d) 2a(a + b), $4a^2b(a^2 – b^2)(a + b)$
e) 1, (y+1)(y+2)(y+3)(y+4)
f) 1, $(x^2 + 1)(x^2 – 1)$
g) 1, $(1 + x)(1 – x)(1 + x + x^2)$
h) 1, $x(x + 5)(x^3 – 27)$
i) 1, $(a + b + c)^2(a + b – c)$
j) (x – a), (x – a)(x – b)(x – c)

E10) a) $\frac{x^2+y}{x-y}$ b) $\frac{x^2+y^2}{x+y}$ c) $\frac{2y}{x+y}$ d) $\frac{-2ax}{a-x}$ e) $\frac{-x-2}{x-3}$ f) $\frac{-2x^2+6x-5}{x-2}$ g) $\frac{x^3+x^2-2x+1}{x+2}$ h) $\frac{2a^2-11a+6}{a-3}$ i) $\frac{-2a^3+a^2+2a+1}{a-1}$ j) $\frac{3a^4+6a^3-4a^2-4}{3a^2+1}$

Scanned by CamScanner

E11) a) $\frac{a-4b-4c}{6}$ b) $\frac{2x+1}{(x-2)(x+3)}$ c) $\frac{3x+16}{(x-8)(x+2)}$ d) $\frac{2x}{x^2-1}$ e) $\frac{4ax}{a^2-x^2}$ f) $\frac{ax}{x^2-a^2}$ g) $\frac{-4ab}{4a^2-b^2}$ h) $-\frac{2}{9-a^2}$ i) $\frac{b}{a^2-b^2}$ j) $\frac{5x+8}{x^2-4}$

E12) a) $\frac{x+1}{1-9x^2}$ b) $\frac{3(a^2+4a+1)}{a(a+1)(a+3)}$ c) $\frac{x^3-x^2+x+1}{x(x^2-1)}$ d) $\frac{2(x^2-7)}{(x+2)(x-3)}$ e) 0 f) 0 g) $\frac{2a}{a+b}$ h) $\frac{3a}{1-a^2}$ i) $\frac{2}{x+4y}$ j) $\frac{2x+12}{4x^2-9}$

E13) P(x).Q(x) E14) M(x).R(x) E15) M

E16) $\frac{6x^2+xy+y^2}{y^2-x^2}$ E17) (A) E18) (B)

E19) $\frac{5x+3y}{(x^2-y^2)}$ E20) (A) E21) 5/3

E22) $\frac{1}{x^3+y^3}$ E23) $\frac{pq}{p+q}$ E24) $\frac{1}{2(x^2-1)}$

E25) $\frac{x^2+1}{x^2-1}$ E26) 1 E27) $\frac{1}{1+x}$

Scanned by CamScanner

Capítulo 7

Frações algébricas

Obrigatório para concursos

Questões de álgebra muitas vezes recaem em frações algébricas. Em uma prova de 20 questões, incluindo aritmética, álgebra e geometria, tipicamente um grande número delas requerem conhecimentos de frações algébricas. É preciso usar nessas questões, conceitos de:

- Produtos notáveis
- Fatoração
- MMC e MDC
- Operações com expressões algébricas

Por exemplo, uma questão sobre equações ou inequações, tipicamente recairá em uma fração algébrica.

Exemplo: Colégio Naval 2013

Considere, no conjunto dos números reais, a desigualdade $\frac{2x^2-28x+98}{x-10} \geq 0$. A soma dos valores inteiros do conjunto solução desta desigualdade, que são menores que 81/4, é:

(A) 172 (B) 170 (C) 169 (D) 165 (E) 157

Esta questão não pode ser ainda resolvida neste capítulo, pois requer conhecimentos sobre inequações do segundo grau. Observe que a referida inequação tem a forma de uma fração algébrica. Sem bons conhecimentos sobre frações algébricas, o aluno não conseguirá resolver a inequação.

Também as questões de geometria costumam recair em cálculos algébricos envolvendo o número π e radicais. Sem habilidade na manipulação algébrica, uma prova de matemática pode ser colocada a perder.

Nesta parte inicial da álgebra, o capítulo sobre frações algébricas costuma ser o mais difícil, pois usa muitos conceitos anteriores. Neste livro fizemos questão de facilitar este trabalho, com a apresentação prévia de frações algébricas nos capítulos anteriores. Dessa forma o assunto fica facilitado pela sua introdução prévia, ou seja, praticamente todos os conceitos necessários já foram apresentados, ficando faltando somente a sua consolidação.

Scanned by CamScanner

Simplificação de frações algébricas

Em geral questões que envolvem frações algébricas requerem a execução de operações matemáticas, como simplificação, adição, subtração, multiplicação e divisão.

Devemos simplificar as frações algébricas sempre que possível, caso contrário podem resultar em expressões algebricamente complicadas, o que aumenta a chance de erro nas operações. A simplificação de uma fração algébrica, já abordada rapidamente no capítulo 6, consiste em fatorar numerador e denominador, e a seguir "cancelar" os termos iguais.

Exemplo: Simplifique $\frac{x^2+7x+12}{x^2+8x+15}$

Devemos fatorar numerador e denominador, e procurar termos iguais para cancelar. Os dois trinômios podem ser facilmente fatorados:

$$\frac{x^2+7x+12}{x^2+8x+15}=\frac{(x+3)(x+4)}{(x+3)(x+5)}$$

Cancelamos no numerador e denominador o termo comum (x + 3), ficando com:

$$\frac{x+4}{x+5}$$

Exemplo: Simplifique a fração algébrica $\frac{4x^2-4x+1}{2x^2+3x-2}$

A fração tem como numerador e denominador, trinômios do segundo grau. É preciso fatorá-las, para então cancelar fatores iguais. A dificuldade na questão é que tratam-se de trinômios do segundo grau com a≠1.

O numerador é um quadrado perfeito, não apresenta dificuldade: $(2x - 1)^2$. O denominador é um trinômio do segundo grau com a≠1. No capítulo 5 foi mostrada uma técnica para fatorar trinômios da forma $ax^2 + bx + c$: desmembrar o termo em x em dois termos cuja soma seja b (3) e cujo produto seja a.c (–4):

Soma = 3; Produto = –4 ➔ 4 e – 1. O trinômio é então escrito como:

$$2x^2 + 4x - x - 2 = 2x(x + 2) - (x + 2) = (x + 2)(2x - 1)$$

A fração é então escrita como:

$$\frac{(2x-1)^2}{(x+2)(2x-1)}$$

O termo (2x – 1) pode ser cancelado, e ficamos com

$$\frac{(2x-1)}{(x+2)}$$

Scanned by CamScanner

Um erro clássico

Ao chegar até este ponto no livro, obviamente você não comete este erro, mas eventualmente alguns alunos cometem um erro muito comum ao estudarem frações algébricas"

Erro comum: Simplificar $\frac{(x+6)}{(x+2)}$

Esta fração algébrica não pode ser simplificada, pois os fatores (x + 6) e (x + 2) são primos entre si. Entretanto muitos alunos "perdidos" em álgebra não resistem à tentação de simplificar o x nesta expressão:

$$\frac{(x+6)}{(x+2)} = \frac{6}{2} = 3 \text{ (ERRADO !!!)}$$

Quando um aluno faz isso significa que ele não sabe porque está cancelando os termos. Provavelmente pensa que é para "cortar os iguais". Não é nada disso. O correto é "cortar os fatores iguais", e não "cortar qualquer coisa que seja igual". O procedimento de cortar fatores iguais é conseqüência de uma importante propriedade da divisão:

"O resultado de uma divisão exata não se altera quando multiplicamos, ou dividimos o dividendo e o divisor pelo mesmo valor".

Como uma fração nada mais é que uma divisão, esta propriedade é válida também para frações:

"O valor de uma fração não se altera quando multiplicamos (ou dividimos) o numerador e o denominador pelo mesmo valor."

É por isso que, por exemplo, $\frac{500}{100}$ é o mesmo que $\frac{5}{1}$. Quando dividimos o numerador e o denominador da fração $\frac{500}{100}$, por 100, o resultado é exatamente $\frac{5}{1}$.

Já a eliminação do x na fração algébrica $\frac{(x+6)}{(x+2)}$ não é uma simplificação válida, pois x não é um fator, ou seja, um valor que está multiplicado pelo restante da expressão.

Esta falha conceitual leva alguns alunos a erros ainda mais absurdos:

a) $\frac{a+b}{a-b}$ ➔ "corta a com a, b com b, ficando com $\frac{+}{-}$, e sabemos que mais dividido por menos dá "menos". Resposta: – (ERRADO !!!)

b) $\frac{\text{sen}(x)}{\cos(x)} = \frac{\text{sen}\, x}{\cos x} = \frac{en}{co}$ (ERRADO !!!). O talentoso aluno cortou) com), (com (, s com s e x com x...

Infelizmente o sistema de educação brasileiro forma alguns alunos com essas deficiências.

Scanned by CamScanner

Para simplificar frações com monômios

A simplificação de frações algébricas com monômios é muito parecida com a simplificação de frações numéricas com numerador e denominador fatorados.

Exemplo: Fatore $\frac{720}{450}$

Na aritmética, fatoramos totalmente o numerador e o denominador, depois passamos a cancelar fatores iguais:

$$\frac{720}{450} = \frac{2^4 \times 3^2 \times 5}{2 \times 3^2 \times 5^2}$$

Os fatores iguais podem ser cancelados:

$$\frac{2^4 \times 3^2 \times 5}{2 \times 3^2 \times 5^2} = \frac{2^3}{5} = \frac{8}{5}$$

Façamos o mesmo com uma fração algébrica que tenha monômios no numerador e no denominador:

Exemplo: Fatorar $\frac{72a^3b^2c^4}{45a^2b^3c}$

Um monômio é uma expressão algébrica que representa um produto de fatores literais, podendo ainda ter um coeficiente numérico. Para efeitos de simplificação, este coeficiente numérico precisa também ser fatorado.

$$\frac{72a^3b^2c^4}{45a^2b^3c} = \frac{2^3.3^2.a^3.b^2.c^4}{3^2.5.a^2.b^3.c}$$

Observe que o cancelamento pode ser feito porque todos são fatores, ou seja, fazem parte de um produto. Cancelar um fator no numerador e o denominador é o mesmo que dividir ambos os termos da fração por este fator, o que não altera a fração.

Os fatores a serem cancelados são: 3^2, a^2, b^2 e c.

$$\frac{2^3.3^2.a^3.b^2.c^4}{3^2.5.a^2.b^3.c} = \frac{2^3.a.c^3}{5.b}$$

Exercícios

E1) Simplifique as seguintes frações algébricas

a) $\frac{36x^4y^2z}{90x^3z^2}$

b) $\frac{15a^4b^7c^3}{72b^5c^4}$

f) $\frac{a^4b^3c^5}{a^7b^4c^7}$

g) $\frac{45x^2y^3z}{84x^3y^5z}$

k) $\frac{125a^2xy^2}{80b^3x^2z^2}$

l) $\frac{91rs^2t^3}{65r^2s^3t}$

Scanned by CamScanner

c) $\frac{7m^2n^4p^5}{98m^2p^8q^2}$ h) $\frac{180a^2b^5c^7}{80a^5b^3c^2}$ m) $\frac{42a^4b^2c^3}{63a^5bc^2}$

d) $\frac{24a^5b^3c}{15ab^3c^5}$ i) $\frac{77a^4x^3z^5}{43a^8x^7z^4y^2}$ n) $\frac{44x^2y^3z^5}{11xyz^2}$

e) $\frac{64x^2y^2z^3}{12w^2x^3y^4}$ j) $\frac{25m^2n^2p^3}{45m^5n^3q^3}$ o) $\frac{5a^2bc^3}{75a^4b^5c^5}$

Quando fatoramos números, os fatores usados são os números primos. Já nas expressões algébricas, os fatores são muito mais variados.

O fator x é diferente do fator y. Portanto não podemos simplificar, por exemplo, x^3 com y^3. Tampouco podemos simplificar a^5 com x^3, dando como resultado a^2. Os fatores representados por letras diferentes são diferentes, e nunca podem ser combinados. Devemos deixá-los indicados como estão.

Da mesma forma, o fator (a + 3) não pode ser cancelado com (a + 2). São fatores completamente diferentes, não podem ser combinados em um cancelamento. Da mesma fora, (a + 5) não pode ser combinado com (b + 5). Por exemplo, a fração algébrica abaixo não admite simplificação:

$$\frac{(x+5)^3(y+3)^2}{(x+4)^2(y+5)^4}$$

Nada pode ser simplificado nesta fração. Por outro lado, a expressão $\frac{(x+5)^3(y+3)^2}{(x+4)^2(x+5)^4}$ admite simplificação, pois possui o fator (x + 5) no numerador e no denominador. Podemos cancelar $(x + 5)^3$ no numerador e no denominador, ficando com:

$$\frac{(y+3)^2}{(x+4)^2(x+5)}$$

Exercícios

E2) Simplifique as seguintes frações algébricas

a) $\frac{(x+3)^2(x-3)^5(x+5)^4}{(y+3)^4(x-3)^2(x+5)^3}$ f) $\frac{xy^2(x-2)(y^2-9)}{x^2y^2(x^2-4)(y+3)}$ k) $\frac{25(x^2-1)^2}{15(x-1)(x+1)^3}$

b) $\frac{6x^2(x+1)^2(x+2)^3}{30x^5y(x+1)^3(x+2)^2}$ g) $\frac{(x-2)^3(x+2)}{(x^2-4)^2}$ l) $\frac{(x^2-y^2)^2-(x^2+y^2)^2}{12x^3y^5}$

c) $\frac{a^2b(a-b)^3(a+b)^2}{ab^2(a-b)^2(a+b)^3}$ h) $\frac{x^2+7x+12}{(x+4)(x+5)}$ m) $\frac{(x+1)^2(x+2)^3(x^2-9)}{(x+1)^3(x^2-4)(x+3)^2}$

d) $\frac{x^2y^5(x-1)^5(y+1)^5}{xy^4(x+y)(x-1)^3(y+1)^4}$ i) $\frac{(a-b)^2(a+b)^4(a-1)}{(a^2-b^2)^3(a-1)^2}$ n) $\frac{(x^{16}-1)}{x^2-1}$

Scanned by CamScanner

e) $\frac{(a+3)(x+2)(x+3)}{(x+3)(a+2)(x+2)}$ j) $\frac{(x-y)(x+1)^2(y-1)^3}{(y-x)(x+1)^3(y-1)^4}$ o) $\frac{(x+y)^3}{x^3+y^3}$

Nem sempre as frações algébricas aparecem com seus termos na forma fatorada. Muitas vezes é preciso fatorar os termos da fração, para só então partir para as simplificações, como nos exercícios que se seguem.

Exercícios

E3) Simplifique as frações algébricas

a) $\frac{x^2+4x}{5x^2}$ f) $\frac{a^2-4ab+4b^2}{a^2-4b^2}$ k) $\frac{x^2-4}{2x^2+7x+6}$

b) $\frac{x^2-2x+1}{x^2+2x-3}$ g) $\frac{xy+5x+7y+35}{5+y}$ l) $\frac{2x^2+17xy+21y^2}{3x^2+26xy+35y^2}$

c) $\frac{x^2-7x+10}{x^2-25}$ h) $\frac{2ab+a^2+b^2-c^2}{2bc-b^2-c^2+a^2}$ m) $\frac{(x-y)^2-z^2}{x^2-(y-z)^2}$

d) $\frac{x^2-5x-14}{x^2-4x-21}$ i) $\frac{x^2+7x+12}{x^2+6x+9}$ n) $\frac{a^2+ab}{a^2-b^2-a-b}$

e) $\frac{x^2+2x-15}{2x^2-5x-3}$ j) $\frac{3-9y}{3y^2+11y-4}$ o) $\frac{12x^3y^2z^2(2z^2-z-3)}{(3x^2z^2-2x^2z^3)(1-z^2)}$

Frações algébricas aparecem em questões diversas na álgebra. Algumas questões pedem simplesmente que sejam feitas operações seguidas de simplificação. Outras recaem em equações ou inequações. A maior dificuldade nas questões é a fatoração, que às vezes pode ser difícil. Felizmente (para os alunos) são também comuns as questões de cálculo e fatoração fáceis.

E4) Simplifique as frações algébricas

a) $-\frac{60x^5}{10x}$ f) $\frac{z+z^2}{z^2-1}$ k) $\frac{y^2+8y+15}{y^2+4y+3}$

b) $\frac{x^2+3x-70}{x-7}$ g) $\frac{ax+ay+bx+by}{a^2-b^2}$ l) $\frac{x^2+10x+21}{x^3+2x^2-3x}$

c) $\frac{7x+49}{x^2+14x+49}$ h) $\frac{x^2-9x+20}{x^2-16}$ m) $\frac{32x}{40x+48}$

d) $\frac{x^2-25}{4x+20}$ i) $\frac{x^2+5x-50}{x^2-6x+5}$ n) $\frac{x^2-6x-7}{x^2-1}$

e) $\frac{15a^2b^3c^4}{6ab^2c^3}$ j) $\frac{a^3+4a^2+3a}{a^4(a^2-9)}$ o) $\frac{12x-32}{8x-28}$

Scanned by CamScanner

Apesar de poderem aparecer casos de simplificação muito fáceis, como os do exercício acima, podem surgir casos mais difíceis, envolvendo fatorações não triviais.

Exercícios

E5) Simplifique as frações algébricas

a) $\frac{x^3-2x^2-x+2}{x^2-1}$

b) $\frac{abx^2-4ab}{abx^2-9abx+14ab}$

c) $\frac{x^2-3x+2}{8x^2+2x-10}$

d) $\frac{3x^2-9x+6}{5x^3-15x^2+10x}$

e) $\frac{1-a^2}{(1+ax)^2-(a+x)^2}$

f) $\frac{(a^2-b^2-c^2-2bc)(a+b-c)}{(a+b+c)(a^2+c^2-2ac-b^2)}$

g) $\frac{4a^3x-6a^2x^2}{8a^4x-24a^3x^2+18a^2x^3}$

h) $\frac{x^2+y^2+z^2+2xy+2xz+2yz}{x^2-y^2-z^2-2yz}$

i) $\frac{(x^2-7x+12)(x^2+8x+15)}{(x^2-9)(x^2+x-20)}$

j) $\frac{a^2b^2+b^2c^2-b^4-a^2c^2}{a^2b+a^2c-abc-ab^2}$

Provas podem apresentar questões de simplificação de frações algébricas, mas são muito mais comuns as questões de adição, subtração, multiplicação ou divisão de frações algébricas, seguidas da sua simplificação.

Multiplicação de frações algébricas

As regras para multiplicação de frações algébricas são muito parecidas com as de multiplicação de frações numéricas:

Para multiplicar frações algébricas, multiplicamos os numeradores e multiplicamos os denominadores.

Antes de fazer as multiplicações, é altamente recomendável que os termos das frações sejam fatorados. Não é recomendável desenvolver as multiplicações, mas sim, deixar os termos na forma fatorada, pois eventualmente é possível fazer simplificações.

Exemplo: Multiplique e simplifique o resultado:

$$\frac{4a^2b^4c^5}{12a^2b^2c}\times\frac{12a^3b^2c}{16ab^2c^5}$$

Uma forma de resolver este tipo de operação é multiplicar os denominadores, multiplicar os denominadores, e realizar simplificações:

$$\frac{4a^2b^4c^5}{12a^2b^2c}\times\frac{12a^3b^2c}{16ab^2c^5}=\frac{4.12.a^5b^6c^6}{12.16.a^3b^4c^6}=\frac{a^2b^2}{4}$$

Para não ficar com números grandes, é recomendável deixar indicadas as multiplicações dos coeficientes, pois assim já estarão em uma forma parcialmente fatorada, facilitando a posterior simplificação. Realizamos a multiplicação da parte literal do numerador, que resulta em $a^5b^6c^6$. Fazemos o mesmo com a parte literal do denominador, resultando em $a^3b^4c^6$. A seguir

Scanned by CamScanner

fazemos os cancelamentos possíveis, entre numerador e denominador, resultando na forma simplificada, $a^2b^2/4$.

Nas multiplicações de frações algébricas, os fatores de numerador de uma fração podem cancelar com os fatores dos denominadores de ambas as frações. Este expediente agiliza a operação de simplificação. Por exemplo, podemos começar cancelando os coeficientes 12, o termo a^2 nos termos da primeira fração, os termos b^2 nos termos da segunda fração e os termos c^5 existentes nas duas frações.

$$\frac{4a^2b^4e^5 \times 12a^3b^2c}{12a^2b^2c \times 16ab^2e^5}$$

Ficamos então com $\frac{4b^4}{b^2c} \times \frac{a^3c}{16a}$

É recomendável reescrever a expressão simplificada, antes de prosseguir, o que reduz a possibilidade de erros de cálculo. Agora podemos continuar com as simplificações:

4 simplifica com 16, ficando 1 no numerador, 4 no denominador
b^4 simplifica com b^2, ficando b^2 no numerador, 1 no denominador
c cancela com c
a^3 simplifica com a, ficando a^2 no numerador e 1 no denominador

O resultado final é $\frac{a^2b^2}{4}$

Exemplo: Efetuar $\frac{x^2-2x-15}{x^2-16} \times \frac{x^2-4x}{x^2-5x}$

Inicialmente devemos fatorar os termos das frações:

$$\frac{(x-5)(x+3)}{(x+4)(x-4)} \times \frac{x(x-4)}{x(x-5)}$$

Os fatores do numerador que podem ser cancelados com fatores nos denominadores são $(x-5)$, x e $(x-4)$. Ficamos com:

$$\frac{(x+3)}{(x+4)} \times \frac{1}{1} = \frac{x+3}{x+4}$$

Realmente a multiplicação de frações algébricas é muito simples, e consiste em:

1) Fatorar numeradores e denominadores
2) "Juntar" todos os fatores dos numeradores, idem nos denominadores
3) Simplificar cada fator dos numeradores com fatores iguais nos denominadores

O mais importante: um fator de um numerador pode ser cancelado com fatores iguais em qualquer um dos denominadores.

Scanned by CamScanner

Exercícios

E6) Multiplique as frações algébricas

a) $\frac{10ab^3}{8c^2} \times \frac{24c^4}{15a^3b}$

b) $\frac{12xy^3}{36mp^3} \times \frac{27m^2p}{20x^3y}$

c) $\frac{48y^2}{7y} \times \frac{7y^4}{8y^3}$

d) $\frac{15x^3y^4}{12xy} \times \frac{32xy^2}{20x^2y^3}$

e) $\frac{15y^4z^3}{16wx^4} \times \frac{24w^3x^3}{25y^3z^2}$

f) $5(x+1) \times \frac{(x-2)(x-5)}{5(x+1)}$

g) $3(x-2) \times \frac{5(x-6)}{4x(x-6)}$

h) $\frac{35x^2-25x}{2x^2} \cdot \frac{10x}{7x^2-5x}$

i) $\frac{x-5}{x^2} \times \frac{x^3}{x^2-2x-15}$

j) $\frac{x^2+7x+10}{x+1} \times \frac{3x+3}{x+5}$

k) $\frac{m+3}{7m} \times \frac{5m^3}{(m+3)(m+4)}$

l) $\frac{x^2-4}{3x} \times \frac{5x^2}{x+2}$

m) $\frac{x^2-16}{x+4} \times \frac{x+5}{x^2-8x+16}$

n) $\frac{x-5}{x^2-7x+10} \times \frac{x^2+x-6}{x^2}$

o) $\frac{x-5}{(x+8)(x-4)} \cdot \frac{(x+4)(x-4)}{x-5}$

E7) Efetue as multiplicações:

a) $\frac{75x^3y}{16z^4w} \cdot \frac{24z^2w^2}{25xy^3}$

b) $\frac{(x+4)(x+6)}{(x-6)(x+1)} \cdot \frac{(x+2)(x+1)}{(x+4)(x+6)}$

c) $\frac{x-5}{(x-2)(x+8)} \cdot \frac{(x+3)(x-2)}{x-5}$

d) $\frac{x^2-25}{8} \cdot \frac{x+3}{x-5}$

e) $\frac{x-4}{x^2-x-12} \cdot \frac{x+3}{x+4}$

f) $\frac{x^2+12x+11}{x^2-9} \cdot \frac{x+9}{x^2+20x+99}$

g) $\frac{x^2-4}{x^2-1} \cdot \frac{x+1}{x-2}$

h) $\frac{x-8}{x^2+4x-32} \cdot \frac{x-4}{x+2}$

i) $\frac{4a^2}{a^2+9a+20} \cdot \frac{2a+10}{a^3}$

j) $\frac{x^2-x-2}{x^2-16} \cdot \frac{x^2+7x+12}{x^2+4x+3}$

Como vemos, a multiplicação de operações algébricas é bastante simples. É uma operação tão fácil quanto a simplificação. O mais importante é que as frações devem estar fatoradas, caso contrário a operação será um pouco mais trabalhosa, pois será preciso antes fatorar o numerador e o denominador das frações.

Frações algébricas com sinais negativos

Sinais negativos muitas vezes são motivo de dúvida entre os estudantes. Com frações algébricas o problema é semelhante. Vamos fazer algumas considerações sobre sinais para esclarecer o assunto:

Exemplo 1: Trocar o sinal n vezes

Tomemos um número real não nulo qualquer, por exemplo, 5. Vamos multiplicá-lo por (–1). O resultado é –5, ou seja, o valor original fica com o sinal trocado, antes era positivo, depois passou a ser negativo. Se o início fosse tomado um número negativo, por exemplo, –3, ao multiplicarmos por (–1) o resultado passaria a ser 3. É errado dizer que multiplicar um número

Scanned by CamScanner

por (–1) torna-o negativo. O correto é dizer que o número troca de sinal, passa a ser negativo ou positivo, dependendo do fato do número original ser positivo ou negativo.

Vamos multiplicar o resultado novamente por (–1). O número original, que era 5, passou a dar resultado –5, e ao ser multiplicado por (–1) pela segunda vez, o resultado volta a ser 5. Se o número original fosse –3, teria mudado para 3, e novamente para –3. Multiplicar qualquer valor por (–1) duas vezes, dá como resultado, o valor original. Isto ocorre porque (-1) multiplicado por (–1) dá como resultado, 1, ou seja, o valor original não se altera, já que 1 é o elemento neutro da multiplicação.

$5 \times (-1) \times (-1) = 5 \times 1 = 5$

Se multiplicássemos o valor original por (–1) n vezes, o resultado seria $(-1)^n$. Se n for par, o resultado será 1, e se n for ímpar, o resultado será (–1).

Exemplo 2:

Considere a e b números reais positivos, com b≠0, e formemos a fração $\frac{a}{b}$.

Considere agora o número real simétrico deste valor, ou seja, $-\frac{a}{b}$.

As seguintes frações possuem o mesmo valor numérico:

$$-\frac{a}{b} = \frac{-a}{b} = \frac{a}{-b}.$$

As três expressões são iguais porque são obtidas a partir da expressão original a/b, acrescida de uma troca de sinal. A troca de sinal nada mais é que a multiplicação pelo fator (–1). Tanto faz multiplicar a expressão original por (–1) na fração, só no numerador ou só no denominador, o efeito é o mesmo: a fração original troca de sinal.

Vamos agora retirar a restrição de que a e b tenham que ser positivos. Na verdade a e b podem ser números reais quaisquer, positivos ou negativos, exceto pela restrição que b não pode ser zero. Ainda com essa liberdade de sinais, permanece válida a igualdade:

$$-\frac{a}{b} = \frac{-a}{b} = \frac{a}{-b}$$

Também é correto afirmar que:

$$\frac{a}{b} = -\frac{-a}{b} = -\frac{a}{-b} = \frac{-a}{-b}$$

As três frações são iguais a a/b, pois em cada uma delas, ocorreram duas trocas de sinais, o que é o mesmo que multiplicar por (–1) duas vezes. Quando multiplicamos uma expressão por (–1) um número par de vezes, o resultado não se altera.

Scanned by CamScanner

Exemplo 3: Simplifique: $\frac{x-3}{3-x}$

A princípio parece que não é possível simplificar, pois existem termos diferentes no numerador e no denominador. Na verdade os termos são iguais, exceto por um sinal negativo. Note que (3 – x) é a mesma coisa que –(x – 3). Como se fossem, por exemplo, –5 e +5. Podemos então usar a propriedade

$-\frac{a}{b}=\frac{-a}{b}=\frac{a}{-b}$, e escrever

$$\frac{x-3}{3-x}=\frac{x-3}{-(x-3)}=-\frac{x-3}{x-3}=-\frac{1}{1}=-1$$

Exemplo 3: Simplifique: $\frac{(x-1)(x-3)}{(1-x)(3-x)}$

O numerador possui fatores (x – 1) e (x – 3), enquanto o denominador possui fatores (1 – x) e (3 – x). Cada um dos fatores do denominador tornam-se iguais aos do numerador se forem multiplicados por (–1), bastando prestar atenção no sinal.

Um erro muito comum nesse cálculo é o seguinte:

Usando a propriedade $\frac{a}{b}=-\frac{a}{-b}$, ficaríamos com:

$\frac{(x-1)(x-3)}{(1-x)(3-x)}=-\frac{(x-1)(x-3)}{(x-1)(x-3)}$ ERRADO !!!!!!!!!!

O que foi tentado aqui foram duas trocas de sinal para que a fração não se altere. Os dois sinais trocados foram o da fração e o do denominador. Ocorre que esta troca de sinal no denominador está completamente errada !!!!!

Ao trocar o sinal do denominador, o procedimento correto é seguinte: a troca de sinal é uma multiplicação por (–1):

(–1) . (1 – x) . (3 – x)

O fator (–1) atua sobre (1 – x), transformando-o em (x – 1). Não é o caso de trocar também o sinal de (3 – x), pois o fator (–1) já foi usado em (1 – x). Se trocássemos o sinal também de (3 – x), estaríamos usando o fator (–1) duas vezes, o que estaria errado.

É uma situação diferente do exemplo em que trocamos o sinal do denominador em $\frac{x-3}{3-x}$. Não é para trocar o sinal de tudo o que está no denominador, e sim, trocar o sinal de um fator do denominador, e não de todos os fatores.

O procedimento correto para realizar esta simplificação é o seguinte:

Em $\frac{(x-1)(x-3)}{(1-x)(3-x)}$, existem dois fatores no denominador que gostaríamos que trocassem de sinal. Como é uma multiplicação, são duas trocas de sinal, ou seja, duas multiplicações por (–

Scanned by CamScanner

1). Quando multiplicamos uma expressão por (–1) um número par de vezes, o resultado não se altera. É o mesmo que dizer:

$$\frac{a}{(-b)(-c)} = \frac{a}{bc}$$

Portanto fazemos:

$$\frac{(x-1)(x-3)}{(1-x)(3-x)} = \frac{(x-1)(x-3)}{(x-1)(x-3)} = \frac{1.1}{1.1} = 1$$

Fatores de uma fração algébrica, ou mesmo uma expressão algébrica fatorada, podem trocar livremente de sinal, sendo que no resultado final, se o número de trocas for ímpar, é preciso multiplicar por um fator (–1) para manter o sinal.

Exemplo 4: Simplifique $\frac{(x-1)^2(x-3)^3}{(1-x)^3(3-x)^4}$

Ao trocarmos o sinal de $(1 - x)^3$, estamos multiplicando por (–1) 3 vezes. Trocando o sinal do termo $(3 - x)^4$, estamos introduzindo 4 fatores (–1). Portanto são 7 trocas de sinal, e para compensar, temos que trocar o sinal mais uma vez:

$$\frac{(x-1)^2(x-3)^3}{(1-x)^3(3-x)^4} = -\frac{(x-1)^2(x-3)^3}{(x-1)^3(x-3)^4} = -\frac{1}{(x-1)(x-3)}$$

Exercícios

E8) Efetue quando for o caso e simplifique

a) $\frac{4-x}{x^2-x-12} \cdot \frac{3-x}{x+4}$

b) $\frac{x^2-25}{8} \cdot \frac{x+3}{5-x}$

c) $\frac{x^2-4}{1-x^2} \cdot \frac{x+1}{2-x}$

d) $\frac{x-5}{x^2} \times \frac{-x^3}{15+2x-x^2}$

e) $3(x-2) \times \frac{5(6-x)}{4x(x-6)}$

f) $\frac{x^2-9x+20}{16-x^2}$

g) $\frac{-x^2+3x-2}{8x^2+2x-10}$

h) $\frac{-6+9x-3x^2}{5x^3-15x^2+10x}$

i) $\frac{x^3-2x^2-x+2}{1-x^2}$

j) $\frac{32-12x}{8x-28}$

k) $5(x+1) \times \frac{(2-x)(x-5)}{5(x+1)}$

l) $\frac{x^2-2x-15}{x^2-16} \times \frac{4x-x^2}{5x-x^2}$

m) $\frac{16-x^2}{x-4} \times \frac{-(x+5)}{x^2-8x+16}$

n) $\frac{z+z^2}{1-z^2}$

o) $\frac{(x-y)^2-z^2}{(z-y)^2-x^2}$

Divisão de frações algébricas

Na aritmética aprendemos que para dividir duas frações numéricas, basta repetir a primeira fração a multiplica-la pelo inverso da segunda. Ou seja:

$$\frac{n}{d} \div \frac{a}{b} = \frac{n}{d} \times \frac{b}{a}$$

Scanned by CamScanner

Esta propriedade é consequência da propriedade do inverso multiplicativo dos números reais. Para qualquer número real x, diferente de zero, existe o seu inverso multiplicativo x', de tal forma que seu produto é a unidade.

$x.x' = 1$

Propriedade:
O inverso multiplicativo é único.

Demonstração:
Esta propriedade diz que cada número real, diferente de zero, possui um único inverso multiplicativo. Para demonstrá-la, suponha que existe mais de um inverso, e mostraremos que esses inversos são iguais. Suponhamos então que o número x possui dois inversos multiplicativos, x' e x". Podemos então escrever:

$x.x' = 1$
$x.x'' = 1$

Subtraindo as duas equações ficamos com:

$x.x' - x.x'' = 1 - 1 = 0$

Podemos colocar x em evidência, o que é uma consequência da propriedade distributiva da multiplicação em relação à subtração:

$x.(x' - x'') = 0$

Temos agora o produto de dois números reais, a saber, x e (x' – x"), dando como resultado zero. Para que o produto de dois números seja zero, pelo menos um deles tem que ser zero. Como x não pode ser zero (zero não tem inverso multiplicativo), então concluímos que x' – x" tem que ser zero, ou seja:

$x' = x''$

Isto mostra que o inverso multiplicativo é único.

Consequência 1: O inverso multiplicativo de x é 1/x.
Prova: Multiplicando x por 1/x ficamos com:

$x \cdot \frac{1}{x} = \frac{x}{1} \cdot \frac{1}{x} = 1$, já que o x do numerador cancelará com x do denominador

Consequência 2: O inverso multiplicativo de a/b é b/a.
Prova: Multiplicando a/b por b/a ficamos com:

$\frac{a}{b} \times \frac{b}{a} = 1$, pois a cortará com a e b cortará com b.

Como o produto é igual a 1, segue pela definição, que (b/a) é o inverso multiplicativo de (a/b), e vice-versa.

Scanned by CamScanner

Com esses resultados, fica fácil mostrar porque dividir por uma fração é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso da fração.

Seja F uma fração, e vamos dividi-la pelo número real x.

$$F \div x$$

Com uma fração é na verdade uma divisão, podemos representar esta divisão na forma:

$$\frac{F}{x}$$

Este valor é o resultado da seguinte expressão:

$$\frac{F}{1} \times \frac{1}{x}$$

Agora consideremos que F seja representada como n/d, e x seja uma outra fração, a/b. Como 1/x na expressão acima é o inverso de x, e como já mostramos que o inverso de a/b é b/a, ficamos com:

$$\frac{n}{d} \times \frac{b}{a}$$

Substituindo F por n/d e x por a/b também na expressão original, ficamos com:

$$\frac{n}{d} \div \frac{a}{b} = \frac{n}{d} \times \frac{b}{a}$$

Portanto, para dividir duas frações, basta repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda.

Isso é o mesmo que dizer:

Dividir é o mesmo que multiplicar pelo inverso.

Um caminho muitas vezes apresentado para este resultado é simplesmente "memorizar" a regra, aceita sem contestação, mas na verdade esta regra é consequência de resultados provados matematicamente.

Para dividir frações algébricas, transformamos a divisão em uma multiplicação, na qual a primeira fração é a original, e a segunda fração é invertida.

Exemplo: Efetue a divisão: $\frac{4b^4}{b^2c} \div \frac{b^3c}{16c^3}$

Basta repetir a primeira fração, inverter a segunda e multiplicá-las. Ficamos então com:

$$\frac{4b^4}{b^2c} \div \frac{b^3c}{16c^3} = \frac{4b^4}{b^2c} \times \frac{16c^3}{b^2c} = \frac{64c}{1} = 64c$$

Scanned by CamScanner

Como vemos, dividir frações algébricas é tão fácil quanto multiplicar, basta repetir a primeira fração, inverter a segunda e multiplicá-las.

Exercícios

E9) Efetue as divisões:

a) $\frac{15x^2}{7} \div \frac{10x^5}{63}$

b) $\frac{15x^2y}{16zw} \div \frac{5xy^3z}{24w^2}$

c) $\frac{10ab^3}{8c^2} \div \frac{12a^4}{16c^3b}$

d) $\frac{48y^2}{7y} \div \frac{8y^4}{21y^3}$

e) $\frac{12xy^3}{36mp^3} \div \frac{27x^2y}{20m^3p}$

f) $\frac{x^2+3x+2}{4} \div \frac{x+1}{x+2}$

g) $\frac{4a-20}{a+3} \div \frac{a-5}{5a+15}$

h) $\frac{x+3}{x^2+10x+25} \div \frac{5x+15}{x+5}$

i) $\frac{2x}{x+3} \div \frac{x-3}{x+3}$

j) $\frac{x^2+8x+16}{2x+8} \div \frac{x^2-6x+9}{3x-9}$

k) $\frac{3x-6}{x^2+9x+14} \div \frac{x+1}{x^2+5x+6}$

l) $\frac{3x+12}{4x-18} \div \frac{2x+12}{x+6}$

m) $\frac{x^2-16}{4x^2} \div \frac{x^2+7x+12}{3x}$

n) $\frac{x^2+3x+2}{3x} \div \frac{x+2}{x+3}$

o) $\frac{x^2+2x-15}{x^2-3x-18} \div \frac{x^2-x-30}{x^2-2x-24}$

Adição e subtração de frações algébricas

Essas são as operações mais trabalhosas que envolvem frações algébricas. A dificuldade adicional é que as frações a serem adicionadas ou subtraídas precisam ter o mesmo denominador. Sendo assim, é preciso reduzir todas as frações ao mesmo denominador. Antes disso, cada fração deve ser simplificada, se possível, o que resulta em expressões mais fáceis de operar.

Exemplo: Calcule e simplifique $\frac{x^2}{x-5} + \frac{3x}{x-5} - \frac{40}{x-5}$

Quando as frações têm denominadores iguais, o problema é bem fácil. Basta repetir o denominador e somar os numeradores:

$$\frac{x^2}{x-5} + \frac{3x}{x-5} - \frac{40}{x-5} = \frac{x^2+3x-40}{x-5} = \frac{(x+8)(x-5)}{x-5} = x+8$$

Exemplo: Calcule e simplifique $3 + \frac{2}{x} + \frac{5}{x^2}$

A primeira coisa a fazer é transformar o número 3 em fração, ficando com 3/1:

$$\frac{3}{1} + \frac{2}{x} + \frac{5}{x^2}$$

Vemos ainda que nada pode ser simplificado nessas três frações. Para realizar a adição, reduzimos as frações ao mesmo denominador. Este denominador será o MMC entre os denominadores, ou seja, 1, x e x^2.

Scanned by CamScanner

MMC(1, x, x^2) = x^2.

Para que as três frações fiquem com o mesmo denominador, é preciso multiplicar numerador e denominador por um valor apropriado:

$\frac{3}{1}$: Multiplicar ambos os termos por x^2 ➔ $\frac{3x^2}{x^2}$

$\frac{2}{x}$: Multiplicar ambos os termos por x ➔ $\frac{2x}{x^2}$

$\frac{5}{x^2}$: Multiplicar ambos os termos por 1 ➔ $\frac{5}{x^2}$

Os valores que multiplicarão os termos de cada fração são iguais ao MMC dividido por cada denominador.

Ficamos então com:

$$\frac{3x^2}{x^2}+\frac{2x}{x^2}+\frac{5}{x^2}$$

Uma vez que as frações ficaram com denominadores iguais, podemos somá-las:

Para somar frações com denominadores iguais, somamos os numeradores e repetimos o denominador:

$$\frac{3x^2}{x^2}+\frac{2x}{x^2}+\frac{5}{x^2}=\frac{3x^2+2x+5}{x^2}$$

Nesse caso o resultado final não admite fatoração nem simplificação.

Exemplo: Calcule e simplifique $\frac{x}{x+1}+\frac{2x}{x-1}-\frac{3}{x^2-1}$

A questão envolve adição e subtração de frações algébricas. Como os denominadores são diferentes, precisamos converter as três frações para o mesmo denominador.

O MMC entre (x + 1), (x – 1) e (x^2 – 1) é (x^2 – 1). Para que os denominadores fiquem iguais, é preciso multiplicar numerador e denominador das frações por (x – 1), (x + 1) e 1, respectivamente. É usual fazer esta indicação sobre as frações, colocando um traço inclinado sob cada denominador e escrever abaixo os fatores que devem multiplicar numerador e denominador, como indicado abaixo:

$$\frac{x}{x+1\,/\,x-1}+\frac{2x}{x-1\,/\,x+1}-\frac{3}{x^2-1\,/\,1}$$

Scanned by CamScanner

Ficamos então com:

$$\frac{x(x-1)}{x^2-1}+\frac{2x(x+1)}{x^2-1}-\frac{3\cdot 1}{x^2-1}=\frac{x^2-x+2x^2+2x-3}{x^2-1}=\frac{3x^2+x-3}{x^2-1}$$
$$=\frac{3x^2+x-3}{(x+1)(x-1)}$$

Denominadores que simplificam

Frações que serão multiplicadas ou divididas não precisam ter denominadores iguais, como ocorre nas adições e subtrações. Esses denominadores podem ser diferentes, e eventualmente até simplificam. Genericamente temos:

$$\frac{\frac{a}{x}}{\frac{b}{x}}=\frac{a}{x}\div\frac{b}{x}=\frac{a}{x}\times\frac{x}{b}=\frac{a}{b}$$

Ou seja, em uma divisão na qual os denominadores são iguais, os denominadores "cancelam":

$$\frac{a/x}{b/x}=\frac{a}{b}$$

Isto nada mais é que uma consequência da propriedade da divisão, que estabelece que dividir por um valor é o mesmo que multiplicar pelo seu inverso.

Exemplo: Calcule: $\dfrac{x+\frac{y-x}{1+xy}}{1-\frac{xy-x^2}{1+xy}}$

$$\frac{x+\frac{y-x}{1+xy}}{1-\frac{xy-x^2}{1+xy}}=\frac{\left(x(1+xy)+y-x\right)/(1+xy)}{\left(1+xy-xy+x^2\right)/(1+xy)}=\frac{x+x^2y+y-x}{1+xy-xy+x^2}=\frac{y(x^2+1)}{x^2+1}=y$$

Portanto, ao dividirmos frações algébricas com denominadores iguais podemos perfeitamente cancelá-los.

Exercícios

E10) Efetue e simplifique

a) $\dfrac{2x+5}{x-2}-\dfrac{x-3}{x-2}$

b) $\dfrac{5x}{x-5}-\dfrac{2x}{5-x}$

f) $\dfrac{2x+1}{(x-1)^2}+\dfrac{x-2}{x^2-1}$

g) $\dfrac{4x-11}{2x-7}-\dfrac{5x}{7-2x}$

k) $\dfrac{x^2}{4x^2-9}+\dfrac{x}{(2x+3)^2}$

l) $\dfrac{x-2}{x^2+4x+4}-\dfrac{x-4}{x^2-4}$

Scanned by CamScanner

c) $\frac{a^2}{a-b}+\frac{b^2}{b-a}$

d) $\frac{2x-4}{3x-2}+\frac{5x-2}{2-3x}$

e) $\frac{2}{x+7}-\frac{-3x}{x+7}$

h) $\frac{x+2}{x}+\frac{x-3}{4x}$

i) $\frac{x-1}{x^2+4x+4}+\frac{x-1}{x+2}$

j) $\frac{3}{4x-4}-\frac{x}{x+2}$

m) $\frac{x+8}{x^2-16}-\frac{x}{x-4}$

n) $\frac{x}{x-2}-\frac{4}{x^2+3x-10}$

o) $\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x-1}$

E11) Efetue e simplifique

a) $\frac{3x}{a-x}-\frac{x^2-3ax}{x^2-a^2}$

b) $\frac{x^2-9}{x^2-5x+6}+\frac{x-x^2}{2x^2-6x+4}$

c) $\frac{2x}{x+3}+\frac{x^2-1}{x-1}\div\frac{x^2+4x+3}{12}$

d) $\frac{x^2-x}{1-2x+x^2}-\frac{x+1}{ax^2-a}$

e) $\frac{x+\frac{y-x}{1+xy}}{1-\frac{xy-x^2}{1+xy}}$

f) $\left(\frac{2a}{a-2}-\frac{2a^2}{a^2-4}-\frac{4}{a+2}\right)\div\frac{8}{a+2}$

g) $\left[\frac{2x}{x+y}-\frac{y}{y-x}+\frac{y^2}{y^2-x^2}\right]\div\left[\frac{1}{x+y}+\frac{x}{x^2-y^2}\right]$

h) $\frac{a}{a-b}+\frac{a}{a+b}+\frac{2a^2}{a^2+b^2}+\frac{4a^2b^2}{a^4-b^4}$

i) $\frac{x}{x-y}+\frac{x}{x+y}+\frac{2x^2}{x^2+y^2}-\frac{4x^2y^2}{x^4-y^4}$

j) $\frac{\frac{a+b}{ab}+\frac{a}{b^2}}{\frac{1}{a^2}+\frac{1}{ab}+\frac{1}{b^2}}$

Note que todas essas operações já haviam sido ensinadas nos capítulos anteriores, e finalmente no presente capítulo foram consolidadas.

Exercícios de revisão

E12) Efetue e simplifique

a) $\frac{9x^2-4y^2}{x^2-4}\times\frac{x+2}{3x-2y}$

b) $\frac{25a^2-b^2}{16a^2-9b^2}\div\frac{5a-b}{4a-3b}$

c) $\frac{x^2-49}{(a+b)^2-c^2}\div\frac{x+7}{a+b-c}$

d) $\frac{x^2+2x+1}{x^2-25}\div\frac{x+1}{x^2+5x}$

e) $\frac{a^2+3a+2}{a^2+5a+6}\times\frac{a^2+7a+12}{a^2+9a+20}$

f) $\frac{y^2-y-30}{y^2-36}\times\frac{y^2-y-2}{y^2+3y-10}\times\frac{y^2+6y}{y^2+y}$

g) $\frac{x^2-2x+1}{x^2-y^2}\times\frac{x^2+2xy+y^2}{x-1}\div\frac{x^2-1}{x^2-xy}$

h) $\frac{a^2-b^2}{a^2-3ab+2b^2}\times\frac{ab-2b^2}{a^2+ab}\div\frac{(a-b)^2}{a(a-b)}$

i) $\frac{(a+b)^2-c^2}{a^2+ab-ac}\times\frac{a^2b^2c^2}{a^2+ab+ac}\div\frac{b^2c^2}{abc}$

j) $\frac{x^2+7xy+10y^2}{x^2+6xy+5y^2}\times\frac{x+1}{x^2+4x+4}\div\frac{1}{x+2}$

Scanned by CamScanner

E13) Efetue e simplifique

a) $\dfrac{\dfrac{2m+x}{m+x}-1}{1-\dfrac{x}{m+x}}$

b) $\dfrac{\dfrac{x-y}{x^2-y^2}}{\dfrac{x-y}{x+y}}$

c) $\dfrac{a+\dfrac{ab}{a-b}}{a-\dfrac{ab}{a+b}}$

d) $\dfrac{9a^2-64}{a-1-\dfrac{a+4}{4}}$

e) $\dfrac{\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}}{\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{y}}$

f) $\dfrac{x+3+\dfrac{2}{x}}{1+\dfrac{3}{x}+\dfrac{2}{x^2}}$

g) $\dfrac{\dfrac{1}{x}-\dfrac{2}{x^2}+\dfrac{1}{x^2}}{\dfrac{(1-x)^2}{x^2}}$

h) $\dfrac{x^2-x-6}{1-\dfrac{4}{x^2}}$

i) $\dfrac{a^2-a+\dfrac{a-1}{a+1}}{a+\dfrac{1}{a+1}}$

j) $\dfrac{\dfrac{4a(a-x)}{a^2-x^2}}{\dfrac{a-x}{a+x}}$

E14) Efetue e simplifique

a) $\dfrac{4a^3x-6a^2x^2}{8a^4x-24a^3x^2+18a^2x^3}$

b) $\dfrac{a^2x+abx}{a^3+3a^2b+3ab^2+b^3}$

c) $\dfrac{a^2b^2+b^2c^2-b^4-a^2c^2}{a^2b+a^2c-abc-ab^2}$

d) $\dfrac{x^2+y^2+z^2+2xy+2xz+2yz}{x^2-y^2-z^2-2yz}$

e) $\dfrac{a^4-b^4}{2a^4-2a^3b+2a^2b^2-2ab^3}$

f) $\dfrac{1-a^2}{(1+ax)^2-(a+x)^2}$

g) $\dfrac{3-5x}{2-3x}-\dfrac{2x+3}{2+3x}+\dfrac{9x^2}{4-9x^2}$

h) $\dfrac{1}{x+y}+\dfrac{2}{x^2-y^2}$

i) $\dfrac{a+b}{a-b}-\dfrac{a-b}{a+b}+\dfrac{4b^2}{a^2-b^2}$

j) $\dfrac{a-b}{2(a+b)}-\dfrac{a^2+b^2}{a^2-b^2}$

E15) Efetue e Simplifique

a) $\dfrac{1}{a^2-b^2}+\dfrac{1}{2(a+b)^2}+\dfrac{1}{2(a-b)^2}$

b) $\dfrac{1}{x-a}-\dfrac{3}{x+a}+\dfrac{2x}{(x+a)^2}$

c) $\dfrac{x-y}{x^2-xy+y^2}+\dfrac{1}{x+y}+\dfrac{xy}{x^3+y^3}$

d) $\dfrac{a^3}{(a+b)^3}-\dfrac{ab}{(a+b)^2}+\dfrac{b}{a+b}$

f) $\dfrac{18(x^2-y^2)}{35(a+y)}\div\dfrac{12(x-y)^2}{7(a^2-y^2)}$

g) $\dfrac{a^3+3ab^2+3a^2b+b^3}{a^4-b^4}\div\dfrac{2(a+b)^2}{a-b}$

h) $\dfrac{a^2+3a+9}{a^4-3a^2+9}\div\dfrac{a^3-27}{a^6+27}$

i) $\left(\dfrac{x^2}{y^2}+\dfrac{y}{x}\right)\div\left(\dfrac{x}{y^2}-\dfrac{1}{y}+\dfrac{1}{x}\right)$

Scanned by CamScanner

e) $\frac{a^2-x^2}{a+b}\times\frac{a^2-b^2}{ax+x^2}\times\left(a+\frac{ax}{a-x}\right)$

j) $\frac{\frac{x^2+y^2}{y}-x}{\frac{1}{y}-\frac{1}{x}}\div\frac{x^3+y^3}{x^2-y^2}$

E16) Efetue e simplifique

a) $\frac{x^2-2x+1}{(x-1)^3}-\frac{x^2+x+1}{x^3-1}$

b) $x-\frac{x^2-1}{1-\frac{x-1}{x}}$

c) $\frac{x^2-9}{x^2-5x+6}+\frac{3x-x^2}{x^2-4x+4}$

d) $\frac{4x^2-4x+1}{2x^2+3x-2}$

e) $\frac{1}{x^2-1}-\frac{x}{x^2-2x+1}$

f) $\frac{x^2+2x}{x^2+x+6}\times\frac{x^2+2x+1}{x^2+3x+2}$

g) $1+\frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{x}}}$

h) $\left(1-\frac{x-y}{x+y}\right)\times\left(2+\frac{2y}{x-y}\right)$

i) $\frac{x^2+x-6}{x^2-2x^2+3x+18}$

j) $\frac{15x^2-10xy+3xz-2yz}{25x^2+10xz+z^2}$

k) $\frac{(2x-4)(3x+6)}{5x^2-20}$

l) $\frac{x^3+y^3}{x^2-y^2}\times\frac{\frac{1}{y}-\frac{1}{x}}{\frac{x^2+y^2}{y}-x}$

m) $\left(a^{-2}-b^{-2}\right)^{-1}\cdot\frac{b^2+ab}{a^2b^3}$

n) $\frac{a+x}{a+1}+\frac{a+x}{a-1}+\frac{2a+2x}{a^2-1}$

o) $\frac{a^4-b^4}{a^3+a^2b+ab^2+b^3}$

E17) Efetue as operações (fatoração ou divisão de polinômios)

a) $(4x^3 + 4x^2 - 29x + 21)/(2x - 3)$

b) $(a^4 - 9a^2b^2 - 6abc^2 - c^4)/(a^2 - 3ab - c^2)$

c) $(32a^5 + b^5)/(2a + b)$

d) $(a^8 - 16x^8)/(a^2 - 2x^2)$

e) $(3a^5 + 16a^4b - 33a^3b^2 + 14a^2b^3)/(a^2 + 7ab)$

f) $(a^6 + 2a^3y^3 + y^6)/(a^2 - ay + y^2)$

g) $(a^m - b^m)/(a - b)$

h) $\frac{x^4-y^4}{\left(x^2+y^2\right)^2}\div\left(x^4-2x^2y^2+y^4\right)^{1/2}$, para $|x|>|y|$

i) $\frac{a}{a-b}+\frac{a}{a+b}+\frac{2a^2}{a^2+b^2}+\frac{4a^2b^2}{a^4-b^4}$

j) $\frac{a^3-x^3}{a^3+x^3}\div\frac{a-x}{a^2-ax+x^2}$

Scanned by CamScanner

E18)

a) $\frac{a^3}{(a+b)^3}-\frac{ab}{(a+b)^2}+\frac{b}{a+b}$

b) $\frac{x^3-64}{4x^2-4}\div\frac{x-4}{3x^2+2x-5}$

c) $\frac{x^2+2x-15}{x^2+3x-18}\div\frac{x^2-3x-40}{x^2+14x+48}$

d) $\frac{x^2-9}{x^2-4x-12}\div\frac{x^2-5x+6}{x^2-4}$

e) $\frac{x^{2k}-9}{3x^{k+3}+9x^3}\div\frac{x^{k+2}-3x^2}{6x^{k+5}}$

f) $\frac{2}{x^2-x}+\frac{x^2+x+1}{x^3-1}-\frac{x}{x^2-1}$

g) $\frac{1-2a}{4a^2-1}-\frac{a-1}{2a^2-3a+1}-\frac{1}{1-a}$

h) $\left(\frac{a+b}{a-b}-\frac{a-b}{a+b}-\frac{4a^2}{b^2-a^2}\right)\times\frac{a^2+2ab+b^2}{4a}$

i) $\frac{3a-4b}{7}-\frac{2a-b-c}{3}+\frac{15a-4c}{12}$

j) $\frac{21a^2b^3c-9ab^3c^2}{15a^2b^2c+3a^5b^4c^2-12ab^2c}$

E19)

a) $\frac{6ax+9bx-5x^2}{12adf+18bdf-10dfx}$

b) $\frac{6ac+10bc+9ad+15bd}{6c^2+9cd-2c-3d}$

c) $\frac{2x^3-(3c+d+2)x^2+(3x+d)x}{x^4-x}$

d) $\frac{x^2+3xy+xz+2y^2+2yz}{x^2+y^2+2xy-z^2}$

e) $\frac{x^3-6x^2+11x-6}{x^4-7x^3+11x^2+7x-12}$

f) $\frac{a^3+(a+1)ay+y^2}{a^4-y^2}$

g) $\frac{x^3-12x^2+41x-30}{x^2-11x-30}$

h) $\frac{x^2+y^2+z^2+2xy+2xz+2yz}{x^2-y^2-z^2-2yz}$

i) $\frac{a^3b^3+c^3x^3}{a^2b^2-c^2x^2}$

j) $\frac{2}{(x-3)(x-2)}-\frac{1}{(x-3)(x+1)}$

E20)

a) $\frac{x^2-1}{x^2-5x+4}\cdot\frac{x^2-3x+2}{x^2-4}$

b) $\frac{x-1}{x^2-4}-\frac{x+1}{x^2-x-2}$

f) $\frac{x^2-25}{x^3-4x^2-5x}\cdot\frac{x^2+x}{1-x^2}$

g) $\frac{\frac{x}{x-a}+\frac{a}{x+a}}{\frac{x}{x-a}-\frac{a}{x+a}}$

Scanned by CamScanner

c) $\frac{a}{b}+\frac{a-3b}{cd}+\frac{a^2-b^2-ab}{bcd}$

d) $\frac{\left(2^n.3^n\right)^{\sqrt{4n^2}}}{\left[2\left(4+\left(23^n\right)\left(23^{-n}\right)\right)-4\right]^{3n^2}}$

e) $\left(\frac{a+x}{a-x}+\frac{b-x}{b+x}\right)\times\left(\frac{a-x}{a+x}+\frac{b+x}{b-x}\right)$

h) $\frac{x^2-9}{x^2-4x-12}\div\frac{x^2-5x+6}{x^2-4}$

i) $\frac{3a}{(a-2x)^2}+\frac{2a+x}{(a+x)(a-2x)}-\frac{5}{a+x}$

j) $\frac{x^4-y^4}{x^3+x^2y+xy^2+y^3}$ (x≠0 e y≠0)

E21) A expressão racional $\frac{x}{2-x}$ é equivalente a:

(A) $\frac{x}{x-2}$ (B) $-\frac{x}{x-2}$ (C) $-\frac{x}{2+x}$ (D) $\frac{x}{-2-x}$

E22) Simplifique

$$1+\frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{x}}}}$$

(A) $\frac{3x+2}{x}$ (B) $\frac{5x+3}{3x+2}$ (C) x

(D) $\frac{4x+1}{x}$ (E) $\frac{2x+6}{x+4}$

E23) Simplifique $\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{2}-\sqrt{x}}$

(A) $\frac{\sqrt{2x}+x}{2-x}$ (B) $\sqrt{x}$ (C) $\frac{2\sqrt{x}+x}{4-x}$ (D) $\frac{\sqrt{x}-x}{2+x}$ (E) $\frac{\sqrt{2x}-x}{2-x}$

E24) Simplifique:

$$\frac{1+\frac{1}{x}}{1-\frac{1}{x}}$$

(A) $\frac{2x+1}{x-2}$ (B) $\frac{1+x}{x-2}$ (C) $\frac{x^2+1}{x-1}$ (D) $\frac{x-1}{x+1}$ (E) $\frac{x+1}{x-1}$

E25) Qual é o valor de $\frac{1}{4+\frac{1}{4+\frac{1}{4+\ldots}}}$?

Scanned by CamScanner

(A) 1
(B) não pode ser determinado
(C) –4
(D) 0
(E) $-2+\sqrt{5}$

E26) Efetue e simplifique $\dfrac{1}{x+1}-\dfrac{1}{x-1}$

(A) $\dfrac{1}{x^2-1}$ (B) $\dfrac{-2}{x^2-1}$ (C) $\dfrac{1}{x-1}$ (D) $\dfrac{-2}{x^2-2x+1}$ (E) $\dfrac{-2x}{x^2-1}$

E27) Efetue e Simplifique

$$\frac{a+b}{ab}\left(a^2+b^2-c^2\right)+\frac{b+c}{bc}\left(b^2+c^2-a^2\right)+\frac{a+c}{ac}\left(a^2+c^2-b^2\right)$$

E28) Outra forma de escrever $\left(a^{-1}+b^{-1}\right)^{-1}$ é:

(A) $\dfrac{a+b}{ab}$ (B) $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}$ (C) $\dfrac{ab}{a+b}$ (D) $a+b$ (E) ab

E29) Efetue a simplifique $\dfrac{11x+3}{9x^2-64}-\dfrac{2x-21}{9x^2-64}$

(A) $\dfrac{1}{x+8}$ (B) $\dfrac{1}{x-8}$ (C) $\dfrac{3}{3x+8}$ (D) $\dfrac{3}{3x-8}$

E30) Efetue e simplifique $\dfrac{x^2+2x-15}{x^2+3x-18}\div\dfrac{x^2-3x-40}{x^2+14x+48}$

(A) $\dfrac{x+8}{x-8}$ (B) –1 (C) x – 1 (D) $\dfrac{x-8}{x+8}$

E31) Simplifique $\dfrac{\dfrac{x}{1-\dfrac{x}{2+2x}}-2x}{\dfrac{2x}{5x-2}-3}$

(A) $\dfrac{(2+x)(5x-2)}{2x(13x-6)}$ (B) $\dfrac{(x^2+2x-4)(5x-2)}{2(-13x+6)}$ (C) $\dfrac{2x(5x-2)}{(2+x)(13x-6)}$

(D) $\dfrac{(2x-4)(5x-2)}{2(-13x+6)}$ (E) $\dfrac{(2x-4)(5x-2)}{(2+x)(13x-6)}$

Scanned by CamScanner

E32) Simplifique $(2x^2 - 7x - 4)^{-1}(2x^2 + 7x + 3)(x^2 + 3x - 28)(x^2 - 9)^{-1}$

(A) $\frac{x+3}{x+4}$ (B) $\frac{x+7}{x-3}$ (C) $\frac{2x+1}{x-4}$ (D) 1 (E) $\frac{x+4}{x+3}$ (F) Nenhuma das acima

E33) Simplifique

$$\frac{xy-y^2}{xy-x^2}-\frac{x^2-y^2}{xy}$$

(A) x/y (B) -x/y (C) -y/x (D) y/x (E) $\frac{xy-x^2}{xy}$ (F) NDA

E34) Simplifique $\frac{2x^2-5x+3}{3x^2+x-4}\times\left(\frac{2x^2+3x-9}{3x^2+13x+12}\right)^{-\frac{1}{2}}$, considerando os fatores dentro dos radicais como positivos.

(A) $\sqrt{\frac{2x-3}{3x+4}}$ (B) $\sqrt{\frac{3x+4}{2x-3}}$ (C) $\sqrt{\frac{2x+3}{3x-4}}$ (D) $\sqrt{\frac{3x-4}{2x+3}}$ (E) $\sqrt{\frac{x-1}{x+3}}$

E35) Simplifique a expressão racional: $\frac{2x^2-16x+32}{x-4}$

(A) 2x - 8 (B) $x^2 + 1$ (C) x - 4 (D) x + 4 (E) Sem solução

E36) Simplifique $\frac{x^2+11x+28}{x^2+13x+42}\times\frac{x^2+6x}{x^2+7x+12}$

(A) $\frac{x}{x+3}$ (B) $\frac{x}{x^2+13x+42}$ (C) $\frac{1}{x+3}$ (D) $\frac{x^2+6x}{x+3}$ (E) $\frac{3x}{x+3}$

E37) Efetue e simplifique $\frac{2}{(x-2)(x-3)}-\frac{1}{(x-3)(x+1)}$

(A) $\frac{1}{(x+1)(x-2)(x-3)}$ (B) $\frac{x+4}{(x+1)(x-2)(x-3)}$

(C) $\frac{x}{(x-2)(x-3)}$ (D) $\frac{4}{(x+1)(x-2)}$ (E) $x+2$

E38) Simplifique $\frac{\frac{3}{x}+\frac{1}{2}}{1-\frac{5}{x}}$

(A) $\frac{3}{10}$ (B) $\frac{3x+2}{5x-1}$ (C) $\frac{2x+3}{5x-2}$ (D) $\frac{x+6}{2x-10}$ (E) $\frac{3x+1}{2x-1}$

Scanned by CamScanner

E39) Efetue e simplifique $\frac{2}{x+2}-\frac{x}{x-2}$

(A) $\frac{-x^2+2x}{x^2-4}$ (B) $\frac{-x^2-4}{x^2-4}$ (C) $\frac{2-x}{4}$ (D) $\frac{2-x}{2x}$ (E) $\frac{x^2-8}{x^2-4}$

E40) Simplifique a expressão $\frac{x^2-9}{x^2-4x-12}\div\frac{x^2-5x+6}{x^2-4}$

(A) $\frac{(x+3)(x-3)^2}{(x-6)(x+2)^2}$ (B) $\frac{x-6}{x+3}$ (C) $(x+3)(x-6)$ (D) $\frac{x+3}{x-6}$ (E) Não existe

E41) Calcule $\frac{2x}{x+3}-\frac{x}{3x+4}$

(A) $\frac{5x^2+6x+5}{(x+3)(3x+4)}$ (B) $\frac{6x^2+6x-6}{(x+3)(3x+4)}$ (C) $\frac{5x^2+5x}{(x+3)(3x+4)}$

(D) $\frac{3x^2+6x+6}{(x+3)(3x+4)}$ (E) $\frac{x}{-2x-1}$

E42) Simplifique $\frac{x^2-1}{x^2-5x+4}\times\frac{x^2-3x+2}{x^2-4}$

(A) $\frac{x+1}{3x+1}$ (B) $\frac{x^2+5x+6}{3}$ (C) $\frac{(x+1)(x-1)}{(x-4)(x+2)}$ (D) $\frac{x+2}{3x+2}$ (E) $\frac{(x+1)^2(x-4)}{(x^2-4)}$

E43) Simplifique $\frac{1-\frac{1}{x}}{x-1}$

(A) $\frac{1}{x-1}$ (B) $\frac{1}{x}$ (C) x (D) $x-1$ (E) 1

E44) Simplifique a expressão $\frac{9+\frac{3}{x}}{\frac{x}{4}+\frac{1}{12}}$

(A) $\frac{x}{36}$ (B) 1 (C) 36 (D) $\frac{36}{x}$ (E) $\frac{12}{x}$

Scanned by CamScanner

E45) Simplificar à expressão mínima

$$\frac{x^3-64}{4x^2-4} \div \frac{x-4}{3x^2+2x-5}$$

(A) x (B) $\dfrac{(x^2+16)(3x^2+2x-5)}{(4x^2-4)}$

(C) $\dfrac{(3x+5)(x^2+4x+16)}{4(x+1)}$ (D) $\dfrac{(x^2+4x+16)(3x-5)}{4(x-1)}$

(E) $\dfrac{(x^2+4x+16)(x-4)^2}{4(x-1)(x+1)(3x^2+2x-5)}$

E46) Calcule $\dfrac{1}{1-\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{x}}}$

(A) 2 (B) 1/2 (C) $\dfrac{1}{1+x}$ (D) $\dfrac{x+1}{x}$ (E) x+1

E47) A equação $\dfrac{1}{f}=\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}$ é usada no projeto de lentes para material fotográfico. Exprimir o valor de f em função de a e b.

(A) $f=a+b$ (B) $f=\dfrac{a+b}{ab}$ (C) $ab=fa+fb$ (D) $f=\dfrac{ab}{a+b}$ (E) $f=ab$

E48) Simplifique $\dfrac{\dfrac{k^3-yk^2-y^2k+y^3}{k^2-yk-nk+ny}}{\dfrac{2yk+3nk+2y^2+3ny}{2yk-3n^2+3nk-2ny}}$

(A) –1 (B) 1 (C) y + k (D) y – k (E) k – y

E49) Encontre as afirmativas verdadeiras

I. $\sqrt{x^2+y^2}=x+y$

II. $(-8)^{1/3}$ é um número real

III. Um fator de $(x^4-y^4)+(-2x^3y+2xy^3)$ é $(x+y)$

IV. Dado que $|x| > 5$ significa que x é qualquer número maior que 5

(A) Todas corretas (B) I e IV (C) I, II e IV (D) II, III e IV (E) II e III

E50) Calcule e simplifique $\dfrac{1}{x+1}-\dfrac{1}{x-1}$

(A) $\dfrac{1}{x^2-1}$ (B) $\dfrac{-2}{x^2-1}$ (C) $\dfrac{1}{x-1}$ (D) $\dfrac{-2}{x^2-2x+1}$ (E) $\dfrac{-2x}{x^2-1}$

Scanned by CamScanner

E51) Simplificar $\frac{x^2-x-2}{x+1}$

(A) x + 2 (B) x – 2 (C) x – 1 (D) x + 1 (E) Sem solução

E52) Efetue e simplifique $\frac{x^2-4x-5}{x^2-x-6}.\frac{x^2+2x-15}{x^2-25}$

(A) $\frac{x+1}{x-3}$ (B) $\frac{x-3}{x-5}$ (C) $\frac{x+1}{x+2}$ (D) $\frac{x+1}{x+5}$ (E) $\frac{x-3}{x+2}$

E53) Se x é positivo, qual dos seguintes valores é menor que a unidade?

(A) $\frac{1}{x}$ (B) x^2 (C) $\frac{x}{x+1}$ (D) $\frac{1+x}{x}$ (E) $\frac{1-x}{x}$

E54) Dividindo $\frac{x^2-5x+6}{x+2}$ por $\frac{2x-6}{x^2+4}$, o quociente é:

(A) $\frac{x^2-4}{2}$ (B) $\frac{x^3-2x^2+4x-8}{2x+4}$ (C) $\frac{-(x^2+4)}{2}$ (D) $\frac{(x^3+2x^2+4x+8)}{(2x+4)}$ (E) NRA

E55) Para quais valores de x a expressão $\frac{x-9}{x^2-x-6}$ é indefinida?

(A) –3 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 9

E56) Para quais valores de x a expressão $\frac{x-2}{x^2+3x+2}$ é indefinida?

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) –2

E57) Dividindo $a^{-1} - 1$ por $a - a^{-1}$, onde a não é 0 nem 1, o quociente será:

CONTINUA NO VOLUME 2: 64 QUESTÕES DE CONCURSOS

Exemplo:

E58) EPCAr 2009 - Considere os valores reais de ***a*** e ***b***, a≠b, na expressão

$$p=\frac{(a+b)(2a)^{-1}+a(b-a)^{-1}}{(a^2+b^2)(ab^2-ba^2)^{-1}}$$

Após simplificar a expressão ***p*** e torná-la irredutível, pode-se dizer que $\sqrt{p^{-1}}$ está definida para todo:

(A) $a \in R$ e $b \in R^*$ (B) $a \in R$ e $b \in R_+^*$ (C) $a \in R^*$ e $b \in R^*$

(D) $a \in R^*$ e $b \in R_+^*$

Respostas dos exercícios

E1) a) $\frac{2xy^2}{5z}$ e) $\frac{16z^3}{3w^2xy^2}$ l) $\frac{77z}{42a^4x^4y^2}$ m) $\frac{2bc}{3a}$

Scanned by CamScanner

b) $\frac{5a^4b^2}{24c}$

c) $\frac{n^4}{14p^3q^2}$

d) $\frac{8a^4}{5c^4}$

f) $\frac{1}{a^3bc^2}$

g) $\frac{15}{28xy^2}$

h) $\frac{9b^2c^5}{4a^3}$

j) $\frac{5p^3}{9m^3nq^3}$

k) $\frac{25a^2y^2}{16b^3xz^2}$

l) $\frac{7t^2}{5rs}$

n) $4xy^2z^3$

o) $\frac{1}{15a^2b^4c^2}$

E2) a) $\frac{(x+3)^2(x-3)^3(x+5)}{(y+3)^4}$

b) $\frac{(x+2)}{5x^3y(x+1)}$

c) $\frac{a(a-b)}{b(a+b)}$

d) $\frac{xy(x-1)^2(y+1)}{(x+y)}$

e) $\frac{(a+3)}{(a+2)}$

f) $\frac{(y-3)}{x(x+2)}$

g) $\frac{(x-2)}{(x+2)}$

h) $\frac{x+3}{(x+5)}$

i) $\frac{(a+b)}{(a-b)(a-1)}$

j) $-\frac{1}{(x+1)(y-1)}$

k) $\frac{5(x-1)}{3(x+1)}$

l) $-\frac{1}{3xy^3}$

m) $\frac{(x+2)^2(x-3)}{(x+1)(x-2)(x+3)}$

n) $(x^8+1)(x^4+1)(x^2+1)$

o) $\frac{(x+y)^2}{x^2-xy+y^2}$

E3) a) $\frac{x+4}{5x}$

b) $\frac{x-1}{x+3}$

c) $\frac{x-2}{x-5}$

d) $\frac{x+2}{x+3}$

e) $\frac{x+5}{2x+1}$

f) $\frac{a-2b}{a+2b}$

g) $x+y$

h) $\frac{a+b+c}{a-b+c}$

i) $\frac{x+4}{x+3}$

j) $\frac{-3}{y+4}$

k) $\frac{x-2}{2x+3}$

l) $\frac{2x+3y}{3x+5y}$

m) $\frac{x-y-z}{x+y-z}$

n) $\frac{a}{a-b-1}$

o) $\frac{12xy^2}{(z-1)}$

E4) a) $-6x^4$

b) $x+10$

c) $\frac{7}{x+7}$

d) $\frac{x-5}{4}$

e) $\frac{5abc}{2}$

f) $\frac{z}{z-1}$

g) $\frac{x+y}{a-b}$

h) $\frac{x-5}{x+4}$

i) $\frac{x+10}{x-1}$

j) $\frac{a+1}{a^3(a-3)}$

k) $\frac{y+5}{y+1}$

l) $\frac{x+7}{x(x-1)}$

m) $\frac{4x}{x+6}$

n) $\frac{x-7}{x-1}$

o) $\frac{3x-8}{2x-7}$

E5) a) $x-2$

b) $\frac{x+2}{x-7}$

d) $\frac{3}{5x}$

e) $\frac{1}{1-x^2}$

g) $\frac{1}{2a-3x}$

h) $\frac{x+y+z}{x-y-z}$

j) $\frac{(a+b)(b-c)}{a}$

Scanned by CamScanner

c) $\frac{x-2}{2(4x-5)}$

f) 1

i) 1

E6) a) $\frac{2b^2c^2}{a^2}$

b) $\frac{9my^2}{20x^2p^2}$

c) $6y^2$

d) $2xy^2$

e) $\frac{9w^2yz}{10x}$

f) $(x-2)(x-5)$

g) $\frac{15(x-2)}{4}$

h) $\frac{25}{x}$

i) $\frac{x}{x+3}$

j) $3(x+2)$

k) $\frac{5m^2}{7(m+4)}$

l) $\frac{5x(x-2)}{3}$

m) $\frac{x+5}{x-4}$

n) $\frac{x+3}{x^2}$

o) $\frac{x+4}{x+8}$

E7) a) $\frac{9x^2w}{2y^2z^2}$

b) $\frac{x+2}{x-6}$

c) $\frac{x+3}{x+8}$

d) $\frac{(x+5)(x+3)}{8}$

e) $\frac{1}{x+4}$

f) $\frac{x+1}{x^2-9}$

g) $\frac{x+2}{x-1}$

h) $\frac{x-8}{(x+2)(x+8)}$

i) $\frac{8}{a(a+4)}$

j) $\frac{x-2}{x-4}$

E8) a) $\frac{x-3}{(x+3)(x+4)}$

b) $-\frac{(x+3)(x+5)}{8}$

c) $\frac{x+2}{x-1}$

d) $\frac{x}{x+3}$

e) $-\frac{15(x-2)}{4x}$

f) $\frac{5-x}{x+4}$

g) $-\frac{x-2}{2(4x+5)}$

h) $-\frac{3}{5x}$

i) $2-x$

j) $\frac{8-3x}{2x-7}$

k) $(2-x)(x-5)$

l) $\frac{x+3}{x+4}$

m) $\frac{x+5}{x+4}$

n) $\frac{z}{1-z}$

o) $\frac{x-y-z}{z-y-x}$

E9) a) $\frac{27}{2x^3}$

b) $\frac{9xw}{2y^2z^2}$

c) $\frac{5cb^4}{3a^3}$

d) 18

e) $\frac{20m^2y^2}{81xp^2}$

f) $\frac{(x+2)^2}{4}$

g) 20

h) $\frac{1}{3(x+5)}$

i) $\frac{2x}{x-3}$

j) $\frac{3(x+4)}{2(x-3)}$

k) $\frac{3(x-2)(x+3)}{(x+1)(x+7)}$

l) $\frac{3(x+4)}{4(2x-9)}$

m) $\frac{3(x-4)}{4x(x+3)}$

n) $\frac{(x+1)(x+3)}{3x}$

o) $\frac{(x-3)(x+4)}{(x-6)(x+3)}$

E10) a) $\frac{x+8}{x-2}$

b) $\frac{7x}{x-5}$

c) $a+b$

e) $\frac{2+3x}{x+7}$

f) $\frac{3x^2+3}{(x-1)^2(x+1)}$

g) $\frac{9x-11}{2x-7}$

i) $\frac{x^2+2x-3}{(x+2)^2}$

j) $\frac{-4x^2+7x+6}{4(x-1)(x+2)}$

k) $\frac{2x^3+6x^2-3x}{(2x+3)^2(2x-3)}$

m) $\frac{-x^2-3x+8}{x^2-16}$

n) $\frac{x^2+5x-4}{x^2+3x-10}$

o) $-\frac{2}{x^2-1}$

Scanned by CamScanner

d) $\frac{2+3x}{2-3x}$ h) $\frac{5x+5}{4x}$ l) $\frac{-2x+12}{(x+2)^2(x-2)}$

E11) a) $\frac{4x^2}{a^2-x^2}$ b) $\frac{x+6}{2(x-2)}$ c) $\frac{2x+12}{x+3}$ d) $\frac{ax-1}{ax-a}$ e) y f) $\frac{1}{a-2}$ g) x h) $\frac{4a^2}{a^2-b^2}$ i) $\frac{4x^2}{x^2+y^2}$ j) a

E12) a) $\frac{3x+2y}{x-2}$ b) $\frac{5a+2b}{4a+3b}$ c) $\frac{x-7}{a+b+c}$ d) $\frac{x(x+1)}{x-5}$ e) $\frac{a+1}{a+5}$ f) 1 g) $\frac{x(x+y)}{(x+1)}$ h) $\frac{b}{a-b}$ i) abc j) $\frac{(x+1)(x+2y)}{(x+2)(x+y)}$

E13) a) 1 b) $\frac{1}{x-y}$ c) $\frac{a+b}{a-b}$ d) $4(3a+8)$ e) $\frac{x+y}{y-x}$ f) x g) $\frac{x+2}{x-1}$ h) $\frac{x^2(x-3)}{(x-2)}$ i) $a-1$ j) $\frac{4a}{a-x}$

E14) a) $\frac{1}{2a-3x}$ b) $\frac{ax}{(a+b)^2}$ c) $\frac{(b-c)(a+b)}{a}$ d) $\frac{x+y+z}{x-y-z}$ e) $\frac{a+b}{2a}$ f) $\frac{1}{1-x^2}$ g) $\frac{x(14x+17)}{9x^2-4}$ h) $\frac{x-y+2}{x^2-y^2}$ i) $\frac{4b}{a-b}$ j) $\frac{ab}{b^2-a^2}$

E15) a) $\frac{2a^2}{(a^2-b^2)^2}$ b) $\frac{-2a^2}{(x^2-a^2)(x+a)}$ c) $\frac{2x^2}{x^3+y^3}$ d) $\frac{a^3+ab^2+b^3}{(a+b)^3}$ e) $\frac{a^2(a-b)}{x}$ f) $\frac{3(a-y)}{10}$ g) $\frac{1}{2(a^2+b^2)}$ h) $\frac{a^2+3}{a-3}$ i) $x+y$ j) 1

E16) a) 0 b) $2x-x^3$ c) $\frac{4x-6}{(x-2)^2}$ d) $\frac{2x-1}{x+2}$ e) $\frac{x^2+1}{(1-x)(x^2-1)}$ f) $\frac{x^2+x}{x^2+x+6}$ g) $\frac{3x+2}{2x+1}$ h) $\frac{4xy}{x^2-y^2}$ i) $\frac{x-2}{x-6}$ j) $\frac{3x-2y}{5x+z}$ k) $\frac{6}{5}$ l) $\frac{1}{x}$ m) $\frac{1}{b-a}$ n) $\frac{2a+2x}{a-1}$ o) $a-b$

Scanned by CamScanner

E17) a) $2x^2 + 5x - 7$

b) $a^2 + c^2 + 3ab$ (fatorar e simplificar)

c) $16a^4 - 8a^3b + 4a^2b^2 - 2ab^3 + b^4$

d) $(a^4 + 4x^4)(a^2 + 2x^2)$

e) $3a^3 - 5a^2b + 2ab^2$

f) $(a^3 + y^3)(a + y)$

g) $a^{m-1} + a^{m-2}b + a^{m-3}b^2 + \ldots + ab^{m-2} + b^{m-1}$

h) $\dfrac{1}{x^2 + y^2}$

i) $\dfrac{4a^2}{a^2 - b^2}$

j) $\dfrac{a^2 + ax + x^2}{a + x}$

E18) a) $\dfrac{a^3 + ab^2 + b^3}{(a+b)^3}$

b) $\dfrac{(3x+5)(x^2+4x+16)}{4(x+1)}$

c) $\dfrac{x+8}{x-8}$

d) $\dfrac{x+3}{x-6}$

e) $2x^k$

f) $\dfrac{3x+2}{x(x^2-1)}$

g) $\dfrac{4a-1}{(a-1)(4a^2-1)}$

h) $\dfrac{(a+b)^2}{(a-b)}$

i) $\dfrac{85a-20b}{84}$

j) $\dfrac{b(7a-3c)}{5a+a^4b^2c-4}$

E19) a) $\dfrac{x}{2df}$

b) $\dfrac{3a+5b}{3c-1}$

c) $\dfrac{2x-3c-d}{x^2+x+1}$

d) $\dfrac{x+2y}{x+y-z}$

e) $\dfrac{x-2}{(x+1)(x-4)}$

f) $\dfrac{a+y}{a^2-y}$

g) $x-1$

h) $\dfrac{x+y+z}{x-y-z}$

i) $\dfrac{a^2b^2+abcx+c^2x^2}{ab-cx}$

j) $\dfrac{x+4}{(x-3)(x-2)(x+1)}$

E20) a) $\dfrac{x^2-1}{x^2-2x-8}$

b) $\dfrac{1}{4-x^2}$

c) $\dfrac{a^2-4b^2+acd}{bcd}$

d) $\dfrac{1}{6^{n^2}}$

e) $\dfrac{4(x^2+ab)^2}{(a^2-x^2)(b^2-x^2)}$

f) $\dfrac{x+5}{1-x^2}$

g) $\dfrac{x^2+2ax-a^2}{x^2+a^2}$

h) $\dfrac{x+3}{x-6}$

i) $\dfrac{-2x(x+10a)}{(a+x)(a-2x)^2}$

j) $x-y$

E21) (B) E22) (B) E26) (A) E24) (E) E25) (E)

E(25) Sugestão: Fazer k = 1(4 + k) (por quê?) e resolver a equação do 2º grau, lembrando que k tem que ser positivo.

E26) (B) E27) 2(a+b+c) E28) (C) E29) (D) E30) (A)

E31) (C) E32) (B) E33) (B) E34) (A) E35) (A)

Scanned by CamScanner

E36) (A) E37) (B) E38) (D) E39) (B) E40) (D)

E41) (C) E42) (C) E43) (B) E44) (D) E45) (C)

E46) (E) E47) (D) E48) (E) E49) (E) E50) (B)

E51) (B) E52) (C) E53) (C) E54) (B) E55) (C)

E56) (E) E57) $-\frac{1}{a+1}$ E58) (D)

Scanned by CamScanner

Capítulo 8

Equações do primeiro grau

Facilidade ou dificuldade?

Problemas que envolvem equações são fáceis, de execução quase mecânica. A dificuldade que alguns alunos enfrentam não é por causa das equações, mas pela falta de base em expressões numéricas, expressões algébricas, fatoração, produtos notáveis e outros tópicos anteriormente estudados. Treinado esses tópicos com uma quantidade generosa de exercícios, a resolução de equações torna-se uma tarefa de rotina.

Igualdades

O sinal "=" é usado com diferentes significados dentro da matemática. Por exemplo, considere as duas sentenças matemáticas:

1) $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$

2) $x + 3 = 5$

No caso 1 temos uma expressão chamada *identidade*. Nesta identidade temos duas variáveis, x e y. As variáveis em uma expressão matemática podem a princípio, assumir qualquer valor numérico. A segunda igualdade possui uma variável x, que a princípio também pode assumir qualquer valor. A diferença é que a primeira é verdadeira para qualquer valor de suas variáveis. Trata-se de uma forma conhecida (produto notável, quadrado da soma), que é sempre verdadeira, quaisquer que sejam os valores das suas variáveis.

A segunda expressão tem também uma variável que pode assumir qualquer valor, entretanto só é verdadeira para $x = 2$. Igualdades que somente são corretas para determinados valores são chamadas de *equações*. Resolver uma equação significa determinar os valores das variáveis que tornam a expressão verdadeira.

A expressão (1) é uma identidade, que é verdadeira para quaisquer valores de suas variáveis. A expressão (2) é uma equação, que só é verdadeira para $x = 2$. Chamamos o conjunto $S=\{2\}$ de conjunto solução da equação. Resolver uma equação nada mais é que encontrar o seu conjunto solução. As letras a serem encontradas em uma equação (nesse exemplo, x) são chamadas de ***incógnitas***.

Existem vários tipos de equação, por exemplo:

1) $2^x = 8$

Scanned by CamScanner

A incógnita nesse caso aparece na forma de um expoente. Encontrar a solução significa encontrar o valor de x que faz com que 2 elevado a este valor de x, dê como resultado, 8. É fácil verificar que a solução é x=3. Dizemos que esta é uma ***equação exponencial***.

2) $\sqrt{x-5}=9$

Nesta equação a incógnita x aparece em um radical. Trata-se de uma ***equação irracional***. Esta em particular é de solução simples. Se a raiz quadrada de x – 5 é 9, então x – 5 vale 81. Portanto, x vale 86. Equações irracionais podem ser bem mais complicadas, e são muito exigidas em concursos. São estudadas no capítulo 15.

3) $(x + 5)(x – 3) = 0$

Esta é chamada de ***equação do segundo grau***, assunto importantíssimo da matemática do ensino fundamental, e exigido em praticamente todos os concursos deste nível. Para resolver uma equação do segundo grau, manipulamos a expressão de tal forma que resulte em zero no segundo membro (o lado direito da igualdade). A seguir fatoramos em duas expressões do primeiro grau. O valor somente será zero se um ou outro fator for zero. Neste caso, as soluções são –5 e 3, ou seja, S={–5, 3}. Equações do segundo grau serão estudadas no capítulo 13.

4) $3x + 5 = 17$

Esta é uma ***equação do primeiro grau***, o objetivo deste capítulo. Pode ser expressa a partir de uma expressão algébrica do primeiro grau, com uma só variável, no caso, x. Em geral é fácil de resolver, até mesmo "de cabeça". Se 3x + 5 vale 17, então 3x vale 12, ou seja, x = 4. Uma vez conhecendo as equações do primeiro grau, estudamos os sistemas do primeiro grau (duas equações com duas incógnitas), as equações e sistemas de equações do segundo grau, depois as equações biquadradas (quarto grau), e equações irracionais. Finalmente serão estudadas as inequações de primeiro e segundo grau, e seus sistemas. O restante do livro se ocupará desses temas.

Equações de primeiro grau

Uma equação é uma sentença matemática composta de duas expressões separadas por um sinal "=". Por exemplo:

$2x + 5 = 13$

As duas expressões são chamadas de *primeiro membro* e *segundo membro*. Na equação acima, o primeiro membro é 2x+5, e o segundo membro é 13.

Os valores que são somados, multiplicados, subtraídos e divididos em uma equação são chamados de *termos*. No exemplo acima, 2x é um termo, 5 é um termo e 13 é um termo. Explicando de forma bem simples, os termos podem ser puramente numéricos (como 5 e 13 na equação acima) ou podem ter uma *parte literal*. O termo 2x tem uma parte literal, ou *variável*, que é x. 2x significa "duas vezes x", ou seja, 2.x. Da mesma forma, 3y significa "3 vezes y", e assim por diante.

No termo 2x, o x é chamado de *parte literal*, ou *variável*, e o 2, que está sendo multiplicado pela parte literal, é chamado de *coeficiente*. Esses nomes se aplicam a qualquer expressão algébrica, mas no caso de uma equação, a variável é chamada de ***incógnita***.

Uma expressão algébrica é uma expressão que envolve letras, ou seja, termos com partes literais. Por exemplo, 2x+3y+4z é uma expressão algébrica com três variáveis, x, y e z. Para resolver equações, precisamos ter a habilidade algébrica ensinada no capítulo 3 – Expressões

Scanned by CamScanner

algébricas. É claro, precisamos também dos demais conhecimentos de álgebra, apresentados nos capítulos de 4 em diante.

Quando igualamos duas expressões algébricas, temos uma equação.

Variáveis algébricas podem assumir qualquer valor, mas uma expressão somente será verdadeira (ou seja, satisfará a condição de que os dois membros são iguais) para os valores-solução da equação.

Por exemplo, na expressão algébrica 2x+5, x pode ter qualquer valor, mas quando fazemos 2x+5=13, a expressão só é verdadeira se x tiver o valor 4.

Expressão algébrica: 2x+5; x pode ter qualquer valor
Equação: 2x+5=13; é uma sentença matemática que só é verdadeira se x for igual a 4.

Na equação 2x+5=13, a letra x é chamada *incógnita* da equação. O objetivo da equação é descobrir o valor da incógnita, ou seja, descobrir o valor de x que torna a expressão verdadeira.

Exercícios

E1) Determine o valor de x para que as expressões abaixo sejam verdadeiras:

a) x+3=5
b) 2x=8
c) 3x+1 = 10
d) 5–x=3
e) 3x+5=65
f) 4x+7 = 27
g) 5x+2=52
h) 2x–3 = 7
i) 7x–9 = 54
j) 8x–3=45

Método de resolução

Resolver uma equação é encontrar o valor de x que torna a expressão verdadeira. Por exemplo, resolver a equação x+3=5 é encontrar qual valor de x torna a expressão x+3 igual à expressão 5. Esta é uma equação muito simples, que pode ser resolvida de cabeça:

x+3=5

Até mesmo nos primeiros anos do ensino fundamental surgem problemas do tipo "qual é o número que somado com 3 dá como resultado 5?". No caso, este número é 2. Dizemos que resolver a equação é encontrar x=2. Note que se x for igual a 2, as expressões do primeiro membro e do segundo membro são realmente iguais.

Por outro lado, a maioria das equações são mais complicadas e não podem ser resolvidas "de cabeça". Por exemplo:

$27 - 3x = 4x + 13$

Devemos então usar algumas técnicas para sua solução:

a) Uma igualdade não se altera quando somamos o mesmo valor aos seus dois membros.
Por exemplo, na nossa equação, vamos somar 3x a ambos os membros, ficando com:

$27 - 3x + \mathbf{3x} = 4x + 13 + \mathbf{3x}$

Scanned by CamScanner

Nosso objetivo em somar 3x nos dois membros foi eliminar o termo –3x que estava no primeiro membro, ficando com a incógnita x somente no segundo membro. Já que 3x – 3x vale 0, ficamos então com.

$27 = 4x + 13 + 3x$

Comparando a primeira forma ($27 - 3x = 4x + 13$) com a segunda ($27 = 4x + 13 + 3x$), vemos que esta operação é equivalente a passar o "3x" para o outro membro, com o sinal trocado. Podemos fazer isso em qualquer equação, ou seja, trocar um termo de "lado" com o seu sinal trocado, de + para – ou de – para +. Lembre-se que os dois lados da equação, separados pelo sinal "=", são chamados de 1º membro e 2º membro.

b) Uma igualdade não se altera quando invertemos as posições do primeiro e do segundo membro. É óbvio que se A=B, então B=A. Podemos então escrever nossa equação como:

$4x + 13 + 3x = 27$

c) Uma igualdade não se altera quando subtraimos o mesmo valor dos dois membros. No nosso exemplo, vamos subtrair 13 dos dois membros, ficando com:

$4x + 13 + 3x - 13 = 27 - 13$

Como 13 – 13 vale 0, e 27 – 13 vale 14, a equação fica:

$4x + 3x = 14$

d) Esta não é uma propriedade das equações, e sim, de qualquer termo algébrico. Quando temos dois termos com a mesma parte literal, podemos somar seus coeficientes e manter a sua parte literal. No nosso caso, 4x + 3x vale 7x. Isso é na verdade a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Nossa equação ficará então:

$7x = 14$

e) Uma igualdade não se altera quando dividimos os dois membros pelo mesmo valor. No nosso exemplo, vamos dividir os dois membros por 7. Se dividirmos 7x por 7, ficaremos com x, e se dividirmos 14 por 7, ficaremos com 2.

Resposta: $x = 2$

Podemos então resumir essas propriedades no seguinte procedimento:

1) Devemos realizar as operações necessárias para que a incógnita x fique sozinha no primeiro membro. Quando conseguirmos isso, o valor do segundo membro será a solução da equação.

2) Um termo que está somado ou subtraído em um membro pode passar para o outro membro, trocando o seu sinal, ou seja, se estava somando, troca de termo subtraindo. Se estava subtraindo, passa para o outro lado somando.

Exemplo:
$x - 5 = 12$
$x = 12 + 5$ (o 5 estava subtraído, passou para o outro lado somando)

Scanned by CamScanner

Exemplo:
$3x + 5 = 17$
$3x = 17 - 5$ (o 5 estava somando no primeiro membro, passou para o outro lado subtraindo)

3) Quando um número está multiplicando um termo inteiro, podemos passar para o outro lado, porém dividindo o segundo termo inteiro.

Exemplo:
$8x = 48$
$x = 48/8 = 6$ (o 8 estava multiplicando o primeiro membro, passou para o outro lado dividindo)

4) Quando um número está dividindo o primeiro membro inteiro, podemos passá-lo para o outro lado multiplicando o segundo membro

Exemplo:
$x/5 = 14$
$x = 14 \times 5 = 70$

Vejamos a resolução de algumas equações simples usando essas propriedades:

Exemplo:
$7x - 9 = 54$
$7x = 54 + 9$ (o 9 estava subtraindo, passou para o outro lado somando)
$7x = 63$
$x = 63 / 7$ (o 7 estava multiplicando, passou para o outro lado dividindo)
$x = 9$

Exemplo:
$8x - 3 = 45$
$8x = 45 + 3$ (o 3 estava subtraindo, passou para o outro lado somando)
$8x = 48$
$x = 48 / 8$ (o 8 estava multiplicando, passou para o outro lado dividindo)
$x = 6$

Exemplo:
$3x + 5 = 47 - 4x$
$3x + 4x = 47 - 5$ (4x e 5 trocam de lado, o 4x vai somando e o 5 vai subtraindo)
$7x = 42$ (3x + 4x vale 7x)
$x = 42/7 = 6$ (o 7 estava multiplicando, passa para o outro lado dividindo)

Exemplo: diga o que está errado na resolução abaixo
(1) $3x+3 = 15$
(2) $x +3 = 15/3$
(3) $x+3 = 5$
(4) $x = 5 - 3 = 2$

O erro está na passagem (2). O coeficiente 3 não pode passar para o segundo membro dividindo, pois a expressão 3x não está sozinha no primeiro membro, ainda existe o 3 que está somado com ele. O correto é passar o 3 para o segundo membro, ficando com:
$3x = 15 - 3 = 12$

Agora sim o 3 que está multiplicado pelo x pode passar para o segundo membro dividindo. Ficamos com:

Scanned by CamScanner

$x = 12 / 3 = 4$

Exemplo:
A incógnita de uma equação não precisa ser necessariamente x. Qualquer outra letra pode ser usada.

$2b - 5 = 4 - 3b$
$5b = 9$
$b = 9/5$

Como vemos, a solução de uma equação não precisa ser um número inteiro. Muitas vezes o resultado é uma fração, ou um número real qualquer.

Exemplo:

$$\frac{x-3}{2} = \frac{4-x}{3} + 2$$

Esta é uma equação que envolve frações. A primeira coisa a fazer é reduzir todas elas ao mesmo denominador. Os denominadores são 2, 3 e 1 (2 é o mesmo que 2/1). O MMC entre os denominadores é 6. Devemos então multiplicar a primeira fração, numerador e denominador, por 3, a segunda por 2 e a terceira por 6. Ficamos com:

$$\frac{3(x-3)}{6} = \frac{2(4-x)}{6} + \frac{12}{6}$$

Agora vem uma novidade: podemos simplesmente eliminar todos os denominadores. Isso é o mesmo que multiplicar todos os temos da equação por 6. Isso é uma propriedade das igualdades: uma igualdade não se altera quando multiplicamos os dois membros pelo mesmo valor. É claro então que se A/6 = B/6, então A=B. Ficamos então com:

$3(x - 3) = 2(4 - x) + 12$

Atenção: a eliminação de denominadores só pode ser feita nas equações. Se estivermos simplesmente calculando o valor de uma expressão, os denominadores têm que ser mantidos.

$3x - 9 = 8 - 2x + 12$
$5x = 8 + 12 + 9$
$5x = 29$
$x = 29/5$

Exemplo:
$1000x - 25000 = 4000x - 60000$

Vemos que todos os termos da equação podem ser divididos por 1000. A equação não se altera quando multiplicamos, ou dividimos todos os seus termos pelo mesmo valor. Ficamos então com:

$x - 25 = 4x - 60$
$60 - 25 = 4x - x$
$35 = 3x$
$x = 35/3$

Scanned by CamScanner

Exemplo:
$0{,}01x + 1{,}3 = 0{,}02x - 0{,}9$

Para não ficar com decimais, podemos multiplicar a equação inteira por 100. Ficamos com:

$x + 130 = 2x - 90$
$130 + 90 = 2x - x$
$x = 220$

Exercícios

E2) Resolva as seguintes equações:

a) $2x + 5 = 47 - 4x$
b) $3.(4 - 2x) = 45 - 17x$
c) $4y + 18 = 72 - 2y$
d) $30 - 4a = 2(a - 3)$
e) $2(x + 3) + 4(x - 2) = 5(x - 7) + 2(x + 3)$
f) $\frac{3-x}{5} + 1 = \frac{x-4}{2}$
g) $5(x + x/2) = 15$
h) $12 - x = (7/5).x$
i) $x = 4(5 - x)$
j) $x + 2x + 4x = 70$

E3) Resolver as equações

a) $2x + 6 = 14$
b) $3x + 8 = 23$
c) $3x + 7 = 1$
d) $4x + 2 = 10$
e) $4x + 7 = 11$
f) $5x + 18 = 13$
g) $2x + 13 = 3$
h) $45 + 2x = 21$
i) $7 + 2x = 7$
j) $3x + 18 = 3$
k) $2 - 2x = 12 + 3x$
l) $5x + 9 = 3x + 17$
m) $4x - 18 = 12 - 6x$
n) $4(x + 3) = 2(12 - x)$
o) $2x + 5 + 3x + 7 = 4x - 15$

E4) Resolver as equações

a) $3x + 15 = 45$
b) $6x - 13 = -25$
c) $5 - 2x = 7 - 6x$
d) $5x - 18 = 4(x - 3)$
e) $4x + 3(5 - 2x) = 5(x + 2)$
f) $4(3x - 2) + 5(7 - 2x) = 15$
g) $2(x + 1) + 3(x - 2) = 8x + 7$
h) $3a + 2 - 4(a + 3) = 3(5 - 3a)$
i) $4(1 - m) = 3 - 4(2 - 2m)$
j) $y/2 + y/3 - y/5 = 1/30$
k) $2(1 - 4x) + 3(2x - 7) + 4(x - 5) = 10$
l) $(x + 3) + (2x + 6) + (3x + 9) = 36$
m) $2(4 - 2x) + 3(5 - 7x) = 6(8 - 6x)$
n) $(4m - 3) + 2(m + 5) + 3(m - 7) = -70$
o) $(z + 5).3 + (z + 8).4 = 6z + 13$

E5) Resolver as equações

a) $\frac{x}{2} + \frac{1-x}{4} = \frac{x+1}{4}$
b) $\frac{a}{3} + \frac{a}{6} = 3$
c) $\frac{x-2}{4} = x - 8$
d) $\frac{1}{5} + \frac{x}{3} + = \frac{11}{2}$
e) $\frac{x-1}{2} = \frac{19-x}{4}$
f) $\frac{x+1}{2} + \frac{x+1}{3} = 20$
g) $\frac{1}{2} + 2x = x - 1/2$
h) $\frac{x-2}{319} = 0$
i) $\frac{415(x-3)}{777} = 0$
j) $\frac{x-1}{419^2 + 420^2} = 0$
k) $\frac{x-1}{2} + \frac{x-2}{3} + \frac{x-3}{4} = \frac{4}{3}$
l) $\frac{3x+5}{3} + \frac{2x-8}{5} = \frac{64}{15}$
m) $\frac{17-x}{4} + x = 5$
n) $\frac{x}{3} + \frac{x}{2} = x - 4$
o) $\frac{3x+20}{5} = x + 6$

Scanned by CamScanner

E6) Resolver as equações

a) $x-\frac{x}{3}=10$

b) $x-\frac{3x}{2}-\frac{1}{5}=-\frac{6}{5}$

c) $2x-4.\frac{x-2}{3}=-1$

d) $\frac{2x-\frac{1}{3}}{3}=\frac{1}{5}$

e) $x-3.\left(4-\frac{3x}{2}\right)=-3$

f) $\frac{3x+5}{2}-\frac{2x-9}{3}=8$

g) $\frac{x+1}{3}-\frac{3(4-x)}{4}=1$

h) $1+\frac{x}{5}=1-\frac{x}{4}$

i) $\frac{x}{4}-\frac{2x-1}{3}=\frac{x+1}{6}$

j) $\frac{x+1}{2}-\frac{x-1}{4}=\frac{3}{4}$

k) $\frac{x+3}{2}+\frac{x+4}{3}+\frac{x+5}{4}=1$

l) $\frac{7x-\frac{1}{3}}{9x-\frac{3}{4}}=\frac{8}{5}$

m) $\frac{\frac{x}{2}-(x-1)}{\frac{1}{2}-x}=\frac{2}{3}$

n) $1+\frac{2x-5}{4}-\frac{3-x}{2}=1+x-\frac{11}{4}$

o) $\frac{2x-4}{5}-\frac{37}{6}=\frac{20-x}{4}-\frac{x+\frac{1}{2}}{3}$

E7) Resolver as equações

a) $\frac{3x-16}{x}=\frac{5}{3}$

b) $\frac{x}{2}+\frac{3x}{4}-\frac{5x}{6}=15$

c) $\frac{x}{2}+\frac{x}{3}+\frac{x}{4}+\frac{x}{5}=x-17$

d) $\frac{10x+3}{3}-\frac{3x-1}{5}=x-2$

e) $\frac{5x-7}{3}-\frac{2x+7}{3}=3x-14$

f) $\frac{7}{24}-\frac{\frac{13}{15}}{\frac{2x}{3}+\frac{4}{5}}=\frac{1}{4}$

g) $\frac{3x-7}{4x+2}=\frac{3x-14}{4x-13}$

h) $\frac{1}{2x-3}-\frac{3}{2x^2-3x}=\frac{5}{x}$

i) $\frac{7x+16}{21}-\frac{x+8}{4x+10}=\frac{23}{70}+\frac{x}{3}$

j) $\frac{5}{6}\left(x-\frac{1}{3}\right)+\frac{7}{6}\left(\frac{x}{5}-\frac{1}{7}\right)=4\frac{8}{9}$

Discussão de uma equação do primeiro grau

Algumas equações do primeiro grau podem ser impossíveis, ou seja, nenhum valor de x a satisfaz. Dizemos que seu conjunto solução é vazio, ou seja, S = {}.

Por exemplo:

0x = 5

Qualquer valor de x a ser substituído na expressão, resultará em zero no primeiro membro, ficando então com

0 = 5

Mas zero não pode ser igual a 5, portanto este é um resultado impossível.

Scanned by CamScanner

Uma equação impossível pode parecer inicialmente com uma equação normal, mas realizando os cálculos, "o x desaparece", ficando com apenas um número não nulo, que obviamente não pode ser igual a zero, o que torna a equação impossível.

Exemplo: $5x - 3 = 8 + 5x$
Isolando o x no primeiro membro, ficamos com:

$5x - 3 = 8 + 5x$
$5x - 5x = 8 + 3$
$0x = 11$ ➔ impossível

Existe também o extremo oposto, que é a equação indeterminada. Enquanto na equação impossível nenhum valor de x satisfaz, na equação indeterminada qualquer valor satisfaz. Por exemplo:

$2(x + 3) = 2x + 6$

Obviamente $2x + 6$ é o dobro de $x + 3$, para qualquer x. De fato, ao resolvermos a equação, ficamos com:

$2(x + 3) = 2x + 6$
$2x + 6 = 2x + 6$
$2x - 2x = 6 - 6$
$0x = 0$, ou seja, $0=0$

De fato $0=0$ é uma afirmação sempre verdadeira, não importa qual seja o valor de x. Sendo assim, o conjunto-solução é o próprio conjunto dos números reais:

$S = R$

Dizemos que esta é uma ***equação indeterminada***, ou seja, o valor de x não pode ser determinado.

De um modo geral, ao resolvermos uma equação do primeiro grau, chegamos a uma expressão do tipo:

$ax = b$, onde a e b são números.

A equação poderá recair em três situações:

$a \neq 0$	: determinada, a solução é $x=b/a$
$a=0$ e $b \neq 0$	: equação impossível, ou seja, $S=\{\}$ (conjunto vazio)
$a=0$ e $b=0$	: equação indeterminada, ou seja, $S=R$

Basta lembrar dos exemplos:

$2x = 6$	: determinada, $x = 6/2 = 3$
$0x = 6$	: impossível
$0x = 0$	: indeterminada

As equações do primeiro grau são muito fáceis, a sua resolução não é mais pedida em concursos mais difíceis, porém questões que envolvem sua discussão são quase sempre

Scanned by CamScanner

pedidas. Isto significa que saber resolver a equação é obrigatório. Sem saber resolver, o aluno também não saberá discuti-la.

Exemplo:
Calcule o valor do parâmetro k para que a equação em x

$$kx - x + 1 = 0$$

seja impossível.

Observe que a expressão possui duas variáveis algébricas, k e x. Quando se diz que uma delas é um parâmetro, significa que deve funcionar como um valor fixo, apesar de desconhecido. A outra variável, no caso x, é a incógnita da equação. Obviamente o valor de x dependerá de k. Eventualmente para um determinado valor de k a equação em x poderá ser impossível. Portanto deveremos considerar x como incógnita e k como um número. Para encontrar o valor exato de x, será preciso inicialmente ser informado o valor de k. Uma vez informado k, x poderá ser calculado.

Calculemos portanto o valor de x, considerando k como um número dado.

$$kx - x + 1 = 0$$
$$x(k - 1) = -1$$

Lembrando que uma equação do primeiro grau, na forma ax = b, para que seja impossível deve satisfazer:

$$a = 0$$
$$b \neq 0$$

No nosso caso temos

$$a = k - 1$$
$$b = -1$$

A segunda condição é satisfeita sempre, basta que o valor de b seja diferente de zero, e -1 é diferente de zero. Resta então satisfazer a primeira condição, ou seja, o coeficiente de x deve ser zero:

$$k - 1 = 0$$
$$k = 1$$

Então, k deve ser igual a 1 para que a equação seja impossível. De fato, se fizermos k = 1 a equação ficará:

$$1.x - x + 1 = 0$$
$$x - x = -1$$
$$0x = -1$$

Com k = 1, a equação reduz-se a 0 = 1, o que obviamente é impossível.

Resposta: k = 1

Scanned by CamScanner

x=0 é solução determinada

Na equação ax = b apresentamos as situações quer nos levam a uma solução indeterminada e a uma solução impossível:

ax = b

Indeterminada: a = 0 e b = 0
Impossível a = 0 e b ≠ 0

Note que a solução possível exige apenas a≠0. Uma vez que ***a*** seja diferente de zero, ***b*** pode ter qualquer valor, seja ele zero ou não:

Exemplo:
5x = 0

Nesse caso, o valor de x é perfeitamente determinado: x = 0 / 5 = 0
A solução x=0/5 é tão determinada quanto x = 3/5. O que importa é que ***a***, o coeficiente de x, seja diferente de zero.

Exemplo:
Determine os valores de m de tal forma que a equação abaixo tenha solução:
2mx + 7 = 4x

A solução de uma equação do primeiro grau **ax = b** pode recair em três situações:

a) Possível e determinada (uma solução), ocorre quando a≠0
b) Possível e indeterminada (infinitas soluções), ocorre quando a=0 e b=0
c) Impossível (nenhuma solução), ocorre quando a=0 e b≠0.

Sendo assim, a condição dada pelo problema, de que a equação tenha solução, é atendida pelos casos (a) e (b), ou seja, a equação pode ser determinada ou indeterminada. O único caso que não atende ao que o problema pede é o da solução impossível.

A equação do exemplo reduz-se a:
2mx + 7 = 4x
2mx – 4x = 7
x(2m – 4) = 7

Note que a opção da equação indeterminada (infinitas soluções) não ocorre, já que b vale 7. Resta-nos como única solução para o que o problema pede, é ter uma equação determinada, ou seja, a≠0. Portanto 2m – 4 não pode ser zero, ou seja, m não pode ser igual a 2.

Resposta: m≠2.

Exemplo:
Determine os valores de ***a*** e ***b*** de tal forma que x=1,072 e x=1,024 sejam raízes da equação
ax + 4 = b + 3x

A equação em x é do primeiro grau. Uma equação do primeiro grau pode ter 3 tipos de solução:

a) nenhuma solução = quando a equação é ***impossível***

Scanned by CamScanner

b) uma solução = quando a equação é ***determinada***
c) infinitas soluções = quando a equação é ***indeterminada***

Se o problema cita duas soluções, então a equação só pode ter infinitas soluções (opção (c) acima). Basta então calcular **a** e **b** de tal forma que a equação seja indeterminada.

$ax + 4 = b + 3x$
$ax - 3x = b - 4$
$x(a - 3) = b - 4$

Para que a equação seja indeterminada basta que o coeficiente de x e o termo independente de x sejam iguais a zero:

$a - 3 = 0 \rightarrow a = 3$
$b - 4 = 0 \rightarrow b = 4$

Resposta: a=3 e b=4.

Exercícios

E8) Indique se cada uma das equações abaixo é determinada, indeterminada ou impossível. No caso de determinada, apresente a solução.

a) $3x + 18 = 2x + 2 + x + 9$
b) $3x + 12 - x - 4 = 2x + 8$
c) $4x + 18 = 2.(2x + 12)$
d) $4x - 18 = 12 - 2x$
e) $5x + 3 = 5(x - 1) + 8$
f) $0.(x + 3) = 0.(x + 5)$
g) $1.(x + 3) = 1.(x + 5)$
h) $x/2 + x/3 + x/5 - x/30 = x$
i) $2(x + 1) + 3(x - 2) = 6x - 4$
j) $3(x + 5) = 3x + 15$
k) $(x + 3) + (2x + 6) + (3x + 9) = 72$
l) $4(x + 3) = 4x + 12 + 1$
m)) $4(1 - m) = 12 - 4(2 - 2m)$
n) $2k + 3 + 2(k - 1) = 4k + 1$
o) $6(y + 2) - 4 = 6y + 8$

E9) Qual deve ser a relação entre a e b de tal forma que a equação em x $3x + 2a - \frac{2x + b}{3} = a + 20$ admita a raiz x = 2 ?

E10) Quantas raízes tem a equação em x $(a^2 - 1)x = a + 1$, quando a = –1 ?

E11) Quantas raízes tem a equação em x $(m - 1)x = m^2 + 1$ quando m = 1?

E12) Determine ***a*** de tal forma que a equação (a – 1)x = b seja determinada.

E13) Calcule o valor de k que torne impossível a equação em y:
$\mathbf{k^2y - k^2 = 2k + ky}$

E14) Determine o valor de ***a*** de tal forma que x=5 seja solução da equação
$ax + 3 = 12$

E15) Determine m de tal forma que x = 2 seja solução da equação em x:
$\mathbf{mx + 5 = 7 - 2x}$

E16) Dada a equação em x $\mathbf{k^2x = k + 1 + x}$, qual é o valor do parâmetro k que a torna impossível?

E17) Qual condição para que a equação em x abaixo seja determinada?
$\mathbf{(x - b)^2 - (x - a)^2 = a^2 - b^2}$

Scanned by CamScanner

E18) Resolver a equação

$$\frac{x-1}{4}-\frac{1}{8}\left(\frac{x-5}{4}-\frac{14-2x}{5}\right)=\frac{x-9}{2}-\frac{7}{8}$$

Equações equivalentes

Certos problemas podem solicitar para que seja calculada uma condição de modo que duas equações sejam *equivalentes*. O problema não apresenta dificuldade, apenas é uma questão de nomenclatura, mas de fato quem não conhece a nomenclatura não consegue resolver o problema.

Dizemos que duas equações são *equivalentes* quando suas soluções são idênticas.

Exemplo: São equivalentes as duas equações:

$x + 5 = 8$, e
$2x - 4 = 2$

Já que ambas têm como única solução, $x = 3$.

É claro que não basta encontrar uma solução comum, é preciso que tais soluções sejam em mesmo número. Por exemplo, as equações $\mathbf{2x = 6}$ e $\mathbf{(x - 1)(x - 3) = 0}$ não são equivalentes, pois apesar de terem uma solução comum ($x = 3$), a segunda equação tem também a solução $x = 1$, que não é solução da primeira.

Inequação

Uma inequação é uma sentença matemática, na qual os dois membros não estão relacionados por uma igualdade, mas sim, por uma *desigualdade*. Exemplos:

$x + 5 \neq 3$
$4x + 3 > 18$
$2x + 2 < 15 - 3x$
$x^2 \geq 4x + 7$
$x - a \leq 4(x + b)$

Este livro traz capítulos dedicados às inequações (capítulos 12 e 17), mas por hora, precisamos utilizar o tipo mais simples de inequação, que é aquele que tem o sinal de diferente ($\neq$).

Exemplo:
Determine os valores de m de tal forma que a equação em x tenha uma única solução:
$4mx = 6 - 8x$

Inicialmente devemos reduzir a equação à forma $\mathbf{ax = b}$:
$4mx = 6 - 8x$
$4mx + 8x = 6$
$(4m + 8)x = 6$

Para que a equação tenha uma única solução (possível e determinada) basta que tenhamos $a \neq 0$, ou seja,

$4m + 8 \neq 0$

Scanned by CamScanner

Trata-se de uma inequação em m. Para resolver este tipo de inequação, com sinal de diferente (≠), operamos exatamente como na resolução de uma equação, porém mantendo o sinal "≠" ao invés de "=".

$4m + 8 \neq 0$
$4m \neq -8$
$m \neq -8/4$
$m \neq -2$

Para que a equação seja determinada é necessário que $m \neq -2$

Resposta: $m \neq -2$

Exercícios

E19) Resolva as seguintes inequações

a) $4x + 2 \neq 10$

b) $5x + 18 \neq 13$

c) $5x + 9 \neq 3x + 17$

d) $4(x + 3) \neq 2(12 - x)$

e) $4(1 - m) \neq 3 - 4(2 - 2m)$

f) Determine p e q para que a equação abaixo seja possível
$(5p - 1)x + q - 3 = 0$

g) Determine m e p para que a equação seja possível
$4y(3m - 1) - 10m = 5p$

h) Determine c para que a equação em x tenha uma única solução
$(2c + 5)^2y = (2c + 5)(2c - 5)$

i) Resolver a inequação
$(3x + 1)/2 \neq (2x - 1)/(3 - 1)$

j) Resolver a inequação

$$1 + \frac{x}{5} \neq 1 - \frac{x}{4}$$

Equação fracionária

Equações fracionárias são aquelas que possuem incógnita no denominador. Ao resolver essas equações é preciso aplicar uma restrição: os denominadores precisam ser diferentes de zero. Isto recai em inequações, e devem ser eliminadas da solução, aquelas raízes que anulariam os denominadores. Isto se chama "excluir as restrições".

Outra providência é usar a "eliminação de denominadores", que consiste em reduzir todas as frações ao mesmo denominador, e a seguir trocar todos os denominadores por 1, ou seja, eliminar os denominadores.

Exemplo:
Resolva a equação

$$\frac{x-2}{x-1} + \frac{1}{x-2} = \frac{3}{2}$$

Note que existem incógnitas no denominador, portanto trata-se de uma equação fracionária.

Inicialmente verificamos as restrições aos denominadores, ou seja, os denominadores têm que ser diferentes de zero:

$x - 1 \neq 0 \rightarrow x \neq 1$
$x - 2 \neq 0 \rightarrow x \neq 2$

Scanned by CamScanner

Portanto, $x \neq 1$ e $x \neq 2$. Isto significa que depois de encontrada a solução, teremos que eliminar soluções que eventualmente recaiam nesta restrição.

Equações fracionárias nem sempre recaem em equações do primeiro grau, podem recair em equações mais complicadas.

O próximo passo é reduzir todas as frações ao mesmo denominador. Isto equivale a operar com frações algébricas. Temos que determinar o MMC entre os denominadores para reduzir todas as frações a este denominador comum:

Denominadores: $(x - 1)$, $(x - 2)$ e 2

MMC = $2(x - 1)(x - 2)$

Sendo assim, os denominadores deverão ser multiplicados, respectivamente, por $2(x - 2)$, $2(x - 1)$ e $(x - 1)(x - 2)$:

$$\frac{x-2}{x-1\diagup 2(x-2)}+\frac{1}{x-2\diagup 2(x-1)}=\frac{3}{2\diagup (x-1)(x-2)}$$

Agora todas as frações estarão com o mesmo denominador, e os numeradores estão recalculados, já que foram multiplicados pelos valores que completavam os denominadores iguais:

$$\frac{2(x-2)(x-2)}{2(x-1)(x-2)}+\frac{2(x-1)}{2(x-1)(x-2)}=\frac{3(x-1)(x-2)}{2(x-1)(x-2)}$$

Agora será feita uma operação que só pode ser realizada em equações ou inequações que usam o sinal "≠": a eliminação de denominadores. O conceito básico envolvido é que:

se $\frac{x}{a}=\frac{y}{a}$, então x = y, ou seja, o denominador pode ser eliminado.

No caso ficaremos com:

$$2(x-2)(x-2)+2(x-1)=3(x-1)(x-2)$$

Uma vez que os denominadores foram eliminados, fica mais fácil prosseguir com a resolução da equação. Desenvolvendo os produtos, teremos:

$$2(x^2-4x+4)+2(x-1)=3(x^2-3x+2)$$
$$2x^2-8x+8+2x-2=3x^2-9x+6$$

$$-x^2+3x=0$$

Observe que esta não é uma equação do primeiro grau, entretanto podemos resolvê-la através de fatoração. Fatorando a equação (que na verdade é do segundo grau), temos:

$$x(-x+3)=0$$

Scanned by CamScanner

Para que um produto de dois fatores seja igual a zero, basta que um dos fatores seja zero, ou seja:

$x = 0$ ou
$-x + 3 = 0$

Então a solução é $x=0$ ou $x=-3$.

Temos que a seguir aplicar a restrição, ou seja, eliminar os valores que anulam os denominadores. Verificamos previamente que esta restrição resulta em $x\neq1$ e $x\neq2$, portanto permanecem válidas as soluções $x=0$ e $x=-3$.

Resposta: $S = \{0, -3\}$

Observe que uma equação fracionária pode recair em alguns casos, em uma equação que não seja do primeiro grau, como ocorreu nesse caso.

Exemplo:

$$\frac{a+b}{x}+\frac{a-b}{x}+\frac{2a}{a-b}=\frac{4a}{x}$$

O fato de existirem denominadores não é suficiente para caracterizar uma equação fracionária. Equações fracionárias são aquelas que possuem incógnita no denominador. Convenciona-se usar x, y ou z, caso não seja indicada qual letra é a incógnita. Neste exemplo temos a letra x no denominador, portanto trata-se de uma equação fracionária. A restrição no caso é $x\neq0$. Observe ainda que temos um temo (a – b) no denominador. Devemos então prestar atenção em qualquer passagem que resulte em a=b. Tal passagem ou resultado não será válido, pois anularia este denominador.

Antes de reduzir as frações ao mesmo denominador, observamos que é possível antes fazer uma simplificação. As duas primeiras frações somadas (podem ser diretamente somadas pois possuem o mesmo denominador, x) resultam em 2a/x, já que b será cancelado. A expressão fica reduzida a:

$$\frac{2a}{x}+\frac{2a}{a-b}=\frac{4a}{x}$$

Considerando que o parâmetro ***a*** seja diferente de zero, podemos dividir a expressão toda por ***2a***, ficando com:

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{a-b}=\frac{2}{x}$$

Agora com a expressão mais simples, vamos reduzir as frações ao mesmo denominador. O MMC é x(a – b):

$$\frac{1}{x/(a-b)}+\frac{1}{(a-b)/x}=\frac{2}{x/a-b}$$

Scanned by CamScanner

$$\frac{a-b}{x(a-b)}+\frac{x}{x(a-b)}=\frac{2(a-b)}{x(a-b)}$$

Eliminando os denominadores:

$$a-b+x=2(a-b)$$

$$x=a-b$$

Deve ser usada a restrição $x\neq 0$, ou seja, devemos ter $a\neq b$.

Exercícios

E20) Resolva as equações

a) $\frac{5}{x}+\frac{2}{x}=\frac{1}{3}$

b) $\frac{x-1}{x-4}=\frac{x-4}{x-6}$

c) $\frac{1}{x-1}-\frac{2}{x-2}=\frac{1}{3-x}$

d) $\frac{3x+5}{x^2-1}=\frac{2}{x-1}-\frac{1}{x+1}$

e) $\frac{\frac{x}{2}-(x-1)}{\frac{1}{2}-x}=\frac{2}{3}$

f) $\frac{1-x}{1+x}+\frac{1+x}{x-1}+\frac{1}{1-x^2}=0$

g) $\frac{2x}{x-1}-\frac{5-x^2}{x^2-1}=\frac{3x}{x+1}$

h) $\frac{a}{b}\left(1-\frac{a}{x}\right)+\frac{b}{a}\left(1-\frac{b}{x}\right)=1$

i) $\frac{1}{2}+\frac{x}{4-2x}+\frac{2}{x^2-2x}=0$

j) $\frac{2x-1}{x-3}-\frac{x+1}{x+3}=1$

Equação modular

Sabemos que o módulo de um número real nada mais é que este número sem o seu sinal. Por exemplo, $|-5| = 5$, e $|3| = 3$, $|0| = 0$. Do ponto de vista algébrico, pode ser um pouco mais complicado, pois podemos ter que decidir como tratar um módulo, sem saber se o número no seu interior é positivo ou negativo.

Exemplo: Resolver
$|x - 5| = 3$

Se o módulo de uma expressão vale 3, então essa expressão pode ser 3 ou pode ser –3. Temos então que abrir em dois casos:

Caso A)
$x - 5 = 3$
$x = 3 + 5$
$x = 8.$

A outra solução é quando a expressão no interior do módulo vale –3:

Scanned by CamScanner

Caso B)

$x - 5 = -3$

$x = 5 - 3$

$x = 2$

A rigor, uma equação com módulo não é uma equação do primeiro grau, já que precisa deste tratamento especial, de abrir em dois casos. Entretanto, uma vez tratado o módulo, a equação modular pode recair em uma ou mais equações do 1º grau. A rigor também, as equações com módulo são matéria do ensino médio, mas aparecerão algumas ao longo deste livro.

Exercícios de revisão

E21) Resolver as equações

a) $4x + 6 = x + 9$
b) $3x + 4 = x + 10$
c) $3x = 2x + 5$
d) $3x = x + 8$
e) $3x + 10 = x + 20$
f) $8x + 7 = 4x + 27$
g) $3(x - 2) = 2(x - 3)$
h) $7x - 19 = 5x + 7$
i) $5(x - 2) = 3x + 4$
j) $3(x - 2) = 2(x - 1)$
k) $2x + 3 = 16 - (2x - 3)$
l) $3(x - 2) = 50 - (2x - 9)$
m) $2x - 22 = 108 - 2x$
n) $7x - 70 = 5x - 20$
o) $19x - 3 = 2(x + 7)$

E22) Resolver as equações

a) $8x - (x + 2) = 47$
b) $4(1 + x) + 3(2 + x) = 17$
c) $33x - 70 = 3x + 20$
d) $2(3x - 25) = 10$
e) $2(x + 5) + 5(x - 4) = 32$
f) $(x^2 - 9) - (x^2 - 16) + x = 10$
g) $x^2 - 2x - 3 = x^2 - 3x + 1$
h) $4 - 5x - (1 - 8x) = 63 - x$
i) $5(2 - x) + 7x - 12 = x + 3$
j) $2x - (3 + 4x - 3x + 5) = 4$
k) $3x - (x + 10) - (x - 3) = 14 - x$
l) $3(x - 2) + 2(x - 3) + x - 4 = 3x + 5$
m) $x + 1 + x + 2 + x + 4 = 3x + 5$
n) $(2x - 5) - (x - 4) + (x - 3) = x - 4$
o) $x^2 + 8x - (x^2 - x - 2) = 5(x + 3) + 3$

E23) Resolver as equações

a) $x^2 + x - 2 + x^2 + 2x - 3 = 2x^2 - 7x - 1$
b) $10x - (x - 5) = 2x + 47$
c) $7x - 5 - (6 - 8x) + 2 = 3x - 7 + 106$
d) $6x + 3 - (3x + 2) = (2x - 1) + 9$
e) $3(x + 10) + 4(x + 20) + 5x - 170 = 15 - 3x$
f) $20 - x + 4(x - 1) - (x - 2) = 30$
g) $5x + 3 - (2x - 2) + (1 - x) = 6.(9 - x)$
h) $(2x - a) + (x - 2a) = 3a$
i) $(x + a + b) + (x + a - b) = 2b$
j) $(x + 1) + (x + 2) + (x + 3) + (x + 4) = 50$

E24) Resolver as equações

a) $\frac{1}{x+7} = \frac{2}{x+1} - \frac{1}{x+3}$
b) $\frac{4x}{x+1} - \frac{x}{x-2} = 3$
c) $\frac{3x-1}{11} - \frac{2-x}{10} = \frac{6}{5}$
d) $\frac{4}{x^2-1} + \frac{1}{x-1} = \frac{1}{x+1}$
e) $\frac{2}{3}(x+1) - \frac{1}{7}(x+5) = 1$
f) $\frac{60-x}{14} - \frac{3x-5}{7} = \frac{3x}{4}$
g) $\frac{x-1}{8} - \frac{x+1}{18} = 1$
h) $\frac{3x-116}{4} + \frac{180-5x}{6} = 0$
i) $\frac{1}{x+4} + \frac{2}{x+6} - \frac{3}{x+5} = 0$
j) $\frac{5x+3}{x-1} + \frac{2x-3}{2x-1} = 6$
k) $\frac{2x+1}{4} - \frac{4x-1}{10} + \frac{3}{4} = 0$
l) $\frac{3x-4}{2} - \frac{3x-1}{16} = \frac{6x-5}{8}$
m) $\frac{6x-19}{2} = \frac{2x-11}{3}$
n) $\frac{(2x-1)(2-x)}{2} + x^2 = \frac{1+3x}{2}$
o) $\frac{x-1}{5} - \frac{43-5x}{6} - \frac{3x-1}{8} = 0$

E25) Resolver as equações

a) $27 + 3x = 9x - 27$
b) $9x + 15 - 3x = 100 - 12x - 31$
f) $3x + 45 - 17x + 8 = 7x - 13 - 54x$
g) $28x - 21 + 42 - 28x = 22 - 4x$

Scanned by CamScanner

c) 13x – 54 + 12x – 36 + 7x = 18x + 50
d) 15x + 18 – 8x – 9 + 7x – 23 = 0
e) 21x – 42 + 5x – 15 = 11 – 68 + 4x
h) 3(x – 7) = 2(x + 1) – 16
i) 8(x – 13) – 19 = 2(x + 3) – 93
j) 18(x – 7) – 14 = 5(3x + 8) + 12x + 5

E26) Resolver as equações
a) 13x – 8(2x – 1) + 7 = 17x + 5(2 – x) – 14x – 4
b) 12x + 5(3x – 2) + 13 = 8x – 6(3 – 2x) + 11x + 1
c) 3m – 5(m + 1)= 2(7 – m) + 5m – 4(m + 6) – 17
d) 2p + 5 – 4(1 – p) = 8(p + 10) – 64
e) 137 – 8(18 – 7x/9) = 5(x + 3)
f) 3x – 2x/3 = 6x – 22
g) x/2 – x/7 + x/5 = 78
h) 13x – 8x/9 + 7x/2 = 15x + 22
i) (x + 5)(x + 3) = (x – 1)(x + 12)
j) x – 2x/3 – 8 + 4x/5 = 3 + 17x/15

OBS.: (e): Muitas vezes a redução para o mesmo denominador resulta em muitos cálculos. Nada impede que mudemos a ordem de execução das operações, visando reduzir os cálculos, desde que sejam obedecidas as propriedades matemáticas. Na questão (e), o caminho com menos cálculos consiste em manter a fração 7x/9, que se transforma em 56x/9, sem alterar os denominadores, e fazer todos os cálculos com os termos inteiros, para só no final tratar a questão do denominador.

E27) Resolver as equações
a) $(a-x)(b+x)=a^2-x^2$
b) $(x-a)^2-(x-b)^2=2ab-2b^2$
c) $\frac{ax}{b}-\frac{bx}{a}=\frac{1}{b}-\frac{1}{a}$
d) $\frac{x+a}{b}-\frac{x-b}{a}=\frac{2b}{a}$
e) $\frac{ax+b}{b}-\frac{bx-a}{a}=\frac{a}{b}+\frac{b}{a}$
f) $\frac{\frac{x+b}{x-b}}{1-\frac{x-2b}{x-b}}=\frac{3x-5b}{b}$
g) $(x-a)(x-b)-b(a-b)=x^2+\frac{ab^2}{a+b}$
h) $\frac{a}{b}\left(1-\frac{a}{x}\right)+\frac{b}{a}\left(1-\frac{b}{x}\right)=1$
i) $\frac{x}{b}=\frac{h-x}{h}$
j) $a^2-\frac{a^3-b^3}{a-b}=-\frac{ab(a+b)}{x}$

E28) Resolver a equação
$$\frac{5}{x}-\frac{4}{x+2}=\frac{1}{5}+\frac{1}{5x}$$

E29) Resolver a equação em b
$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{1}{c}$$

E30) Calcule **b**
$$A=\frac{1}{2}bh-1$$

(A) $\frac{h+1}{2A}$ (B) $\frac{A+1}{2h}$ (C) $\frac{2h}{A+1}$ (D) $\frac{2A+2}{h}$ (E) $\frac{h}{2A}$

Scanned by CamScanner

E31) Resolva a equação

$$\frac{5}{2x-3}=\frac{3}{x+5}$$

(A) x=16 (B) x=33/2 (C) x=61/3 (D) x=34 (E) Impossível

E32) Calcule ***a*** em $\frac{a+3b}{3c-a}-\frac{27bc}{9c^2-a^2}=\frac{a-3b}{3c+a}$, sendo a, b e c positivos.

(A) $\frac{3bc}{2b+2c}$ (B) $\sqrt{\frac{bc}{b+c}}$ (C) 0 (D) $\frac{bc}{b+c}$ (E) bc

E33) Seja $\frac{-3x+a}{-4x+1}=1$. Encontre o valor de ***a*** que torna a equação indefinida.

(A) −1/4 (B) −5/4 (C) −1 (D) 3/4 (E) −1/4

E34) Dado que $A=b\frac{d}{c}+e$, resolva para ***d***.

(A) $d=cA-be$ (B) $d=cA-ce-b$ (C) $d=\frac{cA-ce}{b}$

(D) $d=\frac{cA-e}{b}$ (E) $d=bcA-bce$

E35) Calcule x em $9^{2-x}=27^{x+2}$.

E36) Calcule x: $\frac{18}{x-2}=\frac{12}{x+2}$

(A) 2 (B) −2 (C) −10 (D) 10

E37) Calcule x: $\frac{x+1}{x^2-4}+\frac{x-1}{x^2+x-2}=\frac{3}{x+2}$

(A) 1 (B) Impossível (C) 5 ou 1 (D) 5

E38) Calcule r na equação $A=y\left(\frac{1}{r}-\frac{mnB}{y}\right)$

(A) $\frac{y}{A-mnB}$ (B) $\frac{A+mnB}{y}$ (C) $\frac{1}{y(A+mnB)}$ (D) $\frac{y}{A+mnB}$ (E) $\frac{1}{Ay+mnB}$

E39) Calcule x em 3[−3x + 4 −7(x + 1)] = 2x + 5

(A) x=9/16 (B) x=−7/16 (C) x=−14/4 (D) x=−9/16 (E) x=−38/3

Scanned by CamScanner

E40) Resolva a equação $-2x + 3(-2x - 6) = -7 - 9x$

(A) 35/17 (B) –1 (C) 11 (D) –35 (E) 2

E41) Resolver a equação $4x - 2(1 + x) = 3(2x + 1) - 5$

(A) –2 (B) 0 (C) 1 (D) 2 (E) 4

E42) Resolva a equação em x: $x-3\left(2-\frac{4}{5}x\right)=\frac{1}{2}x$

(A) x = 60/29 (B) x = –60/19 (C) x = –12/7 (D) x = –6/29 (E) Sem solução

E43) Calcule x em: $a=\frac{x-1}{2x+3}$

(A) $x=1+3a+2ax$ (B) $x=\frac{1+3a}{1-2a}$ (C) $x=\frac{1+3a}{2a-1}$

(D) $x=\frac{1+3a}{2ax}$ (E) $x=\frac{-1-3a}{1-2a}$

E44) Suponha que x e y são números reais positivos e que:

xy = 1/9
x(y+1) = 7/9
y(x + 1) 5/18

Qual é o valor de (x+1)(y+1)?

E45) Resolver

$\frac{x}{4}-\frac{2x-1}{3}=\frac{x+1}{6}$

E46) Resolver $\frac{x+3}{2}+\frac{x+4}{3}+\frac{x+5}{4}=16$

E47) Resolver $\frac{4}{x+3}-\frac{2}{x+1}=\frac{5}{2x+6}-\frac{2\frac{1}{2}}{2x+2}$

E48) Resolver $\frac{7x-\frac{1}{3}}{9x-\frac{3}{4}}=\frac{8}{5}$

E49) Resolver $\frac{\frac{x}{2}-(x-1)}{\frac{1}{2}-x}=\frac{2}{3}$

E50) Qual o valor de a que torna impossível a equação:
$a^2y - a^2 = 2a + 2ay$?

Scanned by CamScanner

E51) Para que as equações $(m-2)x-(m-1)=0$ e $2x-4=0$ sejam equivalentes devemos ter:

(A) m = 2 (B) m = 3 (C) m = 4 (D) m = 5 (E) m = 3/2

E52) Escrevendo-se o algarismo 5 à direita de um certo número, ele fica aumentado de 248 unidades. Qual é este número?

E53) Qual equação abaixo é equivalente a $4(2-5x)=6x+3(1+x)$?

(A) 29x = 5 (B) 8x = 17 (C) 7x = 5 (D) 14x = 17 (E) 23x = 5

E54) Quantas soluções tem a equação $|5+3x|+2=1$?

E55) Resolver $|8x+4|+3=11$

(A) {–3, 1} (B) {–1/2, 3/2} (C) {–3/2, 1/2} (D) {1/2} (E) Sem solução

E56) Resolver $\frac{x}{x-1}=3+\frac{1}{x-1}$

(A) 2 (B) –1 (C) 1 (D) –2 (E) NRA

E57) Resolver a equação $\frac{2}{x-1}+\frac{1}{x+1}=\frac{-2}{x^2-1}$

E58) Resolver a equação $\frac{x+1}{6}-\frac{x-2}{5}+\frac{x+3}{10}=4$

(A) x=17 (B) x=63 (C) x=28 (D) x=52 (E) x=47

E59) Resolver para x a equação $a^2x+4=b^2-4x$

E60) Resolver $\frac{2}{x-3}-\frac{3}{x+3}=\frac{12}{x^2-9}$

E61) Calcule a sabendo que $\frac{1}{1-x^2}=\frac{a}{1-x}+\frac{a}{1+x}$

E62) Resolver $\frac{2}{x-2}=\frac{3}{x+2}+\frac{x}{x^2-4}$

E63) Resolver $\frac{3}{x-7}-\frac{2}{x+7}=\frac{x+35}{x^2-49}$

E64) Resolver $\frac{8}{x^2-4}-\frac{1}{x-2}=\frac{3}{x+2}$

E65) Resolver $-\frac{3}{x+3}=\frac{7}{x^2-9}+\frac{5}{3-x}$

E66) Resolver $\frac{2x}{x+3}=\frac{4x-1}{2x-3}$

Scanned by CamScanner

E67) Resolver $\frac{2x}{4x-3}=\frac{x+2}{2x+3}$

E68) Resolver $\frac{3}{x-3}-\frac{1}{x+3}=\frac{18}{x^2-9}$

E69) Resolver $\frac{1}{x+2}+\frac{2}{x-3}=\frac{3}{x^2-x-6}$

E70) Resolver $\frac{2x}{2x+3}=\frac{4x^2+1}{4x^2+4x-3}$

E71) Encontre x em $3^x+3^{x-1}=36$

E72) Se a=2 e b=3, então o número c, tal que 1/c = 1/a + 1/b é:

(A) 2/3 (B) 4/3 (C) 3/4 (D) 5/6 (E) 6/5

E73) Se $(2+3)^2 - x = 12$, então x vale:

(A) –2 (B) –1 (C) 1 (D) 9 (E) 13

E74) Ache sete números inteiros consecutivos tais que a soma dos primeiros quatro seja igual à soma dos últimos três.

E75) O valor de x que é solução da equação (x/3) – 1/4 = 2(x – 1) pertence ao intervalo:

(A) $0 < x \leq 1$ (B) $1 < x \leq 2$ (C) $3 < x \leq 3$ (D) $3 < x \leq 4$

E76) O valor de x que torna verdadeira a igualdade $2x - [(x+2)/7] = (2/3) - x$ é:

(A) 2/15 (B) 1/7 (C) 1/5 (D) 1/3

E77) Sendo $S = \{x \in R \mid 1/(x+1) + 1/(x-1) = 0\}$,

(A) S não possui elementos
(B) S possui um único elemento
(C) S possui dois elementos
(D) S possui mais de dois elementos

E78) O valor de x que é solução, nos números reais, da equação (1/2) + (1/3) + (1/4) = x/48 é igual a:

(A) 36 (B) 44 (C) 52 (D) 60 (E) 68

E79) A raiz da equação $\frac{x-3}{7}=\frac{x-1}{4}$ é

(A) –3/5 (B) 3/5 (C) –5/3 (D) 5/3

E80) Se $\frac{x+3}{4}-5=x+1$, então

(A) x = 6 (B) x = 8 (C) x = –7 (D) x = –9

Scanned by CamScanner

E81) Se $\frac{2x}{5}+\frac{15x-1}{20}=\frac{1}{3}$, então o valor de **3x + 1** é:

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

E82) 3/5 de um número, somados a 1/2 é igual a 2/3 desse mesmo número. Indique a opção que apresenta esse número:

(A) 0 (B) 1 (C) 20/33 (D) 33/20 (E) 15/2

E83) Qual é o valor de ***x*** na expressão $1+\frac{1}{1+\frac{1}{1+x}}=\frac{1}{2}$?

(A) –3/4 (B) –2/3 (C) –1/2 (D) –3/2 (E) –4/3

E84) Qual é o valor de ***x*** que torna a expressão $\frac{0{,}25-0{,}4+0{,}75x}{0{,}2}=0{,}5$ verdadeira?

(A) 0,25 (B) –0,15 (C) 0 (D) –0,5 (E) –0,25

E85) Numa fração, o denominador é 4 unidades maior que o numerador. Se 24 é adicionado ao numerador, a fração resultante será igual ao inverso da fração original. A fração é:

(A) 5/1 (B) –7/2 (C) –1/5 (D) 7/2 (E) 1/5

CONTINUA NO VOLUME 2: 39 QUESTÕES DE CONCURSOS

Exemplo:
E86) CN 2005 - Em quantos meses, no mínimo, um capital aplicado segundo a taxa simples de 0,7% ao mês produz um montante que supera o dobro do seu valor?

(A) 140 (B) 141 (C) 142 (D) 143 (E) 144

Respostas dos exercícios

E1)	a) x = 2	c) x = 3	e) x = 20	g) x = 10	i) x = 9
	b) x = 4	d) x = 2	f) x = 5	h) x = 5	j) x = 6
E2)	a) x = 7	c) y = 9	e) x = 27	g) x = 2	i) x = 5
	b) x = 3	d) a = 6	f) x = 36/7	h) x = 5	j) x = 10
E3)	a) x = 4	d) x = 4	g) x = –5	j) x = –5	m) x = 3
	b) x = 5	e) x = 1	h) x = –12	k) x = –2	n) x = 2
	c) x = –2	f) x = –1	i) x = 0	l) x = 4	o) x = –27
E4)	a) x = 10	d) x = 6	g) x = –11/3	j) y = 1/19	m) x = 25/11
	b) x = –2	e) x = 5/7	h) a = 25/8	k) x = 49/2	n) m = –56/9
	c) x = 1/2	f) x = –6	i) m = 3/4	l) x = 3	o) z = –34
E5)	a) Indeterminado	d) x = 159/10	g) x = –1	j) x = 1	m) x = 1
	b) a = 6	e) x = 7	h) x = 2	k) x = 3	n) x = 24
	c) x = 10	f) x = 23	i) x = 3	l) x = 3	o) x = –5

Scanned by CamScanner

E6) a) x = 15 b) x = 1/2 c) x = –5/2 d) x = 14/30 e) x = 18/11 f) x = 3 g) x = 44/13 h) x = 0 i) x = 2/7 j) x = 0 k) x = –37/13 l) x = 13/111 m) x = –4 n) Indeterminado o) x = 12

E7) a) x = 12 b) x = 36 c) x = –60 d) x = –24/13 e) x = 14/3 f) x = 30 g) x = 119/17 h) x = 4/3 i) x = 5 j) x = 5

E8) a) Impossível b) Indeterminada c) Impossível d) x = 5 e) Indeterminada f) Indeterminada g) Impossível h) Indeterminada i) x = 0 j) Indeterminada k) x = 9 l) Impossível m) m = 0 n) Indeterminada o) Indeterminada

E9) 3a – b = 46 **E10)** Infinitas **E11)** Nenhuma **E12)** $a \neq 1$ **E13)** k = 1

E14) a = 9/5 **E15)** m = –1 **E16)** k = 1 **E17)** $a \neq b$ **E18)** x = 17

E19) a) $x \neq 2$ b) $x \neq -1$ c) $x \neq 4$ d) $x \neq 2$ e) $m \neq 3/4$ f) $p \neq 1/5$, q qualquer (indeterminado também é possível) g) $m \neq 1/3$, p qualquer h) $c \neq -5/2$ e $c \neq 5/2$ i) $x \neq -2$ j) $x \neq 0$

E20) a) x = 21 b) x = 10 c) Impossível d) x = –1 e) x = –4 f) x = 1/4 g) Impossível* h) x = a + b i) Impossível* j) x = –9/7

OBS.: Nas letras (g) e (i), as soluções encontradas devem ser descartadas porque anulam denominadores.

E21) a) x = 1 b) x = 3 c) x = 5 d) x = 4 e) x = 5 f) x = 5 g) x = 0 h) x = 6 i) x = 7 j) x = 4 k) x = 4 l) x = 13 m) x = 65/2 n) x = 25 o) x = 1

E22) a) x = 7 b) x = 1 c) x = 3 d) x = 10 e) x = 6 f) x = 3 g) x = 4 h) x = 15 i) x = 5 j) x = 12 k) x = 21/2 l) x = 7 m) Impossível n) x = 0 o) x = 4

E23) a) x = 2/5 b) x = 6 c) x = 9 d) x = 7 e) x = 5 f) x = 6 g) x = 6 h) x = 2a i) x = b – a j) x = 10

E24) a) x = –4 b) x = 1 c) x = 4 d) Impossível e) x = 2 f) x = 4 g) x = 17 h) x = 12 i) x = –2 j) x = 3/7 k) x = –11 l) x = 7/3 m) x = 5/2 n) x = 3/2 o) x = 11

E25) a) x = 9 b) x = 3 c) x = 10 d) x = 1 e) x = 0 f) x = –2 g) x = 1/4 h) x = 7 i) x = 6 j) x = –185/9

E26) a) x = 9 b) x = 5 c) m = 22 d) p = –15/2 e) x = 18 f) x = 6 g) x = 140 h) x = 36 i) x = 27/7 j) Impossível

E27) a) x = a ou a = b c) $x = 1/(a + b)$ e) $x = (a - b)/(a + b)$ g) $x = b^3/(a+b)^2$ i) $x = bh/(h + b)$

Scanned by CamScanner

b) $x = (a - b)/2$ d) $x = -(a + b)$ f) $x = 3b$ h) $x = a + b$ j) $x = a$ ou $b = 0$

OBS.: As equações fracionárias têm como restrição a de que os denominadores não pode ser zero. Isto está implícito nas equações. Se uma equação original tem denominador **a – b**, então **a – b** não pode ser zero. Isto não está claro, alguns professores exigem que o aluno explicite isto, outros consideram que está implícito. Por via das dúvidas, em provas objetivas, é bom checar essas condições, sendo que algumas vezes, a banca esquece de considerá-las.

E28) $x = 8$ ou $x = -6$ (Esta é uma equação do 2º grau, cap. 13)

E29) $b = ac/(a - c)$ E30) (D) E31) (D) E32) (B)

E33) (D) E34) (C) E35) $x = -2/5$ E36) (C) E37) (D)

E38) (D) E39) (B) E40) (C) E41) (B) E42) (A)

E43) (B) E44) 35/18 E45) $x = 1/4$ E46) $x = 11$ E47) $x = 1$

E48) $x = 13/111$ E49) $x = -4$ E50) $a = 2$ E51) (B) E52) 27

E53) (A)

E54) Nenhuma, pois o módulo é sempre positivo ou zero, que somado com 2, nunca poderá ser –1.

E55) (C) E56) Impossível - (E)

E57) Impossível pois a solução $x = -1$ anula um denominador

E58) (E) E59) $x = (b^2 - 4)/(a^2 + 4)$

E60) Impossível (a solução x=3 anula denominadores)

E61) $a = ½$ E62) $x = 5$ E63) Indeterminado

E64) $x = 3$ E65) $x = -17/2$ E66) $x = 3/17$ E67) $x = -6$

E68) Impossível. A solução provisória encontrada, x=3, anula denominadores

E69) $x = 2/3$ E70) $x = -1/2$ ou $x = -3/2$

E71) $x = 3$ E72) (E) E73) (E) E74) 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

E75) (B) E76) (D) E77) (B) E78) (C)

E79) (C) E80) (C) E81) (B) E82) (E)

E83) (E) E84) $x = 1/3$ E85) (E) E86 (D)

Scanned by CamScanner

Capítulo 9

Sistemas de equações do primeiro grau

Uma incógnita, duas incógnitas, três incógnitas...

As equações são ferramentas para resolver problemas. Muitas vezes devemos apenas resolver equações, outras vezes é dado um problema, para o qual devemos escrever as equações para resolvê-lo.

Exemplo 1:
Resolver a equação:

$$\frac{x}{2}+\frac{1}{3}\times\frac{x}{2}+20=x$$

Solução:

$$\frac{x}{2}+\frac{x}{6}+20=x$$

$$3x+x+120=6x$$
$$120=2x$$
$$x=60$$

Resposta: 60

Exemplo 2:
Um automóvel percorreu metade de um trajeto e parou para abastecer. A seguir percorreu 1/3 do restante e fez uma outra parada. Percorreu mais 20 km e chegou ao destino final. Qual é a distância total percorrida?

Solução:
Muitos problemas na matemática são apresentados dessa forma. É dada uma situação, muitas vezes real, e pede-se que seja calculado um determinado valor. O aluno precisa ter a habilidade em escrever a formulação matemática (uma equação, por exemplo) a partir da "história contada".

Scanned by CamScanner

O número desconhecido, que em geral é a solução do problema, é normalmente chamado de x ou outra incógnita. As informações do problema permitem chegar à equação necessária. Neste exemplo, chamemos de ***x*** o tamanho total do trajeto. Devemos exprimir as informações dadas pelo problema, em função de ***x***, para chegar à equação que resolve o problema.

O automóvel fez o percurso total em três etapas, realizando duas paradas. Chamemos o percurso total de x e vamos calcular a medida dessas três etapas, em função de x.

Percurso total:	x
1ª etapa:	x/2 (restam x/2)
2ª etapa:	1/3 do restante = (1/3) . (x/2)
3ª etapa:	20

A soma desses três percursos é igual ao percurso total, ou seja, ***x***. Daí montamos a equação:

$$\frac{x}{2}+\frac{x}{6}+20=x$$

Resolvendo a equação encontramos **x = 60 km**.

Um problema cuja solução é obtida a partir de uma equação do 1º grau é chamado ***problema do 1º grau***. Esse tipo de problema será estudado no capítulo 10.

Existem problemas que apresentam mais de um valor desconhecido, por isso recaem em cálculos que envolvem mais de uma incógnita.

Método da substituição

No presente capítulo estudaremos os sistemas de equações do primeiro grau, que são conjuntos com duas ou mais equações, e com duas ou mais incógnitas. Os sistemas nos permitirão resolver problemas mais avançados.

Exemplo:
João tem o dobro da idade de seu irmão Pedro. Daqui a 10 anos, a soma das suas idades será 50 anos. Quais são as idades atuais dos dois irmãos?

Solução:
O problema exige a determinação de dois valores desconhecidos, que são as idades dos dois irmãos. É natural portanto que usemos essas duas idades como incógnitas do problema. Precisamos portanto conseguir duas equações a partir das informações do problema.

Idades: x (idade de João) e y (idade de Pedro)

1ª informação: x é o dobro de y, ou seja, x = 2y. Note que esta equação é válida apenas para o dia atual, já que as idades mudam com passar do tempo e muda a proporção entre elas.
2ª informação: dentro de 10 anos, os dois juntos somarão 50 anos.

A 2ª informação nos levará à segunda equação, porém não de forma tão óbvia. É preciso analisar a informação para chegar à equação. As idades dos irmãos são:

Hoje: x e y
Dentro de 10 anos: x + 10 e y + 10.

Scanned by CamScanner

Obviamente, ambos estarão 10 anos mais velhos.

Soma das idades em 10 anos: $x + 10 = y + 10$

O problema diz que a soma das idades será 50 anos, dentro de 10 anos. Então temos:

$x + 10 + y + 10 = 50$
$x + y = 30$

Os valores x e y encontrados são as idades atuais.

Aí está nossa segunda equação. Podemos assim armar o sistema:

$$\begin{cases} x = 2y \\ x + y = 30 \end{cases}$$

Este é o sistema de duas equações do primeiro grau que resolve o problema. Neste capítulo faremos apenas a resolução de sistemas dados. No capítulo 10 faremos o serviço completo, ou seja, dado um problema, montaremos as equações necessárias para chegar à sua solução.

Usaremos aqui o ***método da substituição*** para resolver este sistema. Consiste em calcular o valor de uma incógnita em função da outra, em uma equação, e substituiremos esta expressão na segunda. Desta forma a segunda equação terá apenas uma incógnita, que poderá ser facilmente determinada. No caso:

$x = 2y$ ➔ substituir x por 2y na segunda equação

$2y + y = 30$ ➔ $3y = 30$ ➔ $y = 10$

Uma vez conhecendo o valor de y, fazemos $x = 2y$ na primeira equação.

$x = 2y = 2.10 = 20$

Solução da equação: $x = 20, y = 10$

Dada a solução da equação, chegamos à solução do problema:

João hoje tem 20 anos e Pedro tem 10 anos.

É importante observar que x e y não são as idades de João e Pedro, mas sim, as idades de João e Pedro hoje.

É conveniente usar o resultado encontrado e substituir no enunciado para verificar se está correto.

João tem (20) o dobro da idade de seu irmão Pedro (10). Daqui a 10 anos (20+10 = 30 e 10+10 = 20), a soma das suas idades (30 +20) será 50 anos (OK!).

É conveniente fazer essa checagem, bem como obter a solução do problema a partir da solução do sistema. Algumas vezes a pergunta do problema pode ser uma "armadilha para distraídos", como "Quantos anos tinha João quando Pedro nasceu?"

Scanned by CamScanner

Exercícios

E1) Resolva os seguintes sistemas pelo ***método da substituição.***

a) $\begin{cases} 3x + y = 40 \\ 2x - y = 10 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 5x - 3y = 20 \\ 2x + 5y = 39 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 6x + 35y = 76 \\ 8x - 21y = -34 \end{cases}$

d) $\begin{cases} 5x + 4y = 14 \\ 17x - 3y = 31 \end{cases}$

e) $\begin{cases} 2x - 3y = -6 \\ 5x + 2y = 23 \end{cases}$

f) $\begin{cases} x + 5y = 3 \\ 3x + 2y = -4 \end{cases}$

g) $\begin{cases} 3x - 5y = -6 \\ 4x - 7y = -9 \end{cases}$

h) $\begin{cases} 8x - y = 43 \\ 7x + 2y = 26 \end{cases}$

i) $\begin{cases} 5x - 4y = 10 \\ 7x + 3y = 14 \end{cases}$

j) $\begin{cases} x + 21y = 20 \\ 2x + 27y = 25 \end{cases}$

k) $\begin{cases} 6x - 13y = -13 \\ 3x - 5y = -5 \end{cases}$

l) $\begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ 8x - 5y = 11 \end{cases}$

m) $\begin{cases} 5x + 7y = 29 \\ 7x + 4y = 29 \end{cases}$

n) $\begin{cases} 11x - 12y = -57 \\ 4x + 5y = -2 \end{cases}$

o) $\begin{cases} x + 8y = 0 \\ 7x - 3y = 0 \end{cases}$

Método da adição

Este método de resolução de sistemas do primeiro grau consiste em somar, ou subtrair as equações, de tal forma que resulte uma equação com apenas uma variável.

Exemplo:

$$\begin{cases} x + y = 14 \\ x - y = 4 \end{cases}$$

Se adicionarmos as duas equações, membro a membro, ficaremos com uma equação com apenas a variável ***x***:

$x + y + x - y = 14 + 4$

$2x = 18$
$x = 9$

Uma vez determinado o valor de x, podemos usá-lo em qualquer uma das equações originais para determinar ***y***. Usando a primeira equação ficamos com:

$9 + y = 14$
$y = 14 - 9 - 5$

Resposta: $x = 9$ e $y = 5$

Exemplo:

$$\begin{cases} 5x + y = 11 & \text{(I)} \\ 3x + y = 9 & \text{(II)} \end{cases}$$

Nesse caso é mais fácil subtrair as equações, o que resultará em uma nova equação com a variável ***y*** eliminada. Fazendo então (I) – (II) ficamos com:

$5x + y - 3x - y = 11 - 9$
$2x = 2$
$x = 1$

Scanned by CamScanner

Substituindo o valor de x na primeira equação:

$5.1 + y = 11$
$y = 6$

Resposta: $x = 1$ e $y = 6$

Algumas vezes as equações envolvidas não possuem um termo que possa ser cancelado. Devemos então multiplicar uma das equações para permitir o cancelamento.

Exemplo:

$$\begin{cases} 5x + 2y = 23 & \text{(I)} \\ 2x + y = 10 & \text{(II)} \end{cases}$$

Podemos eliminar a incógnita y, multiplicando a equação (II) por 2 e fazendo (I) – (II).
$5x + 2y - (4x + 2y) == 23 - 20$
$x = 3$

Substituindo o valor de x na equação (II) – este caminho resultará em números menores – ficamos com:

$2.3 + y = 10$
$y = 4$

Resposta: $x = 3$ e $y = 4$.

Exercícios

E2) Resolva usando adição

a) $\begin{cases} 4x + 2y = 0 \\ 4x + 9y = 28 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 9x - 5y = 22 \\ 9x + 5y = 122 \end{cases}$

c) $\begin{cases} -x - 5y = 28 \\ -x + 4y = -17 \end{cases}$

d) $\begin{cases} 2x - y = 5 \\ 5x + 2y = -28 \end{cases}$

e) $\begin{cases} 10x + 6y = 24 \\ -6x + y = 4 \end{cases}$

f) $\begin{cases} 2x + 4y = 24 \\ 4x - 12y = 8 \end{cases}$

g) $\begin{cases} -7x + 4y = -4 \\ 10x - 8y = -8 \end{cases}$

h) $\begin{cases} 5x + 10y = 20 \\ -6x - 5y = -3 \end{cases}$

i) $\begin{cases} -7x - 3y = 12 \\ -6x - 5y = -20 \end{cases}$

j) $\begin{cases} 9x - 2y = -18 \\ 5x - 7y = -10 \end{cases}$

k) $\begin{cases} 9x + 6y = -21 \\ -10x - 9y = 28 \end{cases}$

l) $\begin{cases} -7x + 5y = -8 \\ -3x - 3y = 12 \end{cases}$

m) $\begin{cases} -8x - 8y = -8 \\ 10x + 9y = 1 \end{cases}$

n) $\begin{cases} 9y = 7 - x \\ -18y + 4x = -26 \end{cases}$

o) $\begin{cases} -7x + y = -10 \\ -9x - y = -22 \end{cases}$

Método da comparação

Neste método de resolução, calculamos o valor de uma incógnita em ambas as equações, em função da outra incógnita. A seguir igualamos esses dois valores.

Scanned by CamScanner

Exemplo:

$$\begin{cases} 5x + y = 11 & (I) \\ 3x + y = 9 & (II) \end{cases}$$

Neste exemplo, para evitar frações, fica mais fácil calcular o valor de y nas duas equações:

(I) ➔ $y = 11 - 5x$
(II) ➔ $y = 9 - 3x$

Igualando esses dois valores de ***y***, ficamos com uma equação em ***x***:

$11 - 5x = 9 - 3x$
$2 = 2x$
$x = 1$
$y = 11 - 5x = 6$

Resposta: x = 1 e y = 6

Exercícios

E3) Resolva os sistemas por comparação

a) $\begin{cases} 5x - 5y = -15 \\ x - y = -3 \end{cases}$

b) $\begin{cases} -3x + 3y = -12 \\ -3x + 9y = -24 \end{cases}$

c) $\begin{cases} -10x - 5y = 0 \\ -10x - 10y = -30 \end{cases}$

d) $\begin{cases} -5x + 6y = -17 \\ x - 2y = 5 \end{cases}$

e) $\begin{cases} x + 3y = -1 \\ 10x + 6y = -10 \end{cases}$

f) $\begin{cases} -6x + 4y = 12 \\ -3x - y = 26 \end{cases}$

g) $\begin{cases} -9x - 5y = -19 \\ 3x - 7y = -11 \end{cases}$

h) $\begin{cases} -5x + 4y = 4 \\ -7x - 10y = -10 \end{cases}$

i) $\begin{cases} 3x + 7y = -8 \\ 4x + 6y = -4 \end{cases}$

j) $\begin{cases} -4x - 5y = 12 \\ -10x + 6y = 30 \end{cases}$

k) $\begin{cases} 8x + 7y = -24 \\ 6x + 3y = -18 \end{cases}$

l) $\begin{cases} -7x + 10y = 2 \\ 4x + 9y = 43 \end{cases}$

m) $\begin{cases} 2x - 4y = -18 \\ 1 + 4y/3 + 7x/3 = 22 \end{cases}$

n) $\begin{cases} -6 - 42y = -12x \\ x - 1/2 - 7y/2 = 0 \end{cases}$

o) $\begin{cases} 6x + 3y = 12 \\ 6x - 3y = 0 \end{cases}$

E4) Resolva os sistemas por qualquer um dos métodos ensinados

a) $\begin{cases} 3x + 2y = 22 \\ x + 5y = 29 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 11x - 27y = -103 \\ 9x - 2y = -24 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 2x + 6y = -20 \\ 5x + 3y = -14 \end{cases}$

d) $\begin{cases} -x + 8y = 14 \\ 7x + 8y = 30 \end{cases}$

e) $\begin{cases} 2y + 8x = 9 \\ 6y - 4x = 13 \end{cases}$

f) $\begin{cases} x + 3y = -12 \\ 3x + y = 4 \end{cases}$

g) $\begin{cases} -x + 9y = 46 \\ 7x + 9y = -34 \end{cases}$

h) $\begin{cases} 7x + 9y = 52 \\ 13x + 2y = 23 \end{cases}$

i) $\begin{cases} x - y = 6 \\ 3x + y = 33 \end{cases}$

j) $\begin{cases} -x - 4y = 18 \\ 2x - 5y = 29 \end{cases}$

k) $\begin{cases} 5x + 3y = 2 \\ 3x + 5y = 3 \end{cases}$

l) $\begin{cases} 5x + 3y = -2 \\ x + y = 5 \end{cases}$

m) $\begin{cases} -2x - 5y = 20 \\ -6x + y = -4 \end{cases}$

n) $\begin{cases} x + 5y = 10 \\ 4x + 15y = -5 \end{cases}$

o) $\begin{cases} 2x + 3y = 3 \\ 3x + y = 4 \end{cases}$

Scanned by CamScanner

E5) Resolver por qualquer dos métodos ensinados

a) $\begin{cases} -10x + 2y = -6 \\ -9x - y = 5 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 7x - 2y = 11 \\ 2x + 3y = 21 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 5x + 3y = 29 \\ 2x - y = 5 \end{cases}$

d) $\begin{cases} -4x - 3y = -26 \\ 6x + y = 32 \end{cases}$

e) $\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 3x + 5y = 11 \end{cases}$

f) $\begin{cases} 2x + 3y = 13 \\ x - y = -1 \end{cases}$

g) $\begin{cases} 7x + 5y = 18 \\ 5x - 7y = 34 \end{cases}$

h) $\begin{cases} x + 2y = -7 \\ 4x + 6y = -18 \end{cases}$

i) $\begin{cases} 2x + y = 13 \\ x - y = 8 \end{cases}$

j) $\begin{cases} 3x - 5y = -36 \\ 2x - 3y = -22 \end{cases}$

k) $\begin{cases} y = -12 + 3x \\ 2x - 4y = -2 \end{cases}$

l) $\begin{cases} x/6 + y/4 = 4/3 \\ x/y = 1/2 \end{cases}$

m) $\begin{cases} 3x + 4y = -25 \\ 4x + 15y = -72 \end{cases}$

n) $\begin{cases} 5x + 3y = 18 \\ 5x - 3y = 12 \end{cases}$

o) $\begin{cases} 7x - 2y = 16 \\ 3x + y = 5 \end{cases}$

E6) Resolver por qualquer dos métodos ensinados

a) $\begin{cases} 3x + 8y = 9 \\ x + 2y = 3 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 35x - 34y = -33 \\ 34x - 35y = -36 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 3x + 4y = 2 \\ 3x + 4y = -6 \end{cases}$

d) $\begin{cases} 5x + 3y = 4 \\ 3x + 5y = -4 \end{cases}$

e) $\begin{cases} 5x - y = 4 \\ 2x + 3y = 22 \end{cases}$

f) $\begin{cases} 4x - 3y = -19 \\ 8x - 7y = -43 \end{cases}$

g) $\begin{cases} 2x - 5y = 2 \\ -y = 2x/5 - 6 \end{cases}$

h) $\begin{cases} 3x + 4y = 18 \\ 2x - 7y = -17 \end{cases}$

i) $\begin{cases} 3x + y = -11 \\ x + 4y = 0 \end{cases}$

j) $\begin{cases} y + 4x = 16 \\ 2x + 5y = -10 \end{cases}$

k) $\begin{cases} 10x + 2y = 3 \\ -5x + 3y = 0 \end{cases}$

l) $\begin{cases} x + 2y = 1 \\ 5x - 2y = -11 \end{cases}$

m) $\begin{cases} 5x + y = 5 \\ 6x + y = 0 \end{cases}$

n) $\begin{cases} x - 2y = 7 \\ x + y = -5 \end{cases}$

o) $\begin{cases} 3x + 4y = 10 \\ 9 = 6x - 3y \end{cases}$

O sistema fracionário é aquele que tem incógnitas no denominador. Devemos resolver as equações como fracionárias, usando a restrição de que nenhum denominador pode ser zero. Antes dessas, é preciso conhecer um outro tipo de sistema que é mais simples, pois apesar de envolver frações, estas não apresentam incógnitas nos denominadores, por isso não são considerados como sistemas fracionários.

E7) Resolver os sistemas abaixo

a) $\begin{cases} 3x - 4y = 3 \\ 2x - 5y = 2 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 2x + 5y = 1 \\ 3x - 6y = 2 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 5x - 8y = 3 \\ 2x + 7y = 4 \end{cases}$

d) $\begin{cases} 2x - y = 3 \\ x - 3y = 4 \end{cases}$

e) $\begin{cases} 7x - 5y = 2 \\ 3x + 4y = 3 \end{cases}$

f) $\begin{cases} 3x + 4y = 2 \\ 5x + 9y = 5 \end{cases}$

g) $\begin{cases} 2x + 6y = 5 \\ 4x + 10y = 3 \end{cases}$

h) $\begin{cases} 7x + 3y = 5 \\ 9x - 5y = 7 \end{cases}$

i) $\begin{cases} 4x - 7y = 9 \\ 3x + 5y = 13 \end{cases}$

j) $\begin{cases} (1/2)x + (4/3)y = 1/6 \\ (1/3)x - (2/5)y = 1/4 \end{cases}$

Caso existam denominadores numéricos entre as equações, é conveniente primeiro eliminar os denominadores e escrever cada equação na forma mais simples, no estilo ax + by = c.

Scanned by CamScanner

E8) Resolver por qualquer dos métodos ensinados

a) $\begin{cases} \frac{2x}{3} - \frac{5y}{4} = -\frac{11}{3} \\ \frac{7x}{6} - \frac{5y}{3} = -\frac{13}{3} \end{cases}$

b) $\begin{cases} \frac{7x}{6} - \frac{6y}{7} = -\frac{152}{21} \\ \frac{5x}{4} - \frac{2y}{3} = -7 \end{cases}$

c) $\begin{cases} \frac{x+y}{2} - \frac{x-y}{3} = 8 \\ \frac{x+y}{3} + \frac{x-y}{4} = 11 \end{cases}$

d) $\begin{cases} \frac{8x-5y}{7} + \frac{11y-4x}{3} = 14 \\ \frac{15x+12y}{4} - \frac{2x-y}{3} = 29 \end{cases}$

e) $\begin{cases} \frac{2x+y}{4} - \frac{7x-5y}{22} = \frac{5}{2} \\ \frac{x}{5} - \frac{3y}{7} + \frac{104}{35} = 0 \end{cases}$

f) $\begin{cases} \frac{6x+5y}{7} = \frac{2}{3} \\ \frac{5y-3x}{5} = \frac{1}{30} \end{cases}$

g) $\begin{cases} \frac{5x-3y}{3} + \frac{7x-5y}{11} = \frac{28}{33} \\ \frac{15y-3x}{7} + \frac{7y-3x}{5} = \frac{88}{35} \end{cases}$

h) $\begin{cases} \frac{2x-3}{4} - \frac{y-8}{5} = \frac{y+3}{4} - \frac{1}{5} \\ \frac{x-7}{3} + \frac{4y+1}{11} = \frac{7}{33} \end{cases}$

i) $\begin{cases} \frac{x-2y}{6} - \frac{x+3y}{4} = -\frac{17}{12} \\ \frac{2x-y}{6} - \frac{3x+y}{4} = \frac{5y}{4} - \frac{10}{3} \end{cases}$

j) $\begin{cases} \frac{x}{a+b} + \frac{y}{a-b} = \frac{1}{a-b} \\ \frac{x}{a+b} - \frac{y}{a-b} = \frac{1}{a+b} \end{cases}$

Método dos determinantes

Dos métodos ensinados (adição, comparação e substituição), podemos considerar este método como o que resulta em menos cálculos para resolver um sistema. Este método é usado apenas para sistemas lineares, ou seja, na forma abaixo:

$$\begin{cases} Ax + By = C \\ A'x + B'y = C' \end{cases}$$

Os números A, B, C, A', B' e C' são os coeficientes da equação. Por exemplo, no sistema

$$\begin{cases} 2x + 3y = 5 \\ 7x - y = 4 \end{cases}$$

Temos A = 2, B = 3, C = 5, A' = 7, B' = –1 e C' = 4.

Esse método requer o cálculo de três determinantes de ordem 2x2, vamos chama-los de Δ, Δ_x e Δ_y, dados por:

Scanned by CamScanner

$$\Delta = \begin{vmatrix} A & B \\ A' & B' \end{vmatrix} = AB' - BA'$$

O determinante do sistema (Δ) é formado por quatro números, que são os coeficientes de x e y na primeira e na segunda equações. A primeira linha usa os coeficientes de x e y da primeira equação (A e B) e a segunda linha usa os coeficientes de x e y da segunda equação (A' e B'). Para calcular o valor numérico deste determinante, multiplicamos as diagonais e subtraímos a primeira da segunda. No sistema do nosso exemplo, temos:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 7 & -1 \end{vmatrix} = 2 \times (-1) - 3 \times 7 = -2 - 21 = -23$$

Ou seja, para calcular o determinante do sistema, dispomos os coeficientes de x e y nas equações, na forma de um dispositivos com 2 linhas e 2 colunas, sendo a linha superior com os coeficientes da 1ª equação, e a linha inferior com os coeficientes da 2ª equação, sendo que a coluna da esquerda deve conter os coeficientes de x e a coluna da direita deve conter os coeficientes de y. Cada coisa em seu lugar.

Agora calculamos os determinantes Δ_x e Δ_y, dados por:

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} C & B \\ C' & B' \end{vmatrix} = CB' - BC'$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} A & C \\ A' & C' \end{vmatrix} = AC' - CA'$$

Ou seja, para formar e calcular o valor do determinante Δ_x, substituímos em , a coluna original que tem os coeficientes de x, pela coluna formada por C e C'., então fazemos a "multiplicação cruzada" para calcular seu valor. No determinante Δ_y, fazemos a mesma coisa, porém colocando C e C' na coluna relativa ao y. Vejamos como é fácil fazer isso, usando o sistema do nosso exemplo:

$$\begin{cases} 2x + 3y = 5 \\ 7x - y = 4 \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 7 & -1 \end{vmatrix} = 2 \times (-1) - 3 \times 7 = -2 - 21 = -23$$

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} = 5 \times (-1) - 3 \times 4 = -17$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 7 & 4 \end{vmatrix} = 2 \times 4 - 7 \times 5 = -27$$

O método dos determinantes usa esses três valores para calcular x e y, usando as fórmulas:

Scanned by CamScanner

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} \text{ e } y = \frac{\Delta_y}{\Delta}$$

Isto permite resolver um sistema linear do tipo 2x2 com uma quantidade mínima de cálculos: 6 multiplicações, 3 subtrações e 2 divisões.

Exemplo: Resolver o sistema abaixo usando o método dos determinantes.

$$\begin{cases} 2x + 6y = 5 \\ 4x + 10y = 3 \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 6 \\ 4 & 10 \end{vmatrix} = 20 - 24 = -4$$

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 3 & 10 \end{vmatrix} = 50 - 18 = 32 \rightarrow x = 32/(-4) = -8$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 6 - 20 = -14 \rightarrow y = -14/32 = -7/16$$

Resposta: x = –8 e y = –7/16

Demonstração

Falta mostrar que o método apresentado é algebricamente correto. Para isto, vamos resolver o sistema original com coeficientes A, B, C, A', B' e C' usando o método da adição, já apresentado. Teremos que multiplicar a primeira equação por B' e a segunda equação por B, para então subtraí-las:

$$\begin{cases} Ax + By = C \\ A'x + B'y = C' \end{cases}$$

Multiplicando as equações respectivamente por B e B', e subtraindo-as, ficamos com:

$$\begin{cases} AB'x + BB'y = CB' \\ BA'x + BB'y = BC' \end{cases}$$

Com a subtração, o termo em "y" cancelará, ficando com:

$AB'x - BA'x = CB' - BC'$

$x = (CB' - BC')/(AB' - BA')$

note que $CB' - BC'$ é Δ_x, e $AB' - BA'$ é Δ. Ficamos então com

$x = \Delta_x/\Delta$.

O mesmo cálculo feito a partir do sistema original, com a eliminação da incógnita x, nos levaria a uma equação que resultaria no valor de y:

$y = \Delta_y/\Delta$.

Scanned by CamScanner

O cálculo de determinantes utilizado é muito simples, e pode ser apresentado sem a necessidade do conhecimento da teoria matemática dos determinantes, que é matéria do ensino médio.

Cuidado com a "pegadinha" das posições trocadas

Algumas vezes uma equação de um sistema pode ter trocadas as posições de x e y. Por exemplo, apresentar "3y + 2x = 5" ao invés de "2x + 3y = 5". É claro que ambas são equivalentes devido à propriedade comutativa da adição, mas um aluno distraído pode prestar mais atenção nos números que nas letras, e acabar confundindo com "3x + 2y = 5", o que estaria errado. Isto é particularmente perigoso quando usamos o método dos determinantes, que visa somente os coeficientes. É bom que você se acostume a prestar atenção nessa ordem (tipicamente escreve-se o termo em x antes do termo em y), para não "cair nessa".

Colocando em evidência

Uma grande simplificação no cálculo de um determinante é colocar valores em evidência. Podemos colocar em evidência valores dentro de uma linha em dentro de uma coluna.

Exemplo:
Colocando em evidência valores nas colunas e nas linhas:

$$\Delta=\begin{vmatrix}17 & 18\\ 34 & 12\end{vmatrix}=17\times\begin{vmatrix}1 & 18\\ 2 & 12\end{vmatrix}=6\times17\times\begin{vmatrix}1 & 3\\ 2 & 2\end{vmatrix}=2\times6\times17\times\begin{vmatrix}1 & 3\\ 1 & 1\end{vmatrix}=2\times6\times17\times(1-3)$$

Inicialmente colocamos 17 em evidência pois este valor é divisor dos elementos da coluna 1 (17 e 34)

A seguir colocamos em evidência 6 na segunda coluna. Finalmente na segunda linha pode ser colocado 2 em evidência. Ficamos então com um determinante muito mais simples e que pode ser calculado mentalmente (1x1 – 3x1 = –2). Temos ainda a vantagem de obter o determinante na forma de um produto, o que facilita simplificações posteriores.

A demonstração desta propriedade é simples, baseada na propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Lembre-se que isto pode ser feito apenas com linhas ou colunas, mas não com diagonais.

Exercícios

E9) Repetir o exercício E7, porém usando na resolução, o método dos determinantes. Por comodidade os sistemas foram repetidos abaixo

a) $\begin{cases}3x-4y=3\\2x-5y=2\end{cases}$

b) $\begin{cases}2x+5y=1\\3x-6y=2\end{cases}$

c) $\begin{cases}5x-8y=3\\2x+7y=4\end{cases}$

d) $\begin{cases}2x-y=3\\x-3y=4\end{cases}$

e) $\begin{cases}7x-5y=2\\3x+4y=3\end{cases}$

f) $\begin{cases}3x+4y=2\\5x+9y=5\end{cases}$

g) $\begin{cases}2x+6y=5\\4x+10y=3\end{cases}$

h) $\begin{cases}7x+3y=5\\9x-5y=7\end{cases}$

i) $\begin{cases}4x-7y=9\\3x+5y=13\end{cases}$

j) $\begin{cases}(1/2)x+(4/3)y=1/6\\(1/3)x-(2/5)y=1/4\end{cases}$

Scanned by CamScanner

Lembre-se que o método dos determinantes ensinado aqui é apenas para sistemas 2x2, e na forma simplificada, com coeficientes A, B e C. O método dos determinantes pode ser generalizado para sistemas com 3 ou mais equações, mas é preciso aprender a calcular determinantes 3x3 ou superiores, o que é matéria do ensino médio.

Sistemas literais

Sistemas podem apresentar múltiplas letras. Normalmente são usadas letras x e y, mas qualquer outra letra pode ser usada. Eventualmente letras podem representar valores numéricos, ou valores conhecidos. Por exemplo, se um sistema tem duas equações e letras x, y, a e b, tipicamente x e y são as incógnitas, e as demais letras são valores conhecidos. Os cálculos devem ser feitos usando as técnicas de operações algébricas ensinadas nos capítulos anteriores.

Exemplo:

$$\begin{cases} x + y = 3a + 2b \\ x - y = 2a - 3b \end{cases}$$

São duas equações, e quatro "letras": x, y, a e b. É de praxe usar as letras x, y, z como incógnitas. Nesse caso, devemos calcular x e y, em função de a e b.

Somando as duas equações ficamos com:

$2x = 5a - b$
$\mathbf{x = (5a - b)/2}$

Subtraindo as duas equações originais, ficamos com:

$2y = a + 5b$
$\mathbf{y = (a + 5b)/2}$

Resposta: $x = (5a - b)/2$, $y = (a + 5b)/2$

Exercícios

E10) Resolver os sistemas

a) $\begin{cases} (a+b)x - ay = \dfrac{a^2+ab+b^2}{a-b} \\ ax + (a+b)y = \dfrac{(a+b)^2}{a-b} \end{cases}$

b) $\begin{cases} b(a+b)x - ab^2y = a^2 \\ (a-b)x + aby = \dfrac{a^2}{b} \end{cases}$

c) $\begin{cases} (m+n)x - (m-n)y = 4mn \\ \dfrac{x}{m+n} + \dfrac{y}{m-n} = 2 \end{cases}$

f) $\begin{cases} x/a + y/b = (a+b)^2/ab \\ x/a - y/b = (b^2 - a^2)/ab \end{cases}$

g) $\begin{cases} 4x - my = m - 4 \\ (2m+6)x + y = 2m + 1 \end{cases}$

h) $\begin{cases} (a+c)x - by = bc \\ x + y = a + b \end{cases}$

Scanned by CamScanner

d) $\begin{cases} \dfrac{x}{m+n} - \dfrac{y}{m-n} = \dfrac{1}{m+n} \\ \dfrac{x}{m+n} + \dfrac{y}{m-n} = \dfrac{1}{m-n} \end{cases}$

e) $\begin{cases} ax = by = cz \\ \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y} + \dfrac{1}{z} = \dfrac{1}{d} \end{cases}$

i) $\begin{cases} (a + 2b)x - (a - 2b)y = 6ac \\ (a + 3c)y - (a - 3c)x = 4ab \end{cases}$

j) $\begin{cases} a(x + y) + b(x - y) = c \\ a(x - y) + b(x + y) = d \end{cases}$

Sistemas com 3 equações e 3 incógnitas

Certos problemas podem recair em sistemas com 3 equações e 3 incógnitas. Em aplicações mais avançadas da matemática, física, química e engenharia, podem surgir sistemas com um grande número de equações e de incógnitas, a ponto de precisarem ser resolvidos por computador. Cabe ao aluno saber resolver manualmente, pelo menos os sistemas de 3 incógnitas. Veremos agora como operar com sistemas do primeiro grau de ordem 3, ou seja, 3 equações e 3 incógnitas. Esses sistemas podem ser resolvidos de diversas formas, inclusive as que apresentamos para os sistemas de segunda ordem.

Exemplo:

$\begin{cases} x - 2y + z = 5 & \text{(I)} \\ 2x + y - z = -1 & \text{(II)} \\ 3x + 3y - 2z = -4 & \text{(III)} \end{cases}$

Somando as duas primeiras equações, membro a membro, ficamos com:

$3x - y = 4$ (IV)

Agora vamos também eliminar z, somando a terceira equação com o dobro da primeira, ficando com:

$2x - 4y + 2z = 10$
$3x + 3y - 2z = -4$

$5x - y = 6$ (V)

Essas duas operações não resolvem o sistema, mas permitem reduzir o sistema de 3 para 2 incógnitas. Ficamos assim com um novo sistema com duas equações em x e y:

$\begin{cases} 3x - y = 4 \\ 5x - y = 6 \end{cases}$

O sistema pode ser resolvido por qualquer um dos métodos. Usemos o método da comparação:

Da 1ª equação: $y = 3x - 4$ (VI)
Da 2ª equação: $y = 5x - 6$ (VII)

Scanned by CamScanner

Igualando (VI) e (VII), temos:

$3x - 4 = 5x - 6$
$-2x = -2$
$x = 1$

Substituindo nas demais equações do sistema:

$y = 3x - 4$
$y = -1$

$x - 2y + z = 5$
$1 - 2(-1) + z = 5$
$z = 2$

Resposta: $x = 1, y = -1, z = 2$

É conveniente substituir os valores encontrados no sistema original, para conferência:

$(1) - 2(-1) + (2) = 5$ OK
$2(1) + (-1) - (2) = -1$ OK
$3(1) + 3(-1) - 2(2) = -4$ OK

O método geral é transformar o sistema de ordem 3, em um sistema de ordem 2 (duas equações e duas incógnitas). Resolve-se o sistema de ordem 2, encontrando duas das incógnitas. Finalmente substitui-se os valores das duas incógnitas encontradas em uma das equações originais para encontrar a terceira incógnita. Neste processo pode ser usada qualquer uma das técnicas apresentadas para sistemas de segunda ordem: adição, comparação ou substituição.

Uma técnica que sempre pode ser usada é calcular o valor da 1ª incógnita (por exemplo, x) na 1ª equação e substituir este valor na 2ª e na 3ª equações. Essas duas últimas equações formaram um sistema com 2 equações e 2 incógnitas (por exemplo, y e z), e finalmente resolvemos este novo sistema. Conhecendo esas duas incógnitas (y e z), voltamos na 1ª equação para encontrar x.

Exercícios

E11) Resolva os seguintes sistemas

a) $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + 3z = 9 \\ 3x + 2y + z = 10 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x - y + z = 0 \\ 2x + y + 3z = 1 \\ x - y + 2z = 1 \end{cases}$

c) $\begin{cases} x - 3y + 2z = 3 \\ 2x + y - 3z = -8 \\ 5x + 2y + 7z = 51 \end{cases}$

f) $\begin{cases} 2x - 7y - 5z = -25 \\ 5x - 3y + 4z = 14 \\ 9x + 5y - 6z = 30 \end{cases}$

g) $\begin{cases} 5x - 3y + 2z = -19 \\ 3x + 7y - 4z = 27 \\ 8x - 4y - 5z = 4 \end{cases}$

h) $\begin{cases} 4x - 3y + 5z = 3 \\ 3x + 9y - 6z = 5 \\ 7x + 6y - z = 8 \end{cases}$

Scanned by CamScanner

d) $\begin{cases} 11x - 4y - 8z = 45 \\ 5x + 3y - 3z = 24 \\ 2x + 2y + 3z = 2 \end{cases}$

e) $\begin{cases} -8x + 3y - 10z = -39 \\ 5x - 4y + 9z = 41 \\ x - 2y - 3z = -5 \end{cases}$

i) $\begin{cases} 5x + 4y - 7z = 4 \\ 3x - y + 2z = 5 \\ 11x + 2y - 3z = 12 \end{cases}$

j) $\begin{cases} 3x - 4y + 5z - t = 6 \\ 2x + 7y - z + 2t = 21 \\ 7x + 3y + 5z - 6t = 4 \\ 2x + 6y - 3z + 3t = 17 \end{cases}$

E12) Resolver os sistemas

a) $\begin{cases} x + y = 1 \\ x + z = 7 \\ y + z = -2 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x - y + z = 9 \\ 3y = 4x - 18 \\ 4z - 15 = x + y \end{cases}$

c) $\begin{cases} x + 2y + 3z = -12 \\ x - y - 5z = 24 \\ 3x + 2y - z = 10 \end{cases}$

d) $\begin{cases} 1/x + 1/y = a \\ 1/x + 1/z = b \\ 1/y + 1/z = c \end{cases}$
OBS.: Substituir m=1/x, n=1/y, p=1/z

e) $\begin{cases} 3x + 2y = 2 \\ 4x - 3z = 5 \\ 5y + 6z = -4 \end{cases}$

f) $\begin{cases} x + 5y - 7z = 83 \\ 3x + 7y - z = 69 \\ 9x - 2y + 3z = 50 \end{cases}$

g) $\begin{cases} x - 2y + 2z = 11 \\ 3x + y - z = 12 \\ x + 2y + 3z = 29 \end{cases}$

h) $\begin{cases} 3x - y - 5z = -3 \\ 4y - x + z = 7 \\ 5x - y + 3z = 5 \end{cases}$

i) $\begin{cases} x + 2y - 3z = -33 \\ -x + 4y + z = -13 \\ 3x - 3y + 7z = 74 \end{cases}$

j) $\begin{cases} 5x + 2y - z = 3 \\ 4x + 3y - 6z = -4 \\ x - y - 5z = -3 \end{cases}$

Sistemas fracionários

Sistemas fracionários são aqueles que possuem incógnitas em denominadores. Resolve-se normalmente e no final deve ser feita a restrição dos denominadores serem diferentes de zero.

Exemplo:

$$\begin{cases} \dfrac{3}{3y-x} = \dfrac{7}{3x-y} \\ \dfrac{9}{4x-3} = \dfrac{5}{4y-3} \end{cases}$$

Restrições:
$3y - x \neq 0 \rightarrow x \neq 3y$
$3x - y \neq 0 \rightarrow y \neq 3x$
$4x - 3 \neq 0 \rightarrow x \neq 3/4$
$4y - 3 \neq 0 \rightarrow y \neq 3/4$

$3(3x - y) = 7(3y - x)$
$9x - 3y = 21y - 7x$
$16x = 24y$
$x = 3y/2$

Scanned by CamScanner

Desenvolvendo na 2ª equação e trocando x por 3y/2:
$9(4y - 3) = 5(4x - 3)$
$36y - 27 = 20x - 15$
$36y - 20x = 12$
$36y - 20.(3y/2) = 12$
$36y - 30y = 12$
$6y - 5y = 2$
$\mathbf{y = 2}$
$x = 3y/2 = 3$

Observamos que esses valores não afetam as restrições. Caso fossem afetados por qualquer uma das restrições, a solução teria que ser eliminada.

Resposta: x = 3, y = 2

Note que um sistema fracionário é aquele que possui incógnitas em denominadores. Um sistema que possui frações porém com denominadores numéricos, ou mesmo literais mas sem incógnitas, não é considerado fracionário. A única diferença entre um sistema fracionário e um não fracionário é que no caso do fracionário é preciso levar em conta as restrições para que o denominador não se anule, ou seja, eliminar as soluções que anulam o denominador. De resto, o método se solução é idêntico.

Exercícios

E13) Resolva os sistemas

a) $\begin{cases} \frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{20}{xy} \\ \frac{x-y}{8}=\frac{1}{2} \end{cases}$

b) $\begin{cases} \frac{1}{4x}+\frac{1}{3y}=2 \\ \frac{1}{y}-\frac{1}{2x}=1 \end{cases}$

c) $\begin{cases} \frac{5x+7y}{x+y}=6 \\ \frac{3(z-x)}{x-y+z}=1 \\ \frac{2x+3y-z}{\frac{x}{2}+3}=4 \end{cases}$

d) $\begin{cases} \frac{1}{x+2y-3}+\frac{1}{3x-2y+1}=\frac{5}{12} \\ \frac{1}{x+2y-3}-\frac{1}{3x-2y+1}=\frac{1}{12} \end{cases}$

e) $\begin{cases} \frac{a}{x}+\frac{b}{y}-\frac{c}{z}=m \\ \frac{a}{x}+\frac{b}{y}+\frac{c}{z}=n \\ -\frac{a}{x}+\frac{b}{y}-\frac{c}{z}=p \end{cases}$

Scanned by CamScanner

Sistemas possíveis e determinados

Os sistemas lineares possíveis e determinados (S.P.D) são aqueles que apresentam uma solução única, ou seja, um único valor de x e um único valor de y. Ao resolvermos este tipo de sistema, sempre chegaremos a uma resposta do tipo x = valor e y = valor.

Para que um sistema 2x2 seja possível e determinado basta que seja atendida a seguinte condição:

$$\frac{A}{A'} \neq \frac{B}{B'}$$

Note que os sistemas indeterminados também são possíveis, porém apresentam infinitas soluções. Os sistemas determinados são possíveis e admitem uma única solução.

Retas concorrentes

As equações envolvendo duas incógnitas podem ser representadas por retas no plano xy. Duas equações são representadas por duas retas. Quando o sistema é determinado (e automaticamente, possível), essas duas retas são concorrentes, ou seja, encontram-se em um único ponto, que representa os valores de x e y que formam a solução do sistema. Nesse tipo de gráfico, as soluções são pontos (x, y) que estão simultaneamente nas duas retas, ou seja, satisfazem a ambas as equações.

Resolver um sistema de equações nada mais é que encontrar os pontos de interseção dos gráficos das suas equações.



Considere por exemplo o sistema formado pelas duas equações, cujos gráficos são indicados ao lado:

y = 2x + 2
y = –x + 10

Não é necessário traçar os gráficos para solucionar o sistema, mas é interessante visualizar a solução como a interseção dos gráficos.

Os dois gráficos envolvidos são retas, pois são funções do 1º grau de x em y.

y = 2x + 2
y = –x + 10

2x + 2 = –x + 10
3x = 8
x = 8/3 e y = 22/3.

Note que as posições relativas das retas estão diretamente relacionadas com as soluções do sistema:

Scanned by CamScanner

Retas concorrentes:	Solução única
Retas paralelas:	Sistema impossível
Retas coincidentes:	Sistema indeterminado, infinitas soluções.

Exemplo:
Dê o ponto de interseção das retas $y + 5x + 24 = 0$ e $y + x + 4 = 0$.

Solução:
Basta resolver o sistema
$-5x - 24 = -x - 4$
$5x + 24 = x + 4$
$4x = -20$
$x = -5$
$y = -x - 4 = -1$.

A solução do sistema é o ponto de interseção das retas.

Resposta (–5, –1)

Sistemas impossíveis

É também usado o termo "equações incompatíveis", caso em que é impossível encontrar valores que atendam às equações simultaneamente. Considere um sistema muito parecido com aquele usado como exemplo no tópico anterior:

$$\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 2x + 4y = 11 \end{cases}$$

Este é um ***sistema impossível*** (S.I). Note que o primeiro membro da segunda equação é o dobro do primeiro membro da primeira ($2x + 4y$ é o dobro de $x + 2y$). Entretanto, o segundo membro da segunda equação não é o dobro do segundo membro da primeira equação (11 não é o dobro de 5). Isto é uma contradição que resulta em um sistema impossível. Nesse exemplo, se subtrairmos da segunda equação, o dobro da primeira, ficaremos com $0 = 1$, o que é impossível.

$$\begin{cases} -2x - 4y = -10 \\ 2x + 4y = 11 \end{cases}$$

$$0 = 1$$

Chamando de A, B, C, A', B' e C' os coeficientes das equações, na forma:

$$\begin{cases} Ax + By = C \\ A'x + B'y = C' \end{cases}$$

O sistema será impossível se: $\frac{A}{A'} = \frac{B}{B'} \neq \frac{C}{C'}$, sendo C e C' diferentes de zero.

Para C e C', valores como 1 e 0, ou 0 e 1 (ou qualquer outro valor diferente de 1) também são impossíveis.

Scanned by CamScanner

Retas paralelas

As equações que formam um sistema impossível são representadas por retas paralelas, ou seja, não existe um ponto (x, y) que esteja simultaneamente nas duas retas.



O fato de termos A/A' = B/B' implica que as retas tenham a mesma inclinação, mas o fato deste valor ser diferente de C/C' implica que as retas sejam diferentes, a retas paralelas diferentes não possuem um ponto de encontro.

Sistemas indeterminados

Um sistema linear com **n** incógnitas precisa de **n** equações independentes para determinar a sua solução. Considere por exemplo o seguinte sistema de 2ª ordem:

$$\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 2x + 4y = 10 \end{cases}$$

Para encontramos duas incógnitas, precisamos de duas equações independentes, ou seja, duas informações. Ocorre que neste caso, a segunda equação não traz uma nova informação, pois esta nada mais é que a primeira equação escrita de uma outra forma. É óbvio que se **x + 2y** vale 5, então o seu dobro, que é **2x + 4y**, valerá 10. Portanto a segunda equação não fornece uma informação nova. A pesar de existirem duas equações, a segunda não conta, pois é na verdade uma espécie de "repetição" da segunda.

Sendo assim, o sistema fica indeterminado, ou seja, não há equações suficientes para determinar os valores de x e y.

Nesse exemplo, o sistema admite infinitas soluções, ou seja, é um ***sistema possível indeterminado*** (S.P.I). Podemos citar algumas soluções, como x = 1 e y = 2, ou x = –15 e y = 10, ou x = 0 e y = 2,5, e ainda infinitas outras.

Para que um sistema linear 2x2 seja indeterminado, é preciso que uma equação seja múltipla da outra, ou seja, tem que existir um fator k, tal que os termos da segunda sejam iguais a k vezes os termos da primeira. No nosso exemplo, vemos que os termos da 2ª equação são iguais ao dobro dos termos correspondentes na primeira, ou seja, k = 2. Também é correto dizer que os termos da primeira são a metade dos termos da segunda, nesse caso, teríamos k = 0,5.

Uma outra forma de definir a condição para que um sistema 2x2 seja indeterminado é a seguinte: chamando de A, B, C, A', B' e C' os coeficientes das equações, na forma:

$$\begin{cases} Ax + By = C \\ A'x + B'y = C' \end{cases}$$

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner



Sendo assim, a segunda reta não traz informação nova, é a mesma coisa que fornecer uma única equação (uma única reta, ou duas retas coincidentes). O gráfico das equações de um sistema como este é formado por duas retas coincidentes, ou seja, todos os pontos são soluções.

Exercícios

E14) Classifique os sistemas abaixo como determinado, indeterminado ou impossível

a) $\begin{cases} 5x - 5y = 10 \\ x - y = -3 \end{cases}$

b) $\begin{cases} -3x + 3y = 12 \\ 3x + 9y = 30 \end{cases}$

c) $\begin{cases} -2x - 5y = 10 \\ -10x - 10y = -30 \end{cases}$

d) $\begin{cases} -3x + 6y = -15 \\ x - 2y = 5 \end{cases}$

e) $\begin{cases} x + 3y = -1 \\ 10x + 6y = -10 \end{cases}$

f) $\begin{cases} -6x + 4y = 12 \\ -3x - y = 26 \end{cases}$

g) $\begin{cases} -9x - 5y = -19 \\ 3x - 7y = -11 \end{cases}$

h) $\begin{cases} -5x + 4y = 4 \\ -7x - 10y = -10 \end{cases}$

i) $\begin{cases} 3x + 7y = -8 \\ 4x + 6y = -4 \end{cases}$

j) $\begin{cases} -4x - 5y = 12 \\ -8x - 10 = 30 \end{cases}$

k) $\begin{cases} 8x + 7y = -24 \\ 6x + 3y = -18 \end{cases}$

i) $\begin{cases} -7x + 10y = 13 \\ 4x + 9y = 22 \end{cases}$

m) $\begin{cases} x - y = 10 \\ 2x - 2y = 21 \end{cases}$

n) $\begin{cases} x - 4y = 12 \\ -2x + 8y = -24 \end{cases}$

o) $\begin{cases} 6x + 3y = 12 \\ 6x - 3y = 0 \end{cases}$

E15) Determine o valor de k para que o sistema abaixo não tenha solução

$$\begin{cases} -kx - 3y = 7 \\ 2x - 5y = 3 \end{cases}$$

(A) 2 (B) 5 (C) 3 (D) –0,8 (E) –1,2

E16) Determine os valores de m e p para que o sistema abaixo seja indeterminado

$$\begin{cases} mx - 3y = 2 \\ 2x + 6y = p - 3 \end{cases}$$

E17) Calcular p e k para que o sistema abaixo seja indeterminado

$$\begin{cases} x - py = 1 \\ 2x + y = k \end{cases}$$

E18) Calcule m e p para que o sistema abaixo seja impossivel

$$\begin{cases} 3x + 2y = 4m + 4 \\ 6x - (p - 2)y = 1 \end{cases}$$

E19) Determine k de modo que as equações abaixo sejam incompatíveis

Scanned by CamScanner

$$\begin{cases} (8k - 13)x + 5y = 10k + 8 \\ 7x - 2y = 12k + 14 \end{cases}$$

E20) Determine os valores de a e b para que o sistema abaixo seja impossível

$$\begin{cases} 3x - ay = 6 \\ 2x + 4y = a + 2b \end{cases}$$

E21) Determine k para que o sistema abaixo seja indeterminado

$$\begin{cases} 4x + ky = 14 \\ kx + 9y = 21 \end{cases}$$

E22) Calcular os valores de a e b para que o sistema abaixo seja indeterminado

$$\begin{cases} ax + 12y = 15 \\ 12x - 16y = b \end{cases}$$

E23) Determine m de modo que o sistema abaixo tenha uma infinidade de soluções

$$\begin{cases} mx - 6y = 5m - 3 \\ 2x + (m - 7)y = 29 - 7m \end{cases}$$

E24) Determine m de modo que o sistema abaixo não tenha solução

$$\begin{cases} m(x + y) = 5 - y \\ m(y + x + 1) = 12 - 2(3x + 2y) \end{cases}$$

Exercícios de revisão

OBS.: Em geral vale a pena simplificar uma equação, dividindo todos os seus valores por um mesmo número inteiro. O resultado é que ficarão números menores, de cálculo mais fácil.

OBS.: Em geral vale a pena multiplicar toda uma equação por um mesmo número inteiro, para evitar as frações, tornando o cálculo mais fácil.

E25) Resolver os sistemas

a) $\begin{cases} 2x + y = 1 \\ 7x + 8y = 19 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 7x/6 + 5y/3 = -64 \\ 7x/8 + y/8 = 33 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 10x + 4y = 2 \\ 20y - 5x = 5 \end{cases}$

d) $\begin{cases} 2x - 6y = -22 \\ -3x + 18y = 78 \end{cases}$

e) $\begin{cases} 3x - y = 1 \\ 2y - x = 8 \end{cases}$

f) $\begin{cases} x/9 + y/7 = 1/21 \\ x/12 - y/8 = -5/24 \end{cases}$

g) $\begin{cases} 12x + 6y = 48 \\ -2x + 7y = 16 \end{cases}$

h) $\begin{cases} x - 3y = 4 \\ 5x + 2y = 8 \end{cases}$

i) $\begin{cases} x - 3y = 1 \\ 3x/4 - y = 2 \end{cases}$

j) $\begin{cases} -2y + x = 4 \\ x - y/2 = -2 \end{cases}$

k) $\begin{cases} -8x + 3y = 17 \\ 7x + 8y = 34 \end{cases}$

l) $\begin{cases} x/y = 3/4 \\ 5x - 4y = -3 \end{cases}$

m) $\begin{cases} 1/x + 1/y = 7 \\ x/2 + y/3 = 3xy \end{cases}$

n) $\begin{cases} 6/x + 2/y = 3 \\ 3/x - 4/y = -1 \end{cases}$

o) $\begin{cases} x - 4y = -3 \\ 3x - 2y = 2 \end{cases}$

Scanned by CamScanner

E26) Resolver os sistemas

a) $\begin{cases} \frac{x+y}{2}-\frac{x-y}{6}=8 \\ \frac{x}{3}+\frac{x+y}{3}=14 \end{cases}$

b) $\begin{cases} \frac{4+x}{5}+\frac{2x-3y}{2}=3x-5 \\ \frac{5x-6}{5}-\frac{2x-5y}{3}=2-5x \end{cases}$

c) $\begin{cases} \frac{x}{4}+\frac{y}{5}=2 \\ \frac{2x+1}{3}-\frac{y-3}{2}=2 \end{cases}$

d) $\begin{cases} \frac{x-2}{3}+\frac{y}{2}=\frac{11}{2} \\ -1+x-\frac{y-1}{2}=4 \end{cases}$

e) $\begin{cases} \frac{x}{3}+\frac{y}{2}=2 \\ \frac{2x+1}{3}+\frac{y-3}{2}=-\frac{1}{6} \end{cases}$

f) $\begin{cases} \frac{x}{a+b}+\frac{y}{a-b}=2a \\ \frac{x-y}{2ab}=\frac{x+y}{a^2+b^2} \end{cases}$

g) $\begin{cases} \frac{10+x}{3}-\frac{3x-y}{4}=2x-5 \\ \frac{5x-3}{2}+\frac{3x-4}{6}=15-3x \end{cases}$

h) $\begin{cases} \frac{x+y}{5}+\frac{x-y}{3}=2 \\ \frac{11x-9y}{17}=5 \end{cases}$

i) $\begin{cases} \frac{x+y}{2}-\frac{3x-4y}{5}=0 \\ \frac{x-3y-1}{5}=\frac{4x-7y+4}{9} \end{cases}$

j) $\begin{cases} a^2x - b^2y = a^2 + ab + b^2 \\ b^2x - a^2y = -ab \end{cases}$

E27) O sistema

$2x - My = 6$
$Px + 4y = 14$

Tem solução x=6 e y=2. Encontre M e P

E28) Resolva o sistema de incógnitas x e y:

$\frac{7}{x}+\frac{2}{y}=5$

$\frac{1}{x}+\frac{4}{y}=-3$

(A) Infinitas soluções
(B) x = 15/7 e y = 15/13
(C) Impossível

Scanned by CamScanner

(D) x = 1 e y = –1
(E) Nenhuma das respostas acima

E29) Se x e y satisfazem ao sistema de equações

$$\frac{1}{2}x + y = 0$$
$$x - y = 3$$

Determine x + y

(A) –2 (B) –1 (C) 0 (D) 1 (E) 2

E30) Sejam x, y e z números reais que satisfazem às equações:

$$x + \frac{1}{yz} = \frac{1}{5} \qquad y + \frac{1}{xz} = -\frac{1}{5} \qquad z + \frac{1}{xy} = \frac{1}{3}$$

Encontre $\frac{z-y}{x-z}$

(A) –1/3 (B) –2 (C) 1/2 (D) –4 (E) 7/15

E31) Resolva o sistema
3x + 2y = 8
5x – 3y = 45

(A) (6, 5) (B) (–6, 5) (C) (6, –5) (D) (–6, 5)

E32) O sistema

$$\begin{cases} 2x - 3y = 4 \\ -4x + 6y = -8 \end{cases}$$

é indeterminado. Dê uma de suas soluções

E33) Determine o valor de ***a*** para que o sistema tenha uma única solução

$$\begin{cases} \sqrt{2}ax + 10y = 30 \\ \sqrt{8}x + 5y = 23 \end{cases}$$

E34) Determinar os parâmetros ***a*** e ***b*** de modo que o sistema abaixo seja indeterminado.

$$\begin{cases} ax - by = 4 \\ 3x + 5y = 1 \end{cases}$$

E35) Qual é o valor negativo de ***a*** que torna indeterminado o sistema:

$$\begin{cases} a^2x - 3y = 3 + x \\ ax + 2y + 2 = 0 \end{cases}$$

E36) Determine ***k*** para que o sistema abaixo seja indeterminado

$$\begin{cases} mx + (k-2)y = k \\ (k+2)x + 3y = 1 \end{cases}$$

Scanned by CamScanner

E37) Calcule m e p de modo que o sistema abaixo seja indeterminado

$$\begin{cases} 6x + (m-1)y = 4 \\ 9x - 2y = p + 1 \end{cases}$$

E38) No sistema abaixo

$$\begin{cases} kx - 2y = k + 2 \\ 3x + (5-k)y = 2k + 2 \end{cases}$$

Determine k de modo que:

a) as equações sejam incompatíveis

b) o sistema seja indeterminado

E39) Determine k para que no sistema abaixo, os valores x e y sejam iguais

$$\begin{cases} kx - 6y = k - 1 \\ 2x + 3y = 11 \end{cases}$$

E40) Determine k para que o sistema abaixo seja indeterminado

$$\begin{cases} kx - 6y = 5k - 3p \\ (k-4)x + 2y = 4k + 3 \end{cases}$$

E41) Determine a para que o sistema abaixo seja impossível

$$\begin{cases} 2x + 3y = -1 \\ a^2x + 6y = a \end{cases}$$

E42) Determine m de modo que as equações abaixo sejam compatíveis

$$\begin{cases} mx + y = 1 \\ x + y = 2 \\ x - y = m \end{cases}$$

E43) Para quais valores de a e b o sistema abaixo é indeterminado?

$$\begin{cases} 2x - 3y = a \\ 4x + by = 10 \end{cases}$$

E44) Calcule o valor de m para que o sistema abaixo seja impossível

$$\begin{cases} mx + 2y = 7 \\ 13x + 26y = 9 \end{cases}$$

E45) Determine k de modo que o sistema abaixo seja indeterminado

$$\begin{cases} 3x = ky \\ 12y = kx - 1 \end{cases}$$

E46) Qual é o valor do parâmetro m de modo que os sistemas abaixo sejam equivalentes?

$$\begin{cases} mx - 2my = 1 \\ mx + 3my = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = a \\ y = -a \end{cases}$$

Scanned by CamScanner

E47) Determine os valores de a e b que tornam equivalentes os sistemas

$$\begin{cases} 2/y = 1/(x - y) \\ y - (x + y)/6 = 7/6 \end{cases}$$

e

$$\begin{cases} 3x + by = 19 \\ ax + by = 16 \end{cases}$$

E48) Calcule m e p de forma que o sistema seja impossível

$$\begin{cases} 3x + 2y = 4m + 1 \\ 6x - (p + 2)y = 1 \end{cases}$$

E49) A soma de três números inteiros e consecutivos é igual a S. Sendo x o menor desses três números, então tem-se:

(A) $S = 3(x + 1)$ (B) $S = 3(x - 1)$ (C) $S = 3x + 1$ (D) $S = 6x$ (E) $S = 3x$

E50) A sentença $\frac{x}{2} - \frac{y-1}{3} = 1$ também pode ser escrita da forma:

(A) 3x+2y–4=0 (B) 3x–2y+4=0 (C) 3x–2y–4=0 (D) 3x+2y+4=0 (E) 3x–2y–8=0

E51) Dividindo-se 70 em três partes, de modo que a primeira esteja para a segunda assim como 2 está para 3, e que a segunda esteja para a terceira assim como 4 está para 5, o valor da terceira parte é:

(A) 16 (B) 20 (C) 24 (D) 30 (E) NRA

E52) O produto de dois números é 1125. Adicionando 3 unidades ao multiplicando, o produto passa a ser 1260. O maior dos dois números é:

(A) 65 (B) 55 (C) 45 (D) 35 (E) 35

E53) O dobro do número que aumenta 144 unidades quando se acrescenta um zero à sua direita é:

(A) 72 (B) 54 (C) 48 (D) 36 (E) 32

E54) A diferença entre dois números é 24. Somando-se 5 unidades a cada um deles, o maior torna-se o quádruplo do menor. O maior número é:

(A) 27 (B) 30 (C) 40 (D) 50 (E) NRA

E55) Sejam a e b dois números naturais consecutivos. Se $1/a + 1/b = 13/42$, então o maior deles é:

(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7 (E) 8

E56) A interseção das retas $\frac{x}{3} - \frac{3y}{5} + 4 = 3$ e $\frac{1}{2x-3y} - \frac{8}{3} = -3$ é o par ordenado:

(A) (1, 2) (B) (6, 5) (C) (1, –6) (D) (6, –5) (E) NRA

E57) Existem alguns números de 4 algarismos com as seguintes características:

1ª) Os dois algarismos do meio são iguais

Scanned by CamScanner

2ª) O número formado pelos dois algarismos da direita é o dobro do número formado pelos dois algarismos da esquerda. Exemplo: 1224.
Escreva o maior deles

E58) Sabendo-se que $4x - y = 5$ e que $2x - 3y = 1/2$, calcule $x + y$.

E59) Um número inteiro N é composto de três algarismos cuja soma é 21. Trocando-se a posição do algarismo das unidades com o das dezenas, o novo número formado é 45 unidades maior que N. Calcule N.

E60) Sabendo que $x/y = 0{,}5$; $y = 0{,}76$ e $x + y + z = 7{,}14$, determine o valor numérico de z.

E61) Resolva o sistema

$$\begin{cases} \dfrac{x-3}{2} - \dfrac{y-1}{4} = 0 \\ \dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{y} = 0 \end{cases}$$

E62) Qual dos sistemas abaixo tem (4, 3) como solução?

(A) $\begin{matrix} 4x + 3y = 25 \\ 4x + 3y = 12 \end{matrix}$ (B) $\begin{matrix} 5x + y = 23 \\ x + 5y = 19 \end{matrix}$ (C) $\begin{matrix} x^2 - 2x - y = 5 \\ x - 2y = -2 \end{matrix}$

(D) A e B (E) B e C

E63) Uma fração e tal que seu denominador é uma unidade menor que o dobro do numerador. Se adicionamos 7 a ambos os termos da fração original, a fração resultante será equivalente a 7/10. Encontre a fração original.

(A) 7 (B) 7/13 (C) 0/3 (D) Não há informação suficiente

E64) Calcule $\mathbf{a^3 + b^3}$, sabendo que a e b são soluções do sistema

$$\begin{cases} x - 2y = 3 \\ 2x + y = 1 \end{cases}$$

(A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1 (E) 0

E65) Resolver

$$\begin{matrix} w + x + y = 4 \\ x + y + z = -5 \\ y + z + w = 0 \\ z + w + x = -8 \end{matrix}$$

E66) Quantas soluções tem o sistema?

$$\begin{cases} 35x + 2y = 5 \\ 2x - 35y = 7 \end{cases}$$

E67) Se $(1/2)a - 2(a + 1) = a$ e $b + (1/3)(b - 1) = 1$, encontre $a + b$

(A) –1 (B) 0 (C) 1/5 (D) 3/5 (E) NRA

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Exemplos:

E79) CN 2005 - Seja S o sistema:

$$\begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ 3x + 2y = 9 \\ ax + by = c \end{cases}$$

É correto afirmar, em relação aos parâmetros reais, a, b e c, que:

(A) Quaisquer que sejam, S será possível e determinado.
(B) Existem valores desses parâmetros que tornam S possível e determinado.
(C) Quaisquer que sejam, S será possível e indeterminado.
(D) Existem valores desses parâmetros que tornam S indeterminado.
(E) Quaisquer que sejam, S será impossível.

E80) CMBH 2005 - O par ordenado (a, b) é solução do sistema

$$\begin{cases} \frac{-7x}{8} - \frac{8y}{7} = \frac{18}{5} \\ \frac{-y}{7} + \frac{x}{8} = \frac{-22}{5} \end{cases}$$

Então, a soma **a+b** vale:

(A) –10 (B) –9 (C) –8 (D) 1 (E) 120

E81) EsPCEx 2010 - Para que o sistema linear

$$\begin{cases} 2x + y = 5 \\ ax + 2y = b \end{cases}$$

seja possível e indeterminado, o valor de **a + b** é:

(A) –1 (B) 4 (C) 9 (D) 14 (E) 19

E82) CN 2013 - Dado que a e b são números reais não nulos, com b≠4a, e que:

$$\begin{cases} 1 + \frac{2}{ab} = 5 \\ \frac{5 - 2b^2}{4a - b} = 4a + b \end{cases}$$

qual é o valor de $16a^4b^2 - 8a^3b^3 + a^2b^4$?

(A) 4 (B) 1/18 (C) 1/12 (D) 18 (E) 1/4

E83) EPCAR 2011 - Considere três números naturais a, b e c, nessa ordem. A soma desses números é 888, a diferença entre o primeiro e o segundo é igual ao terceiro. O terceiro deles excede o segundo em 198. O valor da diferença entre o primeiro e o terceiro é tal que excede 90 em

(A) 23 (B) 33 (C) 43 (D) 53

Scanned by CamScanner

Respostas dos exercícios

E1)
a) x = 10 e y = 10
b) x = 7 e y = 5
c) x = 1 e y = 2
d) x = 2 e y = 1
e) x = 3 e y = 4
f) x = –2 e y = 1
g) x = 3 e y = 3
h) x = 5 e y = –3
i) x = 2 e y = 0
j) x = –1 e y = 1
k) x = 0 e y = 1
l) x = 2 e y = 1
m) x = 3 e y = 2
n) x = –3 e y = 2
o) x = 0 e y = 0

E2)
a) x = –2 e y = 4
b) x = 8 e y = 10
c) x = –3 e y = –5
d) x = –2 e y = –9
e) x = 0 e y = 4
f) x = 8 e y = 2
g) x = 4 e y = 6
h) x = –2 e y = 3
i) x=–120/17 e y=212/17
j) x = –2 e y = 18
k) x = 1 e y = –1
l) x = –1 e y = –3
m) x = –8 e y = 9
n) x = –2 e y = 1
o) x = 2 e y = 4

E3)
a) Indeterminado
b) x = 2 e y = –2
c) x = –3 e y = 6
d) x = 1 e y = –2
e) x = –1 e y = 0
f) x=–58/9 e y=–20/3
g) x = 1 e y = 2
h) x = 0 e y = 1
i) x = 2 e y = –2
j) x = –3 e y = 0
k) x = –3 e y = 0
l) x = 4 e y = 3
m) x = 5 e y = 7
n) Indeterminado
o) x = 1 e y = 2

E4)
a) x = 4 e y = 5
b) x = –2 e y = 3
c) x = –1 e y = –3
d) x = 2 e y = 2
e) x = 1/2 e y = 5/2
f) x = –12/5 e y = –16/5
g) x = –10 e y = 4
h) x = 1 e y = 5
i) x = 9 e y = 6
j) x = 2 e y = –5
k) x = 1/16 e y = 9/16
l) x = –17/2 e y = 27/2
m) x = 0 e y = –4
n) x = –35 e y = 9
o) x = 9/7 e y = 1/7

E5)
a) x = 1 e y = 2
b) x = 3 e y = 5
c) x = 4 e y = 3
d) x = 5 e y = 2
e) x = –3 e y = 4
f) x = 2 e y = 3
g) x = 4 e y = –2
h) x = 3 e y = –5
i) x = 7 e y = –1
j) x = –2 e y = 6
k) x = 5 e y = 3
l) x = 2 e y = 4
m) x = –3 e y = –4
n) x = 3 e y = 1
o) x = 2 e y = –1

E6)
a) x = 3 e y = 0
b) x = 1 e y = 2
c) Impossível
d) x = 2 e y = –2
e) x = 2 e y = 6
f) x = –1 e y = 5
g) x = 8 e y 14/5
h) x = 2 e y = 3
i) x = –4 e y = 1
j) x = 5 e y = –4
k) x = 3 e y = 5
l) x = –2 e y = 1/2
m) x = –5 e y = 30
n) x = –1 e y = –4
o) x = 2 e y = 1

E7)
a) x = 1 e y = 0
b) x=16/27 e y=–1/27
c) x = 53/51 e y = 14/51
d) x = 1 e y = –1
e) x = 23/43 e y = 15/43
f) x = –2/7 e y = 5/7
g) x = –8 e y = 7/2
h) x = 26/31 e y = –1/31
i) x = 136/41 e y = 25/41
j) x = 18/29 e y = 25/232

E8)
a) x = 2 e y = 4
b) x = –4 e y = 3
c) x = 18 e y = 6
d) x = 4 e y = 5
e) x = –2 e y = 6
f) x = 1/2 e y = 1/3
g) x = 1 e y = 1
h) x = 3 e y = 4
i) x = 4 e y = 1
j) x=a/(a–b) e y=b/(a+b)

E9) Mesmas respostas do E7.

E10)
a) $x = \frac{a+b}{a-b}$ e $y = \frac{b}{a-b}$
b) $x = \frac{a}{b}$ e $y = \frac{1}{b}$
Sugestão: Multiplique a 2ª equação por b e some as duas equações, eliminando y e encontrando x. Substitua o valor de x encontrado em uma das equações e encontre y.
c) $x = m+n$ e $y = m-n$
Sugestão deixar m+n e m–n indicados até o final de
f) $x = y = a+b$
g) $x = \frac{m-1}{m+1}$ e $y = -\frac{m-7}{m+1}$
h) $x = b$ e $y = a$

Scanned by CamScanner

cada equação.

d) $x=\frac{m}{m-n}$ e $y=\frac{n}{m+n}$

e) $x=\frac{a+b+c}{ad}$, $y=\frac{a+b+c}{bd}$, $z=\frac{a+b+c}{cd}$

i) $x=a-2b+3c$ e $y=a+2b-3c$

j) $x=\frac{c+d}{2(a+b)}$ e $y=\frac{c-d}{2(a-b)}$

E11) a) x = 1, y = 2, z = 3
b) x = 9, y = –2, z = –5
c) x = 2, y = 3, z = 5
d) x = 3, y = 1, z = –2
e) x = 2, y = –1, z = 3
f) x = 3, y = 3, z = 2
g) x = –1, y = 2, z = –4
h) Indeterminado
i) Impossível
j) x=1, y=2, z=3, t=4

E12) a) x = 5, y = –4, z = 2
b) x = 3, y = –2, z = 4
c) x = 5, y = –4, z = –3
d) x = 2/(a+b–c), y = 2/(a–b+c) e z = 2/(–a+b+c)
e) x = 2, y = –2, z = 1
f) x = 9, y = 5, z = –7
g) x = 5, y = 3, z = 6
h) x = –2, y = 0, z = 5
i) x = 1, y = –5, z = 8
j) x = 1/2, y = 1, z = 3/2

E13) a) x = 12 e y = 8
b) x = 1/4 e y = 1/3 Sugestão: Substituir a=1/x e b=1/y, ficando com um sistema linear.
c) x = 8, y = 8, z = 12 Elimine os denominadores ficando com sistemas lineares de 3 equações
d) x = 3 e y = 2 Sugestão: igualar os denominadores respectivamente a **a** e **b**, chegando a um sistema sem frações.
e) x = 2a/(m – p), y = 2b/(p + n), z = 2c/(n – m)

E14) a) Impossível
b) Determinado
c) Determinado
d) Indeterminado
e) Determinado
f) Determinado
g) Determinado
h) Determinado
i) Determinado
j) Impossível
k) Determinado
l) Determinado
m) Impossível
n) Indeterminado
o) Determinado

E15) (E) **E16)** m=p=–1 **E17)** p = –1/2 e k = 2 **E18)** m ≠ –7/8 e p = –2

E19) k = –9/16 **E20)** a = –6, b ≠ 5 **E21)** k = –6 **E22)** a = –9, b = –20

E23) m = 3 **E24)** m = –2

E25) a) x = 3, y = –5
b) x = 48, y = –72
c) x = 1/11, y = 3/11
d) x = 4, y = 5
e) x = 2, y = 5
f) x = –12/13, y = 41/39
g) x = 5/2, y = 3
h) x = 32/17, y = –12/17
i) x = 4, y = 1
j) x = –4, y = –4
k) x = –2/5, y = 23/5
l) x = 9, y = 12
m) x = 1/3, y = 1/4
n) x = 3, y = 2
o) x = 7/5, y = 11/10

E26) a) x = 20, y = 2
b) x = –73/75, y = 1888/375
c) x = 4, y = 5
d) x = 8, y = 6
e) x = –3, y = 6
f) $x=(a+b)^2$, $y=(a-b)^2$
g) x = 103/36, y = –613/108
h) x = 2, y = –7
i) x = –377/135, y = –29/135
j) x = a/(a – b), y = b/(a = b)

Sugestão: Somar as equações e simplificar, subtrair as equações e simplificar, ficando com um sistema equivalente e mais simples.

Scanned by CamScanner

E27) M = 3, P = 1 E28) (D) E29) (D) E30) (D) E31) (C)

E32) Qualquer solução (x, y) de tal forma que tenhamos $y = (2x - 4)/3$. Por exemplo, se $x = 5$, $y = 2$.

E33) $a \neq 4$ E34) $a = 12$, $b = -20$ E35) -2

E36) $k = -1$ (e também $m = -1$) E37) $m = -1/3$, $p = 7$

E38) a) $k = 6$ ou $k = -1$ b) Não existe k que torne o sistema indeterminado

E39) $k = 61/6$ E40) $k = 3$, $p = 20$ E41) $a = 2$

E42) $m = 0$ ou $m = -1$ E43) $a = 5$, $b = -6$ E44) $m = 1$

E45) Nenhum valor de k tornará o sistema indeterminado

E46) Não existe valor de m que torne as equações equivalentes com essas soluções.

E47) $a=2$, $b=5$ E48) $p=-6$, $m \neq -1/8$ E49) (A)

E50) (C) E51) (D) E52) (C) E53) (E) E54) (A)

E55) (D) E56) (B) E57) 4998 E58) 7/4 E59) 849

E60) $z = 6$ E61) $x = y = 5$ E62) (E) E63) (B) E64) (E)

E65) $x=-3$, $y=5$, $z=-7$, $w=2$ E66) uma E67) (C) E68) (E)

E69) (C) E70) (B) E71) (D) E72) (E) E73) 5/2

E74) $x=-1$, $y=3$, $z=-2$ E75) (E) E76) $x=5$, $y=2$ E77) 28

E78) (B) E79) (B) E80) (C) Sugestão: Subtrair as equações

E81) (D) E82) (E) E83) (B)

Scanned by CamScanner

Capítulo 10

Problemas do primeiro grau

Problema, equação, solução

Resolver um problema do primeiro grau consiste em resolver uma equação ou sistema do primeiro grau. A diferença é que as equações não são fornecidas. Ao invés disso, é apresentada uma "história", a partir da qual as equações devem ser encontradas. Em alguns casos é extremamente fácil encontrar as equações que resolvem o problema, em outros casos pode ser mais difícil. Daí, resolvem-se as equações envolvidas.

Uma etapa final é importantíssima, e muitos alunos erram a questão por distração:

A solução da equação não necessariamente é a solução do problema.

Ou seja, eventualmente alguma etapa adicional deve ser realizada para responder o que o problema pede.

Um exemplo: "a soma dos algarismos do número que resolve o problema é...."

Finalmente, usamos a etapa de verificação, que consiste em conferir a resposta encontrada nos dados do problema original, visando detectar eventuais erros.

Exemplo:
Encontre dois números, sabendo que sua soma é 18 e sua diferença é 8.

Solução:
O problema pede que sejam encontrados dois valores, que são os números envolvidos. Temos então duas incógnitas, por isso precisamos de duas equações. Essas equações devem ser encontradas a partir do enunciado do problema. Neste caso é extremamente fácil encontrar essas equações, pois estão explícitas no enunciado. Chamando os números de x e y temos:

A soma dos números é 18 → $x + y = 18$
A diferença dos números é 8 → $x - y = 8$

Resolvendo o sistema, por adição, ficamos com:

Scanned by CamScanner

$2x = 26$
$x = 13$
$13 + y = 18$
$y = 5$

De fato, $13 + 5 = 18$ e $13 - 5 = 8$.

Resposta: Os números pedidos são 5 e 13

Na maioria das vezes, o enunciado do problema não traz as equações explícitas, mas sim, implícitas. O aluno deverá usar seus conhecimentos do mundo real, e muitas vezes leis da física, para chegar às equações a partir do enunciado.

Exemplo:
Um quintal tem galinhas e cabras, num total de 50 animais. Somando o número de pés de todos os animais, encontramos 120. Qual é o número de animais de cada tipo?

Solução:
Para formar as equações, é preciso levar em conta que as galinhas têm dois pés, e que as cabras têm quatro. Temos aqui duas incógnitas:

x = número de galinhas
y = número de cabras

Observe que esses valores são exatamente o que pede o problema, ou seja, o número de animais de cada tipo.

Como temos duas incógnitas, precisamos de duas equações. O problema dá as duas informações necessárias para obter essas equações:

Número total de animais = 50
Número total de pés = 120

É preciso portanto converter essas duas informações para linguagem matemática, o que resultará nas duas equações das quais necessitamos.

Devemos então exprimir o número de animais e o número de pés matematicamente, ou seja, usando fórmulas em x e y. Neste exemplo é muito fácil:

Número total de animais: $x + y$
Número total de pés: se cada galinha tem dois pés e cada cabra tem 4 pés, então o número total de pés é $\mathbf{2x + 4y}$.

Ficamos assim com o sistema:

$$\begin{cases} x + y = 50 \\ 2x + 4y = 120 \end{cases}$$

Da primeira equação temos $x = 50 - y$, que substituído na segunda resulta em:

$2(50 - y) + 4y = 120$
$100 - 2y + 4y = 120$

Scanned by CamScanner

$2y = 20$
$y = 10$
$x = 50 - y =$
$x = 40$

A solução do sistema é:
$\mathbf{x = 40, y = 10}$

A solução do problema é: 40 galinhas e 10 cabras.

Resposta: 40 galinhas e 10 cabras

Conferindo a solução, calculando o número de animais e de patas:

Animais: $40 + 10 = 50 \rightarrow$ OK
Patas: $2.40 + 4.10 = 120 \rightarrow$ OK

É sempre bom conferir os resultados, checando-os com os dados do problema o que ajuda a detectar eventuais erros de cálculo.

Em concursos, é bom dizer adeus a esse tipo de problema, que é muito fácil. Ainda assim é preciso saber resolvê-los, pois são a base para resolver problemas mais difíceis.

Exemplo:
A soma de dois números é 100, e se o maior for dividido pelo menor, o quociente é 4 e o resto é 5. Determine os números.

Solução:
Chamemos os números de x e y. Tomemos arbitrariamente x como sendo o maior, e y como sendo o menor. Temos então a primeira equação:

$x + y = 100$

A segunda equação vem da informação: "se o maior for dividido pelo menor, o quociente é 4 e o resto é 5", ou seja:

Se x for dividido por y, o quociente é 4 e o resto é 5.

$$\begin{array}{l|l} x & y \\ \underline{5} & 4 \end{array}$$

Isto é o mesmo que dizer: $x = 4y + 5$, que é a nossa segunda equação.

$$\begin{cases} x + y = 100 \\ x = 4y + 5 \end{cases}$$

Na segunda equação temos o valor de x em função de y. Substituímos esta expressão na primeira equação e ficamos com:

$(4y + 5) + y = 100$
$5y = 95$
$y = 19$ e $x = 81$

Scanned by CamScanner

Conferindo o resultado nos dados do problema:

19 + 81 = 100 ➔ OK
81 ÷ 19 = 4, resto 5 ➔ OK

Solução do sistema: 81 e 19
Solução do problema: os números, 81 e 19

Resposta: Os números são 81 e 19

Um problema do primeiro grau recai em um sistema. Em alguns casos, uma única equação resolve o problema, quando um só valor é pedido.

Exemplo:
A pode fazer um trabalho em 6 dias, e B pode fazer o mesmo trabalho em 3 dias. Em quanto tempo A e B trabalhando juntos farão o trabalho?

Solução:
Se A faz o trabalho em 6 dias, então em cada dia, A faz 1/6 do trabalho.
Se B faz o trabalho em 3 dias, então em cada dia, B faz 1/3 do trabalho.

Trabalhando juntos, A e B farão em 1 dia, 1/6 + 1/3 = 1/2 do trabalho.

Logo, o trabalho todo será feito em 2 dias.

Note que neste exemplo, a equação, que é única, está implícita. É o mesmo que dizer que o trabalho será feito em x dias, e que em cada dia é realizado 1/x do trabalho. Mas

1/x = 1/6 + 1/3 ➔ 1/x = 1/2 ➔ x = 2

O caminho para resolver este tipo de problema é lembrar que a fração do trabalho diário que é realizado pelo grupo, é igual à soma das frações do trabalho total que cada participante realiza diariamente. Conhecendo esta fração total, achamos o seu inverso, e teremos o número de dias que o grupo em conjunto necessita para realizar todo o trabalho.

Exercícios

E1) (*) A soma de dois números é 124, e se o maior for dividido pelo menor, o quociente é 4 e o resto é 4. Encontre os números.

E2) A diferença de dois números é 91, e se o maior for dividido pelo menor, o quociente é 8 e o resto é 7. Encontre os dois números.

Alunos da EsPCEx

E3) Dividir o número 320 em duas partes de tal forma que a menor é contida na maior 11 vezes, com um resto de 20.

E4) A diferença entre dois números é 49, e se o maior for dividido pelo menor, o quociente é 4 e o resto é 4. Encontre os números.

Scanned by CamScanner

E5) (*) Uma fração torna-se igual a 1/2 se adicionamos 2 ao seu numerador, e torna-se igual a 1/3 se 3 é adicionado ao denominador. Encontre a fração.

E6) Se o numerador de uma certa fração é aumentado de 2 e seu denominador é reduzido em 1 unidade, a fração torna-se igual a 2. Se o numerador é aumentado do valor do denominador, e o denominador é aumentado de 1, seu valor será 5/4. Encontre a fração.

E7) em uma certa fração própria, a diferença entre o numerador e o denominador é 15. Se o numerador é multiplicado por 4 e o denominador é aumentado de 6, seu valor será igual a 1. Encontre a fração.

E8) (*) A soma dos dois dígitos de um número natural é 9, e se adicionarmos 9 ao número, os dígitos do número vão ser trocados. Encontre o número.

Sugestão: Se os dois dígitos são ***a*** e ***b***, a representação decimal é **ab**, e o valor numérico é **10a** + b. Por exemplo, 37 = 3.10 + 7.

E9) A soma de um número natural de dois dígitos, com o número obtido com a troca dos seus dígitos entre si é 132, e a diferença desses dois números é 18. Encontre os números.

E10) Uma bolsa tem 34 moedas nos valores de R$ 0,05 e R$ 0,50. Determine o número de moedas de cada valor, sabendo que o valor total de todas as moedas juntas é R$ 13,40.

Note que nesses exercícios, as equações estão explícitas no enunciado. Na maioria dos problemas entretanto, as equações não estão explícitas, e o aluno deve usar outros conceitos para obtê-las a partir do enunciado. Passaremos agora a apresentar os métodos de resolução de certos problemas clássicos do primeiro grau. Todos esses problemas que serão abordados são bastante comuns em provas e concursos.

Problemas envolvendo idades

Este é um dos tipos mais comuns entre os problemas do primeiro grau.

Exemplo:
Um filho tem 1/4 da idade do pai. Dentro de 24 anos ele vai ter a metade da idade do pai. Qual é a idade do filho?

Solução:
Tipicamente esse tipo de problema envolve as idades atuais de duas pessoas, que podem ser as incógnitas do problema. São necessárias portanto duas equações, que devem ser obtidas do enunciado do problema. É preciso lembrar que quando uma pessoa envelhece um certo número de anos, a outra também envelhecerá o mesmo número de anos. A diferença entre as idades de duas pessoas permanece constante. Já a razão entre as idades varia sempre. É preciso levar em conta isso ao formar as equações.

Se o filho tem 1/4 da idade do pai, chamando essas idades de x e y, ficamos com a equação:

$y = 4x$

onde x é a idade atual do filho e y é a idade atual do pai.

Daqui a 24 anos, as idades serão:

Scanned by CamScanner

Filho: $x + 24$
Pai: $y + 24$ ou $4x + 24$

Este princípio sempre tem que ser usado nos problemas de idade, ou seja, o aumento das idades é sempre o mesmo para todas as pessoas envolvidas. Não esqueça que x e y são as idades atuais, e não as idades no futuro.

Agora basta usar a última informação do enunciado, de que em 24 anos, o filho terá a metade da idade do pai. Já trocando y por 4x, ficamos com:

$$x + 24 = \frac{1}{2}(4x + 24)$$

$x + 24 = 2x + 12$

$x = 12, y = 48$

Verificando:
Hoje pai tem 48 e filho tem 12 (1/4) : **OK!**
Em 24 anos terão 72 e 36 (1/2) : **OK!**

Problemas do primeiro grau envolvendo idades consistem em formar equações para as idades atuais e para as idades em outra época, seja passado ou futuro, lembrando que os aumentos ou diminuições (no caso do passado), em anos, serão os mesmos, e formar as equações das relações entre as idades nas duas épocas do enunciado.

Exemplo:
A soma das idades de A e B é 30 anos, e dentro do 5 anos a idade de B será igual a 1/3 da idade de A. Encontre as idades.

Solução:
O método é o mesmo, mas ao invés de usar duas incógnitas, usaremos uma só, partindo das informações do enunciado. Isto equivale a usar o método de substituição para ficar com uma só incógnita:

Idade de A: x
Idade de B: $30 - x$

Aqui já estamos usando a informação de que a soma das idades é 30. Assim já "gastamos" uma informação, mas ficamos agora com uma só incógnita.

Idades dentro de 5 anos:
A: $x + 5$
B: $30 - x + 5 = 35 - x$

Usando agora a informação de que a idade de B será 1/3 da idade de A, o que é o mesmo que dizer que a idade de A será igual a 3 vezes a idade de B (assim evitamos frações), ficamos com:

$x + 5 = 3.(35 - x)$

$x + 5 = 105 - 3x$
$4x = 100$

Scanned by CamScanner

$x = 25$

Então as idades de A e B são, respectivamente, 25 e 5

O que o problema pede: as idades atuais!

Resposta: A tem 25 anos e B tem 5 anos.

Verificação: em 5 anos, terão
A: 25 + 5 = 30 anos
B: 5 + 5 = 10 anos

De fato, A ficará com o triplo da idade de B, **OK!**

Exercícios

E11) B tem 1/6 da idade de A. Dentro de 15 anos, a idade de B será 1/3 da idade de A. Encontre as idades.

E12) A soma das idades de A e B é 30 anos, e dentro do 5 anos a idade de B será igual a 1/3 da idade de A. Encontre as idades.

E13) Um pai tem 36 anos, e seu filho tem 1/4 da idade do pai. Dentro de quantos anos a idade do filho vai ser igual à metade da idade do pai?

E14) A tem 60 anos e B tem 2/3 da idade de A. Dentro de quantos anos B terá 1/5 da idade de A?

E15) (*) Um filho tem 1/3 da idade do seu pai. Há quatro anos atrás, ele tinha apenas 1/4 da idade do pai. Qual é a idade de cada um hoje?

E16) A tem 50 anos e B tem a metade dessa idade. Dentro de quantos anos B terá 2/3 da idade de A?

E17) B tem a metade da idade de A. Há 10 anos atrás B tinha 1/4 da idade de A. Quais são suas idades atuais?

E18) A soma das idades de um pai e filho é 80 anos. Dentro de 5 anos o filho terá 1/4 da idade do pai. Quais são suas idades hoje?

E19) Maria é 18 anos mais velha que seu filho. Há um ano atrás, ela era 3 vezes mais velha que seu filho. Qual é a idade dela hoje?

E20) (*) Um pai tem o triplo da idade do seu filho, e sua filha é 3 anos mais nova que o irmão. Se a soma de todas as idades há 3 anos atrás era 63 anos, encontre a idade atual do pai.

Problemas de torneiras

Este é um problema clássico, muito comum em provas de concursos, que resulta em uma equação do primeiro grau, porém muitas vezes pode ser resolvido usando a "fórmula geral das torneiras":

Scanned by CamScanner

Se existem n torneiras que podem encher um tanque, cada uma delas em um tempo T_i (onde i é o número da torneira), o tempo para que todas elas juntas encham o mesmo tanque é dado pela fórmula:

$$1/T = 1/T1 + 1/T2 + ... + 1/Tn$$

Observe que para usar a fórmula não é necessário conhecer a capacidade do tanque, apenas o tempo necessário para cada uma delas sozinha encher o tanque.

A fórmula pode ser demonstrada facilmente somando as vazões das torneiras. Vazão é a quantidade de água que sai da torneira a cada unidade de tempo. A vazão pode ser calculada dividindo a capacidade do tanque pelo tempo para encher aquela capacidade.

Por exemplo, se uma torneira enche um tanque de 1000 litros em 2 dias, a vazão será:

1000 litros ÷ 2 dias = 500 litros por dia.

Ou seja, conhecendo a capacidade C do tanque, e o tempo T_i para uma torneira enchê-lo, a vazão relativa a esta torneira é C/T_i.

Se várias torneiras estiverem enchendo o tanque ao mesmo tempo, a vazão total será a soma das vazões:

$$V = C/T_1 + C/T_2 + C/T_3 + ... + C/T_n$$

Mas esta vazão total também pode ser calculada como sendo a capacidade do tanque (C) dividida pelo tempo (T) para as torneiras juntas encherem o tanque, que vale C/T.

$$C/T = C/T_1 + C/T_2 + C/T_3 + ... + C/T_n$$

Simplificando por C (ou seja, a capacidade do tanque não precisa ser dada), ficamos com:

$$1/T = 1/T_1 + 1/T_2 + 1/T_3 + ... + 1/T_n$$

Isto demonstra a "fórmula das torneiras". Note que ele só pode ser usada quando todas as torneiras são abertas e fechadas juntas. A fórmula não pode ser usada em problemas como "abrir somente a primeira durante duas horas, e depois abrir também a segunda...".

Exemplo:
Três torneiras são capazes, cada uma delas, de encher um tanque em respectivamente 2, 3 e 6 horas. Se forem abertas as três juntas, em quanto tempo o tanque será cheio?

Solução:
Este problema pode ser resolvido pela fórmula das torneiras, pois todas são abertas ao mesmo tempo e trabalham juntas até encher o tanque. Os tempos de enchimento do tanque por cada torneira são:

T1 = 2h, T2 = 3 h e T3 = 6h. Então:

$$\frac{1}{T} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}$$

Scanned by CamScanner

$$\frac{1}{T} = \frac{3+2+1}{6} = \frac{6}{6} = 1$$

$T = 1h$

Resposta: 1 hora

Os "problemas de torneiras" não precisam necessariamente lidar com tanques, reservatórios e torneiras. Certos problemas que lidam com elementos diferentes, porém matematicamente semelhantes, podem ser resolvidos por métodos semelhantes ao usado nos problemas relativos a torneiras.

Exemplo:
A pode fazer um serviço em 3 dias, **B** em 5 dias e **C** em 6 dias. Quanto tempo levará para que realizem o mesmo serviço, trabalhando juntos?

Solução:
Este problema é análogo a um problema de torneiras, no qual as torneiras A, B e C enchem o mesmo tanque, respectivamente em 3, 5 e 6 dias, e é pedido em quanto tempo as três torneiras juntas enchem o tanque. Nesse caso até mesmo a "fórmula das torneiras" pode ser usada, mas vamos resolvê-lo usando o conceito de "trabalho diário".

A faz o serviço em 3 dias ➔ **A** trabalha S/3 por dia, onde S é o total do serviço
Analogamente:

B faz o serviço em 5 dias ➔ **A** trabalha S/5 por dia
C faz o serviço em 6 dias ➔ **A** trabalha S/6 por dia

A cada dia, A, B e C juntos, farão no total, S/3 + S/5 + S/6 = 21S/30 = 7S/10

Para saber o número de dias (tempo) basta dividir o trabalho total (S) pelo trabalho realizado por dia (7S/10):

S ÷ (7S/10) = 10/7 dia

Resposta: 10/7 dia

Infelizmente, nem sempre esta fórmula pode ser usada diretamente. Aplica-se somente quando as torneiras operam juntas, do início ao fim.

Exemplo (CMRJ 2006)
Uma torneira enche um tanque em 12 minutos, enquanto que uma segunda torneira gasta 18 minutos para encher o mesmo tanque. Com o tanque inicialmente vazio, abre-se a primeira torneira durante x minutos. Ao fim desse tempo, fecha-se essa torneira e abre-se a segunda, a qual termina de encher o tanque em $x + 3$ minutos. Então, o tempo gasto para encher o tanque é, em minutos:

(A) 12 (B) 15 (C) 18 (D) 20 (E) 24

Solução:
A conhecida "fórmula das torneiras" não pode ser usada aqui, pois é válida apenas para torneiras que operam juntas do instante em que o tanque está vazio, até ficar totalmente cheio.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Exercícios

E21) (*) Uma cisterna possui três torneiras. A primeira é capaz de encher o tanque em 12 horas, a segunda em 20 horas, e as três juntas enchem o tanque em 6 horas. Quanto tempo a terceira torneira sozinha levará para encher a cisterna?

E22) (*) Um tanque tem 3 torneiras, sendo que duas podem enchê-lo por completo em 3 e 4 horas, respectivamente, e uma terceira que o esvazia em 6 horas. Em quanto tempo o tanque será cheio com as três torneiras operando simultaneamente?

E23) Um tanque possui três torneiras que o enchem respectivamente em 1h 40 min, 3 h 20 min e 5 horas. Em quanto tempo as três torneiras, operando juntas, encherão o tanque?

E24) Uma cisterna possui três torneiras. A primeira é capaz de encher o tanque em 12 horas, a segunda em 20 horas, e as três juntas enchem o tanque em 6 horas. Quanto tempo a terceira torneira sozinha levará para encher a cisterna?

E25) A pode fazer um trabalho em 5 dias, B em 4 dias, e C em 3 dias. Em quanto tempo os três farão o trabalho juntos?

E26) Um tanque pode ser cheio por uma torneira em 20 minutos, ou por outra, que leva 30 minutos. Quanto tempo as duas torneiras juntas levarão para encher o tanque:

E27) Haroldo faz um certo trabalho doméstico em 10 horas, mas sua esposa Cecília é capaz de fazer o mesmo em apenas 8 horas. Se fizerem todo o trabalho juntos, quanto tempo levarão?

E28) Uma piscina tem duas bombas d'água para enchê-la. Uma delas enche a piscina em 4 horas e meia, mas trabalhando em conjunto com outra bomba, a piscina enche em apenas 2 horas. Em quanto tempo a segunda bomba enche a piscina?

E29) (*) Sebastião demora 3 horas a mais que Jaime para cortar a grama de um grande campo. Juntos eles cortam toda a grama em 2 horas. Quanto tempo cada um deles, trabalhando sozinho, leva para cortar toda a grama?

E30) Um tanque d'água tem uma torneira que o enche em 8 horas, e um ralo que o esvazia em 16 horas. Depois de uma limpeza, esqueceram o ralo aberto, e a torneira para enchê-lo foi ligada. Em quantas horas o tanque ficará cheio?

Diagramas - "entendeu ou quer que eu desenhe? "

É uma piada bem conhecida, para chamar uma pessoa de, digamos, "intelectualmente deficitária", usar a expressão "entendeu ou quer que eu desenhe?". De fato, quando representamos uma situação através de um desenho, o entendimento fica bem mais fácil. Isso não significa que pessoas inteligentes devem entender tudo seu usar desenho, mas o fato é que quando acrescentamos um desenho ou uma representação gráfica qualquer, a compreensão é facilitada. Não significa que as pessoas devem se sentir "burras" quando usam desenhos ou diagramas nos problemas de matemática. Muito pelo contrário, esta prática deve ser incentivada.

Nos problemas de matemática é importante entender não só as fórmulas, mas também, visualizar o que está se passando, para que se tenha um bom entendimento do problema. Recomendamos que na resolução desses problemas, o aluno faça um desenho que ilustre o raciocínio matemático. No caso dos problemas de torneiras, não é para desenhar caixas d'água

Scanned by CamScanner

e torneiras, mas retângulos que representem a capacidade, nos quais a base representa o tempo de enchimento e a altura represente a vazão.

Considere por exemplo um reservatório que pode ser cheio com duas torneiras, T1 e T2, que o enchem respectivamente em 4 horas e 6 horas, e desejamos saber o tempo necessário para que as duas torneiras o encham juntas. Usando a "fórmula das torneiras", é fácil determinar a resposta:

$1/t = 1/t_1 + 1/t_2 = 1/4 + 1/6$

$t = 2{,}4$ horas

Muito mais importante que aplicar a fórmula é entender o que está se passando. Entendendo o que está se passando, o aluno será capaz de adaptar sua experiência a novos problemas semelhantes. Aprendendo a simplesmente aplicar uma fórmula, o aluno não terá a habilidade de visualizar problemas correlatos, e esquecerá o aprendido em alguns meses.

A figura abaixo representa o reservatório, de capacidade C, sendo enchido em 4 horas pela torneira T1. A área do retângulo tem área C, que é a capacidade do reservatório. A base representa o tempo para encher o reservatório, e a altura representa a vazão, no caso, a capacidade do reservatório C, divida por 4.



Área = base x altura

Capacidade = tempo x vazão

A capacidade do reservatório é representada pela área do retângulo.

A altura do retângulo nada mais é que a vazão da torneira T1. É dada pela capacidade total (C) dividida pelo tempo de enchimento total (4 horas). Sendo assim, esta vazão é C/4, que é o mesmo que C. 1/4. O produto da base pela altura, ou seja, vazão multiplicada pelo tempo, será igual à capacidade do reservatório:

$4 \cdot C/4 = C$

Ocorre situação análoga com a torneira T2. A diferença é que seu tempo de enchimento é 6 horas, e a vazão é C/6, ou seja, enche 1/6 do reservatório a cada hora.



Também nesse caso a área do retângulo é C, a capacidade do reservatório. Multiplicando base por altura, ou seja, tempo de enchimento pela vazão da torneiras, encontramos a capacidade do reservatório:

Scanned by CamScanner

$6 . C/6 = C$

Na terceira situação, as torneiras T1 e T2 são abertas simultaneamente. Como estão trabalhando juntas, o tempo para enchimento será menor. A figura abaixo mostra a situação que ocorre quando as duas torneiras são abertas.



A vazão total é a soma das vazões das duas torneiras.

A capacidade é a mesma.

Calculamos o tempo total.

Cada torneira será responsável por encher uma fração do reservatório. Os dois retângulos indicados representam juntos, a parte que será cheia por cada torneira (obviamente a água das duas torneiras ficará misturada dentro do reservatório). As duas torneiras serão abertas no mesmo instante e fechadas no mesmo instante, então o tempo de enchimento (x horas) será o mesmo para as duas. Como a torneira T1 tem maior vazão (enche o tanque sozinha em apenas 4 horas, contra 6 horas da torneira T2), a altura do retângulo correspondente (vazão) é maior. A vazão total é a soma das vazões das duas torneiras, ou seja, C/4 + C/6. Finalmente, multiplicando esta vazão por x, o tempo de enchimento, o resultado será a capacidade do reservatório:

Calculando a área do retângulo total (C) com a soma das áreas dos dois retângulos menores, ficamos com:

$C = C1 + C2$

$C = x.(C/4) + x.(C/6)$. Simplificando por C, resulta em:

$1 = x/4 + x/6$

$24 = 6x + 4x$

$x=2,4$

Resposta: 2,4 horas

Algumas variantes deste problema não podem ser resolvidas diretamente com a fórmula das torneiras. Isto ocorre, por exemplo, quando as torneiras não são abertas e fechadas simultaneamente. Pode-se deixar uma torneira operando sozinha, e depois de um tempo, abre-se a segunda. Nesses casos, a fórmula das torneiras não funciona, mas desenhando um diagrama, a solução fica simples. Geralmente nos concursos atuais, para dificultar, usam-se torneiras que são abertas e fechadas em instantes diferentes:

Scanned by CamScanner

E31) (*) No exemplo anterior, a primeira torneira fica aberta sozinha na metade do tempo, depois é fechada e abre-se a segunda torneira, sozinha, na outra metade do tempo.

A figura para esta situação está indicada abaixo, e a resolução é deixada como exercício:



Note que nesse caso, cada torneira deve ser aberta na metade do tempo, que é ainda desconhecido, x/2. Os dois retângulos têm portanto, bases iguais, mas as alturas são diferentes: C/4 e C/6, que são as vazões de cada torneiras. Somando as áreas desses dois retângulos e igualando a C, chegaremos ao valor de x, o que fica para o aluno como exercício.

E32) Idem, considerando que a primeira torneira deverá ficar aberta até encher a metade do reservatório, e depois deverá ser fechada para que a segunda torneira, sozinha, encha a outra metade. Partindo do diagrama, o aluno deve inicialmente resolver o problema "de cabeça", justificando a resposta. Depois, através de cálculos repita o problema. Observe que cada torneira encherá a metade da capacidade (C/2), o e o tempo total será a soma dos tempos x e y que as torneiras levarão, respectivamente, para encher sua metade.



E33) Considerando o mesmo reservatório e as mesmas torneiras do problema anterior, considere que a torneira T2 foi aberta sozinha durante duas horas. Depois desse tempo, a torneira T1 também foi aberta, as duas passando a operar em conjunto, durante uma hora, e então a torneira T1 foi fechada. De quanto tempo precisará para terminar sozinha de encher o tanque?

Exercícios

E34) (*) Um tanque possui duas torneiras, capazes de enchê-lo em 8 e 6 horas, respectivamente. Inicialmente é aberta somente a primeira torneira, e depois que o tanque está 50% cheio, abre-se a segunda torneira, que opera junto com a primeira. Quanto tempo será necessário para encher o restante do tanque?

Scanned by CamScanner

E35) (*) A e B trabalhando juntos aram um campo em 10 horas. A e C fazem o mesmo trabalho em 12 horas, e A sozinho faz o mesmo trabalho em 20 horas. Em quanto tempo B e C juntos farão o mesmo trabalho?

E36) A pode fazer um trabalho em 10 dias, B em 12 dias. A e B trabalhando com ajuda de C fazem o mesmo trabalho em 4 dias. Em quanto tempo C trabalhando sozinho faz o mesmo trabalho?

E37) A e B trabalhando juntos constroem um muro em 12 dias. A e C juntos fazem o mesmo trabalho em 15 dias, e B e C juntos levam 20 dias. Em quanto tempo os três trabalhando juntos farão o mesmo trabalho ?



Diagrama de motor aeronáutico

E38) A e B juntos constroem um muro em 12 dias, A e C fazem o mesmo muro, trabalhando juntos, em 15 dias, e B e C fazem o mesmo muro juntos em 20 dias. Quanto tempo levarão para fazerem o muro, trabalhando juntos?

E39) Um tanque tem duas torneiras. Usando apenas uma delas, o tanque pode ser cheio em 6 horas a menos que se for enchido pela outra. Usando as duas torneiras juntas, o tanque é cheio em 4 horas. Determine o tempo que cada torneira leva para encher o tanque.

E40) Uma secretária A leva 6 minutos a mais que uma secretária B para digitar 10 páginas de texto. Se elas trabalharem juntas, levarão apenas 8 min 45s para digitar as 10 páginas. Quanto tempo cada secretária levará, sozinha, para digitar essas 10 páginas?

Problemas de espaço, tempo e velocidade

Muitos problemas simples de cinemática (estudo dos movimentos na física) são na verdade, problemas do primeiro grau, que usam a equação:

$$Velocidade = \frac{Espaço}{Tempo}$$

Se usarmos para essas três grandezas as letras V, E e T, esta fórmula pode ser escrita de várias fórmulas algebricamente equivalentes:

$$V = \frac{E}{T},\quad T = \frac{E}{V},\quad E = V.T$$

Note que todas são a mesma fórmula, escrita de formas diferentes. A partir de qualquer delas chegamos às outras por manipulação algébrica. Observe que esta fórmula só é válida para velocidades constantes. Quando a velocidade varia com o tempo, os cálculos são mais complexos, muitas vezes necessitando de conteúdos do curso superior (cálculo diferencial e integral).

Exemplo:
Um automóvel percorre uma estrada 60 km/h. Depois de uma hora, um segundo automóvel parte do mesmo ponto de onde partiu o primeiro, em sua direção, a 90 km/h. Em quanto tempo o segundo veículo ultrapassará o primeiro?

Scanned by CamScanner

Solução:
A primeira coisa a fazer é pensar e entender o problema. A seguir, fazemos um desenho que representa o ocorrido:



Aqui é preciso apresentar dois valores físicos que permitirão a resolução do problema:

1) Quando o segundo carro começou a andar, a distância entre eles será de 60 km, pois o primeiro carro já terá andado 1 hora com a velocidade de 60 km/h, e pela fórmula

E = V.T, temos V = 60 km/h e T = 1 h, resultando em E = 60 km.

2) A velocidade de aproximação dos carros é a diferença entre as velocidades dos carros, ou seja, 90 km/h – 60 km/h = 30 km/h.

Agora podemos calcular o tempo para que o segundo carro alcance o primeiro, pela fórmula T = E/V.

T = 60 km / 30 km/h = 2 h.

Resposta: O segundo carro alcançará o primeiro em 2 horas.

Um tipo de problema clássico é o do barco que navega em um rio. Quando um barco navega em um rio, sua velocidade em relação à terra é influenciada pela velocidade da correnteza. Por exemplo, se a correnteza corre a 2 km/h, basta o barco ficar parado em relação ao rio e ser levado pela correnteza. Desta forma o barco correrá 2 km/h em relação à margem, mesmo com o motor parado ou sem remar.

Se o barco mover-se em relação ao rio, sua velocidade em relação à margem aumentará. Por exemplo, remando rio abaixo (a favor da correnteza) a 5 km/h em relação à água, o barco andará a 7 km/h em relação à margem (considerando a correnteza a 2 km/h).

Se o barco mover-se a 5 km/h rio acima, ou seja, contra a correnteza, sua velocidade efetiva, em relação à margem, será de 3 km/h (5 km/h – 2 km/h).

Resumindo, a velocidade de um barco é somada com a velocidade da correnteza, quando navegando rio abaixo, e é subtraída da velocidade da correnteza, quando remando rio acima.

Exemplo:
Um dia você foi andar de canoa em um rio. Você verificou que o rio corre a 2 km/h. Se você navega correnteza abaixo uma distância de 10 km no mesmo tempo que navegaria 2 km rio acima, determine a velocidade na qual sua canoa andaria em água parada.

(A) 3 km/h (B) 0,5 km/h (C) 5 km/h (D) 1 km/h (E) 2 km/h

Solução:
Os dados do problema nos permitem concluir que a velocidade efetiva (em relação à terra) rio abaixo, é 5 vezes maior que a velocidade rio acima, pois:

Scanned by CamScanner

Velocidade rio abaixo: VF = 10 km / T
Velocidade rio acima: VC = 2 km / T

Os trajetos de 10 km rio abaixo e 2 km rio acima são feitos no mesmo T, segundo o enunciado. Logo, VF = 5.VC (espaço = velocidade x tempo)

Navegando rio abaixo, a velocidade do barco (VB) soma-se à velocidade do rio
Navegando rio acima, a velocidade do barco é subtraída da velocidade do rio, que é 2 km/h.

Então, chamando de ***x*** a velocidade do barco:

$VF = 5.VC$

$x + 2 = 5.(x - 2)$
$x + 2 = 5x - 10$
$4x = 12$
$x = 3$

De fato, rio abaixo ficamos com 3 km/h + 2 km/h = 5 km/h
Rio acima ficamos com 3 km/h – 2 km/h = 1 km/h
Resultando em VF = 5.VC

Resposta: (A) 3 km/h

Exercícios

E41) (*) Dois trens em partem de um mesmo tempo, na mesma direção mas em linhas diferentes, horários diferentes e velocidades diferentes. O primeiro trem parte às 2 horas com velocidade de 80 km/h. Às 2:30 parte um segundo trem, na mesma direção, com velocidade de 120 km/h. A que horas o segundo trem ultrapassará o primeiro?



E42) (*) Repetir o problema anterior, nas mesmas condições, exceto que às 2:40 o primeiro trem faz uma parada de 20 minutos.

E43) Para percorrer uma certa distância, um trem capaz de andar a 40 km/h leva duas horas a menos que um outro trem que anda a 30 km/h para percorrer a mesma distância. Calcule a distância.

E44) Um trem fazia diariamente um percurso de 240 km/h a uma certa velocidade. Sua locomotiva foi trocada por um modelo mais potente, 20 km/h mais rápido, e o tempo de viagem foi reduzido em 1 hora. Quais eram as velocidades do trem, antes e depois da troca da locomotiva?

E45) Um atleta remou contra a correnteza de um rio uma distância de 2 km e retornou ao ponto de partida em um tempo total de 2h 24 min. Se a correnteza anda a 2 km/h, a qual velocidade, em relação à água, que ele remou?

Scanned by CamScanner

E46) (*) Dois trens partem no mesmo instante, um da cidade A em direção à cidade B, a 80 km/h, e outro da cidade B para a cidade A, a 70 km/h. A distância entre as cidades é 300 km. Em quanto tempo os trens se encontrarão?

E47) Um barco faz um percurso de 24 km rio acima e volta os 24 km em um total de 5 horas. Sua velocidade rio acima é 4 km/h mais lenta que a velocidade rio abaixo. Qual é a velocidade do barco rio abaixo?

(A) 8 km/h (B) 9,6 km/h (C) 11.6 km/h (D) 12 km/h (E) 13.6 km/h

E48) Um barco tem velocidade de 20 km/h em água parada. Num rio cuja corrente flui a 10 km/h, o barco viaja uma certa distância rio abaixo e retorna. Encontre a razão entre o tempo da viagem de ida e volta e o tempo que levaria em água parada.

(A) 3:2 (B) 1:2 (C) 3:4 (D) 4:3 (E) 5:4 (F) Nenhuma dessas

E49) Uma família fez uma viagem de 260 km em um dia chuvoso. Na primeira parte do percurso, andaram a 50 km/h, então tiveram que reduzir para 10 km/h por que a chuva ficou muito intensa. Se o tempo total da viagem foi de 6 horas, qual foi a distância viajada a 10 km/h?

(A) 5 km (B) 10 km (C) 15 km (D) 20 km (E) 25 km

E50) (*) Carla dirige da cidade A para a cidade B a 45 km/h. Chegando em B, lá permaneceu por 10 horas, e então retornou para A a 75 km/h. Se o tempo total da viagem, da saída de A até a chegada a A foi de 50 horas, qual é a distância entre as duas cidades?

(A) 1190 km (B) 1173 km (C) 1175 km (D) 1160 km (E) 1125 km

Problemas de misturas

Este é mais um tipo de problema bastante comum em provas de concursos. Misturas envolvendo álcool e gasolina, misturas envolvendo água e ácido, com diferentes concentrações, misturas de substâncias em geral. Existem até problemas envolvendo misturas de jujubas com cereais.

Toda mistura de substâncias tem um parâmetro chamado concentração, que é uma relação entre os dois ingredientes (eventualmente podem ser mais de dois). Por exemplo, uma mistura com 20% de álcool e 80% de gasolina, ou uma mistura de 10% de ácido com 90% de água. Tipicamente, os problemas abordam uma mistura inicial, com uma determinada concentração, que é adicionada a outra mistura, ou somente um ingrediente puro da mistura original, e pedem a concentração da nova mistura.



Exemplo:
Quantos litros de água pura devem ser adicionados a 5 litros de uma mistura de água e ácido a 20%, pare resultar em uma nova mistura de água com ácido a 10%?

Solução:
Primeiro temos que calcular as quantidades de água e ácido na mistura original.

Scanned by CamScanner

5 L ácido e água a 20%, significa que o componente ativo, que é o ácido, corresponde a 20% do total. A água é o componente neutro, que serve apenas para diluir o ácido.

5 L da mistura = 0,2 . 5 = 1 L de ácido
0,8 .5 = 4 L de água

A seguir adicionamos x litros de água pura, ficando com uma nova mistura, contendo:

1 L de ácido
(4 + x) L de água
Volume total da mistura: (5 + x) litros

O problema exige que a nova mistura tenha 10% de ácido. Já contatamos que temos ao todo 1 L de ácido e (x + 5) litros de água. Então:

$$\frac{1}{x+5} = 10\% = 0.1$$

$$\frac{10}{x+5} = 1$$

x + 5 = 10
x = 5

Portanto devemos adicionar 5 L de água pura à mistura para que resulte em uma nova mistura com concentração de 10%.

Resposta: 5 L

Neste problema, se partimos da solução a 20% e queremos uma nova mistura com concentração menor, adicionamos água. Se quisermos obter uma nova mistura com concentração maior, devemos adicionar mais ácido.

Esta solução tem apenas um problema: estamos supondo que os 20% de ácido citados referem-se a 20% de volume (1 L de ácido em 5 L de solução), mas isto nem sempre está correto.

Exemplo: CN 2009

O combustível A é composto de uma mistura de 20% de álcool e 80% de gasolina. O combustível B é constituído exclusivamente de álcool. Um motorista quer encher completamente o tanque do seu carro com 50% de álcool e 50% de gasolina. Para alcançar o seu objetivo colocou x litros de A e y litros de B. A razão x/y é dada por

(A) 5/3 (B) 3/5 (C) 2/5 (D) 5/2 (E) 3/2

Solução:
Este é um problema do primeiro grau totalmente diferente. São sugeridas duas incógnitas, x e y, que são respectivamente, o número de litros do combustível A e do combustível B. Uma equação é obtida a partir do fato de que a mistura final deverá ter 50% de álcool e 50% de gasolina. A segunda equação... não é dada! Teria que ser dada por exemplo, a capacidade total do tanque, teríamos então x + y = capacidade, mas essa informação não é fornecida. Em compensação, o problema não pede explicitamente x e y, mas sim, a razão entre x e y.

Scanned by CamScanner

Calculemos a composição de x litros de A e y litros de B:

x litros de A = x.0,2 litros de álcool + x.0,8 litros de gasolina
y litros de B = y litros de álcool

Então um mistura de x litros de A e y litros de B terá:

Álcool: 0,2x + y
Gasolina: 0,8x

Para que composição final tenha 50% de álcool e 50% de gasolina, é preciso que essas duas quantidades sejam iguais.

$0,2x + y = 0,8x$
$y = 0,6x$
$x/y = 1/0,6 = 5/3$

Note que com as informações do problema não é preciso determinar os valores de x e y, mas sim, a razão entre x e y. Passemos então a conferir o resultado. Tomemos uma mistura de 5 litros de A e 3 litros de B (que satisfaz a $x/y = 5/3$). Teremos então:

Álcool: $0,2.5 + 3 = 4$
Gasolina: $0,8.5 = 4$

De fato, esta combinação resulta em quantidades iguais de álcool e gasolina.

Resposta: (A) *5/3*

Este é um tipo de problema do primeiro grau que pode ser esperado em provas atuais. O problema induz o aluno a procurar dois valores, x e y, entretanto é impossível descobrir os valores exatos, pois não é dada a capacidade do tanque. Mas devemos lembrar que uma coisa é a solução do sistema, outra coisa é a solução do problema. Para chegar à solução do problema, apenas calculamos a razão entre x e y. Mesmo que x e y não possam ser determinados a partir dos dados fornecidos, a sua razão x/y pode perfeitamente ser calculada.

A capacidade de resolver problemas do primeiro grau dependerá da habilidade do aluno em converter as informações dadas em equações.

Recomendamos que seja usado um método um pouco diferente, e mais fácil de ser usado. Ao invés de lidar com a quantidade das duas substâncias, lidamos com dois outros valores: o total, e a quantidade de uma das substâncias. Por exemplo, se temos misturas de ácido e água, sal e água, glicose e água, escolhemos respectivamente as substâncias ácido, sal e glicose, já que a água nada mais é que o solvente. No exemplo citado de álcool e gasolina, temos duas misturas":

A: Gasolina + álcool
B: Álcool

Apesar de nesse exemplo, tanto o álcool quanto a gasolina serem importantes, vamos escolher, matematicamente, o álcool como "solvente", e a gasolina como "substância principal", apenas do ponto de vista matemático. O motivo de propormos este método é que não teremos que nos preocupar com as unidades (ex: as porcentagens se referem a peso ou a volume?).

Scanned by CamScanner

Escolhendo este caminho evitaremos problemas relativos às unidades usadas, como será explicado mais adiante.

No referido problema do Colégio Naval, temos, de acordo com o enunciado:

Mistura A: 80% de gasolina, então do volume x, temos 0,8x de gasolina.
Mistura B: 0% de gasolina, pois é álcool puro.

Formamos então uma tabela onde indicamos as misturas A e B, e a mistura total. Preenchemos para cada uma delas a quantidade da substância dissolvida (no exemplo, convencionamos ser a gasolina) e a quantidade total.

	Mistura A	Mistura B	MA + MB
Gasolina:	0,8 x	0	0,5 (x + y)
Total:	x	y	x + y

Vejamos como foram preenchidos os valores da tabela. A linha inferior mostra as quantidades de misturas A e B, que são respectivamente x e y (o problema pede a relação entre x e y). A quantidade total será a soma das duas quantidades, x + y. A linha relativa a "gasolina" mostra as quantidades de gasolina nas duas misturas. A mistura A tem 80% de gasolina, então a quantidade de gasolina será 0,8 x. A mistura B não tem gasolina. O valor MA + MB é igual à soma das quantidades de gasolina nas duas misturas, ou seja, 0,8x + 0, porém é também igual a 50% da mistura total, ou seja, 0,5 (x + y). Temos então:

$0{,}8\,x = 0{,}5\,(x + y)$
$0{,}8\,x = 0{,}5\,x + 0{,}5\,y$
$0{,}3\,x = 0{,}5\,y$
$x/y = 5/3$

A vantagem em resolver o problema desta forma é que não precisamos saber qual é o critério escolhido para definir a concentração, se é volume (L ou mL) ou se é massa (kg ou g). A rigor o problema deveria fornecer esta informação, mas caso não forneça, o critério da resposta será o mesmo critério do enunciado.

Resposta: (A) $x/y = 5/3$

Exemplo: CN 82

Os minérios de ferro de duas minas X e Y possuem, respectivamente, 72% e 58% de ferro. Uma mistura desses dois minérios deu um terceiro minério possuindo 62% de ferro. A razão entre as quantidades do minério da mina X para o da mina Y, nessa mistura, é:

(A) 1,4 (B) 1,2 (C) 0,5 (D) 0,2 (E) 0,4

Solução:
Note que no problema de álcool/gasolina, usamos uma resolução baseada em proporções de volumes, ou seja, que 20% de álcool significa 20% de volume de álcool (1 litro de álcool na solução total de 5 L). Este problema de minério não se refere ao volume de ferro, mas som, ã massa (que é proporcional ao peso) de ferro em relação ao peso total da mistura. Isto está implícito, pois sendo um material sólido, as concentrações são topicamente indicadas em relação ao peso (proporcional à massa). Vamos portanto montar uma tabela similar à usada no problema da gasolina, considerando que o ferro está misturado à impurezas (terra, etc.).

Scanned by CamScanner

	Mina X	Mina Y	MX + MY
Ferro:	0,72x	0,58y	0,72x + 0,58y = 0,62 (x + y)
Total:	x	y	x + y

A tabela foi preenchida de acordo com os dados do problema. Tomemos quantidades x e y das minas X e Y, respectivamente. A quantidade total de minério extraído das duas minas será **(x + y)**. A quantidade de ferro da mistura final será igual às somas das quantidades de ferro extraídos das duas minas (0,72x + 0,58y), mas também é igual a 0,62 (x + y), já que o problema pede que a concentração da mistura final seja 62%. Ficamos então com :

$0{,}72x + 0{,}58y = 0{,}62\ (x + y)$
$0{,}72x + 0{,}58y = 0{,}62x + 0{,}62y$
$0{,}10x = 0{,}04y$
$x/y = 0{,}04/0{,}10 = 0{,}4$

Resposta: (E) 0,4

Exemplo:
Quantos gramas de uma solução de 75% de ácido devem ser adicionados a 36 gramas de uma solução de ácido a 50% para produzir uma solução com ácido a 60%?

(A) 36 g (B) 24 g (C) 18 g (D) 30 g

Solução:
Observe que este exemplo trata de uma solução de água com ácido. Tipicamente usamos volume para quantificar líquidos, mas também pode ser usada massa, como neste exemplo.
O problema pede a quantidade em gramas, da primeira solução, a ser utilizada (chamaremos de ***x***). Usemos portanto a tabela:

	Solução 1	Solução 2	S1 + S2
Ácido:	0,75x	0,5 . 36 = 18	0,75x + 18 = 0,6 . (x + 36)
Total:	x	36	x + 36

As quantidades indicadas na segunda linha são, respectivamente, x, 36 e (x + 36), pois x é o valor pedido pelo problema (a quantidade da primeira solução), os 36 gramas da solução 2, e a soma dessas duas quantidades, (x + 36).

As quantidades de ácido em cada solução são obtidas multiplicando a quantidade de cada solução, pela respectiva concentração (75% para a primeira e 50% para a segunda).

A mistura final nos dará a equação que permitirá encontrar x. A quantidade de ácido é igual à soma das quantidades de ácido nas duas soluções (0,75x + 0,5.36), mas também é igual a 60% da quantidade da mistura final (0,6.(x + 36)), o que nos dá a equação:

$0{,}75x + 18 = 0{,}6\ (x + 36)$
$0{,}75x + 18 = 0{,}6x + 21{,}6$
$0{,}15x = 3{,}6$
$x = 24$

Resposta: (B) 24 g

Scanned by CamScanner

Exemplo:
Quantos litros de uma solução de sal a 4% devem ser adicionados a 24 L de uma solução de sal a 12% para se obter uma solução de sal a 10%?

Este problema mostra como pode ser complicada a questão da concentração, se é uma porcentagem em peso ou em volume. Nesse caso, não faz sentido falar em volume de sal, entretanto a quantidade de solução é dada em litros. É errado por exemplo que 20 litros de uma solução de sal a 10% correspondem a 2 litros de sal em 18 litros de água. Tipicamente, na química, quando mistura-se uma substância sólida com uma líquida, a concentração é dada em g/L ou g/mL. Neste problema isto não está claro. Muitas vezes, em provas de concursos, os professores de matemática, alheios às questões da química, não especificam o critério para definir as concentrações das substâncias envolvidas nas misturas. Na maioria das vezes, pensam em volumes, para substâncias líquidas, e em massa, para substâncias sólidas, mas há casos ambíguos quando tratam de misturas de sólido e líquido. O método de resolução pela tabela evita este problema. Na verdade vale para qualquer tipo de mistura, sólidos e líquidos, mesmo que fique indeterminado, não importa. A resposta encontrada estará usando o mesmo critério de concentração dado no enunciado. Vamos à solução do problema:

Solução:
Usemos a tabela de quantidades das misturas envolvidas:

	Solução 4%	Solução 12%	Solução final (10%)
Sal:	0,04x	0,12 . 24 = 2,88	0,04x 2,88 = 0,1 . (x + 24)
Total:	x	24	x + 24

A segunda linha mostra as quantidades das soluções, que são, respectivamente, x (valor pedido pelo problema) e 24 L. O último valor é a soma das quantidades, x + 24. A primeira linha mostra a quantidade de sal em cada solução. Na primeira solução, temos 4% de x (0,04x), na segunda temos 12% de 24 L (2,88g), e o último valor dá a quantidade de sal na solução final. É igual à soma das quantidades de sal vindas das duas soluções (0,04x + 2,88), mas também é numericamente igual a 10% do volume da solução final (0,1 . (x + 24)). Ficamos então com:

$0{,}04x + 2{,}88 = 0{,}1\ (x + 24)$
$0{,}04x + 2{,}88 = 0{,}1x + 2{,}4$
$0{,}06x = 0{,}48$
$x = 8$

Resposta: 8 litros

Observe que o problema não deixou claro o que representa "4% de sal", se está se referindo a peso ou volume. Não importa, o dispositivo de resolução pela tabela dará uma resposta coerente com o enunciado, seja lá qual for esta porcentagem que o autor da questão tinha em mente.

Exemplo:
Quantos litros de um solvente que custa R$ 80,00 por litro tem que ser misturado com 6 L de um outro solvente que custa R$ 25,00 por litro para resultar em um solvente com custo de R$ 36,00 por litro"

Solução:
Este é um tipo de problemas de mistura menos complicado. A primeira mistura tem x litros (incógnita) a R$ 80,00 por litro, então seu custo será 80x. A segunda mistura tem 6 litros a R$

Scanned by CamScanner

25,00 por litro, então isto custará 6 . R$ 25,00 = R$ 150,00. A mistura final terá x + 6 litros, e o custo por litro deve ser R$ 36,00, então o custo total da mistura será (x + 6).36 = 36x + 216. Agora basta igualar a soma dos custos das duas misturas, com o custo da mistura resultante:

$80x + 150 = 36x + 216$
$44x = 66$
$X = 1,5$

Resposta: 1,5 litros

Exercícios

E51) (*) Luís é um estudante de química que precisa produzir uma solução de ácido acético a 10% para um experimento. Ele verifica que só tem disponíveis, soluções a 5% e a 20%. Ele decide fazer a solução a 10% misturando as duas soluções disponíveis. Quantos litros da solução a 5% devem ser misturados a 8 litros da solução a 20% para obter uma solução a 10% de ácido acético?

(A) 16,5 L (B) 32 L (C) 16 L (D) 8,5 L
(E) 24 L

Biotecnologia

E52) Quantos litros de álcool devem ser adicionados a 24 litros de uma solução de álcool a 14% para resultar em uma solução de 20% de álcool?

E53) Quantos gramas de ácido puro devem ser adicionados a 40 g de uma solução de ácido a 40% devem ser adicionados para produzir uma solução de ácido a 50%?

E54) Um tanque contém 1000 litros de uma solução de 40% de ácido. Quanta água deve ser adicionada para que resulte em uma solução de 30% de ácido?

E55) Uma solução A tem 50% de ácido, e uma solução B, 80%. Quanto deve ser misturado de cada solução para formar uma 100 ml de uma solução de ácido a 68%"

E56) Uma indústria farmacêutica tem duas misturas de xarope, sendo uma pura e outra a 80%. Quanto deve ser usado de cada uma para fabricar 150 L de xarope a 92%?

E57) (*) Uma tinta contém 21% de corante verde vai ser misturada com outra tinta que contém 15% do mesmo corante. Quantos litros devem ser usados de cada uma, para formar 60 l de uma tinta com 19% de corante verde?

E58) Qual o volume de água deve ser eliminado por evaporação, de uma solução de 50 l de água com sal a 12%, para resultar em uma solução de sal a 15%?

E59) Quantos gramas de água pura deve ser misturada a 50 g de uma solução de ácido a 50% para formar uma solução de ácido a 30%?

E60) Um chá com 30% de camomila deve ser misturado com outro que contém 20% de camomila, para formar 10 kg de um chá com 22% de camomila. Quais quantidades de cada chá devem ser usadas?

Scanned by CamScanner

Problemas de juros

Este é mais um tipo de problema do primeiro grau que pode ser resolvido usando técnicas algébricas, apesar de ser um assunto que faz parte da aritmética. Os juros são usados tanto nas aplicações financeiras quanto nos empréstimos. Por exemplo, se alguém toma emprestado um capital de R$ 1000,00 com juros de 1% ao mês, significa que a cada mês, sua dívida crescerá 1% do valor tomado emprestado. Como 1% de R$ 1000,00 são R$ 10,00, a cada mês a dívida aumentará este valor, ou seja, ao final do primeiro mês a dívida estará em R$ 1010,00, no segundo serão R$ 1020,00, no terceiro serão R$ 1030.00, e assim por diante. O valor principal continua o mesmo, no caso, R$ 1000,00, mas o valor a ser devolvido é acrescido dos juros, que são R$ 10,00 por mês. O mesmo ocorre quando alguém "empresta dinheiro ao banco", ou seja, faz uma aplicação.

Este tipo de juros é chamado de "juros simples", e sua característica é um aumento constante a cada mês. Na vida real são usados os "juros compostos", e a diferença é que o aumento mensal depende da soma entre o capital aplicado e os juros adicionados nos meses anteriores ("juros sobre juros"). Para trabalhar com juros compostos é preciso usar uma calculadora, pois as fórmulas são mais difíceis de usar que a dos juros simples. Por isso, apesar de não ser o tipo mais comum na vida real, os juros simples são os mais usados em provas e exercícios.

Existe uma famosa fórmula que calcula o valor dos juros simples acumulados, levando em conta um capital C_0, uma taxa i e um tempo t.

$J = C_0.i.t/100$

$$J = \frac{C_0.i.t}{100}$$

Nesta fórmula, C_0 é o capital emprestado, ou aplicado, i representa a taxa de juros, considerada de 0 a 100. Daí existe o denominador 100, para fazer a correção. Por exemplo, 20% se transforma em 0,2 devido a este denominador 100. Finalmente, t representa o tempo, na mesma escala que o usado na taxa de juros. Por exemplo, se a taxa é um certo valor mensal, o tempo deve ser medido em meses.

Exemplo:
Calcular o valor dos juros de um empréstimo de R$ 1000,00, por um período de 6 meses, a taxa de 1% ao mês.

$$J = \frac{1000.1.6}{100} = \text{R\$ } 60{,}00$$

O valor a ser devolvido é igual ao capital inicial somado aos juros:

R$ 1060,00

Esta fórmula calcula apenas o valor dos juros. Se quisermos calcular o valor total a ser devolvido, basta somar o capital inicial com os juros no período:

$$C = C_0 + J = C_0\left(1 + \frac{i.t}{100}\right)$$

Scanned by CamScanner

Exemplo: CN 93

A que taxa de juros simples, em porcento, ao ano, deve-se emprestar um certo capital, para que no fim de 6 anos e 8 meses, duplique de valor?

(A) 10 (B) 12 (C) 15 (D) 18 (E) 20

Solução:
Como os números envolvem fração de ano, estão em meses, podemos calcular a taxa mensal para depois multiplicar por 12. Para que o capital duplique de valor, é preciso que os juros no período sejam iguais ao capital, ou seja:

$J = C_0 = C_0.i.t/100$

$i.t = 100$

Fazendo t = 6 anos e 8 meses = 80 meses, temos:

$i.80 = 100$
i = 1,25 porcento ao mês.

Para converter para juros anuais, basta multiplicar por 12:

$1,25 \times 12 = 15$
Ou seja, 15 porcento ao ano.

Resposta: (C) 15% ao ano.

Exemplo: CMM 2012

João, Maria e Antônia tinham juntos R$ 100.000,00. Cada um deles investiu sua parte por um ano, com juros de 10% ao ano. Depois de creditados seus juros no final desse ano, Antônia passou a ter R$ 11.000,00 mais o dobro do novo capital de João. No ano seguinte, os três reinvestiram seus capitais, ainda com juros de 10% ao ano. Depois de creditados os juros de cada um no final desse segundo ano, o novo capital de Antônia era igual à soma dos novos capitais de Maria e João. Qual era o capital inicial de João?

(A) R$ 20.000,00 (B) R$ 22.000,00 (C) R$ 24.000,00 (D) R$ 26.000,00 (E) R$ 28.000,00

Solução:
O problema é fácil, mas tem que ser feito com atenção. A primeira coisa a observar é que um capital C, investido por um ano a juros de 10% ao ano, resultará em 1,1 C:

$C = C_0(1+ it/100) = C_0.(1 + 10.1/100) = 1,1.C_0$
Fazendo um novo contrato, por mais um ano, o valor será novamente multiplicado por 1,1, e ao final deste segundo ano será:

$1,1.C_0 . 1,1 = 1,21\ C_0$

Chamando os capitais de José, Maria e Antônia de j, m e a, teremos:

Capitais iniciais: j, m, a, sendo que j + m + a = 100.000
Ao final de 1 ano os capitais serão 1,1j, 1,1m e 1,1a
Ao final de 2 anos os capitais serão 1,21j, 1,21m e 1,21a

Scanned by CamScanner

Ao final de 1 ano, Antônia passou a ter R$ 11.000,00 mais o dobro do novo capital de João:
→ 1,1a = 11.000 + 2.1,1j

Ao final do 2º ano, Antônia passou a ter a soma dos novos capitais de Maria e João
→ 1,21a = 1,21m + 1,21j

Ficamos então com um sistema de 3 equações com 3 incógnitas:

$$\begin{cases} a + j + m = 100.000 \\ 1,1a = 11.000 + 2.1,1j \\ 1,21a = 1,21m + 1,21j \end{cases}$$

Simplificando a segunda equação por 1,1 e a terceira por1,21, temos:

$$\begin{cases} a + j + m = 100.000 \\ a = 10.000 + 2j \\ a = m + j \end{cases}$$

Somando a primeira com a terceira:
2a = 100.000
a = 50.000
Substituindo na segunda:
50.000 = 10.000 + 2j
j = 20.000
Substituindo a e j na primeira equação:
50.000 + 20.000 + m = 100.000
m = 30.000

Resposta:
Os valores dos capitais originais são:
Antonia: R$ 50.000,00
Maria: R$ 30.000,00
João: R$ 20.000,00

Exercícios

E61) (*) Um indivíduo fez dois empréstimos bancários que somavam o valor total de $100.000,00. O primeiro empréstimo foi feito com uma taxa de 10% ao ano, e o segundo com uma taxa de 6% ao ano. Depois de um ano, o indivíduo quitou o valor total, de R$ 107.600,00. Quanto foi a parte do empréstimo original a 10% anuais?

(A) 20.000 (B) 30.000 (C) 40.000 (D) 50.000 (E) 60.000

E62) Um total de R$ 9.000,00 é investido, parte a uma taxa de 10% ao ano e a parte restante a 12% ao ano. O rendimento total depois de 1 ano foi R$ 1.030,00. Quanto foi investido a cada taxa?

E63) (*) José recebeu um total de R$ 900,00 em um ano com seus investimentos. Se R$ 7.000,00 foi investido a uma certa taxa, e R$ 9.000,00 foi investido com uma taxa 2% maior, encontre as duas taxas de investimento.

Mercado financeiro

Scanned by CamScanner

E64) Qual é o capital que aplicado a juros de 4% ao mês, durante 3 anos e meio, resultará em um capital total de R$ 2280,00?

E65) Qual é o capital que vai render R$ 280,00 em dois anos e 4 meses, aplicado a 3% ao mês?

E66) Qual é a taxa mensal de uma aplicação por 8 meses, na qual um capital de R$ 1000,00 renderá R$ 80,00 ?

E67) Qual é o capital que, aplicado a 6% ao ano, renderá por mês juros de R$ 100,00?

E68) (*) (CN) Certa quantia foi colocada a juros, à taxa de 5% ao ano, durante 3 anos. Esse montante foi então aplicado a juros de 6% ao ano, durante mais 5 anos. O novo montante é de R$ 14.950,00. Qual foi o capital inicial?

E69) (CN) Um capital foi colocado à taxa de juros fixa em 3% ao ano. No final de 1 ano foi retirado todo o montante, que se acrescido de 20% do seu valor é igual a R$ 1.854,00. Qual o capital inicial?

E70) (*) (CN) Uma pessoa empregou todo o seu capital da seguinte maneira: metade a 4% ao ano; um terço foi a 10% ao ano e a parte restante a uma taxa, tal que o seu rendimento total no fim de um ano, foi de 7 1/3 % do capital. Qual é essa taxa?

Problemas do segundo grau

O presente capítulo trata sobre problemas do primeiro grau. A resolução desse tipo de problema recai em equações ou sistemas do primeiro grau, ou então em técnicas aritméticas que dispensam o uso de equações, como é o caso dos problemas sobre frações, razões e proporções, juros e outros tópicos da aritmética.

Existem problemas que não recaem em equações ou sistemas do primeiro grau, mas sim, em equações ou sistemas mais complexos. Os capítulos seguintes abordarão tais problemas, mas no momento daremos apenas o exemplo de um problema do segundo grau. Traz esse nome porque recai em uma equação ou sistema do segundo grau.

Exemplo:
Encontrar dois números conhecendo sua soma, 13, e seu produto, 40.

Solução:
Este é um problema de segundo grau dos mais simples. Chamemos os números de x e y, então formamos o sistema:

$$\begin{cases} x + y = 13 \\ x.y = 40 \end{cases}$$

Não é um sistema linear, mas os métodos de resolução (comparação, substituição, eliminação) podem ser aplicados em qualquer tipo de sistema. Em alguns casos a solução poderá não ser obtida, pois nem todo tipo de expressão pode ser resolvido algebricamente. No nosso caso:

$x = 13 - y$
$(13 - y).y = 40$
$y^2 - 13y + 40 = 0$

Scanned by CamScanner

Recaímos em uma equação do segundo grau, que pode ser resolvida pelo método de "soma e produto": as soluções são tais que, a sua soma vale 13 e o produto 40. Se fatorarmos esta expressão ficamos com:

$(y-5).(y-8)=0$

Este produto somente será zero se um dos fatores for zero, ou seja, y pode ser 5 ou 8. Isto resultará em respectivamente, x=8 ou x = 5. Os números procurados são portanto, 5 e 8.

Note que resolver a equação por este método nos levou ao início do problema. Entretanto, poderá ser usado um outro método para resolver a equação, como por exemplo, usar a fórmula geral de resolução da equação do segundo grau (conhecida no Brasil, erradamente, como "fórmula de Bhaskara").

Exemplo: (CN 58)
Um grupo de rapazes ia comprar um rádio de R$ 280,00, com valor dividido em partes iguais. Como três deles desistiram, a quota de cada um dos outros ficou aumentada em R$ 12,00. Quantos eram os rapazes?.

Solução:
Apesar de ser antigo, este tipo de problema é muito típico, e tem sido cobrado em inúmeros concursos atuais.
O número de rapazes é uma boa escolha para ser a incógnita do problema. Vamos chamar este número de n.

Pelo que foi combinado, cada um pagaria uma parte de igual valor, ou seja, 280/n. Ocorre que três desistiram, então o valor de cada uma das partes restantes ficou aumentado em R$ 12,00. Portanto os n – 3 que sobraram, teriam que pagar, cada um, o valor original somado a R$ 12,00, e o valor total teria que ser igual a R$ 280:

$$(n-3)\times\left(\frac{280}{n}+12\right)=280$$

Fazendo as contas ficamos com:

$$(n-3)\times(280+12n)=280n$$
$$(n-3)\times(70+3n)=70n$$

$$70n+3n^2-210-9n=70n$$
$$3n^2-9n-210=0$$
$$n^2-3n-70=0$$

A equação tem como soluções $n=-7$ e $n=10$.
Lembre-se que uma coisa é a solução da equação/sistema, outra coisa é a solução do problema. Muitos alunos, devido ao nervosismo ou pressa, encontram x e marcam logo a resposta. Em questões que envolvem problema, a equação não é o objetivo final, mas uma ferramenta para chegar à solução. As soluções da equação são –7 e 10, mas devemos eliminar o valor negativo porque n representa o número de rapazes, que não pode ser negativo.

Scanned by CamScanner

A resposta é portanto, 10 rapazes. É altamente recomendável fazer uma verificação desta solução, substituindo o valor encontrado no enunciado do problema, o que pode eventualmente detectar erros de cálculo.

10 rapazes iam comprar um rádio de R$ 280,00 ➔ cada um pagaria R$ 28,00
Três desistiram, restaram 7.
Cada um terá que pagar mais R$ 12,00 ➔ R$ 28,00 + R$ 12,00 R$ 40,00
De fato, R$ 280,00 dividido por 7 = R$ 40,00 ➔ OK!
Este antigo problema tem caído em inúmeras provas atuais, com histórias e números ligeiramente diferentes.

Diminuir, subtrair

Na língua portuguesa, usam-se de modo impreciso verbos como *subtrair* e *diminuir*. Na resolução de problemas, quando indica-se "A é diminuído de B", ou "A é subtraído de B", qual é a conta correta, A – B ou B – A?

Quase sempre a dúvida pode ser esclarecida pelo contexto, portanto uma expressão como "A salário é diminuído dos descontos" é claramente entendida como *Salário – desconto*, quando pelo português deveria ser dito nesse caso, "o desconto é subtraído do salário", entretanto isto não é respeitado, sobretudo nas questões de matemática, estejam elas em exercícios de livro em provas e concursos.

Note as descrições das palavras citadas no Dicionário Michaelis:

diminuir
di.mi.nu.ir
(***lat diminuere***) ***vtd*** **1** Tornar menor em dimensões, quantidade, grau, intensidade etc.***;*** reduzir a menos; apoucar: ***Diminuir a despesa, os gastos, a velocidade.vint*** **2** Reduzir-se a menos, tornar-se menor: ***Meus ganhos diminuíram. vtd*** **3**Fazer parecer menos ou menor: ***O interesse e a boa vontade diminuem as dificuldades. vtd*** **4** Abaixar, abater, deprimir: ***Isso não lhe diminui o mérito. vtie vint*** **5** Abater-se, decrescer, enfraquecer-se: ***Através de culturas sucessivas, esse micróbio vai diminuindo em virulência. A sua timidez não diminuíra. vtd*** **6** Deduzir, subtrair: ***Basta diminuir dez. Diminua 9 de 27. vtd*** **7**Tornar menos duradouro; abreviar: ***Os excessos diminuem a mocidade. vint*** **8**Abrandar-se, acalmar-se, afrouxar-se: ***A violência da borrasca diminuiu. vint*** **9**Tender a desaparecer ou a extinguir-se: ***Notava-se que a febre diminuía.vtd*** **10** Gastar: ***Os vícios diminuem a eficiência. vpr*** **11** Estragar-se, perder-se:***Diminuíam-se as oportunidades, sem serem aproveitadas. vint*** **12**Emagrecer: ***Seu físico definhava, diminuía. vtd*** **13** Amortecer, abrandar:***Diminuir o ruído. vtd*** **14** Adoçar: ***Diminuir o amargor do café. Antôn***(acepções 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10): ***aumentar.***

subtrair
sub.tra.ir
(***lat subtrahere***) ***vtd*** **1** Tirar astuciosa ou fraudulentamente: ***À declaração de rendas, para pagamento do respectivo imposto, subtraiu várias quantias.vtd*** **2** Furtar, surripiar: ***Subtrair uma carteira. O moleque subtraiu uma maçã ao quitandeiro. vtd*** **3** Arrebatar, esconder, ocultar: "Antes folgam de subtrair incentivos à sensualidade" (Pe. Manuel Bernardes). ***vtd*** **4** ***Arit*** Tirar um número chamado ***diminuidor, subtraendo ou subtrativo,*** de outro chamado***diminuendo ou minuendo;*** diminuir: ***Subtrair uma parcela. Subtrair aos*** (ou***dos***) ***lucros as despesas. vtd*** **5** Deduzir, tirar: ***Subtrair algumas horas ao descanso. vpr*** **6** Escapar-se, esquivar-se, fugir, retirar-se: ***Subtrair-se a incômodos, a dificuldades. Subtrair-se à obediência. Não se subtraía à defesa do interesse público. vtd*** **7** Fazer desaparecer; retirar: ***Subtraiamos do espírito a recordação de fracassos. vtd*** **8** Afastar, fazer escapar, livrar: ***A misericórdia divina subtrai o pecador à inevitabilidade da condenação. Antôn*** (acepções 4 e 5): ***adicionar;*** (acepção 5): ***juntar.***

Scanned by CamScanner

Nota-se que os verbos podem ser usados de várias formas, mas no seu uso aritmético, o correto é como em "diminua 9 de 27" – o cálculo correto é 27 – 9. É indicada também a operação de tirar o subtraendo do minuendo (minuendo – subtraendo), o que mostra que a parcela que fica depois da preposição "de" é o minuendo.

Também no dicionário Aurélio é exemplificado o uso como "subtrai o tempo de estudo das suas horas de descanso", indicando que a expressão depois do "de" é o minuendo ou primeira parcela, e a expressão anterior, é o subtraendo ou 2ª parcela, portanto subtrai B de A significa A – B.

O problema é que esta ordem nem sempre é respeitada, e deve prevalecer o contexto. Por exemplo, "para saber o lucro, subtrair o ganho das despesas" significa, pelo contexto, lucro = ganho – despesas, apesar do português ser errado. Considere o seguinte problema de matemática:

Qual número é igual ao do seu dobro, diminuído de 15?

O contexto não esclarece o que deve ser feito, então usando a regra do português, o correto é:

$x = (15 - 2x)$
$3x = 15$
$x = 5$

De fato, 5 é igual a 10 diminuído de 15 (15 – 10)

O outro caminho, contrário à regra do português, é

$x = 2x - 15$
$x = 15$

Nessa interpretação, significa que

$15 = 2.15 - 15$

Recomendamos o seguinte: obedeça a ordem sugerida pelo contexto, e quando o contexto não esclarece, use a regra do português correto: "A subtraído de B" é **B – A**, ou seja, o valor que é "subtraído" é o que levará o sinal "–" da subtração.

Exercícios de revisão

E71) Determine dois números, sabendo que a diferença deles é 8, e que um é o dobro do outro.

E72) Achar um número tal que seu dobro mais sua metade seja igual ao seu triplo subtraído de 10.

E73) Achar o número que, somado com sua metade, é igual a 72.

E74) Dividir 220 em duas partes, de modo que 1/8 da primeira seja igual a 1/3 da segunda.

E75) Uma fração é equivalente a 2/5. Somando 2 ao numerador e subtraindo 7, ela passa a ter 5/3 do seu valor original. Determine esta fração.

Scanned by CamScanner

E76) Qual é a fração equivalente a 2/9 cuja soma dos termos é 44 ?

E77) Qual é o número cujo triplo excede em 30 sua metade?

E78) Invertendo a ordem dos dígitos de um número de dois dígitos, o novo valor será igual ao dobro do original, subtraído de 1. Qual é este número?

E79) A soma de dois números é 36 e sua diferença é 1/8 do número menor, aumentado de 2. Encontre os números.

E80) Se adicionarmos 1 ao numerador de uma fração, seu novo valor será 1/2. Se adicionarmos 2 ao denominador, seu valor será 3/5. Encontre a fração.

E81) Um certo número, quando dividido por um segundo número, dá quociente 7 e resto 4. Se o triplo do primeiro número for dividido pelo dobro do segundo número, o quociente é 11 e o resto é 4. Encontre os números.

E82) José comprou 6 laranjas e 3 bananas por R$ 2,10, Maria comprou 3 laranjas e 8 maçãs por R$ 4,10, e Carla comprou 6 bananas e 2 maçãs por R$ 1,40. Qual é o preço de cada fruta?

E83) Achar três números tais que, a soma do primeiro com o segundo seja igual a 35, a soma do primeiro com o terceiro seja 32, e a soma do segundo com o terceiro seja igual a 27.

E84) Achar três números tais que, o primeiro aumentado da metade da soma dos outros dois seja 54, o segundo aumentado da metade da soma dos outros dois seja 41, e o terceiro aumentado da metade da soma dois outros dois seja 83.

E85) A soma dos dois dígitos de um número é 11. Se forem invertidas as posições desses dois dígitos, o número resultante será 45 unidades menor. Qual é este número?

E86) Um número de dois dígitos é igual a 7 vezes o valor da soma dos seus dígitos. O quadrado desta soma de dois dígitos é igual a 12/7 do número. Qual é este número?

E87) Determine uma fração irredutível, sabendo que somando 6 ao denominador, ela se torna três vezes maior, e que subtraindo 2 do denominador, ela dobra de valor.

E88) Uma loja de roupas vendeu 200 camisas, com preços de R$ 33,00 e R$ 18,00. O valor total das vendas foi de R$ 4.800,00. Quantas camisas de cada preço foram vendidas?

E89) A soma de dois números é 104. O maior é um a menos que o dobro do número menor. Quais são esses números?

E90) A diferença entre dois números é 15. A soma do dobro do número maior com o triplo do menor é 182. Encontre os números.

E91) A soma de dois números é 900. Quando 4% do maior é adicionado com 7% do menor, o resultado é 48. Encontre os números.

E92) A soma de um número com o triplo do seu sucessor é igual ao quíntuplo do seu antecessor. Encontre este número.

E93) Num estacionamento existem 100 veículos, entre carros de 4 rodas, e motos. Ao todo são 360 rodas. Quantos são os carros e quantas são as motos?

Scanned by CamScanner

E94) Determine dois números sabendo que sua soma é 14, e o menor deles, quando somado com 20, fica reduzido à metade.

E95) Um número natural é formado por dois algarismos cuja soma é 12. Quando invertemos a posição desses algarismos, o número resultante é 75% maior que o número original. Determine o número original

E96) Dois números são tais que, o primeiro, ao ser somado com 5, tem seu valor multiplicado por 10, e o segundo, ao ser somado com 5, tem seu valor dividido por 10. Determine a soma desses dois números.

E97) Foram construídos para uma decoração, 50 polígonos, entre quadrados e triângulos, totalizando 180 lados. Qual é o número de triângulos?

E98) Um grupo de amigos consumiu em uma lanchonete, 4 sanduiches iguais e 7 refrigerantes, totalizando R$ 41,00. Um casal de namorados comprou 2 sanduiches e dividiram o mesmo refrigerante, pagando R$ 13,00. Determine o preço que um outro grupo pagará por 3 sanduiches e 5 refrigerantes.

E99) Um filho nasceu quando seu pai tinha 30 anos. Determine suas idades atuais, sabendo que a soma é 72 anos.

E100) (*) Um número de 3 dígitos é igual a 25 vezes a soma dos seus dígitos. Se os três dígitos forem revertidos, a número resultante excede o número original de 198. O dígito das dezenas é um a menos que a soma dos dígitos das unidades e das centenas. O dígito das dezenas do número dado é:

(A) 2 (B) 3 (C) 6 (D) 7 (E) 5

E101) Três torneiras iguais são capazes, cada uma delas, de encher um tanque em 60 minutos. Quanto tempo as três torneiras juntas levarão para encher este tanque?

E102) A pode fazer um trabalho em 3 dias, B em 5 dias, e C em 6 dias. Quantos dias, A, B e C, trabalhando juntos, realizarão o mesmo trabalho?

E103) Um tanque tem 3 torneiras independentes. A primeira torneira enche o tanque em 16 horas, a segunda em 24 horas, e a terceira em 32 horas. Em quanto tempo o tanque será cheio, com as três torneiras abertas?

E104) Uma agência de aluguel de carros cobra R$ 600,00 por semana e mais R$ 1,00 por quilômetro. Quantos quilômetros podem-se viajar com um gasto de R$ 1500,00 ?

(A) 700 (B) 800 (C) 900 (D) 1000 (E) 1100

E105) Um automóvel foi vendido por R$ 24.000 após ter sofrido um desconto de 20%. Qual era o preço original do veículo?

(A) R$ 28.800,00 (B) R$ 30.000,00 (C) R$ 19.200,00 (D) R$ 32.000,00 (E) R$ 34.000,00

E106) Um homem deu R$ 64.000 para seus três filhos. O mais velo recebeu três vezes o valor recebido pelo mais novo. O filho do meio recebeu R$ 14.000 mais que o mais novo. Quanto dinheiro recebeu o filho do meio?

(A) R$ 10.000 (B) R$ 15.600 (C) R$ 19.600 (D) R$ 24.000 (E) R$ 30.000

Scanned by CamScanner

E107) Dois garotos, Carlos e Bernardo, estão discutindo a respeito de dinheiro:
Carlos: - Pode me emprestar R$ 10,00 ?
Bernardo: - Não. Já gastei parte dos R$ 10,00 que eu tinha.
Carlos: - Quanto você gastou?
Bernardo: - Exatamente 1/4 do que sobrou.
Carlos: - Bom. Isso deixa você com exatamente de quanto eu preciso
Quanto Bernardo tem?

(A) R$ 7,50 (B) R$ 2,50 (C) R$ 8,00 (D) R$ 2,00 (E) R$ 6,00

E108) Uma companhia telefônica tem dois planos, A e B. O plano A custa R$ 4,98 por mês, mais 7 centavos por minuto. O plano B não cobra taxa mensal, e cobra 13 centavos por minuto. Quantos minutos de chamadas fariam com que os planos A e B resultem no mesmo custo mensal?

E109) Um ciclista fez um trajeto de 4 horas, sendo que uma parte foi feita a uma velocidade de 6 quilômetros por hora. A partir de um certo ponto do trajeto aumentou a velocidade para 10 km/h. Se a distância total percorrida foi de 36 km, em quanto tempo o ciclista fez cada trecho do trajeto?

E110) Como exercício, as irmãs Carla e Ana correm da sua casa até um parque. Carla corre a 4 km/h e Ana corre a 6 km/h. Quando Ana chega ao parque, Carla ainda tem 2 km para terminar o percurso. Qual é a distância entre a casa das irmãs e o parque?

(A) 8 km (B) 6 km (C) 9 km (D) 5 km (E) 4 km

E111) Joana comprou um anel em 2000 por R$ 200,00. Em 2005 o anel perdeu 10% do seu valor. Em 2010 o anel valia 30% mais que em 2005. Em 2015, o anel perdeu R$ 20,00 do seu valor de 5 anos antes. Qual era o preço do anel em 2015, arredondado para um número inteiro de reais?

(A) R$ 210 (B) R$ 214 (C) R$ 224 (D) R$ 209 (E) R$ 220

E112) Havia 500 bolas vermelhas e azuis em uma jarra. 1% das bolas eram azuis. Algumas bolas vermelhas, mas não azuis, foram retiradas. Agora, 2% das bolas são azuis. Quantas bolas ainda estão na jarra?

(A) 400 (B) 495 (C) 485 (D) 250 (E) 245

E113) Um barco que viaja a 13 km/h em água parada pode fazer uma viagem de 216 km a favor da corrente no mesmo tempo que pode fazer uma viagem de 96 km contra a corrente. Encontre a velocidade da corrente.

(A) 3,5 km/h (B) 4,5 km/h (C) 3 km/h (D) 5 km/h

E114) Tomás tem moedas de 1, 5 e 10 centavos em uma jarra. O número de moedas de 10 centavos é um a menos que o triplo do número de moedas de 1 centavo. O número de moedas de 5 centavos é o dobro do número das moedas de 1 e 10 centavos somadas. O valor total das moedas na jarra é R$ 6,90. Encontre o número de moedas na jarra.

(A) 79 (B) 69 (C) 117 (D) 107 (E) 138

E115) (*) Bernardo fez uma viagem de 120 km a uma velocidade média de 50 km/h. A primeira parte da viagem foi feita a uma velocidade de 30 km/h. A segunda parte foi feita a 60 km/h. Quantos quilômetros foram percorridos na primeira parte da viagem?

(A) 40 (B) 96 (C) 45 (D) 30 (E) 24

Scanned by CamScanner

E116) Uma empresa de aluguel de carros cobra um preço básico diário de R$ 29,00 mais R$ 0,39 por cada quilômetro percorrido. José alugou um carro por um dia e foram cobrados ao final, R$ 165,50. Quantos quilômetros José percorreu com o carro alugado?

(A) 200 (B) 210 (C) 424 (D) 350 (E) Mais de 500 km

E117) A metade da soma de dois números é 20 e o triplo da sua diferença é 18. Encontre os números.

E118) Seis cavalos e 7 vacas podem ser comprados por R$ 100.000,00, e 11 cavalos e 13 vacas podem ser comprados por R$ 184.400. Determine o preço de um cavalo e o de uma vaca.

E119) Em um evento, participam 200 pessoas. O ingresso é R$ 10,00 para adultos e R$ 5,00 para crianças. A arrecadação total foi de R$ 1100,00. Qual é o número de crianças?

E120) Um cofre tem 27 moedas de R$ 1,00 e de R$ 0,25. O valor total das moedas é R$ 21,00. Determine o número de moedas de cada valor.

E121) Em uma caixa existem selos de 15 e de 18 centavos. O número de selos de 15 centavos é quatro unidades menor que o triplo do número de selos de 18 centavos. O valor total dos selos é R$ 1,29. Quantos selos de 15 centavos há na caixa?

E122) (CN) No fim de quanto tempo aos juros produzidos por um certo capital serão iguais a 3/8 do mesmo, se empregado à taxa de 15% ao ano?

E123) (EPCAr) Quanto tempo se deve esperar para que um capital A, empregado à taxa de juros de 5% ao ano, duplique seu valor?

E124) (CEFET) Um capital de R$ 6.300,00 foi dividido em duas partes. A primeira parte foi investida a uma taxa de 3% ao ano, durante quatro anos, e rendeu os mesmos juros que a segunda parte, que foi investida à taxa de 2,5% ao ano, por seis anos. Calcule o valor da parte maior.

(A) R$ 3.000,00 (B) R$ 3.100,00 (C) R$ 2.900,00 (D) R$ 3.400,00 (E) R$ 3.500,00

E125) (CN) A diferença entre os capitais de duas pessoas é R$ 20.000,00. Uma delas coloca o seu capital a 9% e a outra aplica-o na indústria, de modo que lhe renda 45%. Sabendo-se que os rendimentos são iguais, achar os dois capitais.

E126) Um número foi dividido em três partes, sendo a 2ª o dobro da 1ª, e a 3ª o dobro da 2ª. Se o número fosse duplicado, a 2ª parte aumentaria de 1 unidade. Calcule esse número.

E127) Num depósito há viaturas de 4 rodas e 6 rodas, ao todo são 40 viaturas e 190 rodas. Quantas viaturas há de cada espécie no depósito?

E128) Há 18 anos, a idade de uma pessoa era o dobro da idade de uma outra. Em 9 anos, a idade da primeira pessoa passou a ser 5/4 da idade da segunda. Que idades têm as duas pessoas atualmente?

E129) Determinar um número de 3 algarismos compreendido entre 400 e 500, sabendo que a soma dos seus algarismos é 9 e que o número com os dígitos invertidos é igual a 36/47 do número original.

Scanned by CamScanner

E130) Um pai diz a seu filho: hoje a sua idade é 2/7 da minha, e há 5 anos era 1/6. Qual a idade do pai e a do filho?

E131) Roberto tem 24 anos e Paulo, 10 anos. No fim de quantos anos a idade de Roberto será o triplo da de Paulo?

E132) Dois indivíduos têm respectivamente, 45 anos e 15 anos. Depois de quantos anos a idade do mais novo será igual a 1/4 da idade do mais velho?

E133) Duas torneiras juntas enchem um tanque em 4 horas. Uma delas sozinha o enche em 7 horas. Em quantos minutos a outra, sozinha, encheria o tanque?

E134) Duas cidades A e B distam 200 km. Às 8 horas parte de A para B um trem a 30 km/h. Duas horas mais tarte parte de B para A, um outro trem a 40 km/h. A que distância da cidade A ocorrerá o encontro dos dois trens?

E135) Um mensageiro vai de A até B de bicicleta, com a velocidade de 10 km/h, e volta de B para A, a pé, com velocidade de 4 km/h. Calcule a distância AB sabendo-se que o tempo total de ida e volta foi 7 horas.

E136) A diferença entre um número de dois algarismos e outro escrito com os mesmos algarismos invertidos é 36. Calcule-os, sabendo que o algarismo das dezenas do 1º número é igual ao inteiro consecutivo ao dobro do algarismo das unidades desse mesmo número.

E137) Um número é composto de três algarismos, cuja soma é 18. O algarismo das unidades é o dobro do das centenas e o das dezenas é a soma do das unidades e das centenas. Qual é esse número?

E138) Em uma bolsa há R$ 35,50, formados por notas de R$ 2,00 e moedas de R$ 0,50. Sabendo que a soma dos números de moedas e cédulas é 26, calcular o número total das moedas e de cédulas.

E139) A soma das idades de A e B é 35 anos. Daqui a 5 anos, a idade de A será o dobro da de B. Calcular as idades de A e B.

E140) A soma de dois números é 13 e o primeiro mais a raiz quadrada do segundo é 7. Calcular esses números.

E141) Uma pilha de 40 tábuas tem 1,7 m de altura. Sabendo-se que as tábuas têm, umas 2 cm e outras 5 cm de espessura, quantas são as de 2 cm?
OBS.: Problema já pedido em concurso várias vezes

E142) Certa quantia é dividida em partes iguais, entre determinado número de pessoas. Se aumentarmos de 6 o número de pessoas, cada uma receberá R$ 3,00 a menos, mas se, ao contrário, o número de pessoas for reduzido de 2, cada uma receberá R$ 2,00 a mais. Achar o número de pessoas e a parte de cada uma.
OBS.: Problema já pedido em concurso várias vezes

E143) (*) Uma bicicleta de R$ 280,00 foi comprada por um grupo de meninos que contribuíram com partes iguais. Como 3 desistiram, a quota de cada um dos restantes foi aumentada em R$ 12,00. Quantos eram os meninos?

Scanned by CamScanner

E144) (*) Um tonel continha 100 litros de vinho puro. Retirou-se certa quantidade de vinho que foi substituída por água. Em seguida retirou-se da mistura, novamente, a mesma quantidade, sendo então substituída por água. A mistura final resultou em 100 litros, contando 36 litros de água. Quantos litros foram trocados de cada vez?

E145) O valor absoluto da terça parte de um número é igual a 1 menos a sexta parte desse mesmo número. Qual é este número?

E146) (*) Qual número é igual ao valor absoluto do seu dobro, diminuído de 15?

E147) Uma pessoa possui dois cavalos e uma sela, que vale R$ 1500,00. Colocando a sela no primeiro cavalo, este passa a valer o dobro do segundo. Colocando a sela no segundo cavalo, este passa a valer R$ 3000,00 a menos que o primeiro. Quanto vale cada cavalo?

E148) A soma de dois números é 14 e a soma dos seus quadrados é 100. Quais são esses números?

E149) O número 51 é decomposto em duas parcelas. A diferença entre as parcelas, dividida pela menor parcela, deixa quociente 4 e resto 3. Quais são essas parcelas?

E150) 400 laranjas devem ser divididas igualmente por um certo número de meninos. Como três desses meninos desistiram das laranjas, os restantes tiveram suas cotas aumentadas em 30 laranjas. Quantos eram os meninos?

E151) Dois ciclistas, A e B, percorrem uma pista circular de 1500 metros. A anda a uma velocidade de 15 voltas por hora, e B anda a uma velocidade de 20 voltas por hora. Em um dado momento, B está meia volta à frente de A. Qual é a distância, neste momento, entre A e o início da pista?

E152) Dividir o número 46 em duas partes, tais que 1/7 de uma parte mais 1/3 da outra parte seja igual a 10.

E153) Encontrar dois números inteiros consecutivos tais que sua soma seja igual a 2/3 do primeiro mais 117/88 do segundo.

E154) Um tonel contém 120 l de vinho de 180 l de água. Um segundo total contém 90 l de vinho e 30 l de água. Quantos litros devem ser usados de cada tonel, de tal forma que a mistura resultante tenha 70 l de vinho e 70 l de água?

E155) Dois trens partem ao mesmo tempo de cidades A e B, distantes de 315 km. O primeiro viaja de A para B a 40 km/h. O segundo viaja de B para A a 30 km/h. A que distância de A se dará o encontro dos trens?

E156) Uma barra de 1320 g é formada por uma mistura de outro e prata. Sabendo que os valores de ouro e prata na barra são iguais, o que cada grama de ouro custa 15 1/2 vezes que um grama de prata, calcule os pesos de ouro e prata na barra.

E157) Um menino disse ao seu colega: me dê 5 das suas balas, e ficaremos com quantidades iguais. O colega respondeu: me dê 10 das suas balas e eu ficarei com o dobro das que você tem. Quantas balas tem cada um?

E158) Se eu receber de A, R$ 10,00, ficarei com o dobro da quantia de B. Entretanto, se A der 10 reais para B, A e B ficarão com quantias iguais. Qual o valor que possui cada um?

Scanned by CamScanner

E159) A e B juntos têm R$ 100,00. Se a gastar a metade do seu dinheiro e B gastar 1/3 do seu, os dois juntos terão apenas R$ 55,00. Quanto dinheiro tem cada um?

E160) Lupércio investe R$ 20.000,00 em dois bancos. Uma parte da aplicação paga 3%. A outra parte é remunerada em 5% ao ano. No final de um ano, os rendimentos somaram R$ 780,00. Quais foram os valores investidos em cada banco?

E161) Lourdes tem R$ 7,40 em moedas em sua bolsa. São moedas de 10 e de 25 centavos, totalizando 44 moedas. Quantas são as moedas de cada valor?

E162) Arnaldo investiu R$ 8.000 em duas contas, sendo uma parte com juros de 6% ao ano e outra com juros de 9% ao ano. No fim de um ano, os juros totais recebidos foram de R$ 540,00. Qual foi o valor investido em cada conta?

E163) Carlos recebeu R$ 128,00 de juros em um investimentos. Uma parte deste rendimento foi devido a uma aplicação de R$ 800,00 a uma certa taxa. Outra parte foi devido a uma aplicação de R$ 1200,00, a uma taxa duas vezes maior que a primeira. Quais foram as taxas de cada uma das duas aplicações ?

E164) 10 litros de uma solução de água salgada tem 10% de sal. Uma outra mistura tem 3% de sal. Quantos litros da segunda mistura devem ser adicionados à primeira para que resulte em água com 5% de sal?

E165) Uma onça (oz) é uma unidade de peso inglesa, equivalente a cerca de 28,35 g. 20 onças de uma liga de platina custa R$ 220 por onça, é misturada com uma outra liga que custa R$ 400,00 por onça. Quantas onças da liga de R$ 400,00 devem ser usadas para fazer uma nova liga, com custo de R$ 300,00 por onça?

E166) (*) Quantos quilos de balas com custo de R$ 15,00 por quilo devem ser misturadas com 24 kg de jujubas com custo de R$ 7,50 por quilo, para fazer uma mistura com custo de R$ 9,00 por quilo?

E167) Um químico vai produzir 50 ml de uma solução de ácido a 16%, misturando duas soluções de ácido, sendo uma de 13% e outra de 18%. Quantos ml de cada solução devem ser usados para obter o produto desejado?

E168) Um número natural é composto de quatro dígitos cuja soma é 21. O dígito dos milhares é a metade da soma dos outros três dígitos. O dígito das unidades é a metade do dígito das dezenas, e se do número citado subtrairmos 3906, é obtido um número com os mesmos dígitos do original, porém na ordem reversa. Qual é este número?

E169) Um número natural é composto de três dígitos cuja soma é 15. O dígito das centenas é o dobro do dígito das unidades, e quando subtraímos 396 do número citado, obtém-se um número formado pelos dígitos do numero original, na ordem reversa. Qual é este número?

E170) (*) Três mulheres possuem juntas, R$ 360,00. Se a primeira der à segunda 1/7 do seu valor, e a terceira também der à segunda, 1/13 do seu valor, as três ficarão com quantias iguais. Que valor possui cada uma?

E171) Uma herança foi repartida entre 3 pessoas. A primeira recebeu **x**, a segunda recebeu **a** a mais que a primeira, e a terceira recebeu **b** a mais que a segunda. Exprimir o valor total da herança em função de **a**, **b** e **x**.

Scanned by CamScanner

E172) Os três dígitos de um número são tais que o dígito das dezenas ultrapassa em 2 o dígito das unidades, e o das centenas ultrapassa em 3 o dígito das dezenas. Qual é a soma dos três dígitos, sendo x o dígito das unidades?

E173) Encontrar dois números tais que, somando o dobro do primeiro com o triplo do segundo, o resultado é 124, e que subtraindo a sétima parte do segundo da metade do primeiro, encontra-se 6.

E174) Se **h** homens podem fazer um trabalho em **d** dias, então **h + r** homens podem fazer o trabalho em quantos dias?

E175) O gerente de um pizzaria italiana em São Paulo percebe que, quando é cobrado o valor de R$ 14,80 pelo rodízio de pizzas, o número médio de fregueses é 180. Ao reduzir o preço para R$ 12,40, ele nota que o número médio de fregueses tem um acréscimo de 120. Considerando que essa demanda seja linear, calcule o número médio de fregueses correspondente a uma redução no preço para R$ 10,00.

(A) 420 (B) 520 (C) 600 (D) 750 (E) 900

E176) Dois amigos, Nelson e Marcos, resolveram abrir uma empresa. Depois de certo tempo, eles resolveram dividir entre si o lucro de R$ 28.000,00. Nelson havia investido o valor de R$ 9.000,00 durante um ano e 3 meses, enquanto Marcos investira R$ 15.000,00 durante um ano. Considerando a quantia e o tempo de investimento, determine a parte do lucro que cabe a Nelson.

(A) R$ 12.000,00 (B) R$ 15.000,00 (C) R$ 16.000,00 (D) R$ 17.525,00 (E) R$ 18.000,00

E177) Um grupo de amigos combinaram contribuir com partes iguais para fazer um jogo na loteria, numa aposta de R$ 108,00. Como 5 deles desistiram, a cota de cada um dos outros ficou aumentada de R$ 3,60. Quantos fizeram a aposta?

(A) 5 (B) 8 (C) 10 (D) 15 (E) NRA

E178) Célio e Oliveira partem do ponto A, ao mesmo tempo, fazendo o mesmo percurso para a cidade de Santos, distante 72 km do ponto A. Célio, que anda 2 km/h a mais que Oliveira, chega a Santos 3 horas antes. Calcular, em km/h, a velocidade média de Célio.

E179) Um trem parte da cidade A para a cidade B às 10 horas da manhã, com velocidade constante de 40 km/h. Duas horas depois, portanto, ao meio dia, parte da cidade B para a cidade A, um outro trem com velocidade constante de 60 km/h, Sabendo que as cidades A e B distam de 1200 km, calcular a que distância da cidade A, um trem passará pelo outro.

E180) (*) Um fazendeiro tem provisões para alimentar 32 bois durante 25 dias. No fim de 4 dias, o fazendeiro compra mais 10 bois. Quanto tempo durarão as provisões, se a ração de cada boi não é aumentada?

E181) Um rajá deixou n pérolas como herança para suas duas filhas, determinando que a divisão se faria do seguinte modo: a filha mais velha retiraria 1 (uma) pérola e a seguir, 1/7 das que restassem. Depois, a outra filha retiraria dentre as restantes, 2 pérolas, a seguir retiraria mais 1/7 das que restassem. Se ao final, cada filha recebeu o mesmo número de pérolas, calcule o valor de n.

Scanned by CamScanner

E182) Uma prancha de R$ 840,00 devia ser comprada por um grupo de rapazes que contribuiriam com partes iguais, Como três deles desistiram, a quota de cada um dos outros ficou aumentada em R$ 36,00. Quantos rapazes compunham o grupo original?

E183) Uma torneira enche um tanque em 3 horas, e uma outra torneira enche o mesmo tanque em 6 horas. Em quanto tempo as duas juntas encherão o tanque?

E184) Um garoto compra o lote de 3 laranjas ao preço de R$ 0,10. Se ele vende o lote de 5 laranjas por R$ 0,20 e pretende lucrar R$ 1,00, deverá vender quantas laranjas?

(A) 67 (B) 150 (C) 200 (D) 300 (E) 350

E185) CN 75 - A que taxa mensal deve ser colocado um capital durante certo tempo, para que o juro recebido seja o triplo do que receberá na taxa anual de 2%?

(A) 2,5% (B) 15% (C) 3% (D) 1% (E) 0,5% (F) NRA

E186) CN 76 - Um capital é empregado à taxa de 8% ao ano. No fim de quanto tempo os juros simples produzidos ficam iguais a 3/5 do capital?

(A) 5 anos e 4 meses (B) 7 anos e 6 meses (C) 8 anos e 2 meses
(D) 6 anos e 4 meses (E) 7 anos e 3 meses

E187) CN 78 - Se, ao efetuarmos o produto do número 13 por um número inteiro N de dois algarismos e, por engano, invertermos a ordem dois algarismos desse número N, o resultado poderá aumentar de:

(A) 130 (B) 260 (C) 65 (D) 167 (E) 234

E188) CN 79 - Com uma produção diária constante, uma máquina produz 200 peças em D dias. Se a produção diária fosse de mais 15 peças, levaria menos 12 dias para produzir 200 peças. O número D é um número:

(A) múltiplo de 6 (B) primo (C) menor que 17 (D) maior que 24 (E) entre 17 e 24

E189) (*) CN 80 - Se, ao multiplicarmos o número inteiro e positivo N por outro número de 2 algarismos, invertemos a ordem dos algarismos deste segundo número, o resultado fica aumentado de 207. A soma dos algarismos que constituem o número N dá:

(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8 (E) 9

E190) (*) CN 80 - Dois veículos partem juntos de um ponto A, em uma corrida de ida e volta entre os pontos A e B. Sabendo que a distância entre A e B é 78 km e que as velocidades dos veículos são 70 km/h e 1000 metros por minuto, concluímos que eles voltam a se encontrar depois do tempo de:

(A) 1h 30 min (B) 1h 12 min (C) 1h 40 min (D) 1h 42 min (E) 1h 36 min

E191) CN 80 - Um número natural de 6 algarismos começa, à esquerda, pelo algarismo 1. Levando-se este algarismo 1, para o último lugar, à direita, conservando a sequência dos demais algarismos, o novo número é o triplo do número primitivo. O número primitivo é:

(A) 100.006 (B) múltiplo de 11 (C) múltiplo de 4 (D) múltiplo de 180.000 (E) divisível por 5

Scanned by CamScanner

E192) CN 82 - Um terreno deve ser dividido em lotes iguais por certo número de herdeiros. Se houvessem três herdeiros a mais, cada lote diminuiria de 20 m^2, e se houvessem quatro herdeiros a menos, cada lote aumentaria de 50 m^2. O número de metros quadrados da área do terreno todo é:

(A) 1600 (B) 1400 (C) 1200 (D) 1100 (E) 900

Alunos do CN

E193) CN 86 - Duas pessoas constituíram uma sociedade: a primeira entrou com um capital de R$ 5.000,00 e a segunda com R$ 6.000,00. Um ano depois, admitiram um terceiro sócio, que entrou com um capital de R$ 10.000,00. Decorridos 18 meses desde o início da sociedade, a firma teve um lucro de R$ 12.900,00. A parte do lucro que caberá ao terceiro sócio é, em reais:

(A) 1.000 (B) 2.000 (C) 3.000 (D) 4.000 (E) 5.000

E194) (*) CN 87 - Dois capitais são empregados a uma mesma taxa de 3% ao ano. A soma dos capitais é igual a R$ 50.000,00. Cada capital produz R$ 600,00 de juros. O primeiro permaneceu empregado 4 meses mais que o segundo. O segundo capital foi empregado durante

(A) 6 meses (B) 8 meses (C) 10 meses (D) 2 anos (E) 3 anos

E195) (*) CN 89 - Uma pessoa tomou um capital C a uma taxa mensal numericamente igual ao número de meses que levará para saldar o empréstimo. Tal pessoa aplica o capital C a uma taxa de 24% ao mês. Para que tenha um lucro máximo na operação, deverá fazer o empréstimo e a aplicação durante um número de meses igual a:

(A) 6 (B) 12 (C) 18 (D) 24 (E) 36

E196) CN 75 - Um composto A leva 20% de álcool e 80% de gasolina e um composto B leva 30% de álcool e 70% de gasolina. Quantos litros devemos tomar do composto A para, completando com o composto B preparar 5 litros de um composto com 22% de álcool e 78% de gasolina? OBS.: Questão similar caiu no CN 2009.

(A) 2 (B) 3 (C) 2,5 (D) 3,5 (E) 4 (F) N.R.A.

E197) CN 76 - O número 38 é dividido em duas parcelas. A maior parcela dividida pela menor dá quociente 4 e resto 3. Achar o produto dessas duas partes.

(A) 240 (B) 136 (C) 217 (D) 105 (E) 380

E198) CN 77 - Os números x, y e z são diretamente proporcionais a 3, 9 e 15, respectivamente. Sabendo que o produto desses 3 números é xyz = 960, a soma será:

(A) 45 (B) 48 (C) 36 (D) 72 (E) 24

E199) CN 78 - Depois de transformarmos o sistema abaixo em um do 1º grau, os valores de módulo diferentes de x e y têm para módulo da diferença:

$$\begin{cases} x^3 - xy^2 - yx^2 + y^3 = 16 \\ x^3 - xy^2 + yx^2 - y^3 = 32 \end{cases}$$

(A) 1 (B) 5 (C) 4 (D) 3 (E) 2

Scanned by CamScanner

E200) Um barco capaz de navegar a 12 km/h em água parada, navega em um rio cuja correnteza flui a 3 km/h. Qual e a velocidade média de uma viagem de ida e volta, 60 km rio abaixo e retornar ao ponto de partida?

E201) Uma agência de aluguel de carros cobra R$ 500,00 por semana e mais R$ 0,50 por quilômetro. Em uma viagem de 1 semana, quantos quilômetros podem ser percorridos com R$ 1200,00 ?

E202) Depois de um desconto de 20%, um automóvel foi vendido por R$ 24.000,00. Qual era o preço original?

E203) Um homem distribuiu R$ 64.000,00 para seus três filhos. O filho mais velho recebeu três vezes o valor recebido pelo mais novo. O filho do meio recebeu R$ 14.000,00 mais que recebeu o mais novo. Quanto dinheiro o filho do meio recebeu?

(A) R$ 10.000,00 (B) R$ 15.000,00 (C) R$ 19.600,00 (D) R$ 24.000,00 (E) R$ 30.000,00

E204) O professor Xeréu propôs aos seus alunos o seguinte desafio:
Tome um número inteiro qualquer, multiplique por 3, some 49 e divida o resultado por 7. Subtraia 7 do quociente, divida o novo resultado por 3. Diga a sua resposta e eu direi qual era o seu número original. O aluno Juquinha, ao invés de começar com um número, partiu de uma expressão algébrica, e ao final das contas, chegou ao resultado 2a + b, e o professor ainda assim conseguiu determinar a expressão original, que era:

(A) $\frac{14a+7b}{3}$ (B) $\frac{2a+b}{7}$ (C) $14a+7b-98/3$ (D) $\frac{2a+b}{3}$ (E) $14a+7b$

E205) Meu filho é 5 vezes mais velho que minha filha, e minha esposa é 5 vezes mais velha que meu filho. Eu sou duas vezes mais velho que minha esposa, e minha avó, que é tão velha quanto todos nós juntos, tem 81 anos. Qual é a minha idade?

(A) 1 (B) 5 (C) 25 (D) 35 (E) 50

E206) Dois veículos iniciam suas trajetórias, um em direção ao outro, em uma estrada reta, a 55 km/h cada. Qual será a distância entre eles, 5 minutos depois que eles se cruzam na estrada?

(A) 4,5 km (B) 5 km (C) 9,2 km (D) 10 km (E) 22 km

E207) A distância percorrida por um automóvel é proporcional ao tempo gasto viajando. Qual dos gráficos abaixo melhor representa essa distância d(t) que o carro percorrem em função do tempo?

a.

b. 

c.

d. 

e. NRA

E208) Dois ciclistas estão competindo em uma corrida de 12 km, em uma pista circular de 250 m. Eles começam a corrida ao mesmo tempo. Um deles anda a 24 km/h e o outro a 30 km/h. Quando o mais rápido completa a corrida, quantas voltas ainda terá o mais lento para percorrer?

Scanned by CamScanner

(A) 2,4 (B) 3 (C) 9 (D) 9,6 (E) 12

E209) Três estados A, B e C têm juntos, uma população de 38.500.000 habitantes. O estado A tem a metade da população do estado B e o dobro da população do estado C. Qual é a população do estado C?

(A) 2.750.000 (B) 5.500.000 (C) 11.000.000 (D) 22.000.000 (E) Não há dados suficientes

E210) Um número de 3 dígitos aumenta seu valor em 9 unidades se invertermos as posições dos algarismos das unidades e dezenas, e aumenta em 90 unidades de invertermos as posições dos dígitos das centenas e dezenas. Em quanto o número aumentará se invertermos as posições dos dígitos das unidades e das centenas?

E211) Um barco anda 24 quilômetros rio acima e volta os 24 quilômetros rio abaixo em um total de 5 horas. Se a velocidade rio acima é 4 km/m menor que a velocidade rio abaixo, com qual velocidade, em km/h, o barco navega rio abaixo?

(A) 8 (B) 9,6 (C) 11,6 (D) 12 (E) 13,6

E212) Um retângulo é repartido em 4 retângulos menores, com as áreas indicadas na figura ao lado. Encontre a área do retângulo desconhecido.

(A) 72 (B) 60 (C) 54 (D) 48 (E) 36

150	180
?	72

E213) A soma dos dois algarismos de um número é 12. Se a ordem dos algarismos é invertida, o novo número será o dobro do número original, menos a soma dos dígitos. Qual é o número original?

E214) João pode completar 2/3 de uma tarefa em 6 dias; Carlos pode completar 1/3 da mesma tarefa em 5 dias. Se Carlos e Pedro trabalharem juntos, eles podem realizar esta tarefa em 6 dias. Pedro começou a trabalhar na tarefa segunda-feira; João e Carlos juntaram-se a Pedro no dia seguinte para completarem a tarefa junto com Pedro. Em qual dia os três juntos finalizaram a tarefa?

(A) Quarta-feira (B) Quinta-feira (C) Sexta-feira (D) Sábado (E) Domingo

E215) (*) João, Carlos e Maria começaram a resolver uma lista de problemas de matemática juntos, sendo que cada um precisava resolver todos os problemas. Cada um trabalha a uma taxa constante. João resolveu 12 problemas por dia e terminou a lista 3 dias depois de Carlos. Maria resolveu 3 problemas a mais que Carlos a cada dia, e terminou a lista dois dias antes de Carlos. Quantos dias levou Maria para terminar a lista?

(A) 18 (B) 15 (C) 12 (D) 10 (E) 9

E216) Um artista criou uma estátua com peso de 14 kg. O trabalho contém ao todo, 75% de bronze. Ele usou duas ligas que contém, respectivamente, 60% e 80% de bronze. Quantos quilos da liga de 60% foram usados?

(A) 10,5 kg (B) 3,5 kg (C) 4,13 kg (D) 0,45 kg (E) 4,5 kg

E217) Dados que $2^x.16^y = 32$ e $27^{y=9^x}$, resolva as equações e encontre x e y. Qual é o valor do produto x.y?

(A) 0 (B) 150/121 (C) 1/4 (D) 4 (E) 15/12

Scanned by CamScanner

E218) Lupércio, um estudante de química, precisa de uma solução de ácido acético a 10% para um experimento químico. Ele percebe que só tem soluções disponíveis a 5% e 20%. Ele decide sintetizar uma solução a 10%, combinando as soluções de 5% e de 20%. Quantos litros da solução de 5% devem ser adicionados a 8 litros da solução de 20% para obter uma solução de ácido acético a 10%?

(A) 16,5 L (B) 32 L (C) 16 L (D) 8,5 L (E) 24 L

E219) Em 3 anos João terá a metade da idade atual de sua mãe. O avô de João tem 48 anos, o dobro da idade da mãe de João. Qual é a idade de João?

(A) 18 (B) 9 (C) 6 (D) 12 (E) 8 (F) NRA

E220) (*) Maria, Joana e Carla podem andar a 6 km/h. Elas possuem uma motocicleta que anda a 90 km/h, mas pode acomodar apenas duas pessoas (e não pode dirigir a si mesma). Seja t o tempo em horas levado para as três chegarem a um ponto a 135 km de distância. Ignorando o tempo levado para dar a partida, embarcar e desembarcar, o que é correto sobre o menor valor possível para t?

(A) $t < 3,9$ (B) $3,9 \leq t < 4,1$ (C) $4,1 \leq t < 4,3$ (D) $4,3 \leq t < 4,5$ (E) $4,5 \leq t$

E221) Quantos litros de água devem ser adicionados a 0,25 L de ácido sulfúrico puro para obter uma solução de 10% de ácido?

E222) Joana é dois anos mais velha que Flávia. 10 anos atrás, a soma de suas idades era 36. A idade de Joana dentro de 6 anos será:

(A) 35 (B) 15 (C) 29 (D) 23 (E) NRA

E223) Quantos ml de uma solução de ácido a 30% devem ser adicionados a 20 ml de uma solução de ácido a 60% para obter uma solução de ácido a 50%?

(A) 20 (B) 10 (C) 20/3 (D) 60 (E) 30

E224) Um carro percorre 120 km no mesmo tempo em que outro percorre 80 km. Se a velocidade do primeiro carro é 20 km/h maior que a velocidade do segundo carro, encontre a velocidade do primeiro carro.

E225) Uma solução A contém 40% de água e 60% de ácido. Uma solução B contém 80% de água e 20% de ácido. Quantos litros da solução A devem ser misturados com 5 litros da solução B para fazer uma nova solução com 50% de água e 50% de ácido?

E226) Um tanque tem duas torneiras, sendo que uma o enche em 6 horas, e a outra em 5 horas. Em quanto tempo o tanque será cheio com as duas torneiras abertas?

E227) Se a soma de três inteiros consecutivos é 174, qual é o menor dos três inteiros?

E228) Jonas vai fazer uma viagem de automóvel, entre duas cidades que distam de 120 km, em duas horas. Nos primeiros 60 km, Jonas dirige a 50 km/h. A que velocidade deve dirigir o restante do percurso para com seguir chegar no destino com duas horas de viagem, como planejado?

E229) Colégio Naval 2015
Dado o sistema S:

Scanned by CamScanner

$$\begin{cases} 2x - ay = 6 \\ -3x + 2y = c \end{cases}$$

nas variáveis x e y, pode-se afirmar que:

A) Existe $a \in]6/5, 2[$ tal que o sistema S não admite solução para qualquer número real C.
B) Existe $a \in]13/10, 3/2[$ tal que o sistema S não admite solução para qualquer número real C.
C) Se $a = 4/3$ e $C = 9$, o sistema S não admite solução.
D) Se $a \neq 4/3$ e $C = -9$, o sistema S admite infinitas soluções.
E) Se $a = 4/3$ e $c = -9$, o sistema S admite infinitas soluções.

E230) Colégio Naval 2015
Qual a medida da maior altura de um triângulo de lados 3, 4, 5?

(A) 12/5 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 20/3.

E231) Colégio Naval 2015
Na multiplicação de um número k por 70, por esquecimento, não se colocou o zero à direita, encontrando-se, com isso, um resultado 32823 unidades menor. Sendo assim, o valor para a soma dos algarismos de k é

A) par.
B) uma potência de 5.
C) múltiplo de 7.
D) um quadrado perfeito.
E) divisível por 3.

CONTINUA NO VOLUME 2: 240 QUESTÕES DE CONCURSOS

Respostas dos exercícios

E1) 100 e 24 E2) 103 e 12 E3) 25 e 295 E4) 15 e 64 E5) 7/18

E6) 2/3 E7) –3/–18 E8) 45 E9) 75 e 57

E10) 8 de 0,05 e 26 de 0,50 E11) A tem 60 e B tem 10 anos

E12) A tem 25 e B tem 5 E13) 18 anos E14) –35 anos (ocorreu há 35 anos atrás)

E15) o pai tem 36 anos e o filho tem 12 anos E16) 25 anos

E17) A tem 30 e B tem 15 E18) 67 e 13 anos E19) 28 anos

E20) 45 anos E21) 5 h E22) 2,4 h E23) 10/11 h E24) 30 h

E25) 60/47 dias E26) 12 min E27) 40/9 h E28) 18/5 h

E29) Jaime: 3h, Sebastião: 6h E30) 16h E31) 4,8 h E32) 5 h

E33) 1,5 h E34) 12/7 h E35) 12 h E36) 15 d

E37) 10 d. Sugestão: Fazer W = 60 e trabalhar com números inteiros

E38) 15, 10 e 6. 4 E39) 6 h e 12 h E40) A = 21 min e B = 15 min

Scanned by CamScanner

E41) 3:30 h E42) 2h 56 min 40 s E43) 240 km E44) 60 km/h e 80 km/h

E45) 3 km/h E46) 2 h E47) (D) E48) (D) E49) (B)

E50) (E) 1125 km E51) (C) E52) 1,8 L E53) 8 g

E54) 333 L E55) 40 mL de A e 60 ml de B. E56) 90 L da pura e 60 L da outra.

E57) 40 L da 1ª e 20 L da 2ª E58) 10 L
OBS.: Considerar a evaporação como uma solução de volume negativo e salinidade 0%.

E59) 33,33 L
OBS.: Água pura é o mesmo que uma solução com concentração de 0% da substância dissolvida na água.

E60) 2 kg a 30% e 8 kg a 20% E61) (C) E62) 2.500,00 a 10% e 6.500,00 a 12%

E63) A primeira parte a 4,5% a.a. (ao ano) e a segunda a 6,5% a.a

E64) R$ 850,75 E65) R$ 235,20 E66) 1% a.m. E67) R$ 20.000 E68) R$ 10.000

E69) R$ 1.500 E70) 12% a.a. E71) 8 e 16, ou – 8 e –16. E72) 20

E73) 48 E74) 160 e 60 E75) 10/25 E76) 8/36 E77) 12

E78) 37
OBS. E37: Como temos uma equação e duas incógnitas (os algarismos), temos que testar valores. Caso típico de problemas que misturam conceitos de aritmética e álgebra.

E79) 20 e 16 E80) –12/–22 E81) 1º = 60 e 2º = 8

E82) Laranja = R$ 0,30, Banana = R$ 0,10 e Maçã = R$ 0,40
E83) 1º = 20, 2º = 15, 3º = 12 E84) 1º = 19, 2º = –7 , 3º = 77 E85) 83

E86) 84 E87) E88) 80 de R$ 33,00 e 120 de R$ 18,00

E89) 35 e 69 E90) 30,4 e 45,4 E91) 500 e 400 E92) 8 E93) 80 carros, 20 motos

E94) 54 e –40 E95) 48 E96) –5 E97) 20 E98) R$ 30,00

E99) 51 e 21 E100) (D) E101) 20 min E102) 10/7 E103) 96/13 h

E104) (C) E105) (B) E106) (D) E107) (C) E108) 83

E109) 1ª parte em 1 h e 2ª parte em 3 h E110) (B) E111) (B)

E112) (E) E113) (E) E114) (C) E115) (E) E116) (D)

E117) 23 e 17 E118) Cavalo a R$ 9.200,00 e vaca a R$ 6.400,00 E119) 180

E120) 19 de R$ 1,00 e 8 e R$ 0,25 E121) 5 E122) 2,5 anos

E123) 20 anos E124) (E) E125) 5 mil e 25 mil E126) 7/2

Scanned by CamScanner

E127) 15 de 6 e 25 de 4 E128) 27 e 36 E129) 423 E130) 35 e 10

E131) Nunca mais será, isto já ocorreu há 3 anos atrás.

E132) Idem, isto já ocorreu há 5 anos atrás E133) 28/3 E134) 120 km

E135) 20 km E136) 1º = 73 e 2º = 37 E137) 396

E138) 15 cédulas e 11 moedas E139) A tem 25 e B tem 10 anos

E140) 1ª solução: primeiro = 4 e segundo = 9
2ª solução: primeiro = 9 e segundo = 4, considerando a raiz quadrada negativa
Quando é usada a expressão "raiz quadrada", é tão válido considerar somente a positiva, quanto é também válido considerar a positiva e a negativa, com 2 soluções. Já quando se usa o símbolo do radical, considera-se apenas a raiz positiva. Cabe ao formulador da questão especificar melhor o que se pede, não é correto usar "pegadinhas" com tópicos polêmicos.

E141) 10 E142) 10 pessoas, R$ 8,00 E143) 10 E144) 20 L

E145) 2 ou –6 E146) 5 ou –15 E147) 1º = 10.500 e 2º = 6.000 E148) 6 e 8

E149) 43 e 8 E150) no início, 8 E151) 750 m E152) 1ª = 28 e 2ª = 18

E153) 87 e 88 E154) 100 L do 1º e 40 L do 2º E155) 180 km

E156) 80g de ouro e 1240g de prata E157) o 1º tem 20 e o 2º tem 30

E158) A tem R$ 25,00 e B tem R$ 5,00 E159) A tem R$ 70,00 e B tem R$ 30,00

E160) 1ª parte = R$ 11.000,00 e 2ª parte = R$ 9.000,00

E161) 24 de R$ 0,10 e 20 de R$ 0,25

E162) 1ª parte = R$ 6.000,00 e 2ª parte = R$ 2.000,00

E163) 4% e 8% no prazo envolvido E164) 25 L

E165) 16 E166) 6 kg E167) 20 mL a 13%, 30 mL a 18% E168) 7563

E169) 834
OBS.: Como já foi explicado, "subtraímos 369 do número citado" significa "número citado – 369"

E170) 140, 90 e 130 E171) 3x + 2a + b E172) 3x + 7

E173) 20 e 20, nesta ordem E174) dh(h + r) E175) (A)

E176) (A) E177) (C) E178) 8 km/h E179) 528 km E180) 16

E181) 36 E182) 10 E183) 2h E184) (B) E185) (E)

E186) (B) E187) (E) E188) (E) E189) (A) E190) (B)

E191) (B) E192) (C) E193) (C) E194) (B) E195) (B)

Scanned by CamScanner

E196) (E) E197) (C) E198) (C) E199) (E) E200) 11,15 km/h

E201) 1400 E202) R$ 30.000,00 E203) (C) E204) (E)

E205) (E) E206) (C) E207) (B) E208) (D) E209) (B)

E210) 198 E211) (D) E212) (B)

Sugestão no E212: Os lados são proporcionais às medidas das áreas

E213) 48 E214) (C) E215) (D) E216) (B) E217) (B)

E218) (C) E219) (B) E220) (C) E221) 2,25 E222) (A)

E223) (B) E224) 60 km/h E225) 15 E226) 30h/11 E227) 57

E228) 75 km/h E229) (C) e (E) (anulada) E230) (C) E231) (A)

Resoluções de exercícios selecionados

E1) A soma de dois números é 124, e se o maior for dividido pelo menor, o quociente é 4 e o resto é 4. Encontre os números.

Divisor = x
Dividendo = quociente . divisor + resto
Dividendo = 4x + 4
$(4x + 4) + x = 124 \therefore 5x + 4 = 124 \therefore 5x = 120 \therefore x = 24$, e $y = 4x + 4 = 100$

R: 24 e 100

E5) Uma fração torna-se igual a 1/2 se adicionamos 2 ao seu numerador, e torna-se igual a 1/3 se 3 é adicionado ao denominador. Encontre a fração.

Seja a fração x/y, com x e y inteiros. O problema dá:
$(x + 2)/y = 1/2$ e $x/(y+3) = 1/3$, que resultam em:
$2(x + 2) = y \therefore y = 2x + 4$
$3x = y + 3 \therefore y = 3x - 3$
Igualando os dois valores encontrados para y:
$2x + 4 = 3x - 3 \therefore x = 7$
Segue-se que $y = 2 \times 7 + 4 \therefore y = 18$

R: a fração é 7/18

E8) A soma dos dois dígitos de um número natural é 9, e se adicionarmos 9 ao número, os dígitos do número vão ser trocados. Encontre o número.

Seja o número ab, que vale 10a + b. O problema dá que "ab" + 9 = "ba", ou seja
$10a + b + 9 = 10b + a \therefore 9a + 9 = 9b \therefore a + 1 = b$
Resolvendo o sistema com $a + 1 = b$ e $a + b = 9$, encontramos $a = 4$ e $b = 5$.

R: 45

E15) Um filho tem 1/3 da idade do seu pai. Há quatro anos atrás, ele tinha apenas 1/4 da idade do pai. Qual é a idade de cada um hoje?

O pai tem o triplo da idade do filho, sejam as idades P=3x e F=x respectivamente.
Há 4 anos atrás as idades eram P=3x–4 e F=x–4.
O problema dá que há 4 anos, $3x - 4 = 4(x - 4) \therefore x = 12$.

Scanned by CamScanner

As idades atuais são P=36 e F=12.

R: 36 e 12

E20) Um pai tem o triplo da idade do seu filho, e sua filha é 3 anos mais nova que o irmão. Se a soma de todas as idades há 3 anos atrás era 63 anos, encontre a idade atual do pai.

As idades atuais são:
Filha: x Filho: $x + 3$ Pai: $3(x + 3) = 3x + 9$
Há 3 anos: $(x - 3) + x + (3x + 6) = 63 \therefore x = 12$
A idade atual do pai é $3(x + 3) = 45$ anos.

R: 45 anos

E21) Uma cisterna possui três torneiras. A primeira é capaz de encher o tanque em 12 horas, a segunda em 20 horas, e as três juntas enchem o tanque em 6 horas. Quanto tempo a terceira torneira sozinha levará para encher a cisterna?

Podemos aplicar diretamente a fórmula das torneiras porque todas operam juntas.
$1/12 + 1/20 + 1/T = 1/6$ (multiplicar por 60T, que é o MMC dos denominadores)
$5T + 3T + 60 = 20T$ (T é o tempo que a 3ª torneira leva para encher o tanque sozinha)
$60 = 12T \therefore T = 5$

R: 5 horas

E22) Um tanque tem 3 torneiras, sendo que duas podem enchê-lo por completo em 3 e 4 horas, respectivamente, e uma terceira que o esvazia em 6 horas. Em quanto tempo o tanque será cheio com as três torneiras operando simultaneamente?

As torneiras operam simultaneamente, então a fórmula das torneiras pode ser usada, porém a torneira que esvazia leva um sinal negativo:
$1/T = 1/3 + 1/4 - 1/6 \therefore T = 2{,}4$ h

R: 2,4 h

E29) Sebastião demora 3 horas a mais que Jaime para cortar a grama de um grande campo. Juntos eles cortam toda a grama em 2 horas. Quanto tempo cada um deles, trabalhando sozinho, leva para cortar toda a grama?

J: x, S: x+3

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{x} + \frac{1}{x+3} \rightarrow \frac{1}{1} = \frac{2}{x} + \frac{2}{x+3} \quad \text{MMC} = x(x+3)$$

$x^2 + 3x = 2(x + 3) + 2x$
$x^2 - x - 6 = 0$
Fatorando: $(x + 2)(x = 3) = 0 \rightarrow x = -2$ ou $x = 3$ (x não pode ser negativo !)
$x = 3$
Jaime demora 3 horas, Sebastião demora 6 horas
De fato, $1/3 + 1/6 = ½$

R: Jaime: 3h, Sebastião: 6h

E31) No problema anterior, a primeira torneira fica aberta sozinha na metade do tempo, depois é fechada e abre-se a segunda torneira, sozinha, na outra metade do tempo.

A vazão da primeira torneira é C/4, da segunda é C/6. Cada uma operou sozinha durante um tempo x/2. A capacidade total é a soma das capacidades.

Scanned by CamScanner

$\frac{C}{4}.\frac{x}{2}+\frac{C}{6}.\frac{x}{2}=C \ \therefore$ x = 4,8 h (C irá cancelar)

R: 4,8 h

E34) Um tanque possui duas torneiras, capazes de enchê-lo em 8 e 6 horas, respectivamente. Inicialmente é aberta somente a primeira torneira, e depois que o tanque está 50% cheio, abre-se a segunda torneira, que opera junto com a primeira. Quanto tempo será necessário para encher o restante do tanque?

As vazões são respectivamente C/8 e C/6, sendo C a capacidade do tanque.
A primeira torneira trabalhará durante 4 horas para encher a metade do tanque. Para encher a outra metade (capacidade C/2), a vazão total será a soma das vazões das torneiras, C/8 + C/6.
O tempo necessário será capacidade/vazão, ou seja:

$\frac{C/2}{C/8+C/6}=\frac{12}{7}h$, lembrando que Tempo = Capacidade / Vazão.

R: 12/7 h

E35) A e B trabalhando juntos aram um campo em 10 horas. A e C fazem o mesmo trabalho em 12 horas, e A sozinho faz o mesmo trabalho em 20 horas. Em quanto tempo B e C juntos farão o mesmo trabalho?

Pessoas trabalhando juntas funcionam matematicamente como torneiras que enchem tanques em conjunto. O que corresponde à vazão das torneiras, é o *rendimento*, de cada pessoa. Por exemplo, o rendimento de A, r_A, é igual ao trabalho total W dividido pelo tempo T_A, que a pessoa A necessita para fazer o trabalho sozinha. Os rendimentos se somam quando pessoas trabalham juntas. No nosso problema temo $r_A = W/20$, $r_A + r_B = W/10$, e $r_A + r_C = W/12$. O trabalho W cancelará e temos 3 equações para determinar r_A, r_B e r_C. Para dar a resposta temos que somar r_B e r_C. Sem perda de generalidade podemos usar W=1, sabendo que os rendimentos estarão referenciados a um trabalho unitário.
$r_A = 1/20$
$r_A + r_B = 1/10 \rightarrow r_B = 1/20$
$r_A + r_C = 1/12 \rightarrow r_C = 1/12 - 1/20 = 1/30$
O problema requer o cálculo de $r_B + r_C = 1/20 + 1/30 = 1/12$
Se $r_B = 1/12$, B necessita de 12 horas para fazer o trabalho.

R: 12 h

E41) Dois trens em partem de um mesmo tempo, na mesma direção mas em linhas diferentes, horários diferentes e velocidades diferentes. O primeiro trem parte às 2 horas com velocidade de 80 km/h. Às 2:30 parte um segundo trem, na mesma direção, com velocidade de 120 km/h. A que horas o segundo trem ultrapassará o primeiro?

Quando o segundo trem partir (1/2 hora depois do 1º), o 1º já terá andado 40 km (8km/h x 0,5 h). O segundo trem é 40 km/h mais rápido que o 1º. O tempo para que o 2º trem alcance o 1º é espaço/velocidade, levando encontra as variações, ou seja, 40 km / 40 km/h = 1 hora. O 1º trem será alcançado 1 hora depois, ou seja, às 3:30 h.

R: 3:30 h

E42) Repetir o problema anterior, nas mesmas condições, exceto que às 2:40 o primeiro trem faz uma parada de 20 minutos.

Nesse caso é melhor pensar em gráficos, do tipo espaço x tempo. No problema 41, o primeiro trem parte em t=0 (considere a contagem de tempo em t=0, correspondentes à partida do

Scanned by CamScanner

primeiro trem, ao invés de 2 horas). A figura abaixo mostra o gráfico das trajetórias dos dois trens.

No primeiro gráfico, relativo ao problema anterior, mostrado à esquerda na figura abaixo, as retas indicadas com (1) e (2) mostram os movimentos dos dois trens. O trem (1) partiu da posição 0, no instante 0, e seguiu uma trajetória com velocidade constante (representada por uma reta), à razão de 80 km/h, que é o mesmo que 40 km a cada 30 min. O trem 2, indicado pela reta (2), partiu da posição 0 no instante t=30 min, e moveu-se com velocidade constante de 120 km/2. No instante t=90, ou seja, depois de mais uma hora de viagem, o trem 2 estará no quilômetro 120, tendo levado até lá, 1 hora de viagem. O trem 1, após essa mesma hora adicional, estará também no km 120, pois terá andado mais 80 km em uma hora.



É preciso fazer o desenho dos gráficos para ter uma ideia do que ocorre com a posição relativa dos trens. O problema indica que em t = 40 min, o trem (1) para por 20 minutos, ou seja, fica parado de t=40 min até t = 60 min. No instante t=40, no qual o trem (1) para, é possível verificar que o trem (2) ainda não o alcançou, pois (1) estará em 80 x 2/3 h = 53,33 km, enquanto o trem (2) terá andado apenas 120 x (1/6 h) = 20 km. O gráfico da direita mostra essa situação em t = 40. O mais importante do problema, é preciso verificar qual é o instante em que o trem (2) passa pelo km 53,33. Se for antes de 60 s, significa que o trem (1) continuará parado mais um pouco depois que o trem (2) o ultrapassa.

O tempo que o trem (2) leva para chegar ao km 53,33 é 53,33 km / 2 km/min = 26,6 min (aqui a velocidade foi convertida para 2 km/min, para que o tempo todo seja dado em minutos). Concluímos então que quando o trem (2) passar pelo km 53,33m terão passado 26,6 minutos depois da sua partida, ou seja, isto ocorrerá antes do instante t=60 (30 minutos de percurso para (2)), que é o instante no qual o trem (1) volta a andar. O instante em que o trem (2) ultrapassa o trem (1) é 30 min + 26,6 min = 56,6 minutos, após as 2:00 horas, ou seja, 2h 56 min e 40 s, aproximadamente.

R: 2h 56 min 40 s

E46) Dois trens partem no mesmo instante, um da cidade A em direção à cidade B, a 80 km/h, e outro da cidade B para a cidade A, a 70 km/h. A distância entre as cidades é 300 km. Em quanto tempo os trens se encontrarão?

$80t + 70t = 300 \therefore t = 2$

R: 2 horas

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

(A) 20.000 (B) 30.000 (C) 40.000 (D) 50.000 (E) 60.000

Usaremos a unidade R$, mas poderíamos usar como unidade, os milhares de reais. Iremos também levar em conta apenas os juros, que totalizaram R$ 7.600 unidades. Os dois empréstimos serão calculados como x e 100.000 – x. O primeiro empréstimo teve juros de 10% em um ano, e o segundo, de 6% no mesmo período. O valor total de juros é a soma dos juros em cada empréstimo.

$x.0,1 + (100.000 - x).0,06 = 7.600$. Multipliquemos tudo por 100 para eliminar as casas decimais:

$10x + 600.000 - 6x = 760.000$

$4x = 160.000 \therefore x = 40.000$ (o primeiro empréstimo), e $y = 60.000$

R: (C)

E63) José recebeu um total de R$ 900,00 em um ano com seus investimentos. Se R$ 7.000,00 foi investido a uma certa taxa, e R$ 9.000,00 foi investido com uma taxa 2% maior, encontre as duas taxas de investimento.

Se considerarmos x a porcentagem, com 1 = 100%, usamos para as taxas, respectivamente x e x + 0,02. Já se considerarmos x um número na faixa de 0 a 100, as taxas são x/100 e (x + 2)/100. Usaremos a primeira opção.

$7000.x + 9000.(x+0,02) = 900 \therefore x = 0,045$ (ou seja, 4,5%) e a segunda taxa é 0,065 (6,5%).

R: A primeira parte a 4,5% a.a. (ao ano) e a segunda a 6,5% a.a

E68) (CN) Certa quantia foi colocada a juros, à taxa de 5% ao ano, durante 3 anos. Esse montante foi então aplicado a juros de 6% ao ano, durante mais 5 anos. O novo montante é de R$ 14.950,00. Qual foi o capital inicial?

Em um ano, a uma taxa anual de 5%, um capital C crescerá para 1,05C. Em 3 anos com a mesma taxa, o crescimento será o triplo, ou seja C tornar-se-á 1,15. Este valor total foi usado em uma nova aplicação (a anterior terminou), com juros de 6% em 5 anos, o que fará o capital investido ser multiplicado por 1,3. C foi multiplicado, levando em consta as duas aplicações, por 1,15 x 1,3 = 1,495. Como este valor finalizou em R$ 14.950,00, o capital C aplicado inicialmente foi de R$ 10.000,00.

R: R$ 10.000,00

E70) Uma pessoa empregou todo o seu capital da seguinte maneira: metade a 4% ao ano; um terço foi a 10% ao ano e a parte restante a uma taxa, tal que o seu rendimento total no fim de um ano, foi de 7 1/3 % do capital. Qual é essa taxa?

Podemos considerar o capital C como sendo 1, pois este valor irá cancelar, mas optamos por deixar C indicado para cancelamento posterior. As duas primeiras partes de C que foram divididas para as três aplicações foram C/2 e C/3. Calculando, a terceira parte será C/6.

A primeira parte, depois de um ano, aplicada a 4% a.a, ficará multiplicada por 1,04. A segunda ficará multiplicada por 1,10, e a terceira ficará multiplicada pelo fator T, que quando calculado, permitirá o cálculo da taxa.

Dado o rendimento, em função do capital, teremos que calcular por quanto este foi multiplicado. Este valor multiplicativo é 107 + 1/3 %, ou seja, foi multiplicado por

$1 + \frac{7\frac{1}{3}}{100} = 1 + \frac{22}{300}$. Podemos então montar a equação para cálculo do aumento total do valor:

$\frac{C}{2} \times 1,04 + \frac{C}{3} \times 1,1 + \frac{C}{6} \times T = C \times \left(1 + \frac{22}{300}\right)$. Simplificando por C e multiplicando todos por 300:

$152 + 110 + 50T = 322 \therefore T = 1,12$

Se T = 1,2, a taxa anual correspondente é 12%

Scanned by CamScanner

R: 12% a.a.

Sugestão: Depois de terminar o cálculo, partir de um capital de R$ 300,00 e aplicar a divisão em partes (1/2, 1/3 e 1/6) e as taxas (4%, 10% e 12%) e calcular o capital final, para constatar que a taxa resultante foi realmente 7,333% a.a.

E100) Um número de 3 dígitos é igual a 25 vezes a soma dos seus dígitos. Se os três dígitos forem revertidos, a número resultante excede o número original de 198. O dígito das dezenas é um a menos que a soma dos dígitos das unidades e das centenas. O dígito das dezenas do número dado é:

(A) 2 (B) 3 (C) 6 (D) 7 (E) 5

Seja o número "abc", com valor 100a + 10b + c. O problema dá que este valor é 25(a + b + c), então o número é múltiplo de 5, só pode terminar em 0 ou 5, portanto c=0 ou c=5.
Invertendo os dígitos o novo número excede o original de 198, então:
100a + 10b + c + 198 = 100c + 10b + a $\therefore$ a = c – 2.
Sendo assim c não pode ser 0, pois a é um dígito, não pode valer –2.
A única opção portanto é c = 5 e a = 3. O número é da forma 3_5.
O problema deu ainda que o dígito das dezenas é a + c – 1, então este dígito é 7. O número é 375, e seu dígito das dezenas é 7.

R: (D)

E115) Bernardo fez uma viagem de 120 km a uma velocidade média de 50 km/h. A primeira parte da viagem foi feita a uma velocidade de 30 km/h. A segunda parte foi feita a 60 km/h. Quantos quilômetros foram percorridos na primeira parte da viagem?

(A) 40 (B) 96 (C) 45 (D) 30 (E) 24

O tempo total de viagem é dado por espaço/(velocidade média) = 120 / 50 = 2,4 h
Chamamos as durações dos trajetos de x e 2,4 – x. O trajeto de 120 km é igual à soma dos trajetos nos dois trechos, o primeiro com x horas a 30 km/h e o segundo com (2,4 – x) horas a 60 km/h.
120 = 30.x + 60.(2,4 – x) $\therefore$ 120 = 30x + 144 – 60x $\therefore$ 30x = 24 $\therefore$ x = 0,8 h
O percurso na primeira parte foi de 0,8 x 30 = 24 km
Usamos todos os intervalos de tempo na mesma unidade (horas), todas as distâncias na mesma unidade (km) e todas as velocidades na mesma velocidade (km/h).

R: (E)

E125) A diferença entre os capitais de duas pessoas é R$ 20.000,00. Uma delas coloca o seu capital a 9% e a outra aplica-o na indústria, de modo que lhe renda 45%. Sabendo-se que os rendimentos são iguais, achar os dois capitais.

Os dois capitais devem ser chamados de x e x + 20, porém é preciso prestar atenção nos valores. O capital maior (x + 20) deve ser o aplicado a 9%, e o menor, a 45%, caso contrário, encontraríamos x negativo. Ou seja, o capital maior é aquele que foi aplicado a juros menores, e vice-versa. Note que o problema não indicou o tempo de aplicação, mas esta informação é desnecessária, pois este valor cancelará. Igualando os rendimentos, já com o tempo cancelado, ficamos com:
Capital 1 x Taxa 1 = Capital 2 x Taxa 2
9(x + 20) = 45x $\therefore$ x + 20 = 5x $\therefore$ x = 5
De fato, sendo os capitais respectivamente 5 mil e 25 mil, uma aplicação sobre 5 mil com taxa de 45% durante um tempo, dará o mesmo rendimento que uma outra de 9% sobre 25 mil, considerando o mesmo período (5 x 45 = 25 x 9)

R: 5 mil e 25 mil

Scanned by CamScanner

E143) Uma bicicleta de R$ 280,00 foi comprada por um grupo de meninos que contribuíram com partes iguais. Como 3 desistiram, a quota de cada um dos restantes foi aumentada em R$ 12,00. Quantos eram os meninos?

Parte de cada um, com x participantes: 280/x
Parte de cada um, com x – 3 participantes: 280/(x – 3)
Como 3 desistiram, a parte de cada um ficou maior, no caso, em R$ 12,00:

$$\frac{280}{x-3} - \frac{280}{x} = 12$$

$280x - 280(x - 3) = 12x(x - 3)$
$280.3 = 12x(x - 3) \therefore 280 = 4x(x - 3) \therefore 70 = x(x - 3) \therefore x^2 - 3x - 70 = 0$
$(x - 10)(x + 7) = 0$. Como x tem que ser positivo, então x = 10 (10 meninos)
Conferindo, antes cada um pagaria 280/10 = 28, depois passou para 280/7 = 40, ou sejam 12 reais a mais.

R: 10

E144) Um tonel continha 100 litros de vinho puro. Retirou-se certa quantidade de vinho que foi substituída por água. Em seguida retirou-se da mistura, novamente, a mesma quantidade, sendo então substituída por água. A mistura final resultou em 100 litros, contando 36 litros de água. Quantos litros foram trocados de cada vez?

Primeiro é preciso notar que quando é retirada uma quantidade constante de uma mistura com volume dado, e substituída por água, o efeito resultante é multiplicar a substância principal (a que está misturada com água) por um fator constante. Por exemplo, se temos um tonal de vinho puro, com 100 L, e retiramos 10 L da mistura (no caso, inicialmente só vinho) e adicionamos quantidade equivalente de água, o efeito resultante é multiplicar a quantidade de vinho por 0,9, com aumento de água para manter o volume total constante. Na primeira etapa, isto ressaltará em uma mistura de 100 L com 90% de vinho e o restante de água. A fazermos a operação da segunda vez, os 10 L de mistura retirados terão 9 L de vinho e 1 L de água, para então ser adicionada água pura. A mistura passará a contar então com 81 L de vinho e 19 L de água, ou seja, a quantidade de vinho puro foi novamente multiplicada por 0,9. Assim por diante, a cada passo, a quantidade de vinho puro continuará sendo multiplicada por 0,9 a cada etapa.

No caso do problema, este fator multiplicativo deve ser encontrado, vamos chama-lo de F (valor entre 0 e 1). Na primeira etapa, a quantidade de vinho incluído na mistura passou a ser 100F (eram 100 L iniciais). Na segunda etapa, passou a $100F^2$. , valor que o problema deu como sendo 64 L (já que 36 eram formados por água, que é sempre adicionada à mistura). Temos então:
$100F^2 = 64 \therefore F = 0,8$
Isto indica que a cada passo, são retirados 20% da mistura (20L) e substituídos por água.

R: 20L

E146) Qual número é igual ao valor absoluto do seu dobro, diminuído de 15?

Já foi explicado que em casos como este, quando o contexto não esclarece a ordem da subtração, deve ser usada a regra do português, ou seja, "algo" subtraído de 15 é o mesmo que 15 – "algo".

O problema é que fica uma dúvida entre
$N = |15 - 2N|$ e
$N = 15 - |2N|$

Ou seja, ao armar a expressão, consideramos

Scanned by CamScanner

O número = | seu dobro|, diminuído de 15, ou
O número = | seu dobro, diminuído de 15 |

A sutileza que deve ser empregada é a vírgula, que serve como separador, ou seja, o valor absoluto e o dobro estão em uma parte da oração, e o diminuído de 15 estão na outra parte, portanto a expressão correta é que o valor absoluto não se aplica ao 15, mas sim, ao dobro.

$N = 15 - |2N|$

Duplas interpretação não deve constar de problemas de matemática. O correto é o formulador da questão usar termos que não deixem dúvida quanto as expressões a serem usadas.

Levando em conta o valor absoluto, temos que abrir em dois casos:

a) N positivo
$N = 15 - 2N \therefore 3N = 15 \therefore N = 5$
b) N negativo
$N = 15 - (-2N) \therefore N = 15 + 2N \therefore N = -15$

R: 5 ou –15

E166) Quantos quilos de balas com custo de R$ 15,00 por quilo devem ser misturadas com 24 kg de jujubas com custo de R$ 7,50 por quilo, para fazer uma mistura com custo de R$ 9,00 por quilo?

Usando a tabela ensinada:

	R$ 15,00/kg	R$ 7,50/kg	Mistura
Valor →	15x	24 x 7,5	M
Quantidade →	x	24	x + 24

O valor M mistura pode ser calculada de duas formas:
Linhas: Somando as linhas anteriores, temos o valor = 15x + 180
Colunas: Calculando o valor levando em conta o peso (x + 24) e o peso por kg (R$ 9,00/kg)
$15x + 180 = 9(x + 24) \therefore 15x + 180 = 9x + 216 \therefore 6x = 36 \therefore x = 6$

R: 6 kg

E170) Três mulheres possuem juntas, R$ 360,00. Se a primeira der à segunda 1/7 do seu valor, e a terceira também der à segunda, 1/13 do seu valor, as três ficarão com quantias iguais. Que valor possui cada uma?

Note que o total é 360, então as três ficarão no final com 120 cada.
A 1ª deu 1/7 do valor e ficou com 6/7, que vale 120. Então 1/7 vale 20, o valor é 140.
A 3ª deu 1/13 do valor e ficou com 12/13, que vale 120. Então 1/13 vale 20, o valor é 130.
A 2ª tinha 120 – os valores recebidos = 120 – 20 – 10 = 90.

R: 140, 90 e 130

E180) Um fazendeiro tem provisões para alimentar 32 bois durante 25 dias. No fim de 4 dias, o fazendeiro compra mais 10 bois. Quanto tempo durarão as provisões, se a ração de cada boi não é aumentada?

Vamos criar uma unidade auxiliar, "BD", como sendo a quantidade de provisões suficiente para alimentar um boi durante um dia. O fazendeiro tem portanto, 32x25 = 800 BD
Com 32 bois, gastará 32 BD por dia, durante 4 dias serão 128 BD, restando portanto
800 BD – 128 BD = 672 BD
Como comprou mais 10 bois, a partir de então serão 42 bois por dia para alimentar.
O número de dias é 672 / 42 = 16 dias

R: 16

Scanned by CamScanner

E189) Se, ao multiplicarmos o número inteiro e positivo N por outro número de 2 algarismos, invertemos a ordem dos algarismos deste segundo número, o resultado fica aumentado de 207. A soma dos algarismos que constituem o número N dá:

(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8 (E) 9

É calculado N.("ab") = N(10a + b)
Por engano, é calculado N.("ba") = N(10b + a)
O número fica aumentado de 207, então N(10b + a) – N(10a + b) = 207
N(9b – 9a) = 207 = N.9.(b – a). Simplificando por 9 fica:
N(b – a) = 23. O número 23 é primo, então só pode ser expresso em produto como 1 x 23.
Como b e a são dígitos, sua diferença b – a não pode ser igual a 23. Então b – a vale 1 e N vale 23. Sua soma de algarismos é 2 + 3 = 5

R: 5 (A)

E190) Dois veículos partem juntos de um ponto A, em uma corrida de ida e volta entre os pontos A e B. Sabendo que a distância entre A e B é 78 km e que as velocidades dos veículos são 70 km/h e 1000 metros por minuto, concluímos que eles voltam a se encontrar depois do tempo de:

(A) 1h 30 min (B) 1h 12 min (C) 1h 40 min (D) 1h 42 min (E) 1h 36 min

As velocidades dos veículos são 70 km/h e 60 km/h (1000 m por minuto). O veículo mais veloz leva um tempo 78 km / 70 km/h para chegar ao ponto B, então retorna. Na volta, o veículo mais veloz encontrará o mais lento, como na figura abaixo:



Contanto o tempo t desde a partida, o primeiro veículo terá andado 60t, do início até o ponto de encontro. O segundo veículo terá andado, desde B em direção a A, um outro trecho durante o tempo (t – 78/70), a uma velocidade de 70 km/h. O termo 78/70 é o tempo que o veículo mais rápido levou para fazer o trecho de A até B. A soma desses dois trechos é igual a 78 km:
60t + 70(t – 78/70) = 78 km (AB)
130t – 78 = 78 ∴ 130t = 156 ∴ 10t = 12 ∴ t = 1,2h (1 h e 12 min))

R: (B)

E194) CN 87 - Dois capitais são empregados a uma mesma taxa de 3% ao ano. A soma dos capitais é igual a R$ 50.000,00. Cada capital produz R$ 600,00 de juros. O primeiro permaneceu empregado 4 meses mais que o segundo. O segundo capital foi empregado durante

(A) 6 meses (B) 8 meses (C) 10 meses (D) 2 anos (E) 3 anos

Desenhar um diagrama que esclareça o que ocorre no problema é sempre importante:



O capital de 50.000 reais foi dividido em duas partes, ambas aplicadas a 3% a.a.m que é o mesmo que 0,25% = 1/400 ao mês.
Os juros das duas partes foram iguais a 600 reais, mas a parte y ficou aplicada por 4 meses a mais.

Usando a fórmula j = c.i.t (considerando 100% como 1), podemos indicar x e y em função de n, número de meses da primeira aplicação:

Scanned by CamScanner

1ª parte: $600 = x.(1/400).n \therefore x = 240.000/n$
2ª parte: $600 = y.(1/400).(n + 4) \therefore y = 240.000/(n + 4)$
A soma desses dois valores é 50.000 $\therefore x + y = 50.000$

$\frac{240.000}{n} + \frac{240.000}{n+4} = 50.000 \therefore \frac{24}{n} + \frac{24}{n+4} = 5$. Eliminando os denominadores ficamos com:
$24n + 96 + 24n = 5[n(n + 4)] \therefore 48n + 96 = 5n^2 + 20n \therefore 5n^2 - 28n - 96 = 0$

Para resolver a equação é preciso fatorar o trinômio, o cálculo pela fórmula da equação do 2º grau (cap. 13) é trabalhoso, alternativamente podemos fatorar o trinômio e igualar seus fatores a zero. Temos que determinar os dois números cuja diferença e 28 e cujo produto é 5x96. Fica mais fácil quando dividimos a soma ou a diferença por um número, e dividimos o produto pelo seu quadrado. Fazendo D = 28 e P = 5.96, podemos dividir a diferença por 4 e o produto pelo seu quadrado, 16, ficando com D'=7 e P'=5.6, fica fácil ver que produto 30 e diferença 7, os números são 10 e 3. Multiplicando de volta por 4, ficamos com 40 e 12, de fato esses números têm diferença 28 e produto 5.96. O termo do 1º grau deve ser então desmembrado (lembre da fatoração ensinada no cap. 5) como:
$5n^2 - 40n + 12n - 96 = 0 \therefore 5n.(n - 8) + 12.(n - 8) = 0 \therefore (5n + 12)(n - 8) = 0$
Sendo n o número de meses, só pode ser 8.

De fato, $\frac{24}{8} + \frac{24}{8+4} = 5$

R: (B) 8 meses

E195) Uma pessoa tomou um capital C a uma taxa mensal numericamente igual ao número de meses que levará para saldar o empréstimo. Tal pessoa aplica o capital C a uma taxa de 24% ao mês. Para que tenha um lucro máximo na operação, deverá fazer o empréstimo e a aplicação durante um número de meses igual a:

(A) 6 (B) 12 (C) 18 (D) 24 (E) 36

A taxa deve ser considerada como um valor de 0 a 100, para que possa ser numericamente igual ao número de meses, entretanto devemos dividir o valor por 100 na fórmula. O capital C foi tomado emprestado por x meses, a uma taxa de x/100. O valor foi aplicado a uma taxa de 24/100 pelo mesmo período de x meses. A diferença entre o valor dos juros da aplicação e o valor dos juros do empréstimo tem que ser o maior possível.
$C.(x/100).x - C.(24/100).x$ maior possível. Como C/100 é constante, nos resta maximizar o valor de $24x - x^2$. Isto ficará mais fácil depois que estudarmos máximos e mínimos do trinômio do 2º grau, mas por hora podemos fazer a mesma coisa completando os quadrados:
$24x - x^2 = 144 - (x - 12)^2$. Esta expressão terá seu valor máximo quando (x – 12) valer zero, ou seja, x = 12.

R: (B)

E215) João, Carlos e Maria começaram a resolver uma lista de problemas de matemática juntos, sendo que cada um precisava resolver todos os problemas. Cada um trabalha a uma taxa constante. João resolveu 12 problemas por dia e terminou a lista 3 dias depois de Carlos. Maria resolveu 3 problemas a mais que Carlos a cada dia, e terminou a lista dois dias antes de Carlos. Quantos dias levou Maria para terminar a lista?

(A) 18 (B) 15 (C) 12 (D) 10 (E) 9

João: 12 por dia (x dias) + 12 + 12 + 12 (3 dias), total de problemas: P = 12x + 36
Carlos: A cada dias (x dias) resolver 12 + 36/x, quando terminou João levou + 3 dias
Maria: A cada um dos (x – 2) dias, resolveu 3 a mais que Carlos = 12 + 36/x + 3

Problemas resolvidos por Maria:
(x – 2) dias x (15 + 36/x) problemas a cada dia, o que é igual ao número de problemas

Scanned by CamScanner

$(x-2)(15+36/x) = 12x + 36$
$(x-2)(5+12/x) = 4x + 12$
$5x + 12 - 10 - 24/x = 4x + 12$
$x - 24/x - 10 = 0 \rightarrow x^2 - 10x - 24 = 0 \rightarrow (x-12)(x+2) = 0 \rightarrow x = 12$

Maria levou $x - 2$ dias = 10 dias

R: (D)

E220) (*) Maria, Joana e Carla podem andar a 6 km/h. Elas possuem uma motocicleta que anda a 90 km/h, mas pode acomodar apenas duas pessoas (e não pode dirigir a si mesma). Seja t o tempo em horas levado para as três chegarem a um ponto a 135 km de distância. Ignorando o tempo levado para dar a partida, embarcar e desembarcar, o que é correto sobre o menor valor possível para t?

(A) $t < 3,9$ (B) $3,9 \leq t < 4,1$ (C) $4,1 \leq t < 4,3$ (D) $4,3 \leq t < 4,5$ (E) $4,5 \leq t$

Inicialmente, duas vão até o final do trajeto usando a moto, o tempo para checar ao final será 135km / 90 km/h = 1,5 hora.
Enquanto isso, a terceira caminhou 1,5 hora a 6 km/h, andando 9 km.
Agora, uma delas volta com a moto até encontrar aquela que já andou 9 k. São 126 km faltando, a velocidade relativa entre esta terceira e a moto será 90 + 6 = 96 km/h. O tempo para o encontro será 126 km/96 km/h = 1,3125 h. Agora as duas voltam juntas de moto, levando o mesmo tempo. O tempo total será t = 1,5 + 1,3125 + 1,3125 = 4,125 h

R: (C)

229) Colégio Naval 2015
Dado o sistema S:

$$\begin{cases} 2x - ay = 6 \\ -3x + 2y = c \end{cases}$$

nas variáveis x e y, pode-se afirmar que:
A) Existe $a \in]6/5, 2[$ tal que o sistema S não admite solução para qualquer número real C.
B) Existe $a \in]13/10, 3/2[$ tal que o sistema S não admite solução para qualquer número real C.
C) Se $a = 4/3$ e $C = 9$, o sistema S não admite solução.
D) Se $a \neq 4/3$ e $C = -9$, o sistema S admite infinitas soluções.
E) Se $a = 4/3$ e $C = -9$, o sistema S admite infinitas soluções.

Solução:
Os casos descritos nos cinco itens acima dizem respeito a um sistema impossível ou indeterminado. Sistemas impossíveis e indeterminados têm uma coisa em comum:

$$\frac{A}{A'} = \frac{B}{B'}$$

O que vai indicar se o sistema é impossível ou indeterminado é a razão C/C':

$$\frac{A}{A'} = \frac{B}{B'} \neq \frac{C}{C'} \rightarrow \text{Impossível}$$

$$\frac{A}{A'} = \frac{B}{B'} = \frac{C}{C'} \rightarrow \text{Indeterminado}$$

Para que o sistema seja impossível ou indeterminado devemos portanto obrigar a relação A/A' = B/B':

$\frac{2}{-3} = \frac{-a}{2}$, ou seja, $a = 4/3 = 1,333...$

Esta condição obrigará o sistema a ser indeterminado ou impossível. O que vai decidir entre indeterminado ou impossível é o valor de C:

Scanned by CamScanner

$\frac{2}{-3} = \frac{-a}{2} = \frac{6}{c}$ → indeterminado → $2C = -18$ → $C = -9$

$\frac{2}{-3} = \frac{-a}{2} \neq \frac{6}{c}$ → impossível → $2C \neq -18$ → $C \neq -9$

Resumindo, para a = 4/3 o sistema será indeterminado (C = –9) ou impossível (C ≠ –9)
Então vamos às respostas:
A) FALSO, o sistema só é impossível para C ≠ –9, e não para qualquer C.
B) FALSO, o sistema só é impossível para C ≠ –9, e não para qualquer C.
C) VERDADEIRO, com a = 4/3 e este valor para C, o sistema é impossível.
D) FALSO, com a ≠ 4/3 o sistema é determinado.
E) VERDADEIRO, com a = 4/3 e C = –9, o sistema é indeterminado, tem infinitas soluções.

Duas opções são verdadeiras, a questão foi anulada.

Resposta: (C) e (E)

230) Colégio Naval 2015
Qual a medida da maior altura de um triângulo de lados 3, 4, 5?

(A) 12/5 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 20/3.

Solução:
Este é um dos mais "famosos" triângulos, que deve ser conhecido por todos os estudantes: trata-se do ***triângulo pitagórico básico***, que é o triângulo retângulo com lados expressos por números inteiros, com os menores valores possíveis. Os catetos são 3 e 4, e a hipotenusa é 5. Sua área é igual à metade do produto dos catetos, ou seja, 3x4/2 = 6
A maior altura é aquela relativa ao menor lado, já que o produto de cada lado pela altura correspondente é constante. O menor lado é o cateto 3, e a altura correspondente é o cateto 4.

Resposta: (C)

231) Colégio Naval 2015
Na multiplicação de um número k por 70, por esquecimento, não se colocou o zero à direita, encontrando-se, com isso, um resultado 32823 unidades menor. Sendo assim, o valor para a soma dos algarismos de k é

A) par.
B) uma potência de 5.
C) múltiplo de 7.
D) um quadrado perfeito.
E) divisível por 3.

Solução:
Multiplicação normal: 70k
Multiplicação com erro: 7k, esquecendo o zero à direita ficamos com um número 10 vezes menor.
A diferença portanto é 70k – 7k = 63k, que o problema dá como 32823
→ k = 32823/63 = 512, a soma dos algarismos de k é 8, um número par.

Resposta: (A).

■

Scanned by CamScanner

Capítulo 11

Conjuntos e tópicos sobre ANÁLISE

Análise e álgebra

Podemos dividir a matemática do ensino fundamental: Aritmética, Geometria, Álgebra e Análise.

A Aritmética é o conteúdo ensinado nos primeiros anos do ensino fundamental. Trata sobre números inteiros, operações matemáticas, múltiplos e divisores, fatoração numérica, números primos, MMC, MDC, frações, números decimais.

A Geometria é ensinada em todo o ensino fundamental. Nos primeiros anos, limita-se a apresentar os nomes das figuras geométricas, depois conceitos de paralelismo, ângulos, e finalmente relações métricas. Esta última parte requer bons conhecimentos de álgebra.

A Álgebra é ensinada na segunda parte do ensino fundamental, e é o objetivo principal deste livro. Existe ainda uma quarta parte da matemática do ensino fundamental, que é intimamente ligada à Álgebra: a Análise. Esta parte da matemática trata sobre conjuntos, números reais e funções, principalmente. Seu conteúdo está intimamente ligado à Álgebra, por isso esta é uma boa ocasião para apresentar um capítulo com seus principais conceitos. Tais conceitos são ferramentas para desenvolver certos tópicos da Álgebra. Por exemplo, duas equações em x e y podem ser representadas como retas no plano xy, chamado de *plano cartesiano*. O ponto de encontro das duas retas indica a solução do sistema. Quando as retas são coincidentes, o sistema é indeterminado, e quando as retas são paralelas, o sistema é impossível.

Vários tópicos de Análise são cobrados em vários concursos. O Colégio Naval, por exemplo, cobra com frequência questões sobre conjuntos. A EPCAr cobra eventualmente questões sobre conjuntos, e sempre duas ou três questões sobre funções. Vamos apresentar neste capítulo, noções sobre análise quer permitirão um melhor entendimento da álgebra.

Alunos da EPCAr

Scanned by CamScanner

O número zero

O número 0 é motivo de polêmica no que diz respeito à sua classificação. Praticamente todos os autores de matemática dos ensinos médio e fundamental consideram o 0 como o primeiro número natural. A maioria dos autores do ensino superior consideram que o zero não é um número natural, mas sim, um número inteiro. Isto não faz diferença alguma no desenvolvimento da matemática, é só uma questão de nomes. Convenciona-se que um texto pode usar qualquer uma das abordagens, desde que seja indicada qual a convenção usada. Em geral isto fica claro nos livros, e no início das provas de concursos. Este livro, assim como a maioria dos que abordam a matemática para ensino fundamental, considera o zero como um número natural. Recomendamos que esta convenção seja seguida também em provas, a menos que exista indicação contrária no início dos cadernos de provas. Isto é importante, pois muitas provas apresentam questões que exigem esta informação na sua solução.

Muitas vezes usa-se a expressão "N = conjunto dos números inteiros não negativos" para deixar claro que o zero está incluído, sem entrar em conflito com um "conjunto N sem o zero".

0, 1, 2

Os números 0, 1 e 2 devem ser considerados com atenção, pois possuem algumas particularidades não existentes em outros números. Já foi visto que o 0 pode ser considerado como número natural ou não, é pura questão de convenção. Mesmo quando o 0 não é considerado número natural, é ainda assim considerado número inteiro. Na classificação dos números entre primos e compostos, o 0 atende à definição de número composto. Já o 2 é um número primo, aliás, é o único número primo e par ao mesmo tempo. O número 1 não é primo nem composto.

Conjuntos

A teoria dos conjuntos é necessária para o entendimento de toda a matemática a partir do 6º ano. Neste capítulo faremos uma introdução sobre o assunto.

O conjunto dos números naturais

Conjunto é uma coleção de elementos. Um dos primeiros conjuntos com o qual lidamos é sem dúvida o conjunto dos números naturais, representado por N. Este é um conjunto infinito.

N = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ...}

O conjunto N pode ser representado em uma *reta numerada* ou *reta numérica*. Os números são dispostos em uma sequência crescente. Quanto mais à direita nessa reta, maior é o número.



Reta numérica que representa o conjunto dos números naturais

O conjunto dos números racionais positivos

O conjunto Q^+ é o conjunto dos números racionais positivos. Este conjunto tem todos os números naturais e mais todas as frações positivas. Assim como o conjunto N, o conjunto Q^+ também é infinito, porém é um tipo de infinito muito mais denso. Por exemplo, entre dois

Scanned by CamScanner

simples números naturais, 0 e 1, existem infinitos números racionais positivos. Apenas para citar alguns:
1/2, 1/3, 1/4, ..., 1/100, 2/3, 2/5, 2/7, 2/9, ..., 3/4, 3/5, 3/7, 3/8, 3/10, ..., 21/37, 125/1042, ...

Exemplos de conjuntos

Podemos ter conjuntos de qualquer tipo de objeto:

Exemplos:
a) Conjunto dos dias da semana
= {domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado}
b) Conjunto dos quatro planetas mais próximos do Sol = {Mercúrio, Vênus, Terra, Marte}
c) Conjunto das notas musicais = {dó, ré, mi, fá, sol, lá, si}
d) Conjunto das frutas de uma cesta = {banana, laranja, maçã, pêra, abacate}
e) Conjunto dos parafusos de um motor = {parafuso-1, parafuso-2, parafuso-3, ..., parafuso-n}

Exemplos:
Conjunto dos alunos de uma escola
Conjunto dos torcedores de um time
Conjunto das moedas de um cofre
Conjunto dos automóveis de uma rua
Conjunto das ruas de uma cidade
...

Pertinência

Quando um elemento está dentro de um conjunto, dizemos que este elemento *pertence* ao conjunto. O símbolo matemático para a pertinência é $\in$.

Exemplos:
$3 \in N$
bola $\in$ {bola, boneca, bicicleta, carro}
José $\in$ NJ, onde NJ é o conjunto dos nomes que começam com a letra J
$3/5 \in Q+$

Quando um elemento não pertence a um conjunto, usamos o símbolo $\notin$.

Exemplo: $5 \notin \{1, 2, 3\}$

Conjunto vazio

Conjunto vazio é aquele conjunto que não tem elemento algum. Não existe diferença entre um conjunto vazio de laranjas e um conjunto vazio de planetas. Ambos são a mesma coisa, ou seja, o vazio é único.

Representamos o conjunto vazio pelo símbolo $\varnothing$ ou $\{\}$.

Exercícios

E1) Escreva o conjunto dos numerais pares de 2 algarismos, de tal forma que esses dois algarismos sejam iguais.

E2) O que está errado nas seguintes notações de conjuntos:
a) {1, 2, 3, 4 e 5}
b) {1, 2, 3, 3, 4}

Scanned by CamScanner

E3) Dados dois conjuntos A e B, dizemos que a união de conjuntos, indicada por $A \cup B$, é o conjunto que reúne todos os elementos de A e de B. Se A = {1, 2, 4, 5, 6, 7} e B = {1, 3, 5, 7, 9}, determine $A \cup B$.

E4) Dados dois conjuntos A e B, dizemos que a interseção de conjuntos, indicada por $A \cap B$, é o conjunto que tem todos os elementos que pertencem a A e B ao mesmo tempo. Se A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} e B = {1, 3, 5, 8, 9}, determine $A \cap B$.

E5) Entre as três formas abaixo, qual é a errada para representar o conjunto vazio?
Ø , {}, {Ø}

E6) Escreva o conjunto formado pelos sucessores dos números primos maiores que 10 e menores que 30.

Representação por enumeração

Existem várias formas para definir um conjunto. Uma forma usual é escrever os elementos em uma lista, separados por vírgulas, e entre chaves { }.

Normalmente os elementos de um conjunto são do mesmo tipo, mas nada impede que criemos conjuntos de elementos de tipos diferentes.

Exemplo:
{parafuso, maçã, 2, areia, Saturno, José, moeda, 3/5, café, 8, relógio}

Nem sempre conjuntos de tipos diferentes como o do exemplo acima têm utilidade.

Exemplo:
A = { 1, 2, 3, {1, 2}, 4, 5}

O conjunto A acima tem cinco números naturais (1, 2, 3, 4, 5) e um conjunto com os elementos 1 e 2. Como vemos, nada impede que um conjunto seja elemento de outro.

Exemplo:
A = {N, Q+} = conjunto dos dois conjuntos numéricos citados até agora neste capítulo.

Representação por diagrama

Este método é equivalente a listar os elementos entre chaves. A diferença é que ao invés de usar chaves, é desenhado um diagrama com os elementos indicados através de símbolos.



Nos dois exemplos acima, temos um conjunto A com cinco bombinhas e um conjunto B com os números naturais ímpares menores que 10. Este método de representação é usado para ensinar conjuntos para crianças pequenas. Existe um outro método muito útil e usado em estudos mais maduros: o diagrama de Venn.

Scanned by CamScanner



A maioria das questões que caem em concursos como Colégio Naval, EPCAr e similares, pode ser resolvida com a ajuda de um diagrama de Venn.

Este diagrama representa um ou mais conjuntos e a sua relação através de balões. O diagrama acima mostra que existem elementos que pertencem simultaneamente ao conjunto A e ao conjunto B. Não é feito o desenho dos elementos. Considera-se que a área interna ao conjunto representa os seus elementos, não importa quais sejam. Por exemplo, podemos usar o diagrama de Venn para representar os conjuntos numéricos N e Q+. Todo número natural é também um número racional positivo, então é correto dizer que o conjunto N está contido no conjunto Q+, como mostra o diagrama abaixo.



Representação por propriedade

Este é o método mais formal para definir um conjunto. Considere por exemplo o conjunto:

P = { 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ...}

É o conjunto dos números naturais maiores que 4. Pode ser escrito da seguinte forma:

P = { x | x∈N e x>4}

Lê-se: *P é o conjunto dos elementos x tais que x pertence ao conjunto dos números naturais e x é maior que 4.*

Outro exemplo: R = {10, 11, 12, 13, 14, 15, 16} = {x| x∈N e 9<x<17}

Conjunto unitário

Um conjunto unitário é um conjunto que tem um só elemento. Existem infinitos conjuntos unitários.

Exemplos:
{3}
{laranja}
{Sol}
{Drake}
{Josh}
...

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

OBS.: 1) O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto.
OBS.: 2) Qualquer conjunto é subconjunto de si mesmo.

Ou seja, qualquer que seja o conjunto A, temos:

$\emptyset \subset A$
$A \subset A$

Para indicar que um conjunto não está contido em outro, usamos o simbolo $\not\subset$.

Exemplo:
$\{1, 2, 5\} \not\subset \{1, 5, 6, 7\}$

Pertence ou está contido?

É muito fácil ver, por exemplo, que $2 \in \{1, 2, 3\}$.
É fácil entender também que $\{1, 2\} \subset \{1, 2, 3, 4\}$.

Entretanto tudo pode ficar complicado quando são apresentados conjuntos de conjuntos. Por exemplo, será que é óbvio que $\{1, 2\} \in \{ 1, 2, \{1,2\} \}$ ou $\{1, 2\} \subset \{ 1, 2, \{1,2\} \}$?

Nesse caso especial, o conjunto $A = \{ 1, 2, \{1,2\} \}$ tem 3 elementos: 1, 2 e o conjunto $\{1,2\}$. Então como A tem os elementos 1 e 2, é correto afirmar que $\{1, 2\} \subset A$. Além disso, o conjunto A também tem o elemento $\{1, 2\}$, então é correto afirmar que $\{1, 2\} \in A$.

Para evitar confusão, sobretudo quando são envolvidos conjuntos de conjuntos, faça o seguinte:

a) Para verificar se $X \subset A$: Elimine as chaves de X e as chaves de A. Os elementos da lista de X, separados por vírgulas, têm que aparecer exatamente da mesma forma, na lista dos elementos de A, separados por vírgulas. No nosso caso

$\{1, 2\} \subset \{ 1, 2, \{1,2\} \}$?

Comparemos 1, 2 com 1, 2, {1,2}. Os elementos 1 e 2 da primeira lista estão exatamente da mesma forma na segunda lista. Então é correto que

$\{1, 2\} \subset \{ 1, 2, \{1,2\} \}$.

b) Para verificar se $X \in A$: X tem que ser um elemento (um conjunto também pode ser elemento). Nesse caso, elimine as chaves de A e verifique se X aparece na lista de elementos de A separados por vírgulas. No nosso caso

$\{1, 2\} \in \{ 1, 2, \{1,2\} \}$?
Eliminando as chaves somente do segundo conjunto, ficamos com

$\{1, 2\}$ e 1, 2, $\{1,2\}$

Vemos que o primeiro elemento, que é $\{1, 2\}$, está na lista obtida a partir do segundo conjunto, com a eliminação das chaves: 1, 2, {1,2}. Então concluímos que

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

E11) Se A = {1, 2, 3, 4}, determine todos os subconjuntos B ⊂ A tais que 2 ∈ B

E12) Verifique quais dos conjuntos abaixo são unitários
a) { x ∈ N | x+5=20 }
b) { x ∈ N | x é primo e par }
c) { x ∈ N | x é múltiplo de 50 e 120 e 1000 < x < 1500 }
d) { x ∈ N | x é múltiplo de 10 e x é menor que 10 }
e) { x ∈ N | x < 2 e x não é primo }
f) { x ∈ N | x < 2 e x é composto }

E13) Enumere os seguintes conjuntos infinitos, colocando os elementos entre chaves, separados por virgulas.
a) Conjunto dos números naturais pares
b) Conjunto dos números naturais múltiplos de 3
c) Conjunto dos números naturais múltiplos de 5
d) Conjunto dos números naturais múltiplos de 3 e 5 ao mesmo tempo
e) Conjunto dos números naturais que são múltiplos de 3 mas não são múltiplos de 5
f) Conjunto dos números naturais que são quadrados perfeitos
g) Conjunto dos números naturais que deixam resto 2 ao serem divididos por 5
h) Conjunto dos números naturais formados apenas pelos algarismos 2, 3 e 5
i) Conjunto dos números naturais que multiplicados por 0 dão resultado 0
j) Conjunto dos números naturais que deixam resto 2 ao serem divididos por 12 ou por 20

E14) Verifique se o conjunto A está contido no conjunto B
a) A = {3, 6, 9 } e B = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 }
b) A = {1, 2, 5, 6 } e B = { 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 }
c) A = conjunto dos números naturais pares, B = N
d) A = conjunto dos números naturais múltiplos de 4, B = conjunto dos números naturais pares
e) A = conjunto dos números naturais maiores que 50, B = conjunto dos números naturais maiores que 40
f) A = Conjunto dos números primos, B = Conjunto dos números naturais impares
g) A = ∅, B = {1, 2, 3}
h) A = {∅}, B = {1, 2, 3}
i) A = { 1, 2, 3 } e B = { 1, 2, 3 }
j) A = { 1, 2, 2, 3, 3, 3 } e B = { 1, 2, 3 }

Operações com conjuntos

Assim como fazemos com os números, operações aritméticas como adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e outras, fazemos também operações com conjuntos. As operações que vamos estudar aqui são as mais comuns:

- União
- Interseção
- Diferença
- Complementar

União de conjuntos

A união de dois conjuntos A e B (escreve-se A ∪ B) é uma operação que resulta em um terceiro conjunto que tem todos os elementos de A e todos os elementos de B.

Scanned by CamScanner

Exemplo:
Se A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} e B = {5, 6, 7, 8}, então
A ∪ B = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}

Note que todos os elementos de A estão em A ∪ B. Todos os elementos de B também estão em A ∪ B. Os elementos 5 e 6 estão em A e em B, logo estarão na união, porém são contados uma só vez, já que um conjunto não pode ter elementos repetidos.

Os diagramas abaixo mostram exemplos da união de conjuntos.

	A figura mostra o caso mais comum, no qual existem elementos que pertencem somente a A, elementos que pertencem somente a B, e elementos que pertencem a A e B simultaneamente.
	Neste exemplo o conjunto união tem duas partes que não se encontram, pois não existem elementos que pertencem a A e B ao mesmo tempo. Nesse caso dizemos que os conjuntos A e B são DISJUNTOS.
	Nesse caso o conjunto B está contido no conjunto A, ou seja, B ⊂ A. Quando isto ocorre, o conjunto A ∪ B é o próprio conjunto A. Se B ⊂ A então A ∪ B = A
	Nesse caso o conjunto B contém o conjunto A, A está contido em B, o que é a mesma coisa. Quando isto ocorre, o conjunto A ∪ B é o próprio conjunto B. Se A ⊂ B então A ∪ B = B

Interseção de conjuntos

A interseção dos conjuntos A e B, escrita A ∩ B, é uma operação que resulta em um conjunto com os elementos que pertencem a A e B simultaneamente.

Exemplo:
Se A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} e B = {5, 6, 7, 8}, então
A ∩ B = {5, 6}

Os diagramas abaixo mostram exemplos da interseção de conjuntos.

Scanned by CamScanner

	A figura mostra o caso mais comum, no qual existem elementos que pertencem somente a A, elementos que pertencem somente a B, e elementos que pertencem a A e B simultaneamente.
	Neste exemplo não existem elementos que pertencem ao mesmo tempo a A e a B. Nesse caso dizemos que os conjuntos A e B são DISJUNTOS. $A \cap B = \varnothing$
	Nesse caso o conjunto B está contido no conjunto A, ou seja, $B \subset A$. Quando isto ocorre, o conjunto $A \cap B$ é o próprio conjunto B. Se $B \subset A$ então $A \cap B = B$
	Nesse caso o conjunto B contém o conjunto A, A está contido em B, o que é a mesma coisa. Quando isto ocorre, o conjunto $A \cap B$ é o próprio conjunto A. Se $A \subset B$ então $A \cap B = A$

Diferença de conjuntos

Esta é outra operação com conjuntos que tem grande utilidade. Dados dois conjuntos A e B, a diferença de conjuntos, indicada como A – B, é o conjunto dos elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Para definir B – A, basta trocar os papéis de A e B, ou seja, é o conjunto dos elementos que pertencem a B mas não pertencem a A.

Exemplo:
Se $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ e $B = \{5, 6, 7, 8\}$, então
$A - B = \{1, 2, 3, 4\}$
$B - A = \{7, 8\}$

A diferença de conjuntos também pode ser representada em diagramas de Venn:

	A figura mostra o caso mais comum, no qual existem elementos que pertencem somente a A, elementos que pertencem somente a B, e elementos que pertencem a A e B simultaneamente. A figura indica os conjuntos A – B e B – A.

Scanned by CamScanner



No caso de conjuntos disjuntos ($A \cap B = \emptyset$), temos:
$A - B = A$
$B - A = B$



Nesse caso o conjunto B está contido no conjunto A, ou seja, $B \subset A$.
A figura mostra A – B na área hachurada.
Além disso, temos nesse caso, $B - A = \emptyset$.

Complementar

Esta é outra operação com conjuntos, tão importante quanto a união, a interseção e a diferença, que acabamos de apresentar. Entretanto, na união, interseção e diferença, os conjuntos A e B podem ser quaisquer. No complementar, é preciso que um conjunto seja subconjunto do outro, como na figura abaixo.



Dado que A é subconjunto de B, ou seja, $A \subset B$, definimos o complementar de *A em relação a B* como o conjunto dos elementos que pertencem a B mas não pertencem a A, ou seja, B-A, ou *intuitivamente, quanto falta para o conjunto A para que se iguale a B.* Note que o complementar é na verdade uma diferença de conjuntos, mas restrita ao caso em que o conjunto A é subconjunto de B.

Escrevemos:

$$C_B^A \text{ ou } C_{BA}$$

O diagrama abaixo mostra o complementar de A em relação a B.



Exemplo:
Considere B = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} e A = {3, 4, 5}
Então $C_B A$ = {1, 2, 6, 7, 8}

Scanned by CamScanner

Exercícios

E15) Determine $A \cup B$, $A \cap B$, A-B e B-A para os seguintes conjuntos:
a) A={1, 2, 4, 5, 6, 7} e B = {2, 4, 6, 8}
b) A={1, 3, 5, 7, 9} e B={0, 2, 4, 6, 8}
c) A={0, 3, 6, 9, 12, 15, 18} e B={0, 9, 18}
d) A=conjunto das 26 letras do alfabeto, B={a, e, i, o, u}
e) A={3, 4, 5}, B={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}

E16) Para cada caso, determine o complementar de A em relação a B
a) A={0, 1, 2} e B={0, 1, 2, 3, 4, 5}
b) A={1/2, 1/3} e B={1/2, 1/3, 1/5, 1/7}
c) A= {2, 3, 5, 7} e B={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
d) A={1, 2, 3} e B={2, 3, 4, 5, 6}

Diagrama de Venn para 3 conjuntos

Vimos que o diagrama de Venn é uma forma para representar conjuntos e as suas operações. No caso de dois conjuntos, a forma geral de representação é a mostrada abaixo. Nela estamos levando em conta a possibilidade de existirem elementos que pertencem a A e B ao mesmo tempo.



A partir daí podemos indicar a união, interseção e diferença entre os conjuntos.







O diagrama de Venn também pode ser usado para a representação de três conjuntos ao mesmo tempo, como na figura ao lado.



Scanned by CamScanner

O diagrama representa os três conjuntos citados, A, B e C, e ainda:

Elementos que pertencem simultaneamente a A e B
Elementos que pertencem simultaneamente a B e C
Elementos que pertencem simultaneamente a A e C
Elementos que pertencem simultaneamente a A, B e C
Elementos que pertencem a A mas não pertencem a B nem a C
Elementos que pertencem a B mas não pertencem a A nem a C
Elementos que pertencem a C mas não pertencem a A nem a B

Exemplo:
Dado o diagrama de Venn abaixo, indique quais são as operações com conjuntos que resultam nos conjuntos marcados na figura:



As regiões indicadas no diagrama correspondem a:

1+6+7+5	A
2+4+6+7	B
3+4+5+7	C
7	$A \cap B \cap C$
1+2+3+4+5+6+7	$A \cup B \cup C$
6+7	$A \cap B$
5+7	$A \cap C$
4+7	$B \cap C$
1	$(A - B) - C$
2	$(B - A) - C$
3	$(C - A) - B$

Diferença simétrica

A diferença simétrica é uma operação entre dois conjuntos dada por:

$$A \Delta B = (A - B) \cup (B - A)$$



$$A \Delta B = (A\text{-}B) \cup (B\text{-}A)$$

A diferença simétrica também pode ser definida por outra fórmula, que dá o mesmo resultado:

$$A \Delta B = (A \cup B) - (A \cap B)$$

Problemas que envolvem a diferença simétrica não são mais difíceis que problemas que envolvem união, interseção e diferença de conjuntos. O importante é que o aluno precisa

Scanned by CamScanner

conhecer a operação, caso contrário não conseguirá resolver uma questão fácil por falta de conhecimento da operação.

Número de elementos

Um tipo de problema muito comum é o cálculo do número de elementos de um conjunto. O diagrama de Venn é muito útil na resolução desse tipo de problema.

Exemplo (CM):
Numa pesquisa, feita com 100 alunos da Escola Estadual Prof. Guimarães Rosa, para serem conhecidos os dois principais esportes praticados pelos alunos, foi obtido o seguinte resultado:

- 56 alunos praticam futebol;
- 42 alunos praticam basquete;
- 25 alunos praticam futebol e basquete.

Nessas condições, a quantidade de alunos que não pratica nenhum dos dois esportes é igual a:

(A) 75 (B) 27 (C) 25 (D) 23 (E) 2

Solução:
A primeira coisa a fazer é construir o diagrama de Venn para esses conjuntos.



Para não errar esse tipo de problema é preciso atenção ao detalhe: X elementos pertencem a A, ou somente a A? No caso, é dito que 56 alunos praticam futebol, e não que praticam somente futebol. Então o número de elementos de A é 56. Da mesma forma, 42 alunos praticam basquete, então o número de elementos de B é 42.

Estão incluídos nos dois casos, alunos que praticam ambos os esportes, que são 25. Agora calculamos:

Alunos que praticam somente futebol = 56 – 25 = 31
Alunos que praticam somente basquete = 42 – 25 = 17
Número total de alunos = 100

Podemos agora indicar o número de elementos de cada parte dos conjuntos indicada no diagrama. A união dos dois conjuntos, ou seja, todos que praticam algum esporte (futebol ou basquete ou ambos) tem 31+25+17 = 73 elementos. Como a turma tem 100 alunos, os que não praticam esporte algum somam 100 – 73 = 27



Resposta: (B) 27

Scanned by CamScanner

Podemos até mesmo resolver esses problemas sem desenhar diagramas, usando fórmulas apropriadas. O número de elementos de um conjunto A é indicado como n(A) ou #(A). Temos então a seguinte relação relativa à união e à interseção de conjuntos.

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

No exemplo que acabamos de apresentar, ficamos com:

$$n(A \cup B) = 56 + 42 - 25 = 73$$

A fórmula que acabamos de apresentar permite calcular o número de elementos da união de dois conjuntos, conhecendo o número de elementos dos dois conjuntos e o número de elementos da interseção. Também permite calcular o número de elementos da interseção, quando temos o número de elementos da união e o número de elementos de cada conjunto. Ainda assim, recomendamos que você dê preferência a resolver esses problemas usando diagrama de Venn, por ser de visualização mais fácil.

Exemplo (CN):
Dados os conjuntos A, B e C, tais que: $n(B \cup C)=20$, $n(A \cap B)=5$, $n(A \cap C)=4$, $n(A \cap B \cap C)=1$ e $n(A \cup B \cup C)=22$, o valor de $n[A - (B \cap C)]$ é

(A) 10 (B) 9 (C) 8 (D) 7 (E) 6

Alunos do Colégio Naval

Usando esses dados, construímos um diagrama de Venn para 3 conjuntos. É sempre mais fácil começar pelo número de elementos da interseção dos três conjuntos, e a partir daí determinar as demais partes do diagrama.



Precisamos agora calcular o número de elementos que pertencem a A e não pertencem a B nem a C. Basta calcular $n(A \cup B \cup C)$ e subtrair $n(B \cup C) = 22 - 20 = 2$

Scanned by CamScanner



Não temos dados para calcular as três demais regiões do diagrama, mas já temos informações suficientes para resolver o problema. O conjunto pedido, A – (B∩C), está indicado na figura acima. Seu número de elementos é 4+2+3 = 9

Resposta: (B) 9

Número de subconjutnos

Um outro problema interessante é determinar o número de subconjuntos possíveis de um conjunto dado. Por exemplo, se tivermos um conjunto A = {1, 2, 3}, podemos formar os seguintes subconjuntos:

Ø (vazio)
{1}
{2}
{3}
{1, 2}
{1, 3}
{2, 3}
{1, 2, 3}

Entre os subconjuntos de A, sempre constarão o próprio A e o conjunto vazio. Temos que adicionar então os subconjuntos possíveis com 1 elemento, com 2 elementos, e assim por diante. Podemos calcular facilmente o número de subconjuntos de um conjunto dado usando a seguinte fórmula.

É dado um conjunto A, finito, com n elementos. O número de subconjuntos de A é igual a

2^n

No nosso exemplo, o conjunto A = {1, 2, 3} tem 3 elementos. Então o número de subconjuntos de A é $2^3 = 8$.

A demonstração desta fórmula é fácil. Para formar um subconjunto, temos que decidir, para cada um dos n elementos existentes, se este fará parte o não de um subconjunto a ser formado. Para cada um dos ***n*** elementos, temos duas decisões possíveis: pertence ou não pertence. Como são ***n*** elementos, o número de escolhas será 2 x 2 x 2 ... x 2, com n fatores, ou seja, 2^n.

Se for pedido o número de subconjuntos <u>não vazios</u>, temos que descontar 1 desse total, que é o vazio. Portanto, o número de subconjuntos não vazios de um conjunto com ***n*** elementos é

Scanned by CamScanner

$2^n - 1$

Exemplo (CM):
O número de subconjuntos do conjunto X formado pelas letras da palavra CASA é:

(A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 15 (E) 16

Solução:
X = {C, A, S} (a letra A é contada só uma vez porque um conjunto não tem repetições)
n(X) = 3
Número de subconjuntos = $2^3 = 8$

Resposta: (C) 8

Conjunto das partes

Já vimos como calcular o número de subconjuntos possíveis de um conjunto A dado. Se formarmos um conjunto com todos esses conjuntos, teremos o chamado *conjunto das partes de A*. Indicamos este conjunto como P(A). Já vimos um exemplo com A = {1, 2, 3}, e formamos os seguintes subconjuntos:

∅ (vazio)
{1}
{2}
{3}
{1, 2}
{1, 3}
{2, 3}
{1, 2, 3}

Então podemos determinar o conjunto P(A).

P(A) = { ∅, {1}, {2}, {3}, {1, 2}, {1, 3}, {2, 3}, {1, 2, 3} }

Note que os elementos de P(A) são conjuntos, ou seja, todos os subconjuntos de A.

Note ainda que para qualquer conjunto A, temos:

$\varnothing \in P(A)$ e $A \in P(A)$

Ou seja, o conjunto vazio e o conjunto A sempre serão elementos de P(A).

A fórmula do número de subconjuntos pode ser escrita da seguinte forma:

$n(P(A)) = 2^{n(A)}$

ou seja, o número de elementos do conjunto das partes (conjunto dos subconjuntos de A) é igual a 2 elevado ao número de elementos de A.

Exemplo:
P(X) é o conjunto das partes de um conjunto X qualquer. Sendo A = {0, 1, 2, 3} e B = {2, 3, 5}, coloque V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas.

Scanned by CamScanner

1. ( ) $A \subset P(A)$
2. ( ) $(A \cup B) \subset P(B)$
3. ( ) $\varnothing \not\subset (A \cap B)$
4. ( ) $C_B^A \cup B = B$

Solução:
A = {0, 1, 2, 3}
B = {2, 3, 5}
P(A) = {∅, {0}, {1}, {2}, {3}, {0,1}, {0,2}, {0,3}, {1,2}, {1,3}, {2,3}, {0,1,2}, {0,1,3}, {0,2,3}, {1,2,3}, {1,2,3,4} } (16 elementos = 2^4)
P(B) = { ∅, {2}, {3}, {5}, {2,3}, {2,5}, {3,5}, {2,3,5} }

1. É falsa, pois o correto é $A \in P(A)$, e não $A \subset P(A)$
2. Falsa
3. Falsa. O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto.
4. Falsa. A expressão C_B^A só faz sentido quando A é subconjunto de B.

Resposta: FFFF

Exercícios

E17) Determine P(A)
a) A={0, 1, 2}
b) A={10, 20, 30}
c) A={2, 4}
d) A= {a, b, c}
e) A= { ∅, {∅}}
f) A = {1, 2, 3, 4}

E18) Calcule o número de elementos de P(A)
a) A = {10, 20, 30, 40}
b) A = {Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo }
c) A = {1, 3, 5, 7, 9}
d) A = { x∈N | x é primo e 10 < x < 30}
e) A = { x∈N | MDC (x, 120) = 30 e x < 300}
f) A = Conjunto dos múltiplos de 20 maiores que 100 e menores que 200

E19) Sendo U = {0, 1, 2, 3, ..., 20}, A = conjunto dos números naturais múltiplos de 3 menores que 21 e B = conjunto dos números naturais múltiplos de 5 menores que 21, represente em um diagrama de Venn os conjuntos A e B e destaque suas partes A-B, B-A e A∩B

Intervalos

Intervalos são subconjuntos dos números reais com as seguintes propriedades:

1) Existem dois números reais ***a*** e ***b***, sendo que a<b, chamados de ***extremos do intervalo.***

2) Para qualquer x real, tal que x>a e x<b (ou seja, x está compreendido entre a e b), x pertence ao intervalo.

Scanned by CamScanner

Exemplo:
Considere o intervalo I = (1, 2). Este intervalo é o conjunto de todos os números reais compreendidos entre 1 e 2.

Um intervalo pode ser representado graficamente na reta dos reais. Por exemplo, o intervalo (1,2) é representado como na figura abaixo:



Existem intervalos abertos e intervalos fechados. Um intervalo é fechado quando inclui um extremo. Um extremo de intervalo é indicado com uma bola branca, quando for aberto neste extremo, e com uma bola preta, quando for fechado. No exemplo acima, o intervalo é aberto em 1 e aberto em 2, ou seja, 1 e 2 não pertencem ao intervalo. Indicamos este intervalo como (1, 2). Em notação de conjunto, indicamos este intervalo como:

$(1, 2) = \{x \in R \mid 1 < x < 2\}$

O intervalo abaixo é fechado em –1 e 3. Indicamos este intervalo como [–1, 3]. Na notação de conjunto, temos:

$[-1, 3] = \{x \in R \mid -1 \leq x \leq 3\}$



Um intervalo pode ser aberto em um extremo e fechado em outro.

$(a, b] = \{x \in R \mid a < x \leq b\}$

$[a, b) = \{x \in R \mid a \leq x < b\}$

Um intervalo pode também se estender até o infinito, positivo ou negativo:

$[a, \infty)$ ou $[a, +\infty) = \{x \in R \mid x \geq a\}$

Um intervalo também pode se estender até o infinito negativo:

$(-\infty, a] = \{x \in R \mid x \leq a\}$

No caso do infinito positivo, o sinal "+" é opcional.

Obviamente, no outro extremo, o intervalo pode ser aberto ou fechado, mas nos infinitos, o intervalo é sempre considerado aberto.

O conjunto dos números reais também pode ser representado como $(-\infty, +\infty)$.

Scanned by CamScanner

O intervalo aberto pode ter seus extremos indicados com parênteses, como em (a, b), ou então com colchetes voltados para fora, como]a, b[. Quando os colchetes são voltados para dentro, como em [a, b], o intervalo é fechado, ou seja, inclui os extremos.

Operações com intervalos

Como os intervalos são conjuntos, suportam operações usuais de conjuntos, como união, interseção, etc. Isto é muitas vezes necessário na resolução de inequações. Graficamente, operamos como se fossem diagramas de Venn, exceto que tratam de segmentos de reta, ao invés de áreas.

União de intervalos: Fazemos a união de intervalos tomando as regiões que pertencem a um ou ao outro intervalo.

Exemplo:
$[2, 5] \cup (4, 8) = [2, 8)$



Interseção de intervalos: Tomamos os elementos que estão simultaneamente nos dois intervalos envolvidos.

Exemplo:
$[2, 5] \cap (4, 8) = (4, 5]$



Exemplo (CN)
Todos os valores de x que satisfazem a expressão $-15 < 3x^2 - 2x - 20 < 20$, são os do intervalo:

(A) $(-10/3, -1) \cup (5/3, 4)$ (B) $(-3, -1) \cup (5/3, 4)$ (C) $(-10/3, -1) \cup (5/3, 3)$
(D) $(-10/3, -2) \cup (5/3, 4)$ (E) $(5/3, 4)$

Scanned by CamScanner

Solução:

Este é um típico problema que envolve operações com intervalos. O problema é na verdade um sistema de inequações do 2º grau (capitulo 17), que requer operações com intervalos para descrever a resposta. O problema apresenta na verdade duas inequações do 2º grau. É preciso resolver ambas, e fazer a interseção das soluções (note que $a < x < b$ é o mesmo que dizer $a < x$ E $x < b$).

$-15 < 3x^2 - 2x - 20$
$3x^2 - 2x - 5 > 0$
$3x^2 + 3x - 5x - 5 > 0$ (fatoração de $\mathbf{ax^2 + bx + c}$ com $a \neq 1$, cap 5).
$3x(x + 1) - 5(x + 1) > 0$
$(3x - 5)(x + 1) > 0$
A expressão será maior que zero quando os fatores tiverem sinais iguais:

a) $3x - 5 > 0$ e $x + 1 > 0$
$x > 5/3$ e $x > -1$
aqui é preciso fazer a interseção dos intervalos $(5/3, \infty)$ e $(-1, \infty)$



Vê-se claramente que

$(5/3, \infty) \cap (-1, \infty) = (5/3, \infty)$

Foi feita a interseção dos intervalos porque queremos que a expressão seja positiva, e para isto, os dois fatores têm que ter o mesmo sinal, nesse caso, consideramos o caso em que o primeiro fator é positivo E o segundo fator é positivo, e este conectivo "E" é implementado através da interseção.

b) No segundo caso temos que considerar os dois fatores NEGATIVOS, pois isto também resulta no resultado positivo.
$3x - 5 < 0$ e $x + 1 < 0$
$x < 5/3$ e $x < -1$

Fazemos então a interseção entre esses dois intervalos:
$(-\infty, 5/3) \cap (-\infty, -1)$



Nesse caso temos

$(-\infty, 5/3) \cap (-\infty, -1) = (-\infty, -1)$

Esses dois casos (a) e (b) resultam em dois intervalos que devem ser unidos, pois são resultantes de duas expressões unidas por um conectivo OU (ambos são positivos OU ambos são negativos). Fazemos então a união dos intervalos resultados dos casos (a) e (b):

Scanned by CamScanner

$(5/3, \infty) \cup (-\infty, -1)$

Até aqui resolvemos a metade do problema. Temos que fazer a mesma coisa para a segunda inequação do enunciado, ou seja, $3x^2 - 2x - 20 < 20$, e então fazer a interseção com o resultado encontrado na primeira parte.

$3x^2 - 2x - 20 < 20$
$3x^2 - 2x - 40 < 0$
$3x^2 - 12x + 10x - 40 < 0$ (fatoração de $ax^2 + bx + c$ com $a \neq 1$, cap 5).
$3x(x - 4) + 10(x - 4) < 0$
$(3x + 10)(x - 4) < 0$
Para que o produto seja negativo, os fatores devem ter sinais opostos.

a) $(3x + 10) > 0$ e $(x - 4) < 0$
Isto ocorrerá quando $x > -10/3$ e $x < 4$. Fazendo a interseção ficamos com $-10/3 < x < 4$, ou seja, o intervalo solução é $(-10/3, 4)$.

b) $(3x + 10) < 0$ e $(x - 4) > 0$
Esta opção tem como solução o conjunto vazio.

Fazendo a união das soluções dos itens (a) e (b), ficamos com $(-10/3, 4)$.

Encontramos então as soluções das duas inequações do enunciado:

$-15 < 3x^2 - 2x - 20$ ➔ $(5/3, \infty) \cup (-\infty, -1)$
$3x^2 - 2x - 20 < 20$ ➔ $(-10/3, 4)$

Para satisfazer simultaneamente as duas inequações, temos que fazer a INTERSEÇÃO das soluções:
$[(5/3, \infty) \cup (-\infty, -1)] \cap [(-10/3, 4)]$

É recomendável fazer operações desse tipo com intervalos, sempre de forma gráfica:

Fazendo a interseção dos intervalos (ao lado), encontramos dois intervalos abertos: $(-10/3, -1)$ e $(5/3, 4)$.

Preste muita atenção, os valores na reta numérica devem aparecer em ordem crescente, caso contrário o resultado ficará errado.

Resposta: (A).

O problema apresentado pode ter parecido complexo. De fato, fizemos questão de mostrar as várias operações envolvendo intervalos, e a identificação de quando usamos união e quando

Scanned by CamScanner

usamos interseção. Outro motivo é que as inequações ainda serão ensinadas neste livro (cap 12 e cap 17), por isso pode ter se tornado um pouco mais complexo. Deve ser lembrado ainda que questões do Colégio Naval, mesmo antigas (esta foi de 1980), são quase sempre bastante desafiadoras, muitas vezes são mais difíceis que questões de concursos mais atuais.

Máximos e mínimos de intervalos

Um intervalo fechado é um conjunto que tem um elemento de valor máximo e um elemento de valor mínimo. Por exemplo, o maior número do intervalo [4, 7] é o 7, e o menor deles é o 4.

Um efeito interessante ocorre com os intervalos abertos, e este efeito tem sido explorado com provas de concursos.

Pergunta 1: Qual é o maior, e qual é o menor número inteiro x tal que $10 < x < 20$?
Sendo números inteiros compreendidos nesta faixa, os valores possíveis para x são os inteiros entre 11 e 19, então o menor deles é 11 e o maior deles é 19.

Pergunta 2: Qual é o menor número racional compreendido entre 0 e 1, exclusive?

Pergunta 3: Qual é o maior e qual é o número real compreendido no intervalo (0, 3)

A resposta da pergunta 2 e da pergunta 3 é a mesma: **não existe**. Intervalos abertos com números racionais, irracionais ou reais não têm um número específico que seja o máximo, nem o mínimo. Isto ocorre porque esses conjuntos são *densos*, possuem infinitos valores que se aglomeram em torno de qualquer ponto.

Se fosse possível aplicar um "zoom" nas proximidades do número zero, estando à sua direita todos os números reais do intervalo (0, 1), e se existisse um número k, menor de todos, "vizinho" do zero, chegaríamos a um absurdo:



O referido número k não existem pois k/2, ou qualquer outra fração própria de k, seria menor ainda que k, e ainda assim maior que zero.



Se dado um número k qualquer é sempre possível obter a sua metade, então esta metade também é maior que zero. Na verdade por mais próximo de zero que um número real, racional ou irracional sejam sempre existirão infinitos números ainda menores. O mesmo vale para as vizinhanças de qualquer outro número dado. A concepção indicada nas duas figuras acima não existe. Não existe um número "vizinho" de zero ou de qualquer outro número. Esta concepção de "vizinho" só existe para números naturais, inteiros, ou frações de naturais e inteiros com uma proporção conhecida (por exemplo, em intervalos de 0,000001 entre eles),

Scanned by CamScanner

mas quando consideramos os conjuntos Q, R e I, por mais "infinitesimal" que seja um intervalo, sempre existirão infinitos números dentro do intervalo infinitesimal.

Médias

Muitas questões de concursos, sobretudo as do Colégio Naval e OBM, envolvem a chamada *desigualdade das médias*. Existem ainda muitas questões que envolvem apenas o cálculo de médias. Médias são valores calculados em função de uma coleção de números (no mínimo 2), que podem ser usados como representantes, em vários tipos de cálculos estatísticos para representar os números da coleção.

Exemplo: João obteve nos quatro bimestres do ano, as seguintes notas na matéria de português: 7,4; 8,3; 9,0 e 8,5. Qual foi a sua média na matéria?

Solução: Devemos somar as 4 notas e dividir o total por 4.

Média = (7,4 + 8,3 + 9,0 + 8,5)/4 = 33,2/4 = 8,3

Intuitivamente estamos acostumados a calcular esse tipo de média, mas vamos agora fazer uma apresentação mais formal.

Média aritmética

A média aritmética entre n valores é calculada somando esses valores, e depois dividindo o resultado por n.

$$Ma = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \ldots + x_n}{n}$$

Muitas vezes estamos interessados na média entre apenas dois valores. Nesse caso, a fórmula se reduz à semi-soma dos valores:

$$Ma = \frac{x_1 + x_2}{2}$$

Média geométrica

A *média geométrica*, também conhecida como *média proporcional*, é uma outra média que aparece bastante na matemática. É definida apenas para valores positivos. No caso de dois valores, é simplesmente a raiz quadrada do produto desses dois valores:

$$Mg = \sqrt{x_1 . x_2}$$

No caso de três valores, também partimos do produto, porém usamos a raiz cúbica.

$$Mg = \sqrt[3]{x_1 . x_2 . x_3}$$

Para calcular a média geométrica de n valores extraímos a raiz n-ésima do produto dos valores:

$$Mg = \sqrt[n]{x_1 . x_2 \ldots x_n}$$

Scanned by CamScanner

Média harmônica

A média harmônica de n valores, sendo n≥2, é igual ao inverso da média aritmética dos inversos desses valores:

$$Mh = \frac{1}{\frac{1/x_1 + 1/x_2 + \ldots + 1/x_n}{n}}$$

Desigualdade das médias

Para quaisquer conjuntos de n valores positivos, suas médias aritmética, geométrica e harmônica estão relacionadas pela seguinte desigualdade:

$$Ma \geq Mg \geq Mh$$

Além disso, essas médias são iguais, se e somente se, os números envolvidos são iguais.

Muitos problemas de desigualdades que aparecem em provas do Colégio Naval e em Olimpíadas de Matemática, são baseados na desigualdade das médias.

Exemplo (CN)
Se ***h***, ***g*** e ***a*** são, respectivamente, as médias harmônica, geométrica e aritmética entre dois números, então:

(A) ah = 2g (B) ah = g (C) ah = $2g^2$ (D) ah = g^2 (E) ah = $2\sqrt{g}$

Solução:
Trata-se de um problema simples, mas que exige o conhecimento das fórmulas das médias citadas. Para quem tem este conhecimento, é uma "questão dada".

Considerando os números x e y, temos:

a = (x + y)/2; g = $\sqrt{xy}$ e

$$h = \frac{1}{(1/x + 1/y)/2} = \frac{2}{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}} = \frac{2xy}{x+y}$$

De posso dessas expressões, podemos testar cada uma delas, para checar a validade.

Nas cinco opções, temos que calcular o termo a.h, então:

$$a.h = \frac{x+y}{2} \cdot \frac{2xy}{x+y} = x.y$$

Entretanto, como $g = \sqrt{xy}$, temos que a.h = g^2.

Resposta: (D)

Scanned by CamScanner

Exemplo: CN 2010 - Sejam **p** e **q** números reais tais que $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=\frac{1}{\sqrt{2010}}$. Qual o valor mínimo do produto **pq**?

(A) 8040 (B) 4020 (C) 2010 (D) 1005 (E) 105

Solução:

Observe que existem envolvidos uma soma, um produto e um mínimo. É preciso que o aluno seja bastante observador para que enxergue aqui, um problema de desigualdade de médias, envolvendo os números 1/p e 1/q. Dividindo a igualdade dada por 2, encontramos no primeiro membro, a média aritmética desses números:

$$Ma=\frac{1}{2}.\left(\frac{1}{p}+\frac{1}{q}\right)=\frac{1}{2\sqrt{2010}}$$

Como Ma é sempre maior que Mg, e Mg é a raiz quadrada do produto dos números, ficamos com:

$Ma=\frac{1}{2\sqrt{2010}}\geq Mg=\sqrt{\frac{1}{p}.\frac{1}{q}}$. Elevando ao quadrado, ficamos com:

$\frac{1}{8040}\geq\frac{1}{pq}$, ou seja, pq ≥ 8040.

Portanto, o valor mínimo da expressão pq será igual a 8040.

Média ponderada

A média ponderada é um caso especial da média aritmética, no qual os valores possuem pesos. Ao invés de simplesmente somar os números e dividir por n, somamos os produtos dos números pelos respectivos pesos. A média aritmética pode ser considerada como um caso particular de média ponderada, na qual todos os pesos são iguais a 1.

$$Mp=\frac{x_1p_1+x_2p_2+...+x_np_n}{p_1+p_2+...+p_n}$$

Exemplo: Juquinha tirou nos três primeiros bimestres, as notas 7,0, 3,0 e 5,0 na matéria Filosofia. Em seu colégio, precisa de nota 6,0 para passar, e os pesos dos bimestres são 1, 2, 3 e 4. Qual nota precisa obter no 4º bimestre para ser aprovado?

Solução: Seja n a nota que irá obter no 4º bimestre. Sua nota anual nesta matéria é dada como a média ponderada das notas dos bimestres:

$M=\frac{7{,}0\times1+3{,}0\times2+5{,}0\times3+n\times4}{1+2+3+4}$, tem que ser maior ou igual a 6.

Sendo assim, como o denominador é 10 (soma dos pesos), o numerador tem que ser maior ou igual a 60. Fazendo as contas ficamos, no numerador, com:

7,0 + 6,0 + 15,0 + 4n ≥ 60

28 + 4n ≥ 60 ∴ 4n ≥ 60 – 28 ∴ 4n ≥ 32 ∴ n ≥ 8

Scanned by CamScanner

Sendo assim, é bom que Juquinha tire 8,0 ou mais na última prova, caso contrário estará "frito".

O uso de pesos maiores nas provas mais próximas do final do ano é uma "colher de chá" para os alunos que estudaram pouco no início do ano e estudaram mais no final do ano. Se fosse usada a média aritmética simples, Juquinha teria que obter uma soma de 24 pontos, então precisaria de 9,0 na última prova, e não de 8,0. Em geral mais tipos de colher de chá são observados em vários colégios, como apresentar provas mais fáceis no fim do ano, e a eliminação da nota mais baixa.

Plano cartesiano

Já é por nós conhecida a chamada reta numérica, onde representamos graficamente os pontos pertencentes aos conjuntos numéricos, seja este conjunto N, Z, Q, I ou R.



Muito mais comum que representar números nesta reta, é a necessidade de representar pares de números. Por exemplo, podemos ter a necessidade de representar um certo valor (por exemplo, o preço de um produto) em função do tempo. Tais informações são tipicamente representadas em um gráfico bidimensional, como na figura abaixo.



Usamos para tal um sistema de eixos coordenados, ou eixos cartesianos. O nome é uma homenagem ao matemático, físico e filósofo francês René Descartes (1596 – 1650). Através desse sistema de eixos podemos representar a relação entre duas grandezas quaisquer.

Muitas vezes lidamos com dados experimentais, obtidos de medidas reais. Ficamos então com uma tabela de valores. Representados em um gráfico no plano cartesiano, esses valores são representados por pontos. Muitas vezes esses pontos são ligados por segmentos de reta, para dar uma ideia de acabamento. Outras vezes procuramos traçar uma reta que aproxima a relação entre esses valores. É o caso da figura abaixo, à esquerda.

Scanned by CamScanner





Outras vezes, os valores envolvidos são relacionados por uma equação, uma fórmula que indica qual é o valor de y, para cada valor de x. A curva obtida teria no caso, infinitos pontos. É o caso da figura acima, na parte direita.

As questões envolvendo gráficos como o da esquerda na figura acima são voltadas para estatísticas. Podem pedir por exemplo, as quantidades totalizadas em um determinado período, a comparação entre as quantidades de dois períodos diferentes, a determinação de valor médio, máximo ou mínimo, etc. Já os gráficos baseados em equações, como o da parte direita da figura acima, podem pedir a determinação das raízes (valores que anulam a função), máximos e mínimos, pontos de descontinuidade, etc.

Em cada par ordenado, a primeira coordenada corresponde ao eixo x, chamado de eixo das **abscissas**. A segunda coordenada corresponde ao eixo y, chamado de eixo das **ordenadas**.
O cruzamento desses dois eixos é chamado de **origem**, e tem coordenadas (0, 0).

Entretanto, muitas vezes por comodidade pode-se atribuir outras coordenadas para a origem. Por exemplo, em um levantamento relativo ao século XXI, pode-se colocar a origem no ano 2001.

Relações e funções

As relações e funções nada mais são que conjuntos de pares ordenados, ou seja, uma relação que associa valores de x a valores de y – obviamente podem ser usadas outras letras. Esses valores não precisam ser necessariamente números reais. Podem ser números racionais, naturais, inteiros, etc. Podem também ser outro tipo de objeto.

Por exemplo, considere um conjunto P de 5 pessoas, e a relação S definida da seguinte forma:

S: P → P
$(x,y) \in R$ se e somente se, x é mais velho que y.

Falta ainda a informação sobre as idades das pessoas de P. Suponha que sejam:
João, 14,8 anos Carlos, 14,9 anos Maria, 15,1 anos Paulo, 15,5 anos Ivo, 15,9 anos

Ivo é mais velho que todos os demais, então os seguintes pares pertencem a S:
(Ivo, João), (Ivo, Carlos), (Ivo, Maria), (Ivo, Paulo).

Da mesma forma, Paulo é mais velho que João, Carlos e Maria, logo os seguintes pares pertencem a S:
(Paulo, João), (Paulo, Carlos) e (Paulo, Maria).

Scanned by CamScanner

Da mesma forma, os seguintes pares também pertencem a S:
(Maria, João), (Maria, Carlos) e (Carlos, João).

Portanto S é o seguinte conjunto:
S = {(Ivo, João), (Ivo, Carlos), (Ivo, Maria), (Ivo, Paulo), (Paulo, João), (Paulo, Carlos) e (Paulo, Maria), (Maria, João), (Maria, Carlos), (Carlos, João)}.

Uma relação desse tipo, não numérico, também pode ser representada em um sistema de eixos. A diferença é que os eixos não representam retas de números reais, mas sim, conjuntos de pessoas:



A relação S é formada pelos 10 pontos indicados no gráfico. P é o conjunto com as 5 pessoas citadas. Como a relação é de P em P, significa que x são elementos de p, e y, também são elementos de P. Neste exemplo, os eixos não são a reta real, mas sim, o conjunto P, com 5 elementos.

O quadriculado é desenhado para facilitar a visualização e a construção do gráfico.

Uma função também é um tipo de relação, porém com uma particularidade que será apresentada a seguir. Logo, toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função.

Diagrama de setas

Já vimos duas formas de representar uma relação. A primeira consiste em enumerar todos os pares ordenados que a formam. Por exemplo,

S = {(Ivo, João), (Ivo, Carlos), (Ivo, Maria), (Ivo, Paulo), (Paulo, João), (Paulo, Carlos) e (Paulo, Maria), (Maria, João), (Maria, Carlos), (Carlos, João)}.

A segunda forma é usar um gráfico cartesiano onde o eixo horizontal representa a primeira coordenada, e o eixo vertical representa a segunda coordenada, como no gráfico apresentado acima.

Finalmente temos uma terceira forma de representar uma relação, que é usando um diagrama de setas. Na figura abaixo, temos uma relação de X em Y, ou seja, os seus pares ordenados (x, y) são tais que $x \in X$ e $y \in Y$.

As setas são usadas para indicar quais valores de x estão relacionados com quais valores de y. Por exemplo, a relação indicada abaixo, com diagrama de setas, pode ser representada por enumeração como:

$\{(x_1, y_3), (x_2, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3), (x_4, y_4)\}$

Scanned by CamScanner

Note que em uma relação, um mesmo valor de x pode estar relacionado a mais de um valor de y. Neste exemplo, temos os pares (x_2, y_1) e (x_2, y_2). Esta é a diferença entre uma relação e uma função. Na função, cada valor de x só pode ter associado e ele, um único valor de y. Sendo assim, o diagrama abaixo não representa uma função, mas uma relação.



Note ainda que o ponto y_3 está associado (ou seja, existem setas partindo de pontos x diferentes, chegando a ele: (x_1, y_3) e (x_3, y_3). Esta duplicidade na chegada das setas é permitida, tanto na relação quanto na função.

Produto Cartesiano

O produto cartesiano de dois conjuntos A e B é uma relação tal que todos os elementos de A estão ligados a todos os elementos de B, ou seja, "todo mundo está ligado com todo mundo". Representando a operação de produto cartesiano pelo símbolo "x".

Ex: {1, 2} x {a, b, c} = {(1, a), (1, b), (1, c), (2, a, (2, b), (2, c)}

Se A tem m elementos e B tem n elementos, AxB tem m.n elementos.

Suponha A = {1, 2, 3, 4} e B = {1, 2, 3, 4, 5}. Então A x B vale:

{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (4, 5)}



A tem 4 elementos, B tem 5 elementos, A x B tem 4 x 5 = 20 elementos.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Dom(f) = R^+ ou seja, o domínio de f é o conjunto dos reais não negativos (positivos e o 0).

Já o contra-domínio, se não for citado, pode ser considerado o mais abrangente subconjunto de R, ou seja, o próprio conjunto R.

A imagem é o subconjunto do contra-domínio, que contém todos os valores de y, ou seja, os valores que a função efetivamente assume. A raiz quadrada de x será no mínimo zero (quando x=0), e no máximo infinito, à medida em que x assume valores de zero a infinito. Escrevemos então:

Im(f) = R^+.



Para evitar dúvidas, o enunciado do problema poderia especificar o domínio e o contra-domínio, usando a notação:

f: R^+ → R
$f(x) = \sqrt{x}$

Algumas vezes o problema realmente especifica o domínio e o contra-domínio, como na notação acima. Outras vezes, o problema dá apenas a fórmula da função e pede que o domínio seja identificado.

Exemplo: Determine o domínio da função f(x) = 1/x.

Determinar o domínio de uma função consiste em partir de R e excluir os valores proibidos algebricamente, como radicais negativos (com índice par, é claro) e denominadores nulos, principalmente.

No caso deste exemplo, a operação proibida é a divisão por zero. Então, o domínio é R – {0}, ou seja, R^*. De fato, a função 1/x não é definida para x=0. Observe que para valores de x muito próximos de zero, a função tende para infinito.



Gráfico de f(x) = 1/x

Scanned by CamScanner

Função linear e função afim

Essas funções, muitas vezes também chamadas de funções do primeiro grau (apesar desta nomenclatura ser imprecisa), são as comuns e mais simples na matemática. A função linear mostra a relação entre duas grandezas que são diretamente proporcionais. Por exemplo, um trabalhador que recebe R$ 30,00 por hora de trabalho, e que trabalhe x horas, receberá o valor de 30.x reais por essas horas trabalhadas. Nesse caso, se y é o valor a ser recebido e x é o número de horas trabalhadas, temos:

$y = 30x$

Podemos dizer que o valor recebido y é uma função linear do número de horas trabalhadas x. A constante de proporcionalidade é 30, ou seja, o valor a ser recebido por cada hora trabalhada.



Uma função linear tem como gráfico, uma reta passando pela origem. Tais gráficos têm o aspecto da figura ao lado, quando as quantidades envolvidas são positivas.

O gráfico ao lado necessita de um pequeno reajuste. Não faz sentido contabilizar, por exemplo, 3,47 horas trabalhadas. Se o número de horas trabalhadas for um inteiro, a gráfico deverá mostrar apenas os pontos relativos a número inteiros de horas, assim como o valor recebido.

Faz sentido um gráfico contínuo como este quando os valores de x e y puderem assumir valores reais. Por exemplo, considere x o número de horas viajadas, a uma velocidade de 30 km/h. Fará sentido portanto, um trajeto com duração x = 3,47 horas, por exemplo, e a distância percorrida poderá assumir valores reais, e não só inteiros múltiplos de 30.

Note ainda que os eixos x e y, para facilitar a representação, podem usar escalas diferentes, como neste caso.

A função afim é muito parecida com a função linear. A diferença é que a função afim não precisa necessariamente passar pela origem. Pode ter um parâmetro adicional, constante:

$y = ax + b$

Podemos citar como exemplo de função afim, o valor de uma corrida de táxi. Este valor é a soma de uma constante (chamada de "bandeirada") e um valor proporcional à distância percorrida.

Scanned by CamScanner



Note que o valor b da função, nada mais é que o valor de y quando x = 0, ou seja, o ponto onde a função corta o eixo y.

Sistemas de equações e interseção de gráficos

Resolver um sistema de equações nada mais é que encontrar os pontos de interseção dos gráficos das suas equações.



Considere por exemplo o sistema formado pelas duas equações, cujos gráficos são indicados ao lado:

$y = 2x + 2$
$y = -x + 10$

Não é necessário traçar os gráficos para solucionar o sistema, mas é interessante visualizar a solução como a interseção dos gráficos.

Os dois gráficos envolvidos são retas, pois são funções do 1º grau de x em y.

$y = 2x + 2$
$y = -x + 10$

$2x + 2 = -x + 10$
$3x = 8$
$x = 8/3$ e $y = 22/3$.

Note que as posições relativas das retas estão diretamente relacionadas com as soluções do sistema:

Retas concorrentes:	Solução única
Retas paralelas:	Sistema impossível
Retas coincidentes:	Sistema indeterminado, infinitas soluções.

Scanned by CamScanner





Exemplo:
Dê o ponto de interseção das retas $y + 5x + 24 = 0$ e $y + x + 4 = 0$.

Solução:
Basta resolver o sistema
$-5x - 24 = -x - 4$
$5x + 24 = x + 4$
$4x = -20$
$x = -5$
$y = -x - 4 = -1$.

A solução do sistema é o ponto de interseção das retas.

Resposta (–5, –1)

Exercícios de revisão

E20) Um conjunto A possui 256 subconjuntos. Quantos elementos têm o conjunto A?

E21) Utilizando diagramas de Venn, verifique se as afirmações são falsas ou verdadeiras para quaisquer conjuntos A e B

a) $A \subset A$
b) $\varnothing \subset A$
c) $\varnothing \in A$
d) $A \subset (A \cup B)$
e) $B \subset (A \cup B)$
f) $A \subset (A \cap B)$
g) $(A \cup B) \subset A$
h) $(A \cap B) \subset A$
i) $(A \cap B) \subset B$
j) $(A - B) \subset A$
k) $(A - B) \cap B = \varnothing$
i) $(A - B) \cup (A \cap B) \cup (B - A) = A \cup B$
m) $(A \cap B) \cup (B - A) = B$

E22) Se $A = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15\}$, encontre $B = \{ a.b \in A \mid a \in A \text{ e } b \in A \}$

E23) Qual é o número de subconjuntos não vazios que podem ser formados com os elementos do conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$?

E24) Qual é o número de subconjuntos não vazios do conjunto formado pelos múltiplos naturais de 6 menores que 30?

E25) Sendo $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ e $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, determine $C_B A$

Scanned by CamScanner

E26) Um conjunto A tem 63 conjuntos não vazios possíveis e o conjunto B tem 15 subconjuntos não vazios possíveis. Qual é o número total de subconjuntos de $A \cup B$, sabendo que $A \cap B$ tem 3 elementos?

E27) (USP-SP) Depois de n dias de férias, um estudante observa que:

a) choveu 7 vezes, de manhã ou à tarde;
b) quando chove de manhã não chove à tarde;
c) houve 5 tardes sem chuva;
d) houve 6 manhãs sem chuva.

Podemos afirmar então que n é igual a:

(A) 7 (B) 8 (C) 9 (D) 10 (E) 11

E28) Indique quais afirmações abaixo são verdadeiras e quais são falsas:
a) Se $x \in N$ e $y \in N$, então $x+y \in N$
b) Se $x \in N$ e $y \in N$, então $x-y \in N$
c) Se $x \in N$ e $y \in N$, então $x.y \in N$
d) Se $x \in N$ e $y \in N$, então $x/y \in N$

E29) Em uma turma de 50 alunos, 30 lêem a revista A, 20 lêem a revista B e 10 não lêem revista alguma. Quantos alunos lêem ambas as revistas?

E30) Sejam a e b números tais que os conjuntos {5, 6, 7} e {5, a, b} são iguais. Quais são os valores possíveis de a e b?

E31) Seja $A = \varnothing$ e $B = \{1\}$. Calcule $A \cup B$.

E32) Seja $A = \{\varnothing\}$ e $B = \{1\}$. Calcule $A \cup B$.

E33) Se $B = \{\{1, 2\}, \{2\}, \{3\}\}$, é correto afirmar que {2, 3} é subconjunto de B?

E34) Se o gráfico da equação $5x + Ky = 9$ passa pelo ponto (3, –1), qual é o valor de K?

E35) (*) A média aritmética de 40 números é 75. Dez números foram eliminados do conjunto, deixando 30 números com média 85. Qual é a média dos 10 números eliminados?
(A) 80 (B) 65 (C) 45 (D) 50 (E) 60

E36) Qual dos seguintes pontos não pertence ao gráfico da função de equação $3x + y = 6$?
(A) (2, 0) (B) (1, 3) (C) (0, 6) (D) (–1, 9) (E) (–1, 3)

E37) Se $A = \{(x, y \mid x - 3y = 10)\}$ e $B = \{(x, y) \mid 2x - y = 5\}$, então $A \cap B$ é:
(A) {(4, 2)} (B) {(4, 3)} (C) {(–3, 1)} (D) {(3, –1)} (E) {(1, –3)}

E38) Se $h(x) = x^3 - x^2 + x + 1$, determine $\mathbf{h(-a)}$

E39) (*) Se $f(x) = -2x^2 + x + 10$, calcule $f(f(f(-2)))$.

E40) (*) Se $f(x) = ax^2 - bx - 4$, $f(2) = 6$ e $f(-1) = 12$, então **a** vale:

Scanned by CamScanner

E41) Se $f(x) = (1 - x)/(1 + x)$, determine $f(f(x))$

E42) Sejam m e n números reais positivos. Definimos as três quantidades:
$A = (m + n)/2$; $G = (m.n)^{1/2}$; $H = 2mn/(m + n)$.
Qual das seguintes relações é sempre verdadeira?

(A) $A \leq G \leq H$ (B) $G \leq H \leq A$ (C) $H \leq G \leq A$ (D) $H \leq A \leq G$ (E) impossível determinar

E43) (*) Resolver $\left||x+1|-2\right| = 4$

E44) (CM) Durante a realização da Feira de Providência, no Rio Centro, Rio de Janeiro, um grupo de estudantes realiza uma pesquisa com os visitantes desejando avaliar, no que se refere à culinária, a interculturalidade no Brasil. Entre os entrevistados, 12 dizem apreciar somente a culinária árabe, 13 apreciam somente a culinária japonesa, 28 preferem a culinária árabe e s japonesa, 32 preferem a culinária japonesa a e portuguesa, e 20 apreciam os três tipos. Considerando que 10 pessoas disseram que não apreciam nenhuma das três, 50 não optaram pela culinária portuguesa e 40 não optaram pela japonesa, assinale a alternativa que apresenta o número de entrevistados.

(A) 207 (B) 200 (C) 157 (D) 127 (E) 100

E45) A diferença entre a média aritmética e a média proporcional de 4 e 36 é:

(A) 6 (B) 8 (C) 10 (D) 12 (E) 14

E46) Dados dois conjuntos não vazios A e B, se ocorrer $A \cup B = A$, podemos afirmar que:

(A) $A < B$ (B) Isto nunca pode acontecer (C) B é um conjunto unitário
(D) B é subconjunto de A (E) A é um subconjunto de B

E47) Sendo $A = \{x \in N \mid x < 2\}$ e $B = \{x \in Z\} \mid 1/3 < x < 11/5\}$,
o produto cartesiano A x B possui quantos elementos?

(A) 10 (B) 4 (C) 2 (D) 6 (E) 8

E48) Nas sentenças seguintes, marque com C as corretas e com E as erradas, e marque a opção correta.

( ) $\{1\} \in \{1, 2, 3\}$
( ) $7 \in \{2, \{0, 7\}, 8\}$
( ) $\emptyset \subset \{2, 4, 5\}$
( ) $\emptyset \in \{\emptyset, 9\}$
( ) $\{2, 3\} \supset \{2, 3, 8\}$

(A) EEECC (B) EECCE (C) ECECE (D) CCECE (E) ECCEE

E49) A razão entre a média harmônica e o inverso da média aritmética de dois números é igual a:

(A) Soma dos dois números
(B) Produto dos dois números
(C) Quociente dos dois números
(D) Média geométrica dos dois números
(E) NRA

Scanned by CamScanner

E50) (*) (CM) Depois de N dias de férias, uma estudante observou que:
Choveu 7 vezes, de manhã ou à tarde.
Quando chovia de manhã, não chovia à tarde.
Houve 5 tardes sem chuva.
Houve 6 manhãs sem chuva
Calcule N

E51) (*) UFRJ 2008 - Um buquê contém flores, entre as quais rosas vermelhas. Se retirarmos todas as flores de cor vermelha, restarão 14 flores. Se retirarmos todas as rosas, restarão 17 flores. Se retirarmos todas as flores que não são vermelhas, restarão 19 flores e, se retirarmos todas as rosas vermelhas, restarão 26 flores. Determine o número de flores desse buquê e o número de rosas que não são vermelhas.

E52) Encontre $\mathbf{f(k-1)}$, sendo $\mathbf{f(x) = 4x^2 - 2x + 1}$

(A) $4k^2 - 10k + 3$ (B) $-10k^2 + 4k + 7$ (C) $4k^2 - 10k + 7$ (D) $4k^2 + 2k + 3$ (E) $4k^2 - 2k$

E53) Qual é o domínio da função $f(x) = \sqrt{\frac{3-x}{x+1}}$?

E54) Qual é a imagem da função $f(x) = x^3$?

E55) Um aluno obteve notas 68, 82, 87 e 89, nas quatro primeiras provas, de um total de 5. O média final será calculada por média aritmética simples. Qual a faixa de valores deve ser obtida para a última nota, para que a média final fique menor que 90, porém maior ou igual a 80?

E56) Se y é diretamente proporcional a x, e y = 46 quando x vale $2\frac{3}{10}$, qual valor terá x quando y = 42?

(A) $x = -2\frac{3}{10}$ (B) x = 21 (C) x = 20 (D) $x = 2\frac{1}{10}$ (E) x = –23

E57) A e B são conjuntos não vazios. 1/3 de todos os elementos de A são também elementos de B, e 1/4 dos elementos de B são também elementos de A. Se A tem um total de 6 elementos, quantos elementos estão em $A \cup B$?

(A) 6 (B) 14 (C) 12 (D) 10 (E) 16

E58) Dada a função $\mathbf{f(x) = x^2 - 3x + 3}$, calcule $\mathbf{[f(5+h) - f(5)]/h}$

(A) 1 (B) $14 + 7h + h^2$ (C) $7 + h$ (D) $7h + h^2$ (E) $28 + h + h^2$

E59) Calcule f(–2) + f(2), sabendo que f(x) é uma função definida por:

$$\begin{cases} 2x^3 + 6, \text{ para } x < 1 \\ 2x + 4, \text{ para } x \geq 1 \end{cases}$$

(A) 8 (B) 12 (C) 10 (D) –2 (E) –6

E60) Encontre o domínio da função $f(x) = \sqrt{x-1} - \frac{1}{\sqrt{2-x}}$

(A) [1, 2] (B) (1, 2] (C) [1, 2) (D) (1, 2) (E) $(-\infty, +\infty)$

Scanned by CamScanner

E61) Calcule f(–1) + f(1) dada a função f(x) definida por:

$$\begin{cases} \sqrt{-x}\text{, se } x < 1 \\ x + 1\text{, se } x \geq 1 \end{cases}$$

(A) indefinido (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) $\sqrt{2}$

E62) Encontre o domínio da função $f(x)=\frac{\sqrt{x}}{x-1}$

(A) [0, 1) ∪ (1, ∞] (B) [0, ∞) (C) [1, ∞) (D) x > 1 (E) (0, 1)

E63) Quais valores devem ser excluídos do domínio da função racional $f(x)=\frac{x(x+1)}{(x+2)(x+3)}$?

(A) x≠0, 1, –2, –3 (B) x≠0, –1, 2, 3 (C) x ≠ –2, –3 (D) x ≠ 2, 3 (E) x ≠ 0, 1

E64) CN 98 - Dados dois conjuntos A e B tais que n(A∪B) = 10, n(A∩B) = 5 e n(A) > n(B). Pode-se afirmar que a soma dos valores possíveis para n(A – B) é:

(A) 10 (B) 11 (C) 12 (D) 13 (E) 14

E65) CN 78 - Seja R o conjunto dos números reais e Z, o conjunto dos números inteiros. Seja:
A = {x∈R | $x^3 + x = 0$}; B = {x∈Z | –2 < 2x + 2 < 2 }; C = {x∈(R∩Z) | $x^2 - \sqrt{2}\,x = 0$}
Então:

(A) A – C = {0} (B) C – B = { $\sqrt{2}$ } (C) C∩A = A (D) A∪C = B (E) A∪B = C

E66) CN 78 - Sejam os conjuntos:
X = {–10, 1, 2}
Ø: conjunto vazio
Y: Conjunto dos números pares positivos que são primos
Z: Conjunto dos múltiplos de 2 que têm um algarismo e que não são negativos
É falso afirmar que

(A) {x∈ (X∩Y) | x > 3} = Ø
(B) {x∈ (X–Y) | x < 4} = {–1, 0, 1}
(C) {x∈ (X∪Y) | x < 5} = X
(D) {x∈ (X∩Y) | x ≤ 2} = {2}
(E) {x∈ (Z–Y) | x < 8} = Z – {8}

E67) CN 78 - Sejam:
N : o conjunto dos inteiros não negativos
Z : o conjunto dos números inteiros
Q : o conjunto dos números racionais
Podemos afirmar que:

(A) {x∈N | x > 0} = Z – {0}
(B) {x∈(Z∩Q) | $x^2 - 3x/2 + 1/2 = 0$} ≠ Ø
(C) {x∈Q | 2x – 5 = 0 } ⊂ Z
(D) {x∈Q | $x^2 - 4 = 0$ } ⊂ N
(E) N∩Z∩Q = Ø

E68) CN 79 - Sejam os conjuntos:

X = conjunto dos números ímpares positivos que têm um algarismo.
Y = conjunto dos divisores ímpares e positivos de 10.
Z = conjunto dos múltiplos não negativos de 3, que têm um algarismo.

Scanned by CamScanner

$\emptyset$ = conjunto vazio.
Assinale a afirmativa correta

(A) $X - Y = \{3, 6, 7, 9\}$
(B) $Y - X = \{3, 7, 9\}$
(C) $(X \cap Y) - (X \cup Z) = \{3, 6, 7, 9, 0\}$
(D) $(Y \cap Z) \cup X = \{1, 3, 5, 7, 9\}$
(E) $Z - Y = \emptyset$

E69) CN 79 - Sejam os conjuntos:

N = conjunto dos inteiros não negativos
Z = conjunto dos inteiros
Q = conjunto dos racionais
R = conjunto dos reais

Assinale a afirmativa falsa

(A) $\{x \in N \mid x^2 - 4 = 0\}$ é um conjunto com um elemento
(B) $\{x \in Q \mid x^2 - 3 = 0\}$ é um conjunto vazio
(C) $\{x \in R \mid x^2 + 4 = 0\}$ é um conjunto que tem dois elementos
(D) $\{x \in Z \mid x^2 - 4 = 0\}$ é um conjunto que tem dois elementos
(E) $\{x \in Z \mid x \notin N\}$ é um conjunto não vazio.

E70) CN 97 - Considere o conjunto A dos números primos positivos menores do que 20 e o conjunto B dos divisores positivos de 36. O número de subconjuntos do conjunto diferença B – A é:

(A) 32 (B) 64 (C) 128 (D) 256 (E) 512

E71) CN 97 - Dados os conjuntos A, B e C, tais que: $n(B \cup C) = 20$, $n(A \cap B) = 5$, $n(A \cap C) = 4$, $n(A \cap B \cap C) = 1$ e $n(A \cup B \cup C) = 22$. O valor de $n[A - (B \cap C)]$ é:

(A) 10 (B) 9 (C) 8 (D) 7 (E) 6

E72) CN 82 Se $M \cap P = \{2, 4, 6\}$ e $M \cap Q = \{2, 4, 7\}$, logo $M \cap (P \cup Q)$ é:

(A) $\{2, 4\}$ (B) $\{2, 4, 6, 7\}$ (C) $\{6\}$ (D) $\{7\}$ (E) $\{6, 7\}$

E73) (*) CN 83 - Numa cidade constatou-se que as famílias que consomem arroz não consomem macarrão. Sabe-se que: 40% consomem arroz, 30% consomem macarrão, 15% consomem feijão e arroz, 20% consomem feijão e macarrão, 60% consomem feijão. A porcentagem correspondente às famílias que não consomem esses três produtos é:

(A) 10% (B) 3% (C) 15% (D) 5% (E) 12%

E74) CN 83 – Sendo

$A = \{x \in N \mid x^2 - 4 = 0\}$
$B = \{x \in Z \mid -2 \leq x < 5\}$
$C = \{x \in Z \mid 0 < \frac{-3x+2}{3} \leq 5\}$

O conjunto $A \cup (B \cap C)$ é:

OBS: N = conjunto dos números naturais; Z = conjunto dos números inteiros.

(A) $\{0, 2\}$ (B) $\{-2, 2, 1\}$ (C) $\{-2, -1, 0, 2\}$ (D) $\{-2, 0, 3, 5\}$ (E) $\{-2, 0, 2, 4\}$

E75) (*) CN 96 – Numa cidade, 28% das pessoas tem cabelos pretos e 24% possuem olhos azuis. Sabendo que 65% da população de cabelos pretos têm olhos castanhos e que a população de olhos verdes que tem cabelos pretos é 10% do total de pessoas de olhos

Scanned by CamScanner

castanhos e cabelos pretos, qual a porcentagem, do total de pessoas de olhos azuis, que tem os cabelos pretos?

OBS: Nesta cidade só existem pessoas de olhos azuis, verdes ou castanhos.

(A) 30,25% (B) 31,25% (C) 32,25% (D) 33,25% (E) 34,25%

E76) CN 84 - Associando os conceitos da coluna da esquerda com as fórmulas da coluna da direita, sendo ***a*** e ***b*** números reais positivos quaisquer, tem-se:

I – média harmônica dos números ***a*** e ***b***.
II – média ponderada dos números **a** e **b**.
III – a média proporcional entre os números **a** e **b**.
IV – o produto do MMC pelo MDC de **a** e **b**
V – média aritmética simples entre os números **a** e **b**.

a) $\sqrt{ab}$ b) $\frac{a}{b}$ c) $\frac{a.b}{2}$ d) $\frac{2ab}{a+b}$ e) $a.b$

(A) (I; b); (II; c); (IV; e) (B) (II; c); (III; a); (IV; e); (C) (I; d); (II; c); (V; b);
(D) (III; a); (IV; e); (V; b); (E) (I; d); (III; a); (IV; e);

E77) CN 84 - A, B e C são respectivamente os conjuntos dos múltiplos de 8, 6 e 12. Podemos afirmar que o conjunto $A \cap (B \cup C)$ é o conjunto dos múltiplos de:

(A) 12 (B) 18 (C) 24 (D) 48 (E) 36

E78) CN 85 - Dados dois conjuntos A e B tais que:

- o número de subconjuntos de A está compreendido entre 120 e 250
- B tem 15 subconjuntos não vazios

Quantos elementos em o produto cartesiano de A por B ?

(A) 8 (B) 12 (C) 16 (D) 28 (E) 32

E79) CN 85 - Uma empresa possui uma matriz M e duas filiais A e B. 45% dos empregados da empresa trabalham na matriz M e 25% dos empregados trabalham na filial A. De todos os empregados dessa empresa, 40% optaram por associarem-se a um clube classista, sendo que 25% dos empregados da matriz M e 45% dos empregados da filial A se se associaram ao clube. O percentual de empregados da filial B que se associaram ao clube é:

(A) 17,5% (B) 18,5% (C) 30% (D) 58 1/3 % (E) 61 2/3 %

E80) CN 85 - Considere os conjuntos $A = \{1, \{1\}, 2\}$ e $B = \{1, 2, \{2\}\}$ e as cinco afirmações:

I – $A - B = \{1\}$
II – $\{2\} \subset (B - A)$
III – $\{1\} \subset A$
IV – $A \cup B = \{1, 2, \{1, 2\}\}$
V – $B - A = \{\{2\}\}$

Logo,
(A) todas as afirmações estão erradas
(B) só existe uma afirmação correta
(C) as afirmações ímpares estão corretas
(D) as afirmações III e V estão corretas
(E) as afirmações I e IV são as únicas incorretas

Scanned by CamScanner

E81) CN 85 - Sabendo-se que a média aritmética e a média harmônica entre dois números naturais, valem, respectivamente, 10 e 32/5, pode-se dizer que a média geométrica entre esses números será igual a:

(A) 3,6 (B) 6 (C) 6,4 (D) 8 (E) 9

E82) CN 86 - Representando-se por n(X) o número de elementos de um conjunto X, considere dois conjuntos A e B tais que $n(A \cap B) = 4$, $n(A - B) = 5$, e $n(A \times B) = 36$. Podemos afirmar que $n(A \cup B)$ é igual a:

(A) 4 (B) 9 (C) 7 (D) 9 (E) 10

E83) CN 86 - Considere os conjuntos $X = \{x \in N \mid x \leq 4\}$ e Y, $Y \subset X$, O número de conjuntos Y tais que $4 \in Y$ e $0 \notin Y$ é:

(A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 15 (E) 16

E84) (*) CN 87 - Sendo ***a*** e ***b*** números inteiros quaisquer,
$R = \{x \mid x = a/b, b \neq 0\}$ e $S = \{2; 1,3; 0,444...; \sqrt{2}\}$, então:

(A) $S \subset R$ (B) $S \cap R = \emptyset$ (C) $S \cap R$ é unitário (D) $S \cap R$ tem dois elementos (E) S – R é unitário

E85) CN 87 - Dados os conjuntos M, N e P tais que $N \subset M$, $n(M \cap N) = 60\%.n(M)$, $n(N \cap P) = 50\%.n(N)$, $n(M \cap N \cap P) = 40\%.n(P)$ e $n(P) = x\%.n(M)$. O valor de x é:

(A) 80 (B) 75 (C) 60 (D) 50 (E) 45

E86) CN 88 - Num grupo de 142 pessoas foi feita uma pesquisa sobre três programas de televisão, A, B e C, e constatou-se que:

I – 40 não assistem a nenhum dos três programas
II – 103 não assistem ao programa C
III – 25 só assistem ao programa B
IV – 13 assistem aos programas A e B
V – O número de pessoas que assistem somente aos programas B e C é a metade dos que assistem somente A e B.
VI – 25 só assistem a 2 programas
VII – 72 só assistem a um dos programas

Pode-se concluir que o número de pessoas que assistem:

(A) ao programa A é 30 (B) ao programa C é 39 (C) aos 3 programas é 6
(D) aos programas A e C é 13 (E) aos programas B ou C é 63.

E87) CN 90 - Considere os conjuntos A, B, C e U no diagrama abaixo. A região hachurada corresponde ao conjunto:

(A) $[A - (B \cap C)] \cup [(B \cap C) - A]$
(B) $C_{(A \cup B \cup C)}[(A \cup B) - C]$
(C) $C_{A \cup (B \cap C)}[(A \cap B) \cup (A \cap C)]$
(D) $(A \cup B) - [(A \cap B) \cup (A \cap C)]$
(E) $[(B \cap C) - A] \cup (A - B)$



Scanned by CamScanner

E89) CN 91 - A eleição para o diretor de um colégio é feita por voto de qualidade dos votos válidos. Os votos dos professores valem 50%, os votos dos alunos valem 45% e os votos dos funcionários valem 5%. Apurados os votos válidos, obteve-se a seguinte tabela:

	Votaram em A	Votaram em B
Alunos	600	480
Professores	15	180
Funcionários	240	40

Sabendo que o resultado é homologado se, e somente se, o vencedor tiver 10% mais que o oponente, pode-se concluir que:

(A) não houve vencedor
(B) o candidato A venceu por uma margem aproximada de 20% de dos votos válidos
(C) o candidato A venceu por uma margem aproximada de 30% de dos votos válidos
(D) o candidato B venceu por uma margem aproximada de 20% de dos votos válidos
(E) o candidato B venceu por uma margem aproximada de 30% de dos votos válidos

E90) CN 91 - Sejam U o conjunto das brasileiras, A o conjunto das cariocas, B o conjunto das morenas e C o conjunto das mulheres de olhos azuis. O diagrama que representa o conjunto de mulheres morenas ou de olhos azuis, e não cariocas; ou mulheres cariocas e não morenas e nem de olhos azuis é:

(A)


(B)


(C)


(D)


(E)


E91) CN 92 - Considere os diagramas onde A, B, C e U são conjuntos. A região hachurada pode ser representada por:

(A) $(A \cap B) \cup (A \cap C) - (B \cap C)$
(B) $(A \cap B) \cup (A \cap C) - (B \cup C)$
(C) $(A \cup B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C)$
(D) $(A \cup B) - (A \cup C) \cap (B \cap C)$
(E) $(A - B) \cap (A - C) \cap (B - C)$



E92) CN 94 - Sejam $M = \frac{xy}{x+y}$, onde x e y são reais positivos. Logo, M é:

(A) o quociente entre a medis geométrica e a média aritmética de x e y
(B) a metade do quociente entre a média geométrica e a média aritmética de x e y

Scanned by CamScanner

(C) a média aritmética dos inversos de x e y
(D) a média harmônica dos inversos de x e y
(E) a metade da média harmônica de x e y

E93) CN 94 - Num concurso, cada candidato fez uma prova de Português e uma de Matemática. Para ser aprovado, o aluno tem que passar nas duas provas. Sabe-se que o número de candidatos que passaram em Português é o quádruplo do número de aprovados no concurso; dos que passaram em Matemática é o triplo do número de candidatos aprovados no cuncurso, dos que não passaram nas duas provas é a metade do número de aprovados no concurso; e dos que fizeram o concurso é 260. Quantos candidatos foram reprovados no concurso?

(A) 140 (B) 160 (C) 180 (D) 200 (E) 220

E94) Colégio Naval, 2015

Para obter o resultado de uma prova de três questões, usa-se a média ponderada entre as pontuações obtidas entre cada questão. As duas primeiras questões tem peso 3,5 e a 3ª, peso 3. Um aluno que realizou essa avaliação estimou que:
I – sua nota na 1ª questão está estimada no intervalo fechado de 2,3 a 3,1; e
II – sua nota na 3ª questão foi 7.

Esse aluno quer atingir média igual a 5,6. A diferença da maior e da menor nota que ele pode ter obtido na 2ª questão, de modo a atingir o seu objetivo de média é

(A) 0,6 (B) 0,7 (C) 0,8 (D) 0,9 (E) 1

E95) Colégio Naval, 2015

Observe a figura a seguir.
Seja ABC um triângulo retângulo de hipotenusa 6 e com catetos diferentes. Com relação à área S de ABC, pode-se afirmar que:



A) será máxima quando um dos catetos for igual a $3\sqrt{2}$.
B) será máxima quando um dos ângulos internos for 30 graus.
C) será máxima quando um cateto for o dobro do outro.
D) será máxima quando a soma dos catetos for $\frac{5\sqrt{2}}{2}$.
E) seu valor máximo não existe.

E96) Colégio Naval, 2015

O número de divisores positivos de 10^{2015} que são múltiplos de 10^{2000} é

(A) 152 (B) 196 (C) 216 (D) 256 (E) 276

E97) Colégio Naval, 2015

Dado que o número de elementos dos conjuntos A e B são, respectivamente, p e q, analise as sentenças que seguem sobre o número N de subconjuntos não vazios de A∪B.

I) $N = 2^p + 2^q - 1$
II) $N = 2^{pq-1}$

Scanned by CamScanner

III) $N = 2^{p+q} - 1$

IV) $N = 2^p - 1$, se a quantidade de elementos de $A \cap B$ é p.

Com isso, pode-se afirmar que a quantidade dessas afirmativas que são verdadeiras é:

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

CONTINUA NO VOLUME 2: 139 QUESTÕES DE CONCURSOS

Respostas dos exercícios

E1) {22, 44, 66, 88}

E2) a) não se usa o conectivo "e" ao enumerar um conjunto
b) não se usam elementos repetidos

E3) {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9} E4) {1, 3, 5} E5) {Ø} E6) {12, 14, 18, 20, 24, 30}

E7)
a) {0, 2, 4, 6, 8, ...}
b) { 40 }
c) { 0, 3, 6, 9, 12, 15, ...}
d) { 51, 52, 53, 54, 55, ... }
e) { domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado}
f) { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19}
g) { 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, ...}

E8) todos são vazios

E9)

a) F	d) V	g) F	j) V	m) F
b) F	e) F	h) F	k) V	n) F
c) V	f) V	i) V	l) V	o) F

E10) a) {P, A, R, G, U, I} b) {P, E, R, T, I, N} c) {T, E, N, S}

E11) {2}, {2, 4}, {2, 3}, {2, 3, 4}, {1, 2}, {1, 2, 4}, {1, 2, 3}, {1, 2, 3, 4}

E12) (a), (b), (d), (f)

E13)
a) {0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ...}
b) {0, 3, 6, 9, 12, 15, ...}
c) {0, 5, 10, 15, 20, ...}
d) {0, 15, 30, 45, 60, ...}
e) {3, 9, 12, 18, 21, 24, 27, 33, ...}
f) {0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, ...}
g) {2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, ...}
h) {2, 3, 5, 22, 23, 25, 32, 33, 35, 52, 53, 55, 222, 223, ...}
i) {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ...}
j) {2, 14, 22, 26, 38, 42, 50, 62, ...}

E14) a) sim, c) sim, d) sim, e) sim, g) sim, i) sim, j) sim

E15) $A \cup B$, $A \cap B$, A-B e B-A:
a) {1, 2, 4, 5, 6, 7, 8}, {2, 4, 6}, {1, 5, 7}, {8}
b) {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}, { }, A, B
c) A, B, {3, 6, 12, 15}, { }

Scanned by CamScanner

d) A, B, C=Conjunto das consoantes, B
e) B, A, { }, {1, 2, 6, 7, 8}

E16) a) {3, 4, 5} b) {1/5, 1/7} c) {1, 4, 6, 8, 9} d) não definido

E17)
a) {∅ , {0}, {1}, {2} , {0, 1}, {0, 2}, {1, 2}, {0, 1, 2}}
b) {∅ , {10}, {20}, {30} , {10, 20}, {10, 30}, {20, 30}, {10, 20, 30}}
c) {∅ , {2}, {4}, {2, 4}}
d) {∅ , {a}, {b}, {c} , {a, b}, {a, c}, {b, c}, {a, b, c}}
e) {∅ , {∅}, {{∅}}, {∅, {∅}} }
f) {∅ , {1}, {2}, {3}, {4}, {1, 2}, {1, 3}, {1,4}, {2,3}, {2, 4}, {3, 4}, {1, 2, 3}, {1, 2, 4}, {1, 3, 4}, {2, 3, 4}, {1, 2, 3, 4}}

E18) a) 16 b) 16 c) 32 d) 64 e) 32 f) 16

E19)



E20) 8

E21) a) V b) V c) F d) V e) V f) F g) F h) V i) V j) V k) V l) V m) V

E22) {4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15} E23) 63 E24) 31 E25) {7, 8, 9, 10}

E26) n(A) = 6, n(B) = 4, n(A∩B) = 3 ➔ n(A∪B) = 6+4-3 = 7. Resp: $2^7 = 128$

E27) (C) E28) V, F, V, F E29) 10 E30) a=6 e b=7 ou a=7 e b=6

E31) {1} E32) {∅, 1} E33) NÃO E34) 6 E35) (C)

E36) (E) E37) (E) E38) $-a^3 - a^2 - a + 1$

E39) –180 E40) 7 E41) f(x) = x, para $x \neq -1$ E42) (C)

E43) 5 ou –7 E44) (E) E45) (B) E46) (D) E47) (B)

E48) (B) E49) (B) E50) 9 E51) 33 e 9 E52) (D)

E53) (–1, 3] E54) R

E55) Para média acima de 80, nota maior que 74, mas para média 90, impossível.

Scanned by CamScanner

E56) (D) E57) (C) E58) (C) E59) (D) E60) (C)

E61) (D) E62) (A) E63) (C) E64) (C) E65) (C)

E66) (B) E67) (B) E68) (D) E69) (B) E70) (B)

E71) (B) E72) (B) E73) (D) E74) (C) E75) (C)

E76) (E) E77) (C) E78) (D) E79) (D) E80) (D)

E81) (D) E82) (D) E83) (C) E84) (E) E85) (B)

E86) (B) E87) (D) E89) (A) E90) (A) E91) (A)

E92) (E) E93) (E) E94 (C) E95 (E) E96 (D)

E97) (A)

Resoluções de exercícios selecionados

E35) A média aritmética de 40 números é 75. Dez números foram eliminados do conjunto, deixando 30 números com média 85. Qual é a média dos 10 números eliminados?

(A) 80 (B) 65 (C) 45 (D) 50 (E) 60

Sejam os números $x_1, x_2, x_3, \ldots x_{10}, x_{11}, x_{12}, \ldots x_{40}$. Sejam S_{10} a soma dos 10 primeiros e S_{30} a soma dos 30 restantes.
A média dos 30 números é $(S10 + S30)/40 = 75$. Depois de retirados os 10, a média passou a ser 85: $S30/30 = 85$. Ficamos então com:
$(S_{10} + S_{30})/40 = 75 \therefore S_{30} = 40x75 - S_{10} \therefore S_{10} = 300 - S_{30}$ (1)
O problema indicou como 85 a média desses trinta números restantes:
$S_{30}/30 = 85 \therefore S_{30} = 255$. Substituindo em (1) ficamos com:
$S_{10} = 300 - 255 = 45$

R: (C)

E39) Se $f(x) = -2x^2 + x + 10$, calcule $f(f(f(-2)))$.

Usamos a fórmula e calculamos o valor numérico para $x = -2$:
$f(-2) = -8 - 2 + 10 = 0$, a seguir calculamos $f(0)$:
$f(0) = 10$, finalmente calculamos $f(10)$:
$f(10) = -2x100 + 10 + 10 = -180$
Então $f(f(f(-2))) = f(f(0)) = f(10) = -180$

R: -180

E40) Se $f(x) = ax^2 - bx - 4$, $f(2) = 6$ e $f(-1) = 12$, então **a** vale:

Encontraremos duas equações que permitem determinar as incógnitas **a** e **b**, substituindo os valores dados de x e f(x):
$x = 2 \rightarrow 4a - 2b - 4 = 6$
$x = -1 \rightarrow a + b - 4 = 12$
Resolvendo o sistema encontramos $a = 7$ e $b = 9$.
R: $a = 7$

Scanned by CamScanner

E43) Resolver $\big||x+1|-2\big|=4$

Equações com módulos devem ser abertas em casos, partindo do princípio:
Se $|x| = k$, k positivo, então $x = k$ ou $x = -k$.
$||x + 1| - 2| = 4$
a) $|x + 1| - 2 = 4$
b) $|x + 1| - 2 = -4$
O caso (b) não ocorre pois implica em $|x + 1| = -2$, já que um módulo não pode ser negativo.
O caso (a) resulta em $|x + 1| = 6$, que deve ser novamente desmembrado:
a1) $x + 1 = 6 \rightarrow x = 5$
a2) $x + 1 = -6 \rightarrow x = -7$

R: $x = 5$ ou $x = -7$

E50) Depois de N dias de férias, uma estudante observou que:

1º - Choveu 7 vezes, de manhã ou à tarde.
2º - Se chovia de manhã, não chovia à tarde.
3º - Houve 5 tardes sem chuva.
4º - Houve 6 manhãs sem chuva

Calcule N



Dos N dias, podemos destacar dois conjuntos: CM os dias em que houve chuva de manhã, e CT os dias em que houve chuva à tarde. O problema dá ainda que não choveu de manhã e à tarde no mesmo dia, então sua interseção tem 0 elementos. O problema pede que calculemos $x + y + z$.

1º - $x + y = 7$
3º - $x + z = 5$
4º - $y + z = 6$
Somando as três ficamos com $2(x + y + z) = 18 \therefore x + y + z = 9 \therefore N = 9$

R: 9

E51) Um buquê contém flores, entre as quais rosas vermelhas. Se retirarmos todas as flores de cor vermelha, restarão 14 flores. Se retirarmos todas as rosas, restarão 17 flores. Se retirarmos todas as flores que não são vermelhas, restarão 19 flores e, se retirarmos todas as rosas vermelhas, restarão 26 flores. Determine o número de flores desse buquê e o número de rosas que não são vermelhas.

Problemas desse tipo são de resolução mais fácil quando desenhamos diagramas de Venn.



Neste problema devemos considerar dois conjuntos: R, que é o conjunto das rosas, e V, o conjunto das flores vermelhas. Existem interseções entre esses conjunto, que são as rosas vermelhas, e ainda flores que não são rosas nem vermelhas. Ao todo temos que determinar o número de elementos de 4 regiões: x, y, z e w. São 4 incógnitas, a precisamos de 4 equações.

Se retirarmos todas as flores de cor vermelha, restarão 14 flores $\rightarrow x + w = 14$
Se retirarmos todas as rosas, restarão 17 flores $\rightarrow z + w = 17$
Se retirarmos todas as flores que não são vermelhas, restarão 19 flores $\rightarrow z + y = 19$

Scanned by CamScanner

se retirarmos todas as rosas vermelhas, restarão 26 flores ➔ $x + z + w = 26$

O problema pede o número total de flores, que é $x + y + z + w$, mas temos que $(x + w) = 14$ e $(z + y) = 19$, então $x + y + z + w = 33$. Como $x + z + y = 26$, concluímos que $y = 7$. Nesse tipo de problema é sempre importante encontrar o número de elementos da interseção de conjuntos, pois os outros valores são encontrados a partir daí com mais facilidade.
$y + z = 19$ ➔ $z = 12$; $w + z = 17$ ➔ $w = 5$; $x + w = 14$ ➔ $x = 9$.

R: 33 e 9

E71) Dados os conjuntos A, B e C, tais que: $n(B \cup C) = 20$, $n(A \cap B) = 5$, $n(A \cap C) = 4$, $n(A \cap B \cap C) = 1$ e $n(A \cup B \cup C) = 22$. O valor de $n[A - (B \cap C)]$ é:

(A) 10 (B) 9 (C) 8 (D) 7 (E) 6

É sempre mais fácil quando determinamos o número de elementos da interseção, e a partir daí determinamos os números de elementos das demais partes.



Dado que $n(A \cap B \cap C) = 1$, encontramos as regiões com 4 e 3 elementos ao lado.
O problema não permite determinar todas as regiões, mas dá que $A \cup B \cup C$ tem 22 elementos, e que $B \cup C$ tem 20 elementos, logo a região de A que não tem interseção com B nem C tem $22 - 20 = 2$ elementos. O número pedido pelo problema é o número de elementos de A abatendo a interseção dos 3 conjuntos = $2 + 4 + 3 = 9$.

R: (B)

E73) Numa cidade constatou-se que as famílias que consomem arroz não consomem macarrão. Sabe-se que: 40% consomem arroz, 30% consomem macarrão, 15% consomem feijão e arroz, 20% consomem feijão e macarrão, 60% consomem feijão. A porcentagem correspondente às famílias que não consomem esses três produtos é:

(A) 10% (B) 3% (C) 15% (D) 5% (E) 12%



Nessas questões sobre conjuntos, é sempre melhor desenhar com diagrama de Venn. O problema dá que as pessoas que consomem arroz não consomem macarrão, ou seja, os conjuntos são disjuntos. Podemos então desenhar o diagrama com os conjuntos sem interseção, como na figura ao lado. Os que comem feijão podem comer também arroz ou feijão, mas nunca os três alimentos. Considerando uma população de 100, encontramos os valores das regiões do diagrama:

15% consomem feijão e arroz ➔ $y = 15$
20% consomem feijão e macarrão ➔ $w = 20$
60% consomem feijão ➔ $z + y + w = 60$ ➔ $z = 25$
40% consomem arroz ➔ $y + x = 40$ ➔ $x = 25$

Scanned by CamScanner

30% consomem macarrão ➔ w + t = 30 ➔ t = 10
Dos 100%, abatidos esses valores, sobram 5%.

R: (D)

E84) Sendo ***a*** e ***b*** números inteiros quaisquer,
R = {x | x = a/b, b≠0} e S = {2; 1,3; 0,444...; $\sqrt{2}$ }, então:

(A) S⊂R (B) S∩R=Ø (C) S∩R é unitário (D) S∩R tem dois elementos (E) S – R é unitário

O conjunto R dado pelo problema (que obviamente não é o conjunto dos reais) é formado pelos racionais, positivos ou negativos, O conjunto S tem 4 elementos, dos quais 3 são racionais (ou seja, pretencem ao conjunto R) e o $\sqrt{2}$, que é irracional. Em função disso, a única verdadeira é e opção (E), o conjunto S – R é formado apenas pelo elemento $\sqrt{2}$.

R: (E)

E75) Numa cidade, 28% das pessoas tem cabelos pretos e 24% possuem olhos azuis. Sabendo que 65% da população de cabelos pretos têm olhos castanhos e que a população de olhos verdes que tem cabelos pretos é 10% do total de pessoas de olhos castanhos e cabelos pretos, qual a porcentagem, do total de pessoas de olhos azuis, que tem os cabelos pretos?

OBS: Nesta cidade só existem pessoas de olhos azuis, verdes ou castanhos.

(A) 30,25% (B) 31,25% (C) 32,25% (D) 33,25% (E) 34,25%

	OA	OC	OV	
CP	x			0,28
CNP				
	0,24			

Apesar de ser um problema relacionado com conjuntos, um modelo baseado em tabelas é muito mais prático que um baseado em diagrama de Venn. Usamos dados adicionais do problema:
65% da população de cabelos pretos têm olhos castanhos ➔CPOC vale 0,65 x 0,28 = 0,182
olhos verdes que tem cabelos pretos é 10% do total de pessoas de olhos castanhos e cabelos pretos ➔ CPOV = 0,1 x 0,182 = 0,0182.
Então podemos calcular x = CPOA = 0,28 – 0,182 – 0,0182 = 0,0798

	OA	OC	OV	
CP	0,0798	0,182	0,0182	0,28
CNP				
	0,24			

Dentro da população de olhos azuis, comparando os que tem cabelos pretos, temos:
0,0798 / 0,24 = 0,3325 = 33,25%

R: (C)

E94) Colégio Naval, 2015
Para obter o resultado de uma prova de três questões, usa-se a média ponderada entre as pontuações obtidas entre cada questão. As duas primeiras questões tem peso 3,5 e a 3ª, peso 3. Um aluno que realizou essa avaliação estimou que:
I – sua nota na 1ª questão está estimada no intervalo fechado de 2,3 a 3,1; e
II – sua nota na 3ª questão foi 7.

Esse aluno quer atingir média igual a 5,6. A diferença da maior e da menor nota que ele pode ter obtido na 2ª questão, de modo a atingir o seu objetivo de média é

Scanned by CamScanner

(A) 0,6 (B) 0,7 (C) 0,8 (D) 0,9 (E) 1

1ª Solução:
A nota da 3ª questão é fixa, mas tanto a da 1ª quanto a da 2ª são duvidosas. Cada uma delas pode ter um valor máximo e um valor mínimo. Não importa qual seja a média desejada, se tirar a nota máxima esperada na 1ª questão (3,1), a nota na 2ª questão poderá ser menor. Se tirar a nota mínima esperada na 1ª questão (2,3), a nota na 2ª questão terá que ser maior. Como a 1ª e a 2ª questões têm pesos iguais, a variação (máximo – mínimo) da 2ª questão dependerá da variação (máximo – mínimo = 3,1 – 2,3 = 0,8) da 1ª questão. Portanto a variação para a nota da 2ª questão é a mesma da 1ª, ou seja, 0,8, resposta (C).

2ª Solução:
Ficou claro pela explicação acima que a nota máxima na 2ª questão corresponde à mínima da 1ª questão e vice-versa. Vamos calcular a média ponderada nas duas situações:

Max 1ª: M = (3,5 x 3,1 + min2 x 3,5 + 7,0 x 3)/10 = 5,6
Min 1ª : M = (3,5 x 2,3 + max2 x 3,5 + 7,0 x 3)/10 = 5,6

Nas duas situações a média final tem que ser 5,6. Subtraindo as duas fórmulas poderemos determinar a relação entre min2 e max2, que são as notas mínima e máxima permitidas para a questão 2:
3,5 (3,1 – 2,3) + 3,5(min2 – max2) = 0
max2 – min2 = 3,1 – 2,3 = 0,8
É interessante notar que não importa qual seja a média final desejada, e não importa a nota conhecida da 3ª questão, a variação permitida para a nota da 2ª questão será a mesma.

Respsota: (C)

E95) Colégio Naval, 2015
Observe a figura a seguir.
Seja ABC um triângulo retângulo de hipotenusa 6 e com catetos diferentes. Com relação à área S de ABC, pode-se afirmar que:



A) será máxima quando um dos catetos for igual a $3\sqrt{2}$.
B) será máxima quando um dos ângulos internos for 30 graus.
C) será máxima quando um cateto for o dobro do outro.
D) será máxima quando a soma dos catetos for $\frac{5\sqrt{2}}{2}$.
E) seu valor máximo não existe.

Solução:
É preciso usar um pouco de geometria, já que trata-se de uma questão de geometria, mas que envolve um conceito de álgebra importante, que são os limites dos intervalos abertos.
No triângulo ABC, como a base AC é fixa, a área vai ser máxima quando a altura traçada de B for máxima. Como o ângulo B é reto, o vértice B pertence ao arco capaz de 90 graus sobre AC, ou seja, pertence à sem-circunferência de diâmetro AC = 6, ou seja, a altura traçada de B, para que a área seja máxima, é igual ao raio dessa semi-circunferência. Essa altura portanto vale 3, que é o raio da semi-circunferência, e a área é (3 x 6)/2, que vale 9 unidades de área.

Scanned by CamScanner

Ocorre que para que esta altura seja máxima, e igual ao raio, o triângulo ABC tem que ser isósceles, com lados BC = BA. O problema indica que os catetos têm que ser diferentes, então não podemos ter BA = BC, logo o problema não tem solução.

Isso é o mesmo que perguntar, por exemplo, qual é o menor número real do intervalo (0, 1). O número zero é o menor de todos, mas ele não pertence ao intervalo. Não existe um "vizinho" do zero nos números reais, pois se supusermos que existe um núemero real tal, que seja bem próximo de zero, podemos tomar a metade deste valor, que será ainda mais próxima de zero. Da mesma forma não podemos tomar dois catetos "quase iguais", pois sempre poderemos encontrar dois valores ainda mais próximos e ainda assim diferentes. Por isso o problema não tem solução.

Resposta: (E)

E96) Colégio Naval, 2015

O número de divisores positivos de 10^{2015} que são múltiplos de 10^{2000} é

(A) 152 (B) 196 (C) 216 (D) 256 (E) 276

Solução:

Antes de mais nada, notemos que o problema fala apenas de divisores positivos.

Se um divisor de 10^{2015} é múltiplo de 10^{2000}, precisa ter obrigatoriamente todos os fatores de 10^{2000}. Separando esses fatores obrigatórios, o problema recai em formar um divisor de 10^{15} e multiplicá-lo por 10^{2000}. Devemos então determinar quantos são os divisores de 10^{15}:

$10^{15} = 2^{15}.5^{15}$. Para encontrar o núemro de divisores multiplicamos o produto dos seus expoentes de fatores primos, sendo cada expoente somado com 1:

$(15 + 1)(15 + 1) = 16 \times 16 = 256$.

Resposta: (D)

E97) Colégio Naval, 2015

Dado que o número de elementos dos conjuntos A e B são, respectivamente, p e q, analise as sentenças que seguem sobre o número N de subconjuntos não vazios de $A \cup B$.

I) $N = 2^p + 2^q - 1$

II) $N = 2^{pq-1}$

III) $N = 2^{p+q} - 1$

IV) $N = 2^p - 1$, se a quantidade de elementos de $A \cap B$ é p.

Com isso, pode-se afirmar que a quantidade dessas afirmativas que são verdadeiras é:

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

Solução:

Para saber o número de subconjuntos da união, temos que saber quantos são os seus elementos. Para isto usaremos a fórmula que dá o núemro de elementos de uma união de conjuntos:

$$\#(A \cup B) = \#A + \#B - \#(A \cap B)$$

O problema dá o número de elementos de A e o de B (p e q), mas não dá o número de elementos da sua interseção, vamos chamar este valor de r:

$$\#(A \cup B) = p + q - r$$

Em função disso, podemos calcular o núemro de subconjuntos não vazios. Se um conjunto tem n elementos, o número dos seus subconjuntos não vazios é:

Scanned by CamScanner

$2^n - 1$

Portanto o valor que o problema pede é

$2^n - 1 = 2^{p+q-r} - 1$

Resta agura analisar qual das opções (I) e (IV) é igual a este valor:

I) $N = 2^p + 2^q - 1 = 2^{p+q-r} - 1$ FALSO
II) $N = 2^{pq-1} = 2^{p+q-r} - 1$ FALSO
III) $N = 2^{p+q} - 1 = 2^{p+q-r} - 1$ FALSO
IV) $N = 2^p - 1 = 2^{p+q-r} - 1$ (!!!!)

A opção 4 apresenta uma fórmula condicionada à situação em que a quantidade de elementos de $A \cap B$ é p, ou seja, $r = p$. Sendo assim, o segundo membro de (IV) ficaria:

IV) $N = 2^p - 1 = 2^{p+q-p} - 1 = 2^q - 1$, que também é FALSO!

Portanto todas as alternativas são falsas, e a resposta é (A)

Resposta: (A)

■

Scanned by CamScanner

Capítulo 12

Inequações do primeiro grau

Se você é bastante cauteloso, iniciou o capítulo passado considerando que ainda não havia chegado à metade do livro, afinal tinha completado 10 capítulos, e faltavam mais 11 para chegar ao final. Mas agora pode ter certeza de que passou da metade, foram 11 e faltam 10. Entretanto você já está bem além da metade, basta checar as páginas. Você já passa de 70% da sua preparação em álgebra. Parabéns.

Os tópicos presentes no restante do livro são em menor quantidade, porém, com muito maior dificuldade. O importante é que você tem uma base sólida adquirida na parte inicial do livro. Prepare-se, pois o número de páginas restantes ser menor que a metade do total, a dificuldade é maior. Além da habilidade algébrica crescente, será maior a exigência com conceitos matemáticos a serem aprendidos.

Já abordamos neste livro, equações do 1º grau, sistemas do 1º grau e problemas do 1º grau. Neste ponto da álgebra, estudamos:

- Equações e inequações
- Do primeiro e do segundo graus
- Sistemas de equações
- Sistemas de inequações
- Cálculo de radicais

Seriam muitos capítulos para abordar cada um dos tópicos. Muitos livros juntam vários desses assuntos em um só capítulo. Faremos isto parcialmente, ou seja, juntaremos apenas assuntos cujos tópicos são muito curtos. Aqueles cujos tópicos são mais importantes e mais cobrados em provas e concursos, como equações, sistemas e problemas do 1º grau, ficarão com capítulos exclusivos.

Varemos agora o capítulo 12, exclusivo sobre inequações do 1º grau. No capítulo 17 abordaremos inequações do 2º grau, sistemas de inequações do 1º e do 2º grau. Vermos também neste capítulo, as inequações com módulos.

A forma final da inequação do 1º grau

Uma inequação é uma expressão algébrica que representa uma desigualdade, ao invés de uma igualdade, como por exemplo:

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Supondo que o coeficiente ***a*** é positivo, essas inequações resultam respectivamente nas seguintes soluções:

$x > b/a$; $x < b/a$; $x \neq b/a$; $x \geq b/a$; $x \leq b/a$.

Se a for negativo, o sentido da igualdade é invertido. Por exemplo:

$-5x > 10 \rightarrow x < -10/5$

Um sinal de desigualdade não se altera quando multiplicamos ou dividimos os dois membros por um valor positivo. Já que $20 > 10$, então $2 > 1$, $200 > 100$, $40 > 20$, etc.

Quando toda a expressão é multiplicada por um valor negativo, o sentido da desigualdade é invertido. Por exemplo, $20 > 10$ resulta em que $-200 < -100$, $-2 < -1$, etc.

Essa necessidade de inverter o sinal da desigualdade não se deve ao fato da expressão ter valores negativos em um ou nos dois membros, mas sim a fato da expressão toda ter sido multiplicada por um número negativo.

Exemplo:
$-3 < -2 \rightarrow -30 < -20$
A presença de valores negativos não causa a alteração no sinal. O que ocorreu foi a multiplicação da desigualdade original por 10, que é um valor positivo, então o sinal se mantém.

Exemplo:
$-5 < 3 \rightarrow 50 > -30$
Nesse caso a inversão do sinal ocorreu porque os dois membros foram multiplicados por –10, um valor negativo.

Na resolução de uma inequação, podemos adicionar valores, ou trocar valores de membro, respeitando a troca de sinal. Apenas na multiplicação e na divisão, devemos ainda fazer a inversão da desigualdade.

Exemplo: $3x + 12 > 6x - 18$
Temos então:
$3x + 12 > 6x - 18$
$3x - 6x > -18 - 12$
$-3x > -30$
Se agora dividirmos toda a inequação por –3, temos que inverter o sentido da desigualdade:
$3x < 30$
$x < 30/3 = 10$

Outra opção é trocar os membros de posição, trocando os sinais
$30 > 3x$ ou $3x < 30$
$x < 30/3 = 10$

Exemplo: Resolver a inequação $3x + 5(4 - 2x) < 2(x + 2) + 4(2 - 3x)$
$3x + 20 - 10x < 2x + 4 + 8 - 6x$
$-7x + 20 < -4x + 12$
$-3x < -8$
$3x > 8$
$x > 8/3$

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

a) Os denominadores devem ser diferentes de zero
b) Reduzimos todas as frações ao mesmo denominador, mas não os eliminamos.

A técnica de resolução consiste em reduzir toda a expressão a uma forma com uma expressão f(x)/g(x) no primeiro membro, e zero no segundo membro. A seguir fazemos um estudo da variação de sinal da expressão f(x)/g(x). Do conjunto solução encontrado, devemos excluir os valores de x que anulam o denominador.

Exemplo: Resolver $\frac{4x-7}{x-1} > 1$

a) Restrição (valores não permitidos de x) – todos aqueles que anulam algum denominador.
$x - 1 \neq 0$
$x \neq 1$

b) Resolução:
$\frac{4x-7}{x-1} > 1 \rightarrow \frac{4x-7}{x-1} - 1 > 0 \rightarrow \frac{4x-7}{x-1} - \frac{x-1}{x-1} > 0 \rightarrow \frac{4x-7-(x-1)}{x-1} > 0 \rightarrow \frac{3x-6}{x-1} > 0$

É permitido simplificar a expressão por 3, um valor positivo, sem alterar a desigualdade:
$\frac{x-2}{x-1} > 0$

Agora fazemos um estudo da variação de sinal do numerador e do denominador.



$x - 2$ é positivo para $x > 2$, e negativo para $x < 2$. Note que marcamos o valor 0 para $x = 2$.

$x - 1$ é positivo para $x > 1$, e negativo para $x < 1$. Note que marcamos o valor 0 para $x = 1$.

A fração será negativa apenas em $(1, 2)$ e positiva em $(-\infty, 1) \cup (2, \infty)$.

Note na terceira linha da tabela, que é o estudo da variação de sinal da expressão $(x - 2)/(x - 1)$, que marcamos os "pontos críticos":

- 0, quando $x = 2$
- Não existe (símbolo é uma letra "E" riscada invertida) quando $x = 1$

Queremos que a fração seja maior que zero, então temos que ter:
$x \in (-\infty, 1) \cup (2, \infty)$.

Scanned by CamScanner

Observe que não estamos incluindo 1 e 2 porque a desigualdade é estrita (>). Se a inequação fosse da forma ≤ ou ≥, incluiríamos 1 e 2 nesta etapa, e os intervalos seriam $\in (-\infty, 1]$ e $[2, \infty)$.

Devemos agora excluir os valores da restrição (x deve ser diferente de 1, pois anularia o denominador). Como o intervalo encontrado já não contém o valor 1, não haverá diferença.

Resposta: $S = (-\infty, 1) \cup (2, \infty)$.

IMPORTANTE: Preste muita atenção nos pontos críticos, pois muitas vezes o aluno as esquece, por isso são usados em "pegadinhas" em provas de concursos.

Exercícios

E2) Resolva as seguintes inequações fracionárias:

a) (*) $2-\frac{x}{1-x}<1-\frac{1}{x-1}$

b) $\frac{3x-2}{x-1}>1$

c) $\frac{x-17}{2-x}>\frac{3x+15}{x-2}$

d) $\frac{3x-5}{x-1}<3$

e) $\frac{2x-14}{-3x+15}\leq 0$

f) $\frac{x+3}{5-x}+2\leq 0$

g) $\frac{x+2}{x-5}+1>0$

h) $\frac{x+1}{3x-2}\geq 1$

i) $\frac{x-2}{x+3}>5$

j) $\frac{x+3}{5-x}+2\leq 0$

Alunos da EPCAr

Sistemas de inequações

No caso das equações, a determinação do valor de uma incógnita requer apenas uma equação. Entretanto no caso das inequações, podemos ter uma só incógnita e duas ou mais inequações.

Exemplo: Resolver o sistema de inequações

$$\begin{cases} 3x + 5 > 20 \\ x + 3 \leq 30 \end{cases}$$

É um sistema com duas inequações e uma incógnita. Para resolvê-lo, fazemos a **interseção** dos resultados das duas inequações, pois ambas estão implicitamente ligadas por um conectivo E:

$3x + 5 > 20$ E $x + 3 \leq 30$

Sendo assim,
$3x + 5 > 20 \rightarrow 3x > 15 \rightarrow x > 5$
$x + 3 \leq 30 \rightarrow x \leq 27$.

Interseção: x deve ser maior que 5, e menor ou igual a 27: $5 < x \leq 27$.
$S = (5, 27]$

Scanned by CamScanner

Este é o procedimento para resolver este tipo de sistema. Resolvemos cada inequação e fazemos a interseção dos conjuntos solução.

Exercícios

E3) Resolver os seguintes sistemas de inequações:

a) $\begin{cases} x+3>2x-1 \\ \dfrac{x+1}{2}>\dfrac{2x}{3} \end{cases}$

b) (*) $\begin{cases} 3x-\dfrac{1}{4}>20-\dfrac{2x}{3} \\ 2(2x-3)>5x-\dfrac{3}{4} \end{cases}$

c) $\begin{cases} \dfrac{5}{3}x+\dfrac{3}{5}<3x+1 \\ \dfrac{4}{5}x<2-\dfrac{5x-1}{4} \end{cases}$

d) $\begin{cases} \dfrac{4x-9}{7}+3<x-3 \\ \dfrac{3x+10}{4}-5<\dfrac{1-3x}{10} \end{cases}$

e) $\begin{cases} \dfrac{x-3}{4}<\dfrac{2x+3}{2}-3 \\ \dfrac{3x-1}{10}<5-\dfrac{4x-2}{5} \end{cases}$

f) $3<\dfrac{x-1}{3}<4$

g) $\begin{cases} \dfrac{4x-79}{7}<x-13 \\ \dfrac{3x+10}{4}>2x-5 \end{cases}$

h) $\begin{cases} \dfrac{x-1}{x-5}>1 \\ \dfrac{3x-4}{2}-\dfrac{7x-6}{4}<0 \end{cases}$

i) $\begin{cases} \dfrac{x-4}{5}+\dfrac{1}{3}>\dfrac{x}{5}-\dfrac{3x-10}{21} \\ \dfrac{2-x}{9}-\dfrac{1-x}{6}>\dfrac{x}{12}-\dfrac{23}{18} \end{cases}$

(CMB 2009)

j) Resolver $-6<3-2x\leq 4$

Inequações com duas variáveis

É possível formar inequações com duas ou mais variáveis. Apesar de serem mais raras, é necessário conhecê-las para lidar com questões de concurso e aplicações práticas.

Considere por exemplo a inequação y – 2x +4 ≥ 0. O conjunto de pares (x, y) que atendem a esta inequação é uma região do plano cartesiano, como mostraremos a seguir.

Navio patrulha classe "Amazonas"

Se representarmos inicialmente os pontos que atendem a y – 2x + 4 = 0, termos uma reta, já que trata-se de uma função afim. Esta reta está representada na figura a seguir.

Scanned by CamScanner



$y - 2x + 4 = 0$ é o mesmo que

$y = 2x - 4$

Ao lado temos a representação no plano xy, dos pontos que atendem a $y = 2x - 4$.

Vejamos agora quais são os pontos que atendem a $y - 2x + 4 > 0$, ou seja, $y > 2x - 4$. Devemos tomar todos os pontos cuja ordenada (y) seja maior que $2x - 4$, ou seja, todos os pontos cujo valor de y seja maior que valores da reta $y = 2x - 4$. Isto significa tomar os pontos acima da reta:



Os pontos da reta são os que satisfazem a $y = 2x - 4$.

Os pontos acima da reta são os que satisfazem a $y > 2x - 4$.

Os pontos abaixo da reta são os que satisfazem a $y < 2x - 4$.

Vemos que em uma inequação com duas variáveis, o conjunto solução não é um intervalo dos reais, mas sim, uma parte do plano R^2.

Suponha agora que temos um sistema com duas inequações de duas variáveis:

$$\begin{cases} y - 2x + 4 > 0 \\ x + y < 5 \end{cases}$$

Devemos então traçar as duas retas, com y no primeiro membro, e marcar as regiões que atendem a cada inequação, conforme y seja maior ou menor que uma função de x.
A figura abaixo mostra as regiões que satisfazem a cada uma das inequações dadas:





Scanned by CamScanner

A solução do sistema é a região de interseção das duas regiões acima, ou seja:



Não existe uma forma compacta de definir esta região, além de escrever simplesmente:

$S = \{(x, y) \in R^2 \mid y > 2x - 4 \text{ e } y < -x + 5\}$

Deve ser levado em conta ainda, que quando a desigualdade for estrita ($>$ ou $<$), as linhas de fronteira devem ser pontilhadas, e quando for uma desigualdade não estrita ($\geq$ ou $\leq$), a linha de fronteira deve ser continua.

Exemplo: Qual dos seguintes pares ordenados não e uma solução do sistema abaixo?

$$\begin{cases} 3x + 2y \leq 6 \\ 2x - 5y \geq 10 \end{cases}$$

(A) (2, –7) (B) (0, –2) (C) (–2, –3) (D) (0, 3) (E) (3, –2)

Solução:
Serão soluções os pontos que atendem a ambas as inequações. A solução consiste em testar cada uma das cinco opções, para verificar quais pontos satisfazem a ambas as inequações, e qual não satisfaz. Testando todas elas, vemos que o único ponto que não satisfaz é o (D):

$3.0 + 2.(3) \leq 6$ OK
$2.0 - 5.(3) \geq 10$? NÃO !!!!

Resposta: (D)

Equações com módulo

As equações e inequações com módulo não estão no programa do ensino fundamental, mas podem aparecer "disfarçadas" em concursos como CN e EPCAr.

Exemplo: $|3x + 6| = 18$
A resolução consiste em desmembrar a equação em duas, eliminando o módulo. Neste processo, temos que considerar duas situações: conteúdo do módulo positivo e conteúdo do módulo negativo. Na determinação dessas condições, recaímos em inequações.

a) $3x + 6 \geq 0 \rightarrow x \geq -2$
Nesse caso fazemos o conteúdo do módulo positivo e fazemos a eliminação:
$3x + 6 = 18 \therefore 3x = 12$
$\mathbf{x = 4}$

Scanned by CamScanner

Agora fazemos a INTERSEÇÃO com a condição $x \geq -2$. A eliminação do módulo mantendo o sinal da expressão no seu interior está vinculada ao fato desta expressão ser positiva, portanto é preciso ter simultaneamente $x \geq -2$ e $x = 4$ (interseção). Como $x = 4$ atende à condição $x \geq -2$, esta solução encontrada é válida.

Testando a resposta: de fato, fazendo $x = 4$, encontramos $|12 + 6| = 18$.

b) $3x + 6 < 0$
$x < -2$

Nesse caso, a expressão dentro do módulo é negativa, portanto eliminamos o módulo fazendo a inversão do seu sinal:
$-3x - 6 = 18$
$-3x = 24$
$x = -8$

Devemos fazer agora a interseção desse resultado com a condição $x < -2$. De fato, -8 é menor que -2, portanto esta resposta é válida. Podemos testar o valor encontrado -8 na equação original:

$|3(-8) + 6| = |-24 + 6| = |-18| = 18$

De fato esta solução também serve. O fato de termos feito a interseção de cada solução com a condição (valor no módulo positivo ou negativo) garante que as soluções estão corretas, não é necessário fazer uma verificação final. Entretanto é bom fazê-la para detectar eventuais erros de cálculo.

Inequações com módulo

Para resolver uma inequação com módulo, é preciso antes eliminar o módulo da expressão. A eliminação do módulo na expressão $|f(x)|$ consiste em considerar $f(x)$, para $f(x) \geq 0$, e considerar $-f(x)$ para $f(x) < 0$. Isso resulta em um sistema:

Exemplo:

$|x - 3| > 5$

Resultará em dois sistemas, cujas soluções devem ser unidas:

a) $\begin{cases} x - 3 \geq 0 \text{ (restrição)} \\ x - 3 > 5 \text{ (inequação com o módulo eliminado)} \end{cases}$

$\cup$

b) $\begin{cases} x - 3 < 0 \text{ (restrição)} \\ -x + 3 > 5 \text{ (inequação com o módulo eliminado)} \end{cases}$

Resolvendo os dois sistemas:
(a):
Restrição: $x - 3 \geq 0 \rightarrow x \geq 3$
Inequação: $x - 3 > 5 \rightarrow x > 8$
Interseção: $x > 8$

Scanned by CamScanner

(b):
Restrição: $x - 3 < 0 \rightarrow x < 3$
Inequação: $-x + 3 > 5 \rightarrow x < -2$
Interseção: $x > -2$

Resposta: $S = (8, \infty) \cup (-\infty, -2)$

Esta solução pode ser interpretada de outra forma. O valor $|x - 3|$ é a distância entre x e 3 (genericamente, $|x - k|$ é a distância entre x e k). A inequação pede que a distância de x até 3 seja maior que 5, então x deve ser maior que 8 (o lado direito na reta real) ou x deve ser menor que –2 (o lado esquerdo).



Inequações "indeterminadas" e impossíveis

A rigor, toda inequação é indeterminada, já que seu conjunto é um intervalo, que possui infinitos valores, ou seja, não encontramos um valor específico de x que seja solução, mas sim, o maior intervalo possível de valores que x pode assumir. Por isso o termo "inequação indeterminada" não é muito utilizado. Podemos, entretanto, considerar informalmente como "inequação indeterminada", aquela que é satisfeita por qualquer valor de x, ou seja, seu conjunto solução é R (reais). Ao encontrar uma dessas inequações, não a classificamos como "indeterminada", mas simplesmente indicamos que seu conjunto solução é R. Essas inequações têm como característica, o "desaparecimento do x" em sua resolução, sobrando apenas números. No final teremos uma sentença numérica, como $5 > 0$, ou $3 < 0$, por exemplo. Se a sentença numérica final for verdadeira, dizemos que o conjunto solução é R ("indeterminada"). Se a sentença final for falsa, dizemos que a inequação é impossível, ou que o conjunto solução é Ø.

Exemplo: $x + 2 < x + 3$
O x desaparece e resta apenas $2 < 3$, que é sempre verdadeiro.

Resposta: $S = R$

Exemplo: $x - 5 > x - 2$
Resulta em $0 - 3 > 0$, que é sempre falso.

Resposta: $S = \emptyset$.

Módulo

Operações com módulos são tipicamente matéria do ensino médio. Comprove isso verificando no edital do seu concurso. Entretanto, questões "disfarçadas" de tópicos avançados são muitas vezes propostas em concursos, como o do CN. Nada impede que qualquer um deles use a técnica de "definir e cobrar", ou seja, a questão começa apresentando a definição de um tópico qualquer, mesmo fora do programa, e a seguir pede uma questão baseada no tópico. Esse é o caso das operações com módulos, por isso foram aqui apresentados. A abordagem clássica para o módulo é abrir sua expressão em casos, considerando o valor no interior do módulo como negativo, depois como positivo, e fazendo as devidas interseções e uniões necessárias. Vamos apresentar aqui dois "macetes" que usam interpretação geométricas para lidar com módulos.

Scanned by CamScanner

|2x – 8| < 6

A técnica apresentada serve para qualquer expressão similar a esta, como $|ax + b| = c$. É preciso que **c** seja positivo ou zero, caso contrário a expressão não tem solução. O coeficiente de x tem que ser positivo, lembre-se que podemos trocar os sinais da expressão no interior do módulo, pois torna-se no final positiva, o sinal não importa. Podemos simplificar toda a expressão pelo coeficiente de x, para que se torne da forma $|x - d| = e$. O termo adicionado com x tem que aparecer com um sinal negativo, portanto transformamos $x + 3$ e $x - (-3)$. Fazendo esses ajustes, usamos o princípio de que, na reta numérica, $|x - a|$ é a distância de x até **a**. Faremos isso na expressão do exemplo:

$|8 - 2x| < 6$
$|2x - 8| < 6$ (tornamos o coeficiente de x positivo)
$|x - 4| < 3$ (simplificamos toda a expressão por 2)

A expressão resultante indica que: x é um número tal que, sua distância até 4 é menor que 3. O resultado está representado graficamente na reta numérica na figura abaixo.



Portanto x deve ser um número compreendido entre $4 - 3 = 1$ e $4 + 3 = 7$. A solução da inequação modular é o intervalo (1, 7).

|x – a| < |x – b|

Este tipo de inequação modular pode ser descrito graficamente como: "a distância entre **x** e **a** é menor que a distância entre **x** e **b**", ou de forma mais simplificada, "x está mais perto de **a** que de **b**". A representação gráfica é a figura abaixo. Devemos levar em conta, entre a e b, qual deles é o maior e qual é o menor. Tomamos o ponto médio entre a e b, que é $(a + b)/2$, e a região à direita ou à esquerda desse ponto, conforme qual dois módulos é o maior ou o menor. No nosso exemplo tomamos a região que contém a, pois pela inequação, $|x - a|$ é menor que $|x - b|$. Lembre-se de colocar a e b na ordem correta e considerar a desigualdade (no exemplo, mais perto de **a**).



Exemplo:
Resolver $|x + 5| < |x - 3|$

No caso, x está mais perto de –5 que de 3. Tomando o ponto médio (1), temos a solução:
Resposta: $x < 1$

Exercícios

E4) Resolva as seguintes inequações:

a) (*) $5 - |x + 8| \leq 3$
b) (*) $|4x - 2| \leq 8$
c) $|3 - 2x| < 4$
d) $|2 - 2x| \leq 8$
e) (*) $|x + 3| + |x - 5| \leq 10$
f) $|x + 3| \leq |x + 2|$
g) $|x - 3| \leq |x + 5|$
h) $|x + 1| < |x - 1|$
i) (*) $|3x - 9| > 12$
j) (*) $|x + 5| < |x + 10|$

Scanned by CamScanner

União e interseção?

A resolução tanto de inequações normais, quanto a de equações ou inequações com módulos, requerem operações de união e interseção desses conjuntos. Todos esses tipos de igualdade e desigualdade têm uma lógica na formação desses conjuntos. Lembre sempre o seguinte:

E da linguagem comum transforma-se em INTERSEÇÃO na matemática
OU da linguagem comum transforma-se em UNIÃO na matemática

Um sistema é um conjunto de duas expressões que devem ser verdadeiras ao mesmo tempo, portanto temos aqui um conectivo E implícito. Nesse caso, "juntamos" os resultados usando a INTERSEÇÃO.

Exemplo:

$$\begin{cases} 3x + 2y \leq 6 \\ 2x - 5y \geq 10 \end{cases}$$

Em sistemas, resolvemos cada uma das inequações, encontramos um intervalo para cada uma delas. Em sistemas temos sempre um "E" implícito, portanto fazemos a interseção dos intervalos.

A UNIÃO, operação matemática resultante do conectivo "OU" da linguagem comum, resulta de situações quando abrimos uma expressão em dois casos possíveis, ou seja, pode ocorrer um caso OU outro.

Exemplo:
$|x - 5| = 2$

Sabemos por definição que o módulo de uma expressão é aberto em duas expressões:

$|x| = x$, se $x \geq 0$
ou
$|x| = -x$, se $x < 0$

Cada uma das duas expressões tem na sua formação, um, conectivo "E":

$(x \geq 0)$ E $|x| = x$
OU
$(x < 0)$ E $|x| = -x$

A primeira linha resulta em um intervalo I_1 e um resultado R_1. A segunda resulta em um intervalo I_2 e um resultado R_2.

O desmembramento acima resulta em quatro 4 expressões que irão gerar 4 resultados. As inequações resultarão em intervalos, e as equações obtidas com a eliminação dos módulos irão dar resultados, que na verdade são conjuntos-solução. As operações que devem ser feitas nesses conjuntos para chegar ao resultado final são:

$$(I_1 \cap R_1) \cup (I_2 \cap R_2)$$

OBS.: O mesmo princípio se aplica a denominadores zero, radicais negativos (raiz de índice par) e similares. Quando eliminamos um resultado encontrado por contrariar a restrição,

Scanned by CamScanner

estamos na verdade fazendo uma interseção entre o resultado encontrado e a restrição, que é um conjunto da forma "Reais exceto valores proibidos".

Exercícios de revisão

E5) Considere a inequação $\frac{3x-1}{x} \leq 0$ e responda se ela for:

(A) possível apenas para $0 < x \leq 1/3$
(B) possível apenas para $x > 0$
(C) possível apenas para $x \leq 1/3$
(D) impossível
(E) NRA

E6) Resolva $\frac{2x+1}{2} < -1$

(A) $x < -5$ (B) $x < 0$ (C) $x > 3/2$ (D) $x < -3/2$ (E) $x < -2/3$

E7) Determine o inteiro que satisfaz o sistema

$$\begin{cases} \frac{-1}{2x+2} \geq 0 \\ \frac{x}{3} - \frac{x-1}{2} < 1 \end{cases}$$

E8) Determine o maior valor inteiro de x que satisfaz à inequação:
$2x - 4 > 5(x - 1) + 3$

E9) A soma dos valores inteiros de k para os quais a equação $\mathbf{2(x - k) = 4 + k - 1}$ tenha uma raiz no intervalo $]-5, 0[$ é:

(A) –7 (B) 6 (C) –8 (D) 5 (E) –9

E10) Resolver

$$\frac{x+3}{6} - \frac{x-2}{4} > \frac{x-2}{8}$$

E11) Resolver $5 < 2x + 3 < 8$

E12) Resolver $\frac{x-1}{3} - \frac{4x+5}{4} > -2$

E13) Resolver $\frac{3x-5}{x-5} > 4$

(A) $x < 15$ (B) $x > 5$ (C) $5 < x < 15$ (D) $x > 3$ (E) $5/3 < x < 5$

E14) Rosana teve notas 95, 87 e 86. Determine qual nota x é necessária na última prova para obter média final maior ou igual a 90, sabendo que deve ser usada a média aritmética simples.

(A) Impossível (B) $x \geq 90$ (C) $x \geq 80$ (D) $x \geq 92$ (E) $x \geq 97$

Scanned by CamScanner

E15) Resolver $\frac{x-1}{x+4} > 3$

E16) Resolver $7 < 2x + 1 < 9$

E17) Resolver $\frac{x+1}{x-2} \leq 2$ e dar a resposta em forma de intervalo

(A) $(-\infty, 2)$ ou $[5, \infty)$ (B) $[2, 5]$ (C) $(2, 5]$ (D) Todos os reais exceto x=2 (E) $[-1, 2)$

E18) Resolver $\frac{x}{x+1} \geq 0$

E19) Resolver $7 < 3x + 1 < 10$

(A) (2, 3) (B) (–4 , –2) (C) (1, 2) (D) (–3, –1) (E) (3, 4)

E20) Resolver $|2x - 5| - 7 \geq -2$

(A) $(-\infty, \infty)$ (B) $(-\infty, 0] \cup [5, \infty)$ (C) $(5/2, \infty)$ (D) (0, 5) (E) $(-\infty, -1)$ $[1, \infty)$

E21) Resolver $\frac{x+1}{x-1} \leq 2$

(A) $(-\infty, 1) \cup [3, \infty)$ (B) $(-\infty, 1] \cup [5, \infty)$ (C) (2, 5] (D) $x \neq 1$ (E) (1, 3]

E22) Resolver $\frac{1}{x+1} \geq 1$

(A) (–1,0] (B) [–1,0] (C) $(-\infty, -1] \cup [0, \infty)$ (D) $(-\infty, -1)$ $([0, \infty)$ (E) $(-\infty, -1) \cup (-1, \infty)$

E23)Resolver a inequação $|x - 3| \leq 2$

(A) (1, 5) (B) [1, 5] (C) $(-\infty, 1]$ $[5, \infty)$ (D) $(1, \infty)$ (E) $(-\infty, 5]$

E24) Resolver a inequação $\frac{3}{x-1} \geq 1$

(A) $(1, \infty)$ (B) $(-\infty, 4]$ (C) [1, 4) (D) (1, 4] (E) $(-\infty, 1) \cup [4, \infty)$

E25) Resolver $|x - 1| \leq 0$

E26) Resolver $|x - 1| - 5 \leq 4$

(A) [–8, 10] (B) [–10, 8] (C) (–8, 10) (D) (–10, 8) (E) [–9, 9]

E27) Resolver a desigualdade $\frac{x-3}{x+2} \leq 0$

(A) (–2, 3] (B) (–3, 2) (C) (–2, 3) (D) $(-\infty, 3)$ (E) $(-2, \infty)$

E28) Resolver: $\frac{x+2}{x-3} \geq 0$

(A) [–2, 3) (B) (–3, 2) (C) (–2, 3] (D) $(-\infty, -2] \cup (3, \infty)$ (E) $(-\infty, -2) \cup [3, \infty)$

Scanned by CamScanner

E29) Resolver $|3x - 6| - 2 \leq 10$

(A) $[-2, 6]$ (B) $(-2, 6)$ (C) $(-\infty, -2]$ (D) $[6, \infty)$ (E) $(-\infty, -2] \cup [6, \infty)$

E30) Resolver $-5 \leq 1 - 3x < 10$

(A) $[-3, 2]$ (B) $[-3, 2)$ (C) $(-3, 2]$ (D) $(-\infty, -3] \cup (2, \infty)$ (E) $(-\infty, -3) \cup [2, \infty)$

E31) Resolver $\frac{x-8}{x+8} \geq 0$

(A) $[-8, 8)$ (B) $(-\infty, -8) \cup [8, \infty)$ (C) $(-\infty, -8]$ (D) $[8, \infty)$ (E) $(-\infty, -8] \cup [8, \infty)$

E32) Resolver a inequação $|x + 1| > 3$

(A) $(2, \infty)$ (B) $(-\infty, -4) \cup (2, \infty)$ (C) $(-\infty, -4] \cup [2, \infty)$ (D) $(-4, 2)$ (E) $[-4, 2]$

E33) Resolver a inequação $\frac{3}{x-1} \leq -2$

(A) $(-\infty, -1/2)$ (B) $(-1/2, \infty)$ (C) $[-1/2, \infty)$ (D) $[-1/2, 1)$ (E) $(-\infty, -1/2] \cup (1, \infty)$

E34) Resolver a inequação $|7x - 3| - 2 < -1$

(A) $x < 1/7$ (B) $2/7 < x < 4/7$ (C) $5/7 < x < 1/7$ (D) $x < 4/x$ (E) Sem solução

E35) Resolver $\frac{1-x}{x-6} + 2 > 0$

(A) $x<1$ ou $x>6$ (B) $x<6$ ou $x>11$ (C) $x<6$ ou $x \geq 11$ (D) $x>11$ (E) $6<x \leq 11$

E36) Resolver $|-4x - 12| \leq 4$

(A) $[-4, -2]$ (B) $[-4, -2)$ (C) $(-\infty, -4]$ (D) $(-\infty, -4)$ ou $[-2, \infty)$ (E) $[2, 4]$

E37) Resolver $|3x - 4| \leq 5$

(A) $x < -3$ (B) $3 \leq x \leq -3$ (C) $x \leq -1/3$ (D) $-1/3 \leq x \leq 3$ (E) $x < 3$

E38) Resolver $\frac{2-x}{x-3} \geq 0$

E39) Resolver $\frac{2x-3}{x+5} > 0$

E40) Resolver $|x + 1| < |x - 1|$

E41) Resolver $\frac{2x-3}{x+7} \leq 0$

E42) Se $a < b$ e $c < d$, qual das seguintes afirmativas é SEMPRE verdadeira?

(A) $ac < bd$ (B) $(a/c) < (b/d)$ (C) $a + b < c + d$ (D) $a - b < d - c$ (E) $a + b > c + d$

E43) Resolver $\frac{x+2}{x} \leq 0$

Scanned by CamScanner

E44) Encontre o domínio de $f(x)=\sqrt{\frac{x-2}{x+1}}$

CONTINUA NO VOLUME 2: 48 QUESTÕES DE CONCURSOS

Respostas dos exercícios

E1) a) $x < -5$ b) $x > 6$ c) $x < 28$ d) $x < -5/17$ e) $x < 2$ f) S = Ø (Impossível) g) $x > 8$ h) $x > -38/17$ i) $x > 243/44$ j) S = R (Reais)

E2) a) $0 < x < 1$ b) $x < 1/2$ ou $x > 1$ c) $1/2 < x < 2$ d) $x > 1$ e) $x \geq 7$ ou $x < 5$ f) $5 < x \leq 13$ g) $x < 3/2$ ou $x > 5$ h) $2/3 < x \leq 3/2$ i) $-17/4 < x < -3$ j) $x < 5$ ou $x \geq 13$

E3) a) $x < 3$ b) S = Ø c) $-3/10 < x < 45/41$ d) S=Ø(x>11 e x <52/21) e) $1 < x < 5$ f) $10 < x < 13$ g) $4 < x < 6$ h) $x > 5$ i) $33/5 < x < 48$ j) $-1/2 \leq x < 9/2$

E4) a) $x \geq -6$ ou $x \leq -10$ b) $-3/2 \leq x \leq 5/2$ c) $-1/2 < x < 7/2$ d) $-3 < x < 5$ e) S = [–4, 6] f) $x \leq -5/2$ g) $x \geq -1$ h) $x < 0$ i) $x > 7$ ou $x < -1$ j) $x > -15/2$

E5) (A) E6) (D) E7) –2 E8) –1 E9) (E)

E10) $x < 6$ E11) $1 < x < 5/2$ E12) $x < 5/8$ E13) (C) E14) (D)

E15) (–13/2, –4) E16) $3 < x < 4$ E17) (A) E18) $x < -1$ ou $x \geq 0$

E19) (A) E20) (B) E21) (A) E22) (A) E23) (B)

E24) (D) E25) $x = 1$ E26) (A) E27) (A) E28) (E)

E29) (A) E30) (C) E31) (B) E32) (B) E33) (D)

E34) (B) E35) (C) E36) (A) E37) (D) E38) $2 \leq x < 3$

E39) $x < -5$ ou $x > 3/2$ E40) $x < 0$ E41) $-7 < x < 3/2$

E42) (C) E43) $-2 \leq x < 0$ E44) $(-\infty,-1) \cup [2,\infty)$

Resoluções de exercícios selecionados

E2 a) $2-\frac{x}{1-x}<1-\frac{1}{x-1} \rightarrow 1+\frac{x}{x-1}+\frac{1}{x-1}<0 \rightarrow \frac{x-1}{x-1}+\frac{x}{x-1}+\frac{1}{x-1}<0$

$\frac{x-1+x+1}{x-1}<0 \rightarrow \frac{2x}{x-1}<0 \rightarrow \frac{x}{x-1}<0$

Estudo de sinal do numerador e do denominador:

Scanned by CamScanner

	0	1	
N: x	–	+	+
D: x – 1	–	–	+
Resultado	+	–	+
	0	X	

R: $0 < x < 1$

E3 b) $\begin{cases} 3x - \frac{1}{4} > 20 - \frac{2x}{3} \\ 2(2x-3) > 5x - \frac{3}{4} \end{cases}$

1ª inequação:

$3x - \frac{1}{4} > 20 - \frac{2x}{3} \rightarrow 36x - 3 > 240 - 8x \rightarrow 44x > 243 \rightarrow x > 243/44$

2ª inequação:

$2(2x-3) > 5x - \frac{3}{4} \rightarrow 16x - 24 > 20x - 3 \rightarrow -4x > 21 \rightarrow 4x < -21 \rightarrow x < -21/4$

Interseção das duas inequações:

Ø, pois x não pode ser ao mesmo tempo maior que um positivo (243/44) e menor que um negativo (–21/4).

R: S = Ø.

E3 f) $3 < \frac{x-1}{3} < 4$

Esta forma de desigualdade equivale a um sistema com as duas inequações, e devemos no final fazer a interseção das soluções.

1ª inequação: $3 < \frac{x-1}{3} \rightarrow 9 < x - 1 \rightarrow x > 10$

2ª inequação> $\frac{x-1}{3} < 4 \rightarrow x - 1 < 12 \rightarrow x < 13$

Interseção: $10 < x < 13$

R: $10 < x < 13$

E4 a) $5 - |x + 8| \leq 3$

Arrumando a inequação antes de eliminar o módulo:

$5 - |x + 8| \leq 3 \rightarrow 5 - 3 \leq |x + 8| \rightarrow |x + 8| \geq 2$

Agora que a inequação está com uma forma simplificada, analisemos o sinal de $x + 8$:

a) $x + 8 \geq 0$, $x \geq -8$: o módulo é próprio valor:

$x + 8 \geq 2 \rightarrow x \geq -6$

Interseção: $x \geq -8$ e $x \geq -6 \rightarrow x \geq -6$

b) $x + 8 < 0 \rightarrow x < -8$

$-x - 8 \geq 2 \rightarrow x \leq -10$

Interseção: $x < -8$ e $x \leq -10 \rightarrow x \leq -10$

União dos casos (a) e (b): $x \geq -6$ ou $x \leq -10$

Outra solução: A inequação $|x + 8| \geq 2$ pode ser vista como o conjunto dos números x tais que a distância de x até –8 é maior ou igual a 2, na reta numérica. Isto equivale a dizer que $x \geq -6$ ou $x \leq -10$. Para resolver inequações com módulo devemos usar a as expressões: $|x - k|$, é a distância entre x e k.

Scanned by CamScanner

$|x - 5|$ é a distância entre x e 5.
$|x + 3|$ é a distância entre x e –3.
O ponto do qual "x dista de" é aquele que torna o módulo igual a zero.

E4 b) $|4x - 2| \leq 8$
Podemos dividir toda a inequação por 4, sem alterar a desigualdade, pois é um valor positivo. O quatro pode "entrar no módulo", já que é positivo.
$|4x - 2| \leq 8 \rightarrow |x - 1/2| \leq 2$
A solução é o conjunto dos valores de x tais que sua distância a 1/2 é menor ou igual a 2. Então x pode ser no máximo 1/2 + 2 e no mínimo 1/2 – 2.
R: $-3/2 \leq x \leq 5/2$

E4 e) $|x + 3| + |x - 5| \leq 10$
Nesta inequação temos dois módulos, devemos analisar os sinais das expressões para todos os intervalos possíveis, e eliminar os módulos nesses intervalos. Nesse caso temos dois pontos críticos, que são os valores que anulam os módulos: $x = -3$ e $x = 5$. Temos então que dividir o problema em 3 casos, orientados pela tabela abaixo:

		–3		5	
$\|x + 3\|$	–		+		+
$\|x - 5\|$	–		–		+

Como existem três intervalos, é preciso desmembrar a equação original em três. Os pontos críticos são –3 e 5, e é preciso levar em conta sinais ≥ e ≤ para esses valores. Como esta operação é trabalhosa e sujeita a erros, recomendamos uma forma mais fácil: trate todos os intervalos como abertos (ou seja, use sinais > e <), e no final, teste se os valores extremos satisfazem à expressão original. Com base na tabela acima, eliminamos os módulos levando em conta o fato das expressões $x + 3$ e $x - 5$ serem positivas ou negativas:

a) $x < -3$; b) $-3 < x < 5$; c) $x > 5$

a) $x < -3$:
$-x - 3 - x + 5 \leq 10 \rightarrow x \geq -4$, fazendo interseção com $x < -3$ ficamos com $\mathbf{-4 \leq x < -3}$

b) $-3 < x < 5$:
$x + 3 - x + 5 \leq 10 \rightarrow 8 \leq 10 \rightarrow S = R$, fazendo a interseção com a restrição: $\mathbf{-3 < x < 5}$

c) $x > 5$:
$x + 3 + x - 5 \leq 10 \rightarrow 2x \leq 12 \rightarrow x \leq 6$, fazendo a interseção com a restrição: $5 < x \leq 6$

Fazemos agora a união dos três resultados:
$[-4, -3) \cup (-3, 5) \cup (5, 6]$

Devemos agora reconsiderar os pontos críticos, testando seus valores para verificar se atendem à equação original ($|x + 3| + |x - 5| \leq 10$).

$x = -3$: $|0| + |-8| \leq 10$: OK
$x = 5$: $|8| + |0| \leq 10$: OK

Então –3 e 5 fazem parte do conjunto-solução.
$[-4, -3) \cup (-3, 5) \cup (5, 6] \cup \{-3, 5\} = [-4, 6]$

Resposta: $S = [-4, 6]$

E4 i) $|3x - 9| > 12$
Aplicaremos a solução por interpretação geométrica. Podemos dividir a expressão toda por 3, ficando com

Scanned by CamScanner

$|x - 3| > 4$

A expressão significa que a distância entre x e 3 é maior que 4.



Ou sejam devemos ter $x > 7$ ou $x < -1$

R: $x > 7$ ou $x < -1$

E4 j) $|x + 5| < |x + 10|$

Como sempre esta inequação com módulo pode ser resolvida pelo método tradicional ou por interpretação geométrica.

No método tradicional, consideramos dois pontos críticos que anulam os valores dentro dos módulos. São eles $x = -10$ e $x = -5$. Devemos então eliminar os módulos, levando em conta os sinais que essas expressões têm nesses intervalos. Em cada um dos três casos, fazemos a interseção com os intervalos considerados, e no final fazemos a união de todos, lembrando de checar se os pontos críticos atendem à inequação.

A resolução por interpretação geométrica é muito mais rápida. O que a inequação modular indica é que a distância entre x e –5 é menor que a distância entre e x e –10. A figura abaixo ajuda a chegar à solução.



Toma-se o ponto médio entre –10 e –5, que é –7,5 os valores de x da solução devem estar á direita deste ponto, para que fiquem mais próximos de –5 que de –10 ($|x + 5| < |x + 10|$).

R: $x > -7,5$

Gripen NG

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

$x^2 = -1$

$x = \pm\sqrt{-1} = \pm i$

No conjunto dos números complexos, chamamos $\sqrt{-1} = i$. Passamos a calcular todos os demais números complexos em função de *i*, que é o número que elevado ao quadrado resulta em –1. Por exemplo, $\sqrt{-9}$ vale 3i.

No escopo do ensino fundamental, números complexos não são considerados, e dizemos que tal equação é impossível no conjunto dos reais, ou que o conjunto solução é vazio, quando o universo é o conjunto dos reais.

Forma fatorada

Uma técnica geral para resolver equações, não apenas do segundo grau, é manipular a equação de forma que tenhamos zero no segundo membro, e uma expressão fatorada no primeiro membro. As raízes da equação serão os valores de x que anulam esses fatores.

Exemplo: Resolver $(x - 1)(x - 2)(x - 3)(2^x - 16) = 0$
Esta equação não é polinomial, pois mistura termos polinomiais e exponenciais. As soluções são aquelas que anulam algum dos fatores do primeiro membro:

$x - 1 = 0 \rightarrow x = 1$
$x - 2 = 0 \rightarrow x = 2$
$x - 3 = 0 \rightarrow x = 3$
$2^x - 16 = 0 \rightarrow 2^x = 2^4 \rightarrow x = 4$
Portanto, $S = \{1, 2, 3, 4\}$

OBS.: Obviamente fazemos nesse caso a união das soluções, já que a expressão valerá zero quando qualquer um dos fatores for zero.

A forma fatorada de uma equação do 2º grau é:

$a(x - p)(x - q) = 0$ (onde **a** é o coeficiente de x^2, que pode ser simplificado na resolução)

$(x - p)(x - q) = 0$

Resposta: $x = p$ ou $x = q$

Podemos também indicar a solução na forma de conjunto: $S = \{p, q\}$

Portanto, a solução de uma equação do 2º grau na forma fatorada é muito simples. A soluções são os próprios valores que estão subtraídos de x nos fatores. Ou se preferir, pode resolver separadamente as equações obtidas igualando a zero os fatores:

$x - p = 0 \rightarrow x = p$
$x - q = 0 \rightarrow x = q$

Exemplo: Resolver $5(x - 3)(x + 5)$

Solução: As raízes são $x = 3$ e $x = -5$

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

(A) –4 (B) 8 (C) –1 (D) 1 (E) 4

E22) (*) CN 77 - A soma da média aritmética com a média geométrica das raízes da equação $ax^2 - 8x + a^3 = 0$ dá:

(A) $\frac{4-a^2}{a}$ (B) $\frac{-4+a^2}{a}$ (C) $\frac{8+a^2}{a}$ (D) $\frac{4+a^2}{a}$ (E) 5

E23) CN 83 - A soma dos cubos das raízes da equação $x^2 + x - 3 = 0$, é:

(A) –10 (B) –8 (C) –12 (D) –6 (E) –18

E24) A equação $x^2 - 75x + 1 = 0$ tem suas raízes representadas por α e β. Determine o valor da expressão $\frac{1}{\alpha^2}+\frac{1}{\beta^2}$

Resolvendo mentalmente – I (soma e produto)

Lembremos que uma equação do 2º grau pode ser expressa na forma $x^2 - Sx + P = 0$, onde S e P são, respectivamente, a soma e o produto das raízes. Podemos então, com alguma habilidade numérica, resolver tais equações mentalmente, determinando "quais são os números que somados resultam em ... e multiplicados resultam em ... ?". Na maioria das vezes, é fácil determinar tais números:

$x^2 - 8x + 15 = 0$: Soma 8 e produto 15, as raízes são 3 e 5
$x^2 + 30x + 200 = 0$: Soma 30 e produto 200, os números são 10 e 20, ambos com o mesmo sinal, que é negativo, pois –S = 30, S = –30, as raízes são –10 e –20.
$x^2 - 5x - 50 = 0$: Como o produto é negativo, as raízes têm sinais contrários, então –5 é a diferença dos módulos das raízes. As raízes são –5 e 10 (a de menor módulo tem o sinal de b).

Já fizemos resoluções mentalmente no exercício 4. Ocorre que nem sempre isto pode ser usado. As raízes serão números inteiros apenas no caso em que Δ é um quadrado perfeito, caso contrário, serão da forma $p+\sqrt{q}$, e não será possível determiná-las mentalmente usando soma e produto.

Resolvendo mentalmente – II

Também fica difícil resolver mentalmente quando o coeficiente a é diferente de 1. Nesse caso, resulta em:

$ax^2 + bx + c = 0$

$x^2 + (b/a)x + (c/a) = 0$

Quando a soma e o produto envolvem frações, o cálculo mental fica bem mais difícil. Por exemplo:

$15x^2 - 19x + 6 = 0$

Quais são os dois números que somados dão 19/15 e multiplicados dão 6/15?

A resolução fica mais fácil quando usamos o seguinte artifício (raramente ensinado em livros de álgebra):

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

E26) Resolver mentalmente as equações

a) (*) $10x^2 + 11x - 6 = 0$
b) $3x^2 - 8x + 5 = 0$
c) $2x^2 + 24x - 26 = 0$
d) $7x^2 + 5x - 12 = 0$
e) $11x^2 - 13x + 2 = 0$
f) $7x^2 + 15x + 8 = 0$
g) $4x^2 - 11x + 7 = 0$
h) $13x^2 - 9x - 4 = 0$
i) $3x^2 - 10x - 25 = 0$
j) $13x^2 - 16x + 3 = 0$
k) $6x^2 - 19x + 8 = 0$
i) $4x^2 - 17x + 13 = 0$
m) $11x^2 + 2x - 9 = 0$
n) $4x^2 - 25x + 25 = 0$
o) $7x^2 - 2x - 5 = 0$

Exercícios de revisão

E27) Resolver as equações:

a) $x^2 - 169 = 0$
b) $7x^2 - 1008 = 0$
c) $42x^2 - 24 = 6x^2 + 201$
d) $x^2 - 7x = 0$
e) $8x^2 = 3x$
f) $9x^2 + 7x = 0$
g) $x^2 - 13x + 36 = 0$
h) $x^2 - 15x + 44 = 0$
i) $x^2 - 9x - 36 = 0$
j) $x^2 + 11x + 24 = 0$
k) $x^2 + 5x - 14 = 0$
i) $x^2 + 17x - 138 = 0$
m) $x^2 - 30x + 176 = 0$
n) $x^2 - 8x - 660 = 0$
o) $25x^2 - 20x - 96 = 0$

E28) Resolver as seguintes equações

a) $x^2 - x - 11 = 0$
b) $x^2 - 11x + 19 = 0$
c) $x^2 - 9x + 9 = 0$
d) $x^2 + 5x - 5 = 0$
e) $x^2 - 3x - 9 = 0$
f) $x^2 - 5x - 5 = 0$
g) $x^2 - 7x - 19 = 0$
h) $x^2 + 13x + 4 = 0$
i) $12x^2 + 10x - 1 = 0$
j) $7x^2 + 6x - 3 = 0$
k) $7x^2 - 10x - 1 = 0$
i) $2x^2 - 12x + 3 = 0$
m) $13x^2 - 2x - 2 = 0$
n) $9x^2 - 2x - 3 = 0$
o) $5x^2 + x - 2 = 0$

E29) Resolver as seguintes equações SEM USAR A FÓRMULA QUADRÁTICA

a) $2x^2 - 2x - 1 = 0$
b) $3x^2 + 4x - 2 = 0$
c) $10x^2 - 26x + 12 = 0$
d) $(x - 15)(x + 15) = 400$
e) $4x^2 + 17x + 4 = 0$
f) (*) $k^2x^2 - 2pkx + p^2 - q^2 = 0$
g) $x^2 - 2ax + a^2 - b^2 = 0$
h) $x^2 - 4bx + 4b^2 - a^2 = 0$
i) $x^2 - (a + b)x + ab = 0$
j) $x^2 - 2ax + a^2 - 4b^2 = 0$
k) $x^2 + 2bx - a^2 + b^2 = 0$
i) $x^2 - 2acx + a^2(c^2 - b^2) = 0$
m) $x^2 - x - 1 = 0$
n) $15x^2 - 7x - 12 = 0$
o) $x^2 + x + 1 = 0$

E30) Resolver as seguintes equações:

a) $\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2} = \frac{1}{x-3}$
b) $\frac{x}{7} + \frac{21}{x+5} = \frac{47}{7}$
c) $\left(x + \frac{x}{3}\right).2x - 24x = 0$
d) $\frac{x+1}{x} + 1 = \frac{x}{x-1}$
e) $\frac{1-ax}{1+ax}\sqrt{\frac{1+bx}{1-bx}} = 1$
f) $\frac{8}{x+6} + \frac{12-x}{x-6} = 1$
g) $\frac{1}{a} + \frac{1}{a+x} + \frac{1}{a+2x} = 0$
h) $\frac{x+5}{x-5} + \frac{x-5}{x+5} = \frac{10}{3}$
i) $\frac{x}{x-1} - 1 = \frac{x+1}{x}$
j) (*) $\frac{x+8}{x-8} - 2 = \frac{24}{x-4}$
k) (*) $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{x} = \frac{1}{a+b+x}$
i) (*) $\frac{x+1}{x+2} + \frac{x-1}{x-2} = \frac{2x+1}{x+1}$
m) $\frac{2x}{x+2} + \frac{x+2}{2x} = 2$

E31) Resolver as equações:

a) $x\left(x - \frac{2x}{9}\right) + 2x\left(x + \frac{x}{4}\right) - 118x = 0$
b) $\frac{5x^2}{3} + 4(x^2 - 1) = \frac{7x^2}{5} + \frac{172}{5}$
f) $\frac{x^2}{(m+n)^2} - \frac{4mnx}{(m+n)^2} - (m-n)^2 = 0$
g) $\frac{x-4}{x-2} - \frac{3}{x+2} = 1 - \frac{8}{x^2-4}$

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

E106) Para qual valor de **c** a equação $\mathbf{4x^2 - 12x + c = 0}$ possui uma raiz dupla?

(A) –144 (B) 0 (C) 9 (D) 81 (E) 144

E107) Determine a diferença entre as raízes (maior – menor) da equação $x^2 - 5x - 24 = 0$.

(A) 3 (B) 5 (C) 8 (D) 11 (E) 24

E108) Qual valor de p torna a expressão $\mathbf{3p^2 + 9p + 30 = 2p^2 - 2p}$ verdadeira?

E109) Qual dos seguintes valores de k fará com que a equação $\mathbf{2x^2 - kx + 3 = 0}$ tenha raízes racionais?

(A) 0 (B) 5 (C) 6 (D) 1 (E) 2

E110) Encontre k para que a equação $kx^2 + x + k = 0$ possua uma raiz dupla.

E111) Encontre a soma dos inversos das raízes de $6x^2 + x - 15 = 0$.

E112) (*) Encontre k para que $f(x) = kx^3 + x^2 + k^2x + 3k^2 + 11$ seja divisível por $(x + 2)$.

E113) Encontre a relação entre p e q para que na equação $x^2 + px + q = 0$, uma raiz seja o triplo da outra.

E114) Encontre todos os números reais tais que $|x^2 - 9| = 5$.

E115) Qual a relação entre os coeficientes **b** e **c** na equação $ax^2 + bx + c = 0$, para que uma raiz seja o dobro da outra?

E116) Encontre todos os valores de k para que o sistema

$$\begin{cases} (-5 - k)x + 2y = 0 \\ 2x - (2 + k)y = 0 \end{cases}$$

tenha outras soluções além da trivial $(x = y = 0)$.

E117) Determine k para que as raízes de $x^2 + kx + 24 = 0$ sejam dois inteiros pares consecutivos.

E118) Encontre a diferença entre as raízes da equação $3x^2 + 8x - 1 = 0$.

E119) Calcule o produto das raízes de $(x + 2)^2 + (x - 3)^2 = 15$

E120) Determine a, b e c para que o gráfico de $y = ax^2 + bx + c$ passe pelos pontos (1, 4), (–2, –5) e (3, 0).

E121) Calcule a fração contínua $\cfrac{1}{2+\cfrac{1}{2+\ldots}}$

E122) Determine **c** na equação $4x^2 - 12x + c = 0$ de modo que a diferença entre as raízes seja 9.

E123) Dada a equação $x^2 - 2px + q^2 = 0$, forme outra equação do 2º grau cujas raízes sejam, respectivamente, as médias aritmética e geométrica das raízes da equação dada.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

E141) Determinar K na equação $x^2 + Kx + 36 = 0$ de modo que entre suas raízes x' e x" exista a relação $1/x' + 1/x" = 5/12$.

E142) Sem resolver a equação $5x^2 + 22x - 15 = 0$, diga:
a) Se as raízes têm o mesmo sinal, e porque?
b) Qual o sinal da raiz de maior módulo, e porque?

E143) Determine os sinais de x_1 e x_2 ($|x_1| < |x_2|$), raízes da equação em x, $x^2 + bx + c = 0$, onde $b > 0$ e $c < 0$.

E144) Qual o valor de k que torna equivalentes, no campo real, as equações $(x^2 + 1) - (x - k) = 0$ e $-7x + 2 = -3x$?

E145) Os números a e b são raízes da equação em x: $10x^2 + 3x + 10ab = 0$. Calcule a e b sabendo-se que o quíntuplo do inverso de a é igual ao simétrico do dobro do inverso de b.

E146) Dada a equação $x^2 - 6x + 25 = 0$, determinar a equação do 2º grau cujas raízes são as médias aritmética e geométrica das raízes da equação dada.

E147) Determine **c** na equação $4x^2 - 12x + c = 0$ de modo que a diferença entre as raízes seja 9.

E148) CN 78 - Para que no sistema

$$\begin{cases} x + my = 6 \\ \frac{x}{m} + \frac{y}{3} = 2 \end{cases}$$

o valor de x seja o dobro do valor de y, m pode ter valores cuja soma é:

(A) 1 (B) –2 (C) 3 (D) –1 (E) 5

E149) Colégio Naval, 2015
Para capinar um terreno circular plano, de raio 7m, uma máquina gasta 5 horas. Quantas horas gastará essa máquina para capinar um terreno em iguais condições com 14m de raio?

(A) 40 (B) 15 (C) 20 (D) 25 (C) 30

CONTINUA NO VOLUME 2: 130 QUESTÕES DE CONCURSOS

Respostas dos exercícios

E1)
a) x = 0 ou x = –2
b) x = 0 ou x = –9/5
c) x = 0 ou x = 5
d) x = 0 ou x = –7/3
e) x = 0 ou x = 3
f) x = 1 ou x = –1
g) x = 5 ou x = –5
h) x = 9 ou x = –9
i) Impossível
j) x = 1/2 ou x = –1/2
k) x = 0
l) x = 0
m) x = 0
n) x = 0
o) x = 0

E2)
a) x = 2 ou x = 4
b) x = 1 ou x = –7
c) x = 0 ou x = –3
d) x = –1 ou x = –2
e) Impossível
f) x = –2 ou x = –8
g) x = 3 ou x = –9
h) x = 1/2 ou x = 1/3
i) x = –3/2 ou x = –7/3
j) x = 0 ou x = –1/3
k) x = –3/5 ou x = 3/2
l) x = –7 ou x = 9
m) x = 4 ou x = 2
n) x = 3 ou x = –3
o) x = 1/4 ou x = –1/4

E3)
a) x = 2 ou x = 5
b) x = –1 ou x = –3
e) x = –7 ou x = –8
f) x = 5 ou x = –6
i) x = 7 ou x = –8
j) x = –7 ou x = 13
m) x = 5 ou x = –7
n) x = –2 ou x = 8

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

E128) $x = 3$ E129) $k = 4$ E130) $-\frac{2+\sqrt{10}}{3}$

E131) ($m = 1$ e $p = 0$) ou ($m = -2$ e $p = -1$) E132) $k = -1$ ou $k = 4$

E133) $k = 0$ ou $k = 6$ E134) $m = 19$ ou $m = -5$ E135) $k < 81/20$

E136) $n^2 < 4mp$ E137) 7/3, 1/3, $\frac{7+\sqrt{37}}{6}$ E138) a) –7/2, b) –5

E139) –16/5 E140) a) Impossível b) 4 E141) –15

E142) a) Não, porque c/a é negativo; b) Negativo, porque a de menor módulo tem o sinal de b, sendo a positivo.

E143) como a = 1 e c é negativo, as raízes têm sinais contrários. A de menor módulo, x1, tem o mesmo sinal de b, que é positivo, portanto x1 é positivo e x2 é negativo.

E144) $k = -3/4$
A rigor, as equações não seriam equivalentes, pois a primeira teria uma raiz dupla igual a ½, enquanto a segunda tem uma única raiz igual a 1/2.

E145) $a = -1/2$ e $b = 1/5$ E146) $x^2 - 8x + 15 = 0$ E147) –72 E148) (D)

E149) (C)

Resoluções de questões selecionadas

E1 b) $5x^2 + 9x = 0$
$x(5x + 9) = 0$
1ª solução: $x = 0$
2ª solução $5x + 9 = 0 \rightarrow x = -9/5$
R: $S = \{0, -9/5\}$, também pode ser escrito como $x = 0$ ou $x = -9/5$

E1 g) $x^2 - 25 = 0$
$x^2 = 25 \rightarrow x = \pm\sqrt{25} = \pm 5$
R: $x = 5$ ou $x = -5$

E1 j) $4x^2 - 1 = 0$
$4x^2 = 1 \rightarrow (2x)^2 = 1 \rightarrow 2x = \pm 1 \rightarrow x = \pm 1/2$
R: $x = 1/2$ ou $x = -1/2$

E1 k) $3x^2 = 0$
$3x^2 = 0 \rightarrow x^2 = 0 \rightarrow x = 0$
R: $x = 0$

E2 a) $(x - 4)(x - 2) = 0$
Para um produto ser zero, um dos fatores deve ser zero, ou ambos, se possível
$x - 4 = 0 \rightarrow x = 4$
$x - 2 = 0 \rightarrow x = 2$
R: $x = 2$ ou $x = 4$

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

$(-5)^{\frac{3}{4}}$ = NÃO PODE !!!!

OBS.: As operações consideradas inválidas no conjunto dos números reais são permitidas se estivermos operando com números complexos.

Exemplo: $\sqrt{x^2}$

Esta operação é sempre permitida, porém o resultado não é x, mas sim, $|x|$. Como tomando apenas a expressão, não sabemos a priori se x é positivo ou negativo, temos que usar o módulo.

Questões com radicais envolvendo bases negativas podem ser usadas como "pegadinhas" em provas de concursos, entretanto, algumas vezes são falhas da banca, que pode não ter atentado ao problema da base negativa. Nesse caso, o tratamento errado da base negativa resulta em um erro na questão, que torna-se passível de anulação.

Exercícios

E1) Exprimir os radicais na forma de números racionais, quando possível:

a) $\sqrt{25}$

b) $-\sqrt{81}$

c) $-\sqrt{225}$

d) $-\sqrt{\frac{49}{64}}$

e) $\sqrt{\frac{1}{144}}$

f) $-\sqrt{0{,}16}$

g) $\sqrt[3]{-8}$

h) $\sqrt{1{,}69}$

i) $\sqrt{\frac{9}{16}}$

j) $\sqrt{\frac{196}{25}}$

k) $-\sqrt[3]{-64}$

i) $\sqrt{0{,}49}$

m) $\sqrt{0{,}0001}$

n) $-\sqrt{\frac{36}{25}}$

o) $\sqrt[3]{-\frac{27}{125}}$

E2) Completar com >, < ou =

a) $\frac{4}{5} __ \left(\frac{4}{5}\right)^2$

b) $\frac{1}{16} __ \sqrt{\frac{1}{16}}$

c) $k __ \sqrt{k}$, $0<k<1$

d) $\frac{4}{9} __ \sqrt{\frac{4}{9}}$

e) $\frac{3}{7} __ \sqrt{\frac{3}{7}}$

f) $\frac{5}{3} __ \left(\frac{5}{3}\right)^2$

g) $\frac{16}{9} __ \sqrt{\frac{16}{9}}$

h) $\frac{7}{4} __ \sqrt{\frac{7}{4}}$

i) $k __ \sqrt{k}$, $k>1$

j) $\sqrt{\frac{4}{3}} __ \sqrt[3]{\frac{7}{4}}$

k) $\sqrt{3} __ \sqrt[3]{5}$

l) $\sqrt[3]{11} __ \sqrt{5}$

m) $\sqrt[4]{50} __ \sqrt{7}$

n) $\sqrt[3]{\frac{1}{12}} __ \sqrt{\frac{1}{5}}$

o) $\frac{2}{\sqrt{2}} __ \sqrt{2}$

Scanned by CamScanner

E3) Extrair as raízes dos seguintes monômios, considere positivas todas as variáveis

a) $\sqrt{16x^2}$

b) $\sqrt{9a^2x^4}$

c) $\sqrt{25x^4y^6}$

d) $\sqrt{\frac{25}{9}k^4}$

e) $\sqrt{\frac{(-7)^2}{x^2}}$

f) $\sqrt{36x^2y^4z^6}$

g) $\sqrt{0{,}04z^6w^8}$

h) $\sqrt[3]{125x^3y^6z^9}$

i) $\sqrt[3]{-\frac{(-x)^3}{y^6}}$

j) $\sqrt{\frac{x^2}{y^2}}$

k) $\sqrt{a^2b^4c^6d^8}$

i) $\sqrt{(-1)^8k^{10}}$

m) $\sqrt{x^{10}y^{30}z^{50}}$

n) $\sqrt[5]{x^{10}.\frac{z^5}{w^{10}}}$

o) $\sqrt[4]{16\frac{y^{12}}{z^4}}$

E4) Colocar os fatores para dentro do radical e efetuar os radicandos

a) $2\sqrt{3}$
b) $x\sqrt{y}$
c) $10\sqrt{2}$
d) $2\sqrt{10}$
e) $5\sqrt[3]{4}$
f) $3\sqrt{5}$
g) $3\sqrt{3}$
h) $3\sqrt[3]{2}$
i) $2\sqrt[5]{5}$
j) $7\sqrt{5}$
k) $7\sqrt{2}$
i) $5\sqrt{3}$
m) $5\sqrt{8}$
n) $9\sqrt{3}$
o) $10\sqrt{10}$

E5) Colocar o maior valor possível para fora do radical

a) $\sqrt{98}$
b) $\sqrt{27}$
c) $\sqrt{18}$
d) $\sqrt{72}$
e) $\sqrt[3]{16}$
f) $\sqrt{125}$
g) $\sqrt{32}$
h) $\sqrt{75}$
i) $\sqrt{300}$
j) $\sqrt[3]{32}$
k) $\sqrt{243}$
i) $\sqrt{50}$
m) $\sqrt{54}$
n) $\sqrt{500}$
o) $\sqrt[4]{1024}$

E6) Efetue e simplifique

a) $\sqrt{5}+\sqrt{500}$
b) $\sqrt{12}+\sqrt{75}+\sqrt{108}$
c) $\sqrt{2}+\sqrt{8}+\sqrt{32}$
d) $\sqrt{3x^2}+\sqrt{12x^2}$
e) $\sqrt{5k}+\sqrt{80k}$
f) $\sqrt{50}-\sqrt{8}$
g) $\sqrt{28}+\sqrt{7}+\sqrt{175}$
h) $\sqrt{75}-\sqrt{27}$
i) $5\sqrt{2}-\sqrt{32}$
j) $\sqrt{72}-\sqrt{50}$
k) $\sqrt{12}+\sqrt{27}+\sqrt{75}$
i) $\sqrt{49x^4}+\sqrt{9x^4}$
m) $\sqrt{81x}-\sqrt{64x}$
n) $4\sqrt{8}+3\sqrt{2}$
o) $\sqrt{48}+\sqrt{27}$

E7) Efetue as multiplicações:

a) $\sqrt{4a}.\sqrt{10a}$, a>0
b) $\sqrt{5}.\sqrt[3]{5}$
c) $\sqrt{10}.\sqrt{2}$
d) $\left(\sqrt{k}\right)^2$
e) $\left(\sqrt{3x^2}\right)^2$
f) $3\sqrt{18}.5\sqrt{18}$
g) $\sqrt{48}.\sqrt{75}$
h) $\sqrt{24}.5\sqrt{3}$
i) $\left(\sqrt{3}\right)^1$
j) $\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)^2$
k) $\sqrt{3x}.\sqrt{12x}$
i) $3\sqrt{6}.5\sqrt{15}$
m) $2\sqrt{x}.5\sqrt{x}$, x>0
n) $\left(\sqrt{8x}\right)\left(\sqrt[3]{2xy}\right)$
o) $\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)$

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Da segunda equação temos $a^2b = 3$, ou seja, $a^2 = 3/b$. Substituindo este valor da a^2 na 1ª equação ficamos com:

$3/b + b = 4$
$b^2 - 4b + 3 = 0$

$b = 1$ ou $b = 3$

Substituindo b na 1ª equação, achamos os valores correspondentes de a:
$b = 1$ e $a = \pm\sqrt{3}$
$b = 3$ e $a = \pm 1$

Note entretanto que a raiz quadrada tem sempre um valor positivo, então devemos eliminar os resultados negativos. Além disso, de acordo com (II), **a** deve ser positivo. Sendo assim, as soluções válidas são b=1 e $a = \sqrt{3}$ e b=3 e a = 1. Logo,

$$\sqrt{4+2\sqrt{3}} = \sqrt{3}+1$$

De fato, se elevarmos $\left(\sqrt{3}+1\right)$ ao quadrado, encontraremos $\sqrt{4+2\sqrt{3}}$.

Esta solução apresentada merece duas observações importantíssimas:

1) Este é o princípio geral para transformar um radical duplo em uma soma de radicais simples, e pode ser usado quando você esquece a fórmula (que será apresentada) que resolve o problema diretamente, ou em problemas para os quais a referida fórmula não se aplica.

2) Se dois valores reais são iguais, então as suas partes racionais são iguais, e suas partes irracionais são iguais. Neste problema usamos que $2\sqrt{3} = 2a\sqrt{b}$ (equação (II)), apenas porque temos certeza (o problema deu este dado) que a e b são números racionais, ou seja, $2a\sqrt{b}$ é um "irracional puro", e $a^2 + b$ é um racional. Se essas informações não fossem fornecidas a respeito de a e b, não poderíamos formar essas equações.

A fórmula de transformação

Note que nem sempre é possível realizar a transformação de um radical duplo na soma de radicais simples. A transformação só funciona quando o número que está dentro do radical é um quadrado perfeito, ou seja, o quadrado de uma expressão do tipo $\sqrt{x}+\sqrt{y}$. Supondo que isto seja válido, vejamos a fórmula que realiza esta transformação.

Seja o valor $\sqrt{A \pm \sqrt{B}}$, ou seja, a fórmula que iremos deduzir serve tanto para $\sqrt{A+\sqrt{B}}$ como para $\sqrt{A-\sqrt{B}}$. Faremos a dedução para o caso da soma, o da diferença é análogo. Queremos determinar x e y, tais que:

$$\sqrt{A+\sqrt{B}} = \sqrt{x}+\sqrt{y}$$

Elevando ao quadrado temos:

$$A+\sqrt{B} = x+y+2\sqrt{xy}$$

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

e) $\sqrt{27}\times\sqrt[3]{9}$

j) $\sqrt{32}+2\sqrt{\frac{1}{2}}+6\sqrt{\frac{2}{9}}$

o)

E16) Efetue e simplifique

a) Coloque em ordem crescente
$\sqrt[3]{5},\sqrt{3},\sqrt[6]{26}$

b) Calcule $\sqrt{8}\times\sqrt{6}\times\sqrt{15\sqrt{2}}\times\sqrt{5\sqrt{6}}\times\sqrt[4]{3}$

c) Calcule $\sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2...}}}}}$

d) Calcule $\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{...}}}}}$

e) CN $\sqrt{16x^3y}-\sqrt{25xy^3}-(x-5y)\sqrt{xy}$
x e y positivos

f) CN $3\sqrt[3]{a^4b^4}+5a\sqrt[3]{ab^4}+b\sqrt[3]{a^4b}$

g) $\sqrt{32}+\frac{4\sqrt{48}}{\sqrt{6}}-\sqrt[4]{2500}-\left(\sqrt{2}\right)^3$

h) $\left(\frac{5}{\sqrt{3}+1}+\frac{3}{\sqrt{3}-1}\right)\times\frac{2}{4\sqrt{3}-1}$

i) $4\sqrt[4]{2500}+\frac{2}{\left(\sqrt{50}\right)^{-1}}+\frac{30}{\sqrt{2}-\sqrt{3}}$

j) $\sqrt[6]{512}-\left(\frac{1}{\sqrt{50}}\right)^{-1}+\frac{\sqrt{18}}{\sqrt{2}-1}$

E17) Efetue e simplifique

a) CN 65 $\frac{1}{\sqrt[3]{x}-1}$

b) CN 54 $\frac{c}{\sqrt[7]{b^4}}$

c) CN 55 $\frac{5+\sqrt{2}}{3-\sqrt{2}}$

d) $\frac{(-2)^{-5}\div\left[\left(-\sqrt{2}\right)^4\right]^{\frac{1}{2}}}{(-2)^{-1}\times(-2)^{-3}}$

e) $\frac{\left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{3}{2}}\times\left(\frac{2}{5}\right)^{-3}}{\left(\frac{1}{125}\right)^{-\frac{1}{3}}\div\left(\frac{1}{36}\right)^{0}}$

f) $\sqrt{9-\sqrt{5}}\sqrt{9+\sqrt{5}}$

g) $\sqrt{1+2\sqrt{2}}\sqrt{2-\sqrt{2}}$

h) $\sqrt{(2+\sqrt{3})\sqrt{7-4\sqrt{3}}}$

i) CN 59 $\frac{(2+\sqrt{3})(3-\sqrt{3})}{(2-\sqrt{3})(3+\sqrt{3})}$

j) Calcule $\frac{15}{3\sqrt{6}-2}$

k) $\sqrt[4]{7+4\sqrt{3}}$

l) $\sqrt{2-\sqrt{3}}$

m) $\sqrt{\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3-\sqrt{5}}}}$

n) $\frac{3\sqrt{5}-4\sqrt{2}}{2\sqrt{5}-3\sqrt{2}}$

o) Simplifique $\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x-\sqrt{x-3}}}$

E18) Efetue e simplifique

a) $\left(\left(\sqrt[3]{2}\right)^6+\sqrt{\sqrt[3]{16}}\right)\times\left(\frac{3}{2}\sqrt[3]{16}-2\sqrt[12]{16}\right)$

f) Simplifique

$$\frac{2x^2-5x+3}{3x^2+x-4}\times\left(\frac{2x^2+3x-9}{3x^2+13x+12}\right)^{-\frac{1}{2}}$$

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

E42) Resolver $x^2+\sqrt{12}x-28=0$?

E43) Quantas soluções reais possui a equação $\sqrt{x+1+\sqrt{x}}=\sqrt{x+\sqrt{x+7}}$?

(A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1 (E) 0

E44) CN 85 - Considere a soma de n parcelas $S = n^{15} + n^{15} + n^{15} + ... + n^{15}$. Sobre as raízes da equação $\sqrt[4]{S}=13n^2-36$ podemos afirmar que:

(A) seu produto é –36 (B) sua soma é nula (C) sua soma é 5
(D) seu produto é 18 (E) seu produto é 36

E45) Determine o domínio da função $f(x)=\frac{1}{\sqrt{20-x}}-\frac{1}{\sqrt{x-5}}$

(A) [5, 10) (B) (5, 10) (C) (5, 20) (D) (5, 22) (E) $(-\infty,+\infty)$

E46) Resolver a equação $4^x - 18.2^x + 32 = 0$. Qual é a diferença entre as duas soluções?

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4

E47) Resolver a equação $3^{3x+1} = 9^x$.

(A) x = –2 (B) x = –1 (C) x = 0 (D) x = 1 (E) x = 2

E48) Resolver $\frac{1}{x+\sqrt{x}}+\frac{1}{x-\sqrt{x}}\le 1$

E49) (*) Resolver $\sqrt[3]{x+9}-\sqrt[3]{x-9}=3$

E50) Quais são as raízes reais da equação $x^2+18x+30=2\sqrt{x^2+18x+45}$?

E51) CN 84 - A soma das raízes da equação $x^2-6x+9=4\sqrt{x^2-6x+6}$ é:

(A) 6 (B) –12 (C) 12 (D) 0 (E) –6

E52) Resolver $\sqrt{x+10}+\sqrt[4]{x+10}=12$.

E53) Resolver a equação $x^{2/3} - 6x^{1/3} + 8 = 0$

E54) Quantas soluções reais tem a equação $\sqrt{x-5}+3=2$?

E55) Resolver $(x^2 - 3x + 2)(x^2 - 3x - 4) - (x^2 - 6x + 8) = 0$

E56) Resolver $2^{2x} - 3.2^x - 4 = 0$

E57) Resolver $(x^2 - 3x)^2 = 4 - 3.(3x - x^2)$

E58) (*) Determine $c \in R$ tal que $x^2-4x-c=\sqrt{8x^2-32x-8c}$ tenha exatamente duas soluções reais para x.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

E35) CN 83 - O maior valor de y na solução do sistema

$$\begin{cases} \sqrt[4]{x}+\sqrt[5]{y}=3 \\ \sqrt{x}+\sqrt[5]{y^2}=5 \end{cases}$$ é:

(A) 1 (B) 16 (C) 32 (D) 64 (E) 128

E36) CN 84 - No sistema

$$\begin{cases} x^3-3x^2y+3xy^2-y^3=8 \\ (x^2-y^2)(x^2-2xy+y^2)=12 \end{cases}$$

a soma dos valores de x e y é:

(A) 1 (B) 3/4 (C) 2/3 (D) 4/3 (E) 3/2

E37) CN 87 - O sistema

$$\begin{cases} x^2-\sqrt{5}x=8000 \\ 0{,}001x-y=5000 \end{cases}$$

(A) tem apenas uma solução (x, y), x<0 e y<0.
(B) tem apenas uma solução (x, y), x>0 e y<0.
(C) tem apenas uma solução (x, y), x<0 e y>0.
(D) tem duas soluções
(E) não tem soluções

E38) CN 88 - Sobre o sistema:

$$\begin{cases} x^{-2}+\sqrt[4]{y}=7/6 \\ x^{-4}-\sqrt{y}=7/36 \end{cases}$$

pode-se afirmar que:

(A) é impossível (B) é indeterminado (C) x = 1/2 (D) $x=\frac{\sqrt{6}}{3}$ (E) y = 1/16

CONTINUA NO VOLUME 2: 90 QUESTÕES DE CONCURSOS

Respostas dos exercícios

E1) (D) E2) $x=\frac{a}{b}\sqrt{a^2+b^2}$ e $y=\frac{b}{a}\sqrt{a^2+b^2}$ E3) (B)

E5) (B) E6) (D) E7) (D) E8) (C) E9) (D)

E10) (A) E11) 3 ou 9 E12) 9 E13) 6 E14) $2ab = b^2 - c^2$

E15) 2 E16) 35/18 E17) 8 ou –9 E18) (C) E19) (C)

E20) (1, 4) ou (4, 1) E21) (0, –5) ou (3, 4)

E22) (4, 2) ou (–4, –2) E23) S = {(3, 2), (3, –2), (–3, 2), (–3, –2)}

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

O trinômio será negativo para x compreendido entre as raízes, que são –2 e 3.

Resposta: $-2 < x < 3$

Exercícios

E3) Resolver as inequações

a) (*) $|x^2 - 5x + 6| < 12$

b) $|x+1| > \sqrt{x^2+1}$

c) $\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2-4} \leq 8^{x+2}$

d) $\frac{x^2-4x+3}{x-2} > 0$

e) (*) $|x^2 + x + 1| \leq |x^2 + 2x - 3|$

f) $\frac{x}{x+6} \geq \frac{1}{x-4}$

g) (*) $\left(\frac{1}{5}\right)^{x^2+2} \geq \left(\frac{1}{125}\right)^{x}$

h) $x + \frac{1}{x} \leq 2$

Exercícios de revisão

E4) Encontre um valor não nulo para c tal que o intervalo aberto (–3c, c) seja solução da inequação $x^2 + 2cx - 6c < 0$.

E5) Juquinha toma uma peça de arame com 12 dm e o dobra em duas partes, uma com medida x e outra com medida 12 – x. A seguir dobra as duas peças de arame para formar dois quadrados. Encontre os valores de x tais que a soma das áreas dos dois quadrados seja menor que 5 dm^2.

(A) $(0, 4) \cup (8, \infty)$ (B) (4, 8) (C) (4, 6) (D) (5, 8) (E) (5, 12)

E6) Resolver $x^3 - 1 < 13x - 13$.

(A) $-4 < x < 3$ (B) $x < -4$ ou $1 < x < 3$ (C) $x < -3$ (D) $-4 < x < 1$ ou $x > 3$ (E) $x < 3$

E7) Se x é um número inteiro, encontre a soma de todos os valores distintos de x tal que:

$(x - 1)^2.(x - 4).(x + 2) < 0$

(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7 (E) 9

E8) Resolver $x^2 + x - 12 < -6$

E9) Resolver $x^2 - 7x + 12 < 0$

(A) (-3, 4) (B) (3, 4) (C) (–4, 3) (D) (4, ∞) (E) (2, 3)

E10) (*) Resolver a inequação $(2x - 1)^2 \leq 9$

(A) [-1, 1] (B) (–1, 2] (C) $(-\infty, -1] \cup [2, \infty)$ (D) $(-\infty, -1) \cup (2, \infty)$ (E) [–1, 2]

E11) CN 88 - Um subconjunto do conjunto solução da inequação $\frac{1+4x-x^2}{x^2+1} > 0$ é:

(A) $\{x \in R \mid x > 5\}$ (B) $\{x \in R \mid x < 2\}$ (C) $\{x \in R \mid x < 0\}$
(D) $\{x \in R \mid 0 < x < 4\}$ (E) $\{x \in R \mid -1 < x < 3\}$

E12) Resolver $x^3 + x^2 - 2x \geq 0$.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Onde k e m são inteiros positivos tais que x e y sejam primos maiores que 3, e os números ***d*** e ***e*** podem valor 1 ou 2. Escrevemos então:

$x^2 - y^2 = (x + y)(x - y) = (3k + 3m + d + e)(3k - 3m + d - e)$

Como os números ***d*** e ***e*** só podem valor 1 ou 2, de forma independente, só podem ocorrer duas situações:

a) ***d*** e ***e*** iguais: Fará com que o segundo fator acima seja igual a (3k – 3m), um múltiplo de 3.
b) ***d*** e ***e*** diferentes (1 e 2): A soma d + e valerá 3, portanto o primeiro fator (3k + 3m + d + e) = (3k + 3m + 3) será múltiplo de 3.

Isto mostra que se x e y forem primos, não poderão ser divisíveis por 3, e sua diferença de quadrados necessariamente terá um fator 3.

Logo $x^2 - y^2$, com x e y primos maiores que 3, é um múltiplo de 24.

Nas questões de aritmética avançada, a álgebra sozinha não resolve, mas ajuda a chegar à solução, principalmente com o uso de fatoração e produtos notáveis.

Este é um livro de álgebra, e todos os exercícios e questões aqui apresentados podem ser resolvidos usando apenas álgebra.

Exercícios

E1) Se cada dimensão de um retângulo for aumentada de 5 cm, uma dimensão se tornará o dobro da outra e a área aumentará de 95 cm^2. Encontre as dimensões originais.

E2) (*) (CN 82) - Ao extrairmos a raiz cúbica do número natural N, verificamos que o resto era o maior possível e igual a 126. A soma dos algarismos de N é:

(A) 11 (B) 9 (C) 8 (D) 7 (E) 6

E3) A diferença entre dois números é 10. Qual é o menor dos dois números, se esta diferença excede a raiz quadrada do maior deles, em duas unidades?

E4) A soma dos quadrados de dois números inteiros e positivos é 41. Achar esses números, sabendo que são consecutivos.

E5) (CN) A soma de dois números é 13. O primeiro mais a raiz quadrada do segundo é 5. Achar os números.

E6) (*) Um indivíduo que fez uma viagem de 6300 km, teria gasto menos 4 dias se percorresse mais 100 km por dia. Quantos dias gastou na viagem e quantos km percorreu por dia?

E7) (CN) Certa quantia é dividida em partes iguais, por um determinado número de pessoas. Se aumentássemos de 6 o número de pessoas, cada um receberá R$ 6,00 a menos, e se ao contrário, o número de pessoas diminuir de 2, cada um receberá R$ 3,00 a mais. Achar o número de pessoas e a parte de cada uma.

E8) (CN) Um tonel continha 100 litros de vinho puro. Retirou-se certa quantidade de vinho, que foi substituída por água. Em seguida retirou-se igual quantidade de mistura, que também foi substituída por água. Quantos litros foram retirados de cada vez, se a mistura final tem 64 litros de vinho puro?

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

a igualdade valerá somente quando os expoentes forem iguais. Este resultado é apresentado no ensino fundamental sem o uso da noção de função e de injetividade, mas matematicamente é isto o que ocorre. Por isso, se fizermos $f(x) = 2^x$ (injetiva), podemos usar que $f(x + 2) = f(4x)$, logo $x + 2 = 4x$, o que resulta em $x = 2/3$.

Outras funções injetivas, que permitem cálculo similar na resolução de equações, são:

x^3, x^2 (para $x \geq 0$), $\sqrt{x}$, $\sqrt[3]{x}$

Note que x^2 não é injetiva se removermos a restrição $x \geq 0$, já que na parábola, temos valores diferentes de x (exemplo: 3 e –3) que resultam em valores iguais de y (no caso 9).

Uma função injetiva necessita ser estritamente crescente ou estritamente decrescente.

Existe ainda a classificação de uma função como *sobrejetiva*, o *sobrejetora*. É aquela em que todos os pontos do contradomínio pertencem à imagem, ou seja, para qualquer elemento y do contradomínio, existe um x tal que $y = f(x)$. Lembramos que no contradomínio é permitido que "sobrem elementos", ao contrário do que ocorre no domínio (elementos x que não resultam em nenhum y devem ser eliminados do domínio). No caso em que todos os elementos do contradomínio possuem um x correspondente, a imagem coincide com o contradomínio, e a função é sobrejetiva.

Quando uma função é ao mesmo tempo, injetiva e sobrejetiva, dizemos que ela é *bijetiva*, *bijetora*, ou uma *bijeção*.

Translação de eixos

Considere uma função qualquer $y = f(x)$, com um determinado gráfico dado. Investiguemos o que ocorre quando a função é modificada para a forma:

$y - a = f(x)$

Isso é o mesmo que fazer $y = f(x) + a$. Portanto, para cada valor de y, somamos **a**. No gráfico de f, este novo parâmetro **a** tem como efeito, subir a curva de **a** unidades.



Portanto, dado o gráfico de $y = f(x)$, para obter o gráfico de $y - a = f(x)$ (considerando a positivo), ou $y = f(x) + a$, basta mover o gráfico original para cima, de **a** unidades.

Analogamente, para obter o gráfico de $y + a = f(x)$, o mesmo que $y = f(x) - a$, basta mover o gráfico original para baixo, de a unidades. Sendo assim, a troca de y por $y - a$ provoca uma movimentação do gráfico, para cima ou para baixo.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner



O gráfico dado no enunciado é similar ao gráfico de $y=\sqrt{x}$ da figura ao lado, exceto que está deslocado de duas unidades para a direita. Como sabemos, esse tipo de deslocamento é obtido quando trocamos x por x – 2 na fórmula da função.

Sendo assim, o gráfico do enunciado é $y=\sqrt{x-2}$

Resposta: (D)

Função par e função ímpar

Uma função é classificada como ***par***, quando o troca do valor de x por –x não altera o seu valor, ou seja, f(x) = f(–x). Por exemplo, $f(x) = x^2$ é uma função par.

Analogamente, uma função é classificada como ***ímpar***, quando o troca do sinal de x provoca a troca do sinal de f(x), ou seja, f(–x) = –f(x). Por exemplo, $f(x) = x^3$ é uma função ímpar.

A figura abaixo mostra exemplos de função par e função ímpar. A função par tem uma simetria em relação ao eixo y, já que f(x) = f(–x). Valores simétricos de x resultam em valores iguais de y, portanto os pontos (x, y) e (–x, y) pertencem ao gráfico.





Na função ímpar, existe uma simetria em relação à origem, e sempre teremos o gráfico da função passando pela origem (f(0) = 0). Como a troca do sinal de x provoca a troca do sinal de f(x), temos que se (x, y) pertence ao gráfico, (–x, –y) também pertence ao gráfico.

Note que nem toda função pode ser classificada como par ou ímpar. Por exemplo, $f(x) = x^2 +$ 3x + 5 não é par nem ímpar. Entretanto, qualquer função pode ser decomposta como a soma de uma função para com uma ímpar. No caso de $f(x) = x^2 + 3x + 5$, tempos $P(x) = x^2 + 5$ (par(e I(x) = 3x (ímpar).

Teorema: Qualquer função f(x) pode ser decomposta como a soma de uma função par P(x) e uma função ímpar I(x).

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Solução:
Usemos a propriedade F(x + y) = F(x).F(y) para calcular o valor de F(0).
F(0) = F(0 + 0) = F(0).F(0), já que a propriedade vale para quaisquer x e y reais.
Chamando F(0) de k, ficamos com:
$k = k^2 \rightarrow k^2 - k = 0 \rightarrow k = 0$ ou $k = 1$
Ocorre que a função é de R em R_+, portanto F(0) não pode ser zero, então concluímos que F(0) = 1

Resposta: (C)

E10) Seja f(n) = n(n + 1), onde n é um número natural. Encontre um par (a, b) tal que 2.f(b) + 2 = f(a) e a = b + 2.

Solução:
A função f, de acordo com o enunciado, tem como domínio o conjunto dos números naturais, então como o problema envolve f(b) e f(a), os números a e b são necessariamente números naturais. O problema apresentou ainda uma fórmula para calcular o valor da função para qualquer natural n, que é n(n + 1). Então f(a) = a(a + 1) e f(b) = b(b + 1).
As condições dadas pelo problema para encontrar **a** e **b** são:

$2b(b+1) + 2 = a(a + 1)$ (I)
$a = b + 2$ (II)

Nada mais é que um sistema de 2 equações com 2 incógnitas. Usamos o valor de a em função de b dado na equação (II) e substituímos na equação (I):

$2b(b + 1) + 2 = (b + 2)(b + 3)$
$2b^2 + 2b + 2 = b^2 + 5b + 6$
$b^2 - 3b - 4 = 0$
$b = -1$ ou $b = 4$
Como a função tem como domínio o conjunto dos números naturais, b não pode ser –1. A única solução é b = 4, o que resulta em a = 6.
De fato, os valores a = 6 e b = 4 atendem às duas condições
a = b + 2 e
2.f(4) + 2 = f(6), ou seja, 2.4.5 + 2 = 6.7

Resposta: a = 6 e b = 4

E13) Dado um número real x, a função maior inteiro $\lfloor x \rfloor$ (também chamada *piso de x* ou *característica de x*), associa a x o maior inteiro menor ou igual a x. Por exemplo, $\lfloor 3{,}2 \rfloor = 3$ e $\lfloor -4{,}5 \rfloor = -5$. Qual das seguintes afirmações é verdadeira para todo real x?

P: $\lfloor 4x \rfloor = 4\lfloor x \rfloor$ Q: $\lfloor x+2 \rfloor = \lfloor x \rfloor + 2$ R: $\lfloor x+y \rfloor \geq \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor$
S: $\lfloor x+y \rfloor = \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor$ T: $\lfloor -x \rfloor = -\lfloor x \rfloor$

(A) São todas verdadeiras (B) P, Q, R, S (C) S e Q (D) R e Q (E) P, Q, R

Solução:
A função característica é um assunto mais explorado no ensino superior, mas pode aparecer em concursos baseados no ensino fundamental dessa forma: uma definição seguida de perguntas.
De acordo com a definição, ficam claros alguns resultados adicionais como:
$\lfloor 4 \rfloor = 4$, $\lfloor 4{,}1 \rfloor = 4$, $\lfloor -5 \rfloor = -5$, $\lfloor -51 \rfloor = -6$, $\lfloor 1 \rfloor = 1$, $\lfloor 0{,}5 \rfloor = 0$, $\lfloor 0 \rfloor = 0$, $\lfloor -0{,}3 \rfloor = -1$
Passemos a analisar as afirmativas do problema:
P: $\lfloor 4x \rfloor = 4\lfloor x \rfloor$, é FALSA, basta checar o contraexemplo: $\lfloor 4 \times 1{,}9 \rfloor = \lfloor 7{,}6 \rfloor = 7 \neq 4\lfloor 1{,}9 \rfloor$
Q: $\lfloor x+2 \rfloor = \lfloor x \rfloor + 2$, verdadeira, a característica segue a lógica da "parte inteira".

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

E6) $[5, +\infty)$ E7) $(-2, 5)$ E8) (E) E9) (C) E10) (D)

E11) (A) E12) (D) E13) (D) E14) (D) E15) $x = 0$

E16) (3) E17) 11 E18) R E19) (E) E20) (B)

E21) $y = 9 - x^2$ E22) (B) E23) (D) E24) (A)

E25) $b \geq \sqrt{80}$ ou $b \leq -\sqrt{80}$ E26) $t = 6$ E27) (C) E28) 1

E29) (A) E30) (C) E31) (D) E32) (D) E33) (D)

E34) (B) E35) (D) E36) (A) E37) (A) E38) (B)

E39) (D) E40) (D) E41) (D) E42) (B) E43) (C)

E44) (C) – considerando divisores positivos e negativos

E45) (A) E46) 11 E47) (A) E48) (D) E49) (E)

E50) (C) E51) (A) E52) (E) E53) $x = 0$ E54) $(-2, 5)$

E55) R E56) (E) E57) (A) E58) (C)

Resoluções selecionadas

E12) Encontre a equação da parábola que passa por $(-2, 0)$, $(-4, -9)$ e $(0, 5)$.

(A) $f(x) = -x^2 + 3x + 5$ (B) $f(x) = x^2 - 3x - 10$ (C) $f(x) = (1/2)x^2 + (3/2)x + 5$
(D) $f(x) = (-1/2)x^2 + (3/2)x + 5$ (E) $f(x) = 2x^2 - 6x - 10$

Solução:
Dados três pontos quaisquer, desde que não estejam em linha reta, seupre podemos encontrar uma parábola da forma $y = ax^2 + bx + c$ que passe por esses três pontos, bastando para isso resolver o sistema de três incógnitas (a, b e c) e três equações, dadas por $y1 = f(x1)$, $y2 = f(x2)$ e $y3$ a $f(x3)$. O ideal em uma prova é procurar ganhar tempo nessa resolução.
Se a parábola passa por $(0, 5)$ então $f(0) = 5$, ou seja, $c = 5$. Portanto só servem as opções A, C e D.
O problema deu também que a parábola passa por $(-2, 0)$, então $f(-2) = 0$:
(A): $f(-2) = -4 - 6 + 5 = 5$: não serve
(C): $f(-2) = 4/2 - 3 + 5 = 4$: não serve
(D): $f(-2) = -2 - 3 + 5 = 0$: serve
A opção (D) é a única que atende a duas condições do problema, é a única resposta que pode estar certa.
Para conferir, verifiquemos se esta função passa pelo ponto $(-4, -9)$:
$f(-4) = (-1/2).16 + (3/2).(-4) + 5 = -8 - 6 + 5 = 9$: OK!

Resposta: (D)

E13) Uma pizzaria vende uma pizza por R$ 30,00 e está estruturada para vender 40 pizzas por dia. Para cada redução de R$ 0,50 no preço da pizza, exatamente 1 venda adicional é realizada. Encontre a fórmula que relaciona o número de pizzas vendidas com o número de reduções de R$ 0,50 no preço e dê o número de reduções de R$ 0,50 que resulta no maior valor vendido.

Scanned by CamScanner

(A) 8 (B) 5 (C) 1 (D) 10 (E) 14

Solução:
Originalmente eram vendidas 40 pizzas por R$ 30,00 cada, totalizando vendas de R$ 1200,00.
O objetivo é aumentar o valor recebido com as vendas, com a redução no preço da pizza acompanhada do aumento do número de unidades vendidas.
OBS: Na vida real, o objetivo não é maximizar o valor recebido, mas sim, o valor lucrado total.
O problema diz que com cada redução de 0,50 no preço da pizza, ocorre o aumento de uma unidade na quantidade de pizzas vendidas.
Sendo assim, com n reduções de 0,50, ocorrerá um aumento de n unidades vendidas.
Com n reduções de R$ 0,50 o preço de venda de cada pizza será R$ (30 – n.0,5), e o número de unidades vendidas será 40 + n.
Então o valor recebido com as vendas será:
$(40 + n)(30 - 0{,}5n)$.
É uma parábola que tem máximo quando n é a média aritmética das raízes:
$(-40 + 60)/2 = 10$
Portanto, n = 10 (10 reduções de 0,50) resultará no máximo do valor recebido com as vendas (faturamento) será dado por:
Preço de cada unidade: $30 - 0{,}5.10 = 25$
Quantidade vendida: $40 + 10 = 50$
Valor total recebido: $25 \times 50 = R\$\ 1250{,}00$

Resposta: (D) 10 reduções

E14) Uma parábola da forma $y = ax^2 + bx + c$ intercepta o eixo x nos pontos –4 e –2, e a ordenada do seu vértice é 6. Determine o valor da ordenada do ponto onde a parábola intercepta o eixo y.

(A) 4 (B) 13/3 (C) 14/3 (D) –48 (E) 16/3

Solução:
Quando são dadas as duas raízes, é melhor usar a forma fatorada da parábola, pois ficará faltando determinar apenas o coeficiente **a**:
$y = a(x - x_1)(x - x_2)$,
$y = a(x + 2)(x + 4)$
A ordenada do vértice (valor de y) é obtida quando fazemos x igual à média aritmética das raízes (x = –3).
$6 = a(-3 + 2)(-3 + 4)$
$6 = a(-1)(1) = -a$
$a = -6$
Então a equação da parábola é:
$y = -6(x + 2)(x + 4) = y = -6(x^2 + 6x + 8) = -6x^2 - 36x - 48$
Fazendo x = 0, resulta em y = –48, logo o ponto onde a parábola corta o eixo y é (0, –48)
Resposta: (D)

E19) Uma função quadrática tem vértice no ponto (–2, 5). Se o ponto (1, 4) pertence ao seu gráfico, qual é a equação desta função?

(A) $y = (1/3)(x - 2)^2 + 5$ (B) $y = (-1/3)(x + 2)^2 + 5$ (C) $y = (1/4)(x + 2)^2 + 1$
(D) $y = (1/9)(x - 2)^2 + 5$ (E) $y = (-1/9)(x + 2)^2 + 5$

Solução:
Quando é dado o vértice, a forma mais rápida é considerar uma parábola da forma $y = ax^2$, que sofreu uma translação da origem para este vértice. Se o vértice é (x^v, y^v), a equação fica:

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Equações envolvendo polinômios

A igualdade $p(x) = q(x)$ pode ser uma identidade se os polinômios $p(x)$ e $q(x)$ forem identicamente iguais, ou seja, polinômios de mesmo grau e com os respectivos coeficientes iguais. Caso contrário, os polinômios não serão identicamente iguais (ou seja, iguais para qualquer valor de x), mas sim, iguais para certos valores de x. Nesse caso, a expressão $p(x) = q(x)$ é uma equação, cujas soluções são aqueles valores de x que tornam as expressões iguais. Algebricamente, nem sempre existe forma para encontrar analiticamente as soluções, ou seja, resolver a equação. Existem entretanto alguns casos em que é possível encontrar analiticamente essas soluções, e várias técnicas a serem utilizadas. Neste capítulo veremos algumas ferramentas que nos permitem resolver tais equações polinomiais. Por exemplo, a fórmula quadrática nos permite encontrar as soluções de equações do 2º grau. Aliando as técnicas de fatoração com a fórmula quadrática, é possível encontrar a solução de equações do 3º grau, apesar de existir uma fórmula (bastante trabalhosa) para encontrar a solução de uma equação do 3º grau. O *teorema das raízes racionais* permite encontrar facilmente raízes possíveis para uma equação de grau superior, desde que os coeficientes da equação sejam racionais. O *teorema de Bolzano* permite determinar intervalos nos quais existem raízes. As *fórmulas de Girard* determinam relações entre coeficientes e raízes, ajudando bastante na localização dessas raízes.

Divisibilidade entre polinômios

Uma das operações com polinômios mais utilizada é identificar se um determinado polinômio é divisível por outro. Isto permite a sua fatoração, o que pode facilitar a solução de equações polinomiais, ou seja, encontrar suas raízes. Dizemos que $P(x)$ é divisível por $D(x)$ quando existe um polinômio $Q(x)$ tal que

$$P(x) = D(x) \cdot Q(x)$$

Ou seja, a divisão entre $P(x)$ e $D(x)$ dá um resultado exato $Q(x)$, sem resto. Por exemplo:

$P(x) = x^3 - 8$
$D(x) = x - 2$

Fatorando $P(x)$ como uma diferença de cubos (capítulo 5), vemos claramente que

$$x^3 - 8 = (x - 2).(x^2 + 2x + 4)$$

Dizemos assim que $x^3 - 8$ é divisível por $x - 2$, já que o quociente, sem resto, de sua divisão, é $x^2 + 2x + 4$.

Da mesma forma, $x^3 - 8$ é também divisível por $x^2 + 2x + 4$, já que o quociente da sua divisão, sem resto, é $x - 2$.

Quanto identificamos que um polinômio de maior grau, é divisível por outro de menor grau (claro, também é válido quando os polinômios são de mesmo grau, no caso um seria igual ao outro multiplicado por uma constante), podemos fatorar o maior deles, como sendo um múltiplo do menor, o que facilita simplificações e resolução de equações.

Um caso de interesse particular é a identificação da divisibilidade de um polinômio $P(x)$ por um polinômio do 1º grau. Este resultado é o chamado *teorema do resto*.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

O teorema das raízes racionais nem sempre tem o poder de tornar uma equação extremamente fácil. Se tivermos por exemplo uma equação do 3º grau com coeficientes 24 e 35 nos termos em x^3 e em x^0, a lista de "suspeitos" para as raízes será muito grande, envolverá não somente os positivos e negativos (como é de praxe), mas combinações de numeradores com os fatores 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24 no denominador, e 1, 5, 7 e 35 no denominador. Muitas vezes é mais fácil "chutar" raízes 1 e –1, que quase sempre são usadas nas questões pela sua simplicidade. Felizmente as questões que envolvem o uso do teorema das raízes racionais usam equações com raízes simples, como ±1 ou ±2, no caso de uma banca de bom senso, pois é mais importante testar se o candidato sabe usar o teorema que tortura-lo com cálculos em exagero. Infelizmente o bom senso nem sempre pode ser esperado. O grande matemático René Descartes dizia que "O bom senso é a coisa do mundo mais bem distribuída: todos pensamos tê-lo em tal medida que até os mais difíceis de contentar nas outras coisas não costumam desejar mais bom senso do que aquele que têm".

Teorema de Bolzano

Este é um poderoso teorema do cálculo diferencial e integral que pode ser aplicado como uma útil ferramenta para resolução de equações. Vejamos a versão simplificada, para uso na resolução de equações polinomiais. A ideia é bastante simples: Se P(a) é positivo e P(b) é negativo (ou vice-versa), então existe uma raiz de P(x) no intervalo [a, b]. Nem toda função possui esta propriedade, válida pelo fato das funções polinomiais serem contínuas.



No exemplo ao lado, temos f(a) < 0 e f(b) > 0, ou seja, a função f apresenta uma troca de sinal para algum valor entre a e b. Como a função f é contínua (isto inclui todos os polinômios), isto garante que f pelo menos tem uma raiz entre a e b.

Podemos aplicar o teorema de Bolzano juntamente com o teorema das raízes racionais para encontrar raízes em potencial. Sabendo os valores possíveis de acordo com o teorema das raízes racionais e intervalos nos quais existem raízes, usando o teorema de Bolzano, podemos achar mais rapidamente as raízes, reduzindo o número de escolhas.

Lembre de, sempre que for encontrada uma raiz, fazer a divisão da expressão por (x – a) para continuar investigando uma equação mais simples.

Relações de Girard

Finalmente temos a última fórmula deste livro, amplamente utilizada na solução de problemas envolvendo polinômios e equações: as relações de Girard.

Tais relações são uma generalização das relações entre coeficientes e raízes das equações de 2º grau. No capítulo 13, vimos que em uma equação do 2º grau $ax^2 + bx + c = 0$, suas raízes x_1 e x_2 estão relacionadas com os coeficientes da equação da seguinte forma:

Scanned by CamScanner

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \qquad x_1.x_2 = \frac{c}{a}$$

As relações de Girard são fórmulas semelhantes, envolvendo os coeficientes e as raízes de equações de grau maior. Dada a equação polinomial de grau n,

$$a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \ldots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 = 0$$

Temos as seguintes relações:

$$x_1 + x_2 + x_3 + \ldots + x_n = -\frac{a_{n-1}}{a_n}$$

$$x_1.x_2 + x_1.x_3 + x_1.x_4 + \ldots + x_1.x_n + x_2.x_3 + x_2.x_4 + \ldots + x_{n-1}.x_n = +\frac{a_{n-2}}{a_n}$$

...

$$x_1.x_2 \ldots x_n = (-1)^k \frac{a_0}{a_n}$$

As relações listam, na ordem, a soma das raízes, a soma dos produtos das raízes tomadas dois a dois, a soma dos produtos das raízes, tomadas 3 a 3, até que no último termo aparece o produto das raízes. Parcelas ímpares aparecem multiplicadas por (–1). Cada parcela tem simplesmente o coeficiente correspondente ao termo do polinômio dividido pelo termo de maior grau, afetado do sinal negativo quando for o caso.

Exemplo: Encontrar as relações de Girard para as raízes da equação
$x^3 + 6x^2 + 3x - 10 = 0$

Solução:

1) $x_1 + x_2 + x_3 = -(6/1) = -6$
2) $x_1.x_2 + x_1.x_3 + x_2.x_3 = +3/1 = 3$
3) $x_1.x_2.x_3 = -(-10)/1 = 10$

Exercícios

E14) Qual a soma das raízes de $x^4 - 2x^3 - x^2 + 2x$?

E15) Encontre a soma das raízes de $f(x) = 2x^3 - 14x + 12$

(A) 0 (B) 1 (C) 4 (D) –4 (E) NRA

E16) Encontre a soma das raízes de $4x^3 - 4x^2 - 7x = 0$.

Exercícios de revisão

E17) Encontre os zeros do polinômio $f(x) = x^3 - 9x^2 + 26x - 24$

E18) Calcule **a** para que o resto da divisão de $x^3 - 2x^2 - 5x + 9$ por $x - a$ seja 9.

E19) Quando o polinômio $P(x) = x^4 - 8x^3 - 7x^2 + 3$ é dividido por $x^2 + x$, o resto é $ax + 3$. Qual é o valor de a?

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Verificando:

$x = -1 \rightarrow E = -1 + 1 - 1 - 1 + 1 - 1 + 2 = 0$

Portanto x é o único valor real que anula a expressão.

Calculando a soma de x^2 com seu inverso:

$x^2 + 1/x^2 = 1 + 1 = 2$

Resposta: (D)

■

Scanned by CamScanner

LAÉRCIO VASCONCELOS

O ALGEBRISTA

O AUTOR, LAÉRCIO VASCONCELOS.

Engenheiro eletrônico formado pelo IME - Instituto Militar de Engenharia. Foi 1º colocado no concurso de admissão ao Colégio Naval e 2º colocado no concurso de admissão ao IME. Especialista em informática, autor de 55 livros, foi professor da turma IME-ITA do colégio Bahiense, professor do IME e de vários outros cursos e colégios, em turmas preparatórias para vestibulares e para concursos públicos.

CAPÍTULOS

1. NÚMEROS INTEIROS
2. NÚMEROS RACIONAIS, IRRA[illegible]AIS
3. EXPRESSÕES ALGÉBRICAS
4. PRODUTOS NOTÁVEIS
5. FATORAÇÃO
6. MMC E MDC
7. FRAÇÕES ALGÉBRICAS
8. EQUAÇÕES DO 1º GRAU
9. SISTEMAS DE EQUAÇÕES DO 1º GRAU
10. PROBLEMAS DO 1º GRAU
11. TÓPICOS DE ANÁLISE
12. INEQUAÇÕES DO 1º GRAU
13. EQUAÇÕES DO 2º GRAU
14. CÁLCULO DE RADICAIS
15. EQUAÇÕES REDUTÍVEIS AO 2º GRAU
16. SISTEMAS DO 2º GRAU
17. INEQUAÇÕES E SISTEMAS DO 2º GRAU
18. PROBLEMAS DO 2º GRAU
19. FUNÇÕES
20. TRINÔMIO DO 2º GRAU
21. POLINÔMIOS

SINOPSE

ALGEBRISTA é todo aquele que possui grande habilidade em álgebra. Para passar nos concursos do Colégio Naval e EPCAr, o aluno precisa de tornar um algebrista. Para iniciar um prepare para concurso para o IME ou ITA, antes de mais nada o aluno precise ser um algebrista, dada a complexidade das questões e ao curto tempo para resolver cada questão. No Brasil, vários pedagogos chamam de "algebrista" o professor que "tortura" o aluno com problemas algébricos complicados, enquanto no exterior o termo é considerado um elogio.

Independentemente da orientação educacional aplicada (álgebra mais fácil ou difícil), o fato é que a aprovação nesses concursos, o candidato precisa ser bem preparado em álgebra. Nesse sentido, o ALGEBRISTA deste livro se refere às habilidades algébricas que o aluno deve ter para enfrentar esses recursos. O livro completo tem 2 volumes. O volume 1 traz a teoria e exercícios de fixação e de média dificuldade, mais que suficientes para os concursos de dificuldade moderada, como o ENEM. O volume 2 é focado em questões de concursos.

O livro é focado nos concurso para o Colégio Naval e EPCAr, e ainda é mais que suficiente para cobrir os concursos para o Colégio Militar, ensino médio. Não é suficiente para cobrir os concursos do IME e ITA, mas é a base necessária para estudar a seguir, a matemática do ensino médio a nível profundo. Ideal por exemplo para ser estudado um ano antes da realização da turma IME-ITA.

LVC

Visite nosso site e nossa loja virtual:
www.laercio.com.br

Agência Brasileira do ISBN
ISBN 978-85-86770-22-7
9 788586 770227

Scanned by CamScanner